

Diagnosen neuer italienischen Arten.

Von

M. Paulucci.*)

1. *Vitrina Paulucciae Fischer.*

Testa minutissime perforata, orbiculato-subglobosa, tenuis, fragilis, pellucida, lutescens, haud polita nec nitida; apice papilloso, subexerto; anfractus $3\frac{1}{2}$, regulariter crescentes, convexi, subtiliter et peculiariter striati, obsolete plicatuli vel annulosi, striis conspicuis, densis, parum obliquis; anfractus ultimus amplius, parum descendens; apertura obliqua, transversim ovoidea, dimidium latitudinis paulo superans, sed $\frac{2}{3}$ non attinens, marginibus regulariter arcuatis; labrum simplex, acutum, tenue; columella perforationem umbilici tegente, margine columellari elevato.

Long. $2\frac{1}{2}$, lat. $3\frac{1}{2}$ mm.; apert. diam. transv. 2, vert. $1\frac{2}{3}$ mm.

Hab. in monte Aspromonte Calabriae.

2. *Hyalina etrusca Paulucci.*

Testa minutissima, deppressa, subinfundibuliformi - umbilicata, vitrea, nitidissima, sub valida lente lineis arcuatis incrementi minutissime striatula; anfractus 4— $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, regulariter crescentes; sutura impressa, marginata; apertura late lunaris; peristoma rectum, acutum, simplex, margine columellari subreflexo.

Diam. maj. 2, min. $1\frac{1}{3}$, alt. 1 mm.

In alluviis fluminis Arno inventa.

*) Da das Werk der Marchesa Paulucci schwerlich in die Hände aller deutschen Malacozoologen kommen wird, halten wir es für nützlich, die Diagnosen ihrer neuen Arten hier zum Abdruck zu bringen. D. Red.

3. *Hyalina Alleryi Paulucci.*

Testa globoso-depressa, umbilicata, solidula, areuatim et confertim striatula, lineis spiralibus decussata, supra lutescente-cornea, vel radiatim striatula, virescens; anfractus 6 convexiusculi, fortiter accrescentes, ultimo lato, antice non descendente; sutura albomarginata, crispata; apertura obliqua, lunata, ovalis, intus plus minusve margaritacea; peristoma simplex, acutum; margine columellari breviter reflexo.

Diam. maj. 16, min. 14, alt. 9 mm.; apertura $6\frac{1}{2}$ mm. alta, 8 lata.

Hab. circa Monte Gallo Siciliae.

4. *Hyalina Carotii Paulucci.*

Testa peranguste umbilicata, globoso-depressa, glabra, laevigata, lucida, corneo-rufescens, superne ad suturam striatula, spira vix elevata; anfractus 6 convexiusculi forte accrescentes, ad suturam griseo-marginati, ultimus validus, subtus inflatus, non descendens, circa umbilicum excavatus; apertura ampla, ovalis, rotundato lunaris, intus margaritacea; peristoma simplex, tenuer, margine columellari vix expansiusculo, ad umbilicum subreflexo.

Diam. maj. 20—24,⁵, min. 17—20,⁵, alt. 11—15 mm.; apert. 11 mm. alta, 13 lata.

Hab. prope Mongiana Calabriae.

5. *Hyalina fragrans Paulucci.*

Testa anguste umbilicata, depressa, planiuscula, subpellucida, fragilis, laevigata, glabra, ad suturam superne striatula, virenti-cornea, subtus albescens, opaca; anfractus 6, primi lente accrescentes, ultimus dilatatus, non descendens, circa umbilicum angustum leviter excavatus; spira plano-depressa; apertura perobliqua ampla, ovata, intus margaritacea; peristoma simplex,

tenue, acutum, margine inferiore profundo, extense arcuato.

Diam. maj. 20, min. 17, alt. 9. mm.

Differt ab *H. Carotii* spira depressa, umbilico minore, anfractu ultimo celeriter accrescente, colore diverso, apertura ovata, margine columellari non expansiusculo.

— Animal musco olet.

Hab. Melia Calabriae.

6. *Clausilia transitans* Paulucci.

Testa major, profunde rimata, regulariter fusiformis, solidula, acute costulato-striata, griseo-coerulescens, costulis albidis; spira turrita, acuta, apice corneo, laevi; sutura crenulata, papillis minutis, albidis instructa, rufa marginata; anfractus 10—11 valde planulati; basi fere bicristata; apertura rotundato-piriformi, basi subcanaliculata; lamella supera humilis, infera valida, arcuata; lunella suturam attingens, distincta, plica subcolumellaris submersa; peristoma continuum, protractum, breviter expansum; callus palatalis margini parallelus, plus minusve distinctus, supra et infra magis incrassatus.

Long. 15—17, diam. $3\frac{3}{4}$ —4 mm.; apert. 4 mm. longa, 3 lata.

Accedit a *Cl. bidente* var. *virgata* ad *Cl. Deburghiae* Paul.
Hab. in Italia meridionali. Calabria.

7. *Clausilia Deburghiae* Paulucci.

Testa rimata, gracilis, fusiformis, solida, sericina, pallide isabellina, costulato-striata, costulis confertis, filiformibus, albescensibus; spira attenuata, apice laevi, hyalino, mamillato; anfr. 11—12 subplani, sutura crenulata, non marginata neque papillifera disjuncti, ultimus antice magis costulatus, basi leviter bicristatus,

eristis inaequalibus, sulco divisis; apertura subpiriformis, sinulo lato, quadrangulo; lamellis parvis, infera arcuata, profunda; lunella distincta, suturam attingens; plica subcolumellaris fere immersa; peristoma continuum, parum protractum, breviter expansum, callus palatalis distinctus, margini parallelus, supra et infra valde incrassatus.

Long. 14—17, lat. 3—3,⁵ mm.; apert. 3 $\frac{1}{2}$ mm. longa, 2 $\frac{3}{4}$ lata.

Clausilia Tinei Bourg. mss. fide Böttger.

Hab. in Italia meridionali, Calabria et Sicilia.

8. *Clausilia Boettgeriana Paulucci.*

Testa punctiformi-rimata, elevato-fusiformis, subventricosa, solidula, nitida, lutescenti-olivacea; spira attenuata, apice obtusiusculo; anfr. 9 convexiusculi, sutura irregulariter crenulata disjuncti, subtiliter striati, striis rudibus, rugulosis, subarcuatis; anfractus ultimus fere $\frac{1}{3}$ omnis altitudinis aequans, parum inflatus, dorso deplanatus, fere obsolete costulato-striatus, ad aperturam subconstrictus, flavo-perlucens; apertura piriformis; peristoma continuum, subappressum, parum expansum, reflexiusculum, acutiusculum, sub sinulo dentiformi incrassatum, albolabiatum, labio infundibuliformi; lamellae ut in Cl. succinata Zgl., sed subcolumellaris oblique intuenti fere conspicua; plica suturalis nulla vel indistincta, principalis ultra palatalem superam satis elongata.

Long. 11, diam. 3 mm., apert. 3 mm. longa, 2 $\frac{1}{4}$ lata.

Hab. Monte Majella Aprutiorum.

9. *Carychium Mariae Paulucci.*

Testa minutissima, subrimata, sub lente valida longitudinaliter elegantissime striata et obesa; spira conica,

apice obtusiusculo; anfractus 4 convexi, ultimus ac penultimus turgido-ventrosi; apertura obliqua, acuminato-ovalis; pariete aperturali denticulo valido, elongato, compresso munita; peristomate labiato, marginibus callo junctis, dextro sinuoso medio valide noduloso.

Long. 1,5, diam. 1 mm.

Hab. in Lombardia.

10. *Pomatias Cassiniacus Saint Simon.*

Testa imperforata, conoideo-elongata, turrita, solidiuscula, griseo-cornea; parum pellucida, costata, costis obliquis, sinuosis, valde prominentibus, distantibus; spira subacuminata, apice rotundato ac mamillato; anfractibus 10 turgido-rotundatis, regulariter crescentibus, sutura profunda separatis; embryonalibus 3 corneo-flavis, primo laevigato, minimo, secundo turgido ac laevigato, tertio subtilissime lineato, caeteris costatis, costis pallidis; ultimo basi vix infundibuliformi, non carinato; apertura vix obliqua, rotundata, paulum lunata; peristomate crasso, reflexo, expanso, albo, vix continuo; margine columellari crasso, subbilabiato, auriculato; margine externo non reflexo, canaliculato, recurvato. Operculum tenue, pellucidum, concavum, non granulosum, anfractibus obsolete suturatis, vix striatis.

Alt. 8, diam. $2\frac{3}{4}$ mm.

Hab. in regno Neapolitano, prope Monte Cassino, nec non ad Casertam.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Paulucci Marchesa Marianna

Artikel/Article: [355-359](#)