Literatur.

Leche, Wilhelm, Öfversigt öfver de af Svenska Expeditionerna till Novaja Semlja och Jenissei 1875 och 1876 insamlade Hafs Mollusker. Med 2 Taflor. Till Kongl. Vetenskaps-Akademica Inlemnad den 12. Mars 1878. — In Kongl. Vetensk. Akad. Handl. Band XVI. No. 2.

Ein rühmliches Zeichen für unsere Zeit ist, dass eben fast alle seefahrenden Nationen wetteifern in der Erforschung des hohen Nordens; englische, amerikanische, norwegische und schwedische Expeditionen reihen sich in rascher Folge aneinander und haben unsere Kenntniss der Fauna arctica in wenigen Jahren auf eine Höhe gebracht, welche noch vor Kurzem unerreichbar schien. Dem umfassenden Werke von Sars, das wir in einem der vorhergehenden Hefte besprochen, ist sehr rasch die Bearbeitung der Ausbeute der schwedischen Expeditionen gefolgt, und wenn diese Arbeit auch nicht den Anspruch darauf machen kann, eine ganz neue Grundlage für die Erforschung der arctischen Fauna zu legen, wie das Werk des norwegischen Forscher, so müssen wir in ihm doch immerhin eine sehr wichtige Bereicherung unserer faunistischen Literatur erblicken. Die beiden von Nordenskjöld geleiteten Expeditionen galten zwar hauptsächlich der Eröffnung eines neuen Handelsweges durch die Barents-See und das Karische Haff nach den Sibirischen Strömen, aber es ist doch dabei auch die Wissenschaft nicht zu kurz gekommen. Die Zahl der aufgeführten Formen beläuft sich auf 156; davon werden, was sehr anzuerkennen ist, nur drei als neu beschrieben, nämlich *Rissoa sibirica*, *Pleurotoma novaja-semjlensis* und *Utriculopsis densestriata*, aber der Autor characterisirt zahlreiche Varietäten und bildet dieselben nebst einigen Zungenzähnen auf zwei Tafeln sehr gut ab. Auch die fossilen Arten aus der Tundra am Jenissei werden ausführlich behandelt; unter ihnen fällt

eine linksgewundene *Natica* auf, von welcher allerdings nur ein Fragment gefunden wurde.

Die lebend beobachteten Arten sind:

<i>Cyrtodaria</i> Kurriana Dkr.	<i>Limopsis</i> minuta Phil.
<i>Mya</i> truncata L.	<i>Mytilus</i> edulis L.
<i>Neaera</i> cuspidata Oliv.	<i>Crenella</i> nigra Gray.
<i>Pandora</i> glacialis Leach.	— laevigata Gray.
<i>Lyonsia</i> arenosa Möll.	— laevis Beck.
<i>Thracia</i> myopsis Möll.	— decussata Mtg.
<i>Montacuta</i> Maltzani Verkr.	<i>Dacrydium</i> vitreum Holb.
<i>Tellina</i> solidula Pult.	<i>Lima</i> sulculus Leach.
— lata Gmel.	<i>Pecten</i> groenlandicus Sow.
<i>Saxicava</i> pholadis L.	— Hoskyusi var. major Leche.
<i>Venus</i> fluctuosa Gould.	— islandicus Müll.
<i>Axinus</i> flexuosus Mtg.	
<i>Astarte</i> danmoniensis Mtg.	
— crebricostata Forbes et Hanl.	<i>Terebratula</i> cranium Müll.
— Warhami Hanc.	<i>Terebratulina</i> caput serpentis L.
— compressa L.	<i>Rhynchonella</i> psittacea Chemn.
var. crassa Leche.	
— semisulcata Leach.	
var. placenta Mörch.	
— Withami Wood.	<i>Siphonodentalium</i> vitreum Sars.
<i>Cardium</i> ciliatum Fabr. (islandicum Midd.)	
— grönlandicum Chemn.	<i>Chiton</i> albus L.
— fasciatum Mtg.	— ruber L.
— suecicum Rve.	— marmoreus Fabr.
<i>Yoldia</i> hyperborea Lov.	<i>Tectura</i> testudinalis Müll.
— arctica Gray.	<i>Lepeta</i> caeca Müll.
— pygmaea var. gibbosa Smith.	<i>Pilidium</i> rubellum Fabr.
— intermedia var. major Leche.	<i>Hydrobia</i> ulvae Penn.
— lucida Lov.	<i>Rissoa</i> castanea Möll.
— frigida Torell.	— cingulata Midd.
= sp. nova t. 1 fig. 7 a. b.	— sibirica Leche t. 1 fig. 10.
<i>Leda</i> pernula Müll.	— sulcosa Migh.
<i>Nucula</i> expansa Rve.	<i>Lacuna</i> pallidula da Costa.
<i>Arca</i> glacialis Torell.	<i>Litorina</i> obtusata L.
var. pectunculoides grandis.	<i>Turritella</i> erosa Couilh.
	<i>Rimula</i> noachina L.

- Margarita grönlandica* Chemn.
 var. *laevigata* Mörch.
 — *rudis* Mörch.
 — *intermedia* Leche.
 — *cinerea* var. *grandis* Mörch.
 — *helicina* var. *major* Midd.
 — *argentata* Gould.
 var. *gigantea* Leche.
 — *elegantissima* Wood.
 — *obscura* Couth.
 var. *intermedia* Leche.
- Velutina zonata* Gould.
- Onchidiopsis groenlandica* Bergh.
- Trichotropis borealis* Brod.
 var. *turrita* Leche.
 — *Kroyeri* Phil.
- Admete viridula* Fabr.
 var. *undata* Leche.
 — *laevior* Leche.
 — *elongata* Leche.
 — *distincta* Leche.
- Natica clausa* Brod.
 — *pallida* Brod.
 — *flava* Gould.
- Amauropsis helicoides* Johust.
- Amaura candida* Möller.
- Pleurotoma turricula* Mtg.
 var. *nobilis* Mörch.
 — *scalaris* Möller.
 — *exarata* Möller.
 — *novaja-semljensis* Leche t. 1
 fig. 15.
 — *Woodiana* Möll.
 — *impressa* Beck.
 — *bicarinata* Couth.
 — *tenuicostata* M. Sars.
 — *elegans* Möll.
 — *pyramidalis* Ström.
 var. *laevior* Leche.
- Pleurotoma violacea* Migh.
 var. *brevis* Leche.
 = *ventricosa* Mörch.
 — *Mörchi* Leche
 = *gigas* Verkr.
 — *gigantea* Mörch
 = *gigas* Beck.
 — *borealis* var. *ventricosa* Mörch.
 — *plicifera* Wood.
- Columbella rosacea* Gould.
- Buccinum ovum* Turton.
 — *terrae novae* Beck.
 — *ciliatum* var. *turrita* Mörch.
 var. *flavula* Beck.
 — *groenlandicum* Chemn.
 — *Mörchi* Friele.
 — *undulatum* Möller.
 — *tenue* Gray.
 var. *elatio* Midd.
 — *glaciale* L.
 var. *elongata* Leche.
 — *angulosum* Gray.
- Fusus Kroyeri* Möller.
 — *fornicatus* Reeve.
 — *tornatus* Gould.
 — *deformis* Rve.
- Sipho islandicus* Chemn.
 — *Sabini* Midd.
- Trophon clathratus* L.
 var. *Gunneri* Lov.
- Diaphana debilis* Gould.
- Utriculus turritus* Möll.
 — *semen* Reeve.
 var. *elongata* Leche.
- Cylichna alba* Brown.
 — *insculpta* var. *valida* Leche.
 — *Reinhardti* Möll.
 — *scalpta* Reeve.
- Utriculopsis densistriata* Lech. t. 1
 fig. 20.

Philine funnarchica Sars.	Aeolis salmonacea Couth.
— quadrata var. grandis Leche.	Dendronotus arborescens Müll.
— punctata Clark.	Doris repanda Ald. et Hanc.
— lineolata Couth.	Clione limacina Phips.
Aeolis bostoniensis Couth.	Limacina helicina Phips.
— papillosa L.	
Nur fossil gefunden wurden:	
Mya truncata var. uddevallensis.	Pleurotoma trevelyana Turt.
— arenaria L.	— pyramidalis var. jennisceensis Leche.
Margarita obscura var. cinereaeformis Leche.	— borealis Rve.
Admete viridula var. elongata Leche	Fusus tornatus var. antiquatus Midd.
Natica sp.	Trophon elathratus var. major.

Eine Tabelle über die bathymetrische und eine zweite über die geographische Verbreitung der beobachteten Arten erhöhen die Brauchbarkeit des Werkes, das wir allen Freunden der Fauna arctica angelegentlichst empfehlen. K.

Erklärung.

Die von Hrn. Dr. O. Boettger in diesem Jahrbuch, S. 97 erwähnte und als neue Art beschriebene *Conulopolita Raddei* wurde nicht von mir, sondern von Hrn. General Komauow, der um die Insektenkunde unseres Landes, speciell aber um die Coleopterologie unbestreitbare Verdienste hat, in der erwähnten Stalaktitenhöhle in Abchasien entdeckt und durch den Finder dem kaukasischen Museum in Tiflis geschenkt. Dies zur Richtigstellung.

Tiflis, am 18/30 Mai 1879. Dr. G. Radde.

Herr Dr. Boettger bittet ausserdem hinzuzufügen, dass er bedauert, den obigen Missgriff begangen zu haben; er habe leider erst unmittelbar nach dem Abdruck des betr. Bogens Kenntniss von dem wahren Sachverhalt durch Hrn. Dir. Radde erhalten, also zu einer Zeit, wo es leider schon zu spät war, den betreff. Passus zu ändern. — Im Anschluss hieran macht uns Herr Dr. Boettger die Mittheilung, dass der Name *Hyal. effusa* auf S. 11 und auf t. 1, fig. 4 in „*Hyal. subeffusa*“ umzuändern ist, da Pfeiffer bereits 1866 in Mal. Bl., Bd. 13, S. 78 eine gleichnamige Art von Haiti beschrieben habe, die zwar als *Helix* getauft ist, möglicherweise aber doch zu *Hyalinia* (vergl. Clessin, Nomenclator, 1878, S. 64) gehören könnte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Literatur. 287-290](#)