

63. *seminulum* Sowerby Spec. 40. (Ovulum) Thes. 41. 42
(Ovulum) Rv. 48 a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed.
53, 9. 12.
Freundschafts-Inseln.
64. *Antillarum* Reeve CJ. 64. a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed.
53, 10. 11.
Westindien.
65. *subrostrata* Sow. Thes. 39. 40 (Ovulum) Rv. 65 a. b.
(Ovulum) M.-Ch. II Ed. 53, 14. 15.
Bai von Honduras.
wohl nur Var. von *uniplicata*.
66. *rufa* Sowerby CJ. 58 (Ovulum) M.-Ch. II Ed. 53, 13. 16.
= *Ovulum lividum* Rv. 6 9.
Panama, Bai v. Caracas.

Diagnoses specierum novarum Chineae meridionalis

Von

Dr. O. F. von Möllendorff.

1. *Cyclotus tubaeformis* Mlldff.

Testa late umbilicata convexodepressa, solidula, striata, fulva, plerumque infra medium unifasciata et maculis sagittaeformibus seriatis rutilis ornata, interdum unicolor; spira convexa vix conoidea, apice subtili; anfr. 5 convexi, ultimus teres vix descendens; umbilicus profundus fere $\frac{1}{3}$ diametri adaequans; apertura subverticalis, circularis, intus margaritacea; peristoma continuum duplex, internum haud porrectum, externum tubae instar breviter inflatum et expansum. Operculum testaceum, leviter concavum, anfractibus 8 transverse costulato-striatis, margine anfractuum subincrassato.

Diam. maj. 17—19, min. $13\frac{1}{2}$ — $15\frac{1}{2}$, alt. $10\frac{1}{2}$ — $11\frac{1}{2}$,
apert. diam. 7—8 mill.

Habitat in silva prope monasterium W a s h a u in montibus L o - f o u - s h a n provinciae sinensis G u a n g - d u n g.

2. *Pterocyclus?* *Gerlachi* Mlldff.

Testa latissime umbilicata, convexo depressa, solidula, subtiliter striatula, albida, strigis castaneis tenuibus fulminatis, ad peripheriam fascia una fusca ornata, spira breviter conoidea apice acutiusculo; anfr. 5 convexiusculi, ultimus teres vix descendens; apertura sat obliqua, circularis; peristoma duplex, internum breve continuum, expansiusculum, externum expansum et reflexiusculum, saepe multiplex, superne dilatatum, ad anfractum penultimum auriculatum. Operculum?

Diam. maj. 20, min. 16 alt. $9\frac{1}{2}$, apert. diam. (c. perist.) $8\frac{1}{2}$ millim.

Pterocyclus chinensis E. von Martens Conchol. Mittth. I 5. 6. p. 97 (nec Möllendorff).

Pterocyclus planorbulus Gredler Jahrb. D. M. Ges. VIII 1881 p. 128 (nec Sowerby).

3. *Cyclophorus* (*Leptopomoides*) *cuticosta* Mlldff.

Testa pyramidata, sat anguste umbilicata, oblique striata, pallide cornea, strigis et flammis fuscis, interdum infra peripheriam fascia fusca interrupta ornata, carinulis spiralibus plurimis nec non costulis membranaceis sat distantibus transversis instructa; anfr. 6 convexi, sutura profunda discreti, ultimus vix descendens, inflatus, apertura sat obliqua, subcircularis, peristoma simplex brevissime expansum, marginibus callo tenui junctis, margine externo ad insertionem subangulato

brevissime protracto. Operculum tenue corneum arcti-spirum.

Dam. maj. 9 min. $7\frac{1}{2}$ alt. 9 diam $4\frac{1}{2}$ mm.

Habitat. In insula Hongkong (leg. ipse et cl. Hungerford), prope vicum Tung-dshou hand procul ab urbe Macao (Hungerford), ad monasterium Yang-fu provinciae sinensis Fu-dshien. (leg. F. Eastlake).

4. *Leptopoma polyzonatum* Mlldff.

Testa anguste umbilicata conica solidula transverse subtilissime striata nec non lineis spiralibus elevatis plurimis decussata, corneofusca; anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, ultimus leviter descendens, infra medium carina tenui distincta acuta, infra carinam interdum fascia fusca saturata instructus; apertura rotundata, obliqua, peristoma album expansum, reflexiusculum, marginibus callo tenuissimo junctis. Operculum tenue pellucidum succineum.

Diam. maj. $11\frac{1}{2}$ min. 9 alt. 12.

Habitat. In insula sinensi Hainan prope urbem Tshiung-dshou-fu leg. Dr. Gerlach.

5. *Diplommatina rufa* Mlldff.

Testa dextrorsa, vix rimata, ventricosulo-ovata, distanter striatula, corneo rufa; anfr. 5 convexiusculi, ultimus penultimo angustior, distortus, ascendens; apertura fere verticalis; peristoma multiplex valde incrassatum continuum, basi ad columellam angulatum; plica columellaris modica; in anfractu penultimo plica palatalis latiuscula extus supra aperturam conspicua.

Alt. 2, lat. $1\frac{1}{3}$ mm.

Habitat. Ad monasterium Wa-shau in montibus Lo-foushan provinciae sinensis Guangdung.

6. *Alycaeus latecostatus* Mlldff.

Testa perspective umbilicata depresso-turbinata, costulis sat distantibus regulariter sculpta, pallide corneo-fusca, spira brevis, apice rutilo mammilliformi; anfr. $3\frac{1}{2}$ convexi, sutura profunda discreti, ultimus valde inflatus pone aperturam leviter constrictus, dein deflexus, super tubulo ca. 1 mm. longo suturae adnato confertim costulatus, dein usque ad aperturam late sed subobsolete costulifer; apertura diagonalis circularis, peristoma duplex, internum rectum sat porrectum, externum tubae instar inflatum, late expansum. Operculum tenue corneum profunde immersum. Diam. maj. 4, min. $3\frac{1}{2}$, alt. $2\frac{1}{2}$ mm. Apert diam. intus $1\frac{1}{2}$, cum margine externo 2 mm.

7. *Helicina Hungerfordiana* Mlldff.

Testa globoso-conoidea, subtiliter striatula nec non lineis spiralibus tenuibus decussata, rufofulva; anfr. 5 subplani, ultimus breviter descendens, ad peripheriam obtuse subangulatus; apertura fere diagonalis rotundato triangularis; peristoma simplex, expansiusculum, leviter incrassatum, margine basali cum columella angulum formante. Operculum tenue corneum.

Diam. maj. 5, min. $4\frac{1}{3}$ alt. 4 mm.

Habitat. In montibus insulae Hongkong (ipse et cl. Hungerford), ad vicum Tung-dshou prope Macao (Hungerford).

8. *Helicina Hainanensis* Mlldff.

Testa subdepresso-conoidea, striatula, rufocornea, anfr. 5 subplani, ultimus breviter descendens, ad peripheriam obtuse angulatus, fascia albida saepe obsoleta ornatus: apertura obliqua, semielliptica, peristoma simplex, ex-

pansiusculum, leviter incrassatum, cum columella brevissima angulum obtusum efficiens. Operculum tenue pallide corneum.

Diam. maj. $4\frac{1}{2}$ — 5. min. 4, alt. $3\frac{3}{4}$ mm. apert. $2\frac{1}{2}$ mm. longa $2\frac{1}{4}$ lata.

In insula Hainan ad urbem Tshinag-dshou-fu (Gerlach).

9. *Ennea splendens* Mlldff.

Testa umbilicata, cylindracea-ovata, subtiliter striatula, hyalina, nitida; anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, ad suturam crenulati, ultimus subdistortus, basi compressus, obtuse angulatus; apertura subverticalis, triangularis, peristoma expansum, reflexiusculum, valde incrassatum, solum ad insertionem marginis externi attenuatum, breviter recedens. Paries aperturalis plica valida intrante munita, palatum utrimque biplicatum.

Alt. $3\frac{1}{2}$ lat. $1\frac{1}{2}$ mill.

Habitat ad monasterium Wa-shau in montibus Lo-fou-shan prov. sin. Guang-dung.

10. *Macrochlamys cincta* Mlldff.

Testa anguste perforata, orbiculata, transverse subtiliter striatula et lineis spiralibus subtilissimis decussata, valde nitida (interdum iridescent), corneoflava, subtus pallidior; spira prominula subconoidea; anfr. $6\frac{1}{2}$ lente crescentes, ultimus infra inflatus, antice non descendens, regione umbilicali excavata; apertura subverticalis lunata, peristoma rectum acutum, marginibus distantibus, columellari ad umbilicum triangulariter reflexo.

Diam. maj. 22 min. $19\frac{1}{2}$ alt. $11\frac{1}{2}$ mm. apert. $11\frac{1}{2}$ mm. longa, 9 alta.

Habitat. In insula Hai-nan prope oppidum Hoihon leg. cl. Dr. Gerlach.

11. *Microcystis Schmackeriana* Mlldff.

Testa perforata depressoglobosa, subtilissime curvato striatula nec non lineis spiralibus subtilissimis decussata, fulvescenticornea; anfr. $4\frac{1}{2}$ regulariter accrescentes, ultimus subtus valde inflatus non descendens. Aertura sat obliqua rotundatolunaris, peristoma rectum margine columellari ad perforationem reflexo.

Diam. maj. $6\frac{1}{2}$ min. 6 alt. 4 mm.

Hab. in insula Hongkong (Schmacker), in montibus Lofoushan (ipse).

12. *Plectopylis cutisculpta* Mlldff.

Testa perspective umbilicata conoideo-depressa, tenuis, subpellucida, cornea, angulata, superne transverse rugosostriata et lineis spiralibus decussata, subtus striata, nec non costulis cuticulae sat distantibus valde deciduis ad peripheriam in lacinias prolongatis ornata; anfr. 7 lente crescentes, ultimus haud dilatatus, non descendens; apertura diagonalis, sat parva, lunaris, peristoma breviter expansum et reflexum incrassatum, marginibus callo junctis. Palatum intus lamellis quinque brevibus parallelis munitum, una valida lunata in pariete transverse opposita.

Diam. maj. 7, min. 6 alt. $3\frac{1}{2}$ mm.

13. *Helix (Fruticoconus) trochulus* Mlldff.

Testa auguste umbilicata, trochiformis, filocincte carinata, curvatim oblique striatula, irregulariter pilosa, corneo-fusca, spira conica, apice acutiusculo; anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus ad aperturam paullum descendens, basi subinflatus, apertura diagonalis, semielliptica,

peristoma reflexiusculum, marginibus distantibus, columellari sat dilatato.

Diam. maj. 10 alt. $8\frac{1}{2}$ mm.

" " $9\frac{1}{2}$ " 9 "

" " $9\frac{1}{2}$ " $8\frac{1}{2}$ "

" " 9 " $8\frac{1}{2}$ "

Ad muros urbis Tshung-dshou-fu insulae sinensis Hainan, leg. cl. Dr. Gerlach.

14. *Helix Eastlakeana* Mlldff.

Testa semiobtecta umbilicata, depressoglobosa, tuberculis verrucaeformibus in series obliquas retrorsum descendentes dispositis sculpta, basi sublaevigata, (? rufo brunnea); aufr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus ad peripheriam obtuse angulatus, basi inflatus, antice solutus et deflexus, a solutione ad peristoma superne carinatus; apertura valde obliqua, irregulariter semilunaris; peristoma continuum, reflexum, albolabiatum, subtus bidentatum, superne callo noduliformi quasi unidentatum, dentibus scrobiculos in facie externa pone peristoma efficientibus,

Diam. maj. $23\frac{1}{2}$ min. 21, alt. $15\frac{1}{2}$ apert. long. 13 lat. 8 mm.

Ad litus provinciae sinensis Guang-dung insulae Hong-kong oppositum leg. cl. F. Eastlake (spec. unicum).

Affinis *H. trisinuatae* Mart., sed testa majore, multo altiore, fere globosa, seriebus tuberculorum retrorsum descendantibus, apertura indistincte trisinuata, peristome bidentato vel vix tridentata (pro quadridentato *Helicis trisinuatae*), margine columellari ad umbilicum protracto dimidium ejus obtegente.

15. *Helix?* (*an Cochlostyla?*) *Xanthoderma* Mlldff.

Testa dextrorsa imperforata, globoso-conoidea, oblique retrorsum curvatim striatula nec non supra periphe-

riam oblique antrorsum subirregulariter rugulosa, infra peripheriam spiraliter ruguloso-decussata, cuticula laete lutea induta, fascia una fusconigra ad peripheriam et altera circa columellam ornata; anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus magnus, sat inflatus, antice paullum deflexus. Apertura satis obliqua, rotundato lunaris, peristoma expansum, album vel pallide violaceum, marginibus distantibus callo tenuissimo junctis, supero et basali arcuatis, columellari incrassato, dilatato.

A. *typus?* diam. maj. 50 min. 43 alt. 45 mill.

Hab. ad montem Ma-an-shan provinciae sinensis Guang-dung.

B. *forma minor.* Diam. maj. 44, min. 37, alt. 40 mill.

Hab. in insula Hongkong.

16. *Clausilia (Euphaedusa) porphyrea* Mlldff.

Testa fusiformis, tenuis, pellucida, costulato-striata, purpureofusca; anfr. 10 convexiusculi, sutura papillifera. Apertura rotundato-tetragona, peristoma continuum, solutum, expansum, reflexiusculum, carneolabiatum. Laniella parietalis supera marginalis, sat valida, brevis, a spirali sejuncta vel cum ea contigua ut in Cl. aculus Bens; infera a margine parum remota, valida, valde spiraliter torta, subhorizontalis, intus ante spiralem desinens, subcolumellaris immersa. Plica principalis mediocris, palatalis una brevis cum principali subparallela, lunella nulla vel obsoleta. Clausilium latum, subtus retroversum, medio acuminatum.

Alt. $15\frac{1}{2}$ ($13\frac{1}{2}$ —19), lat. 3, apert. long. 3, lat. $2\frac{1}{2}$ mm.

Habitat ad arbores in vico Tungdshou prope Macao; lg. cl. R. Hungerford.

17. *Clausilia (Euphaedusa) mucronata* Mlldff.

Testa ventricosulo-fusiformis, sursum subito attenuata, apice acutiusculo, striatula, rufofusca, subpellucida; anfr. 9 convexiusculi, sutura papillifera. Apertura obliqua piriformis; peristoma continuum, solutum, superne sinuatum, breviter expansum, reflexiusculum. Lamella supera modica a spirali sejuncta, infera valde spiraliter torta, subcolumellaris immersa. Plica principalis modica (lineam lateralem haud attingens), palatalis una supera longiuscula divergens, lunella obsoleta. Clausilium?

Alt. 11, lat. $2\frac{3}{4}$, apert. long. $2\frac{1}{4}$, lat. $1\frac{1}{4}$ mm.
Hab. Ad monasterium Yun-fu provinciae sinensis Fu-dshou lg. cl. F. Eastlake.

Cl. porphyrea et mucronata affines Cl. Lorraini Mke. et cum ea ad subsectionem Euphaedusa Böttg. referendae.

18. *Clausilia Eastlakeana* Mlldff.

Testa brevis, ventricosulo-fusiformis, transverse subtiliter striatula nec non lineis spiralibus decussata, cornea, maculis albidis ornata; anfr. 7 sat convexi, celeriter accrescentes, ultimus penultimo subaequalis. Apertura permagna, dilatato-ovalis, peristoma late expansum, reflexiusculum, superne adnatum, haud sinuatum. Lamella supera mediocris, marginalis, recta; infera valida, valde spiraliter torta, subcolumellaris immersa. Plica principalis mediocris, lunella nulla, palatales duo dorsales, supera longiuscula, infera brevis. Clausilium latissimum.

alt. 11, lat. 3, apert. long. $3\frac{1}{2}$ lat. 3 mm.
Hab. in insula Lan-dau prope urbem Fu-dshon provinciae sinensis Fu-dshien lg. cl. Eastlake.
Species valde peculiaris, an ad subsectionem *Pseudoneniam* Böttg. referenda?

19. *Clausilia (Hemiphaedusa) thaleroptyx* Mlldff.

Testa fusiformis, subtiliter striatula, corneofusca; anfr. $11\frac{1}{2}$ subplani sutura distincta discreti; apertura oblique piriformis, peristoma continuum, solutum, expansum, reflexiusculum, incrassatum, album, superne vix sinuatuni. Lamellae crassae, supera marginalis, cum spirali continua, infera sat remota, subtus abrupte desinens sed ramum tenuem ad marginem emittens, subcolumellaris emersa, usque ad marginem producta. Plica principalis magna, supra aperturam conspicua, lunella valida valde arcuata, subtus strictiuscula, antrorum et retrorsum ramum brevem emittens.

Clausilium?

alt. 23, lat. 5. apert. long. 5, lat. $3\frac{1}{2}$ mm.

Hab. ad monasterium Yun fu provinciae sinensis Fudshien, lg. cl. F. Eastlake.

Museum Löbbeckeanum.

Von

Th. Löbbecke und W. Kobelt.

IV.*)

17. *Conus Weinkauffii* Löbbecke.

Taf. 4 Fig. 1—3.

Testa regulariter conica, sat magna, ponderosa, laeviuscula, lineis incrementi tenuissimis, superne arcuatis, ad basin liris distinctis distantibus, regulariter dispositis, castaneo-articulatis sculpta, alba, maculis nigrocastaneis quadrangularibus interdum confluentibus majoribus et minoribus, fasciatim et strigatim dispositis ubique ornata; spira plus minusve elata, castaneo

* Cfr. pag. 1.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Möllendorff Otto Franz von

Artikel/Article: [Diagnoses specierum novarum Ghinae meridionalis. 179-188](#)