

— 377 —

2. Carinata.

- a. *depressa*, supra granulata, subtus spiraliter lineata peripheria luteo-fasciata:
N. anobrachys n. sp.
- b. turbinata,
- α. carina pone aperturam evanescente,
supra decussata, subtus spiraliter
lineata, rubella N. Eos n. sp.
- β. carina acuta.
- αα. testa major, supra decussata parum
nitens, subtus spiraliter sculpta,
nitida N. Eucharis Desh.
= H. Feneriffensis Ad. et Ang.
- ββ. testa minor.
1. 1. supra subtiliter decussato-granulata, parum nitens, modice
elevata N. Thalia n. sp.
2. 2. undique spiraliter lineata, ni-
tens, subconica . . . N. Hestia n. sp.
- c. alte conica, supra striatula, basi spirali-
ter lineata N. basalis n. sp.
- II. Testa imperforata N. Balstoni Ang.

Guilielmus Dunker

de

Molluscis nonnullis terrestribus Americae australis.

-
1. *Helix Neogranadensis Pfr. var.*
Tab. 11, fig. 5. 6.

Specimen quod hic depictum est, a forma typica differt
carina deficiente, testa solidiuscula et anfractibus
superioribus rugulosis, ceterum cum descriptione
Pfeifferiana (Proc. Zool. Soc. 1845. pag. 64.) satis
convenit.

In montibus altis reipublicae Aequatoris locis uliginosis
hanc varietatem invenit clar. Lehmann m. Februari 1881.

2. *Bulimus lugubris* Dkr.

Tab. 11, fig. 1. 2.

Testa ovata, subrimata, tenuicula, anfractibus quinis
parum convexis, per longitudinem rugosiusculis trans-
versim denseque striatis subito crescentibus instructa,
ultimo $\frac{3}{5}$ longitudinis aequante; color fundi fusces-
cens maculis strigisque irregularibus variegatus, sub
epidermide atro-olivacea translucens; columella parum
sinuata; apertura oblongo-ovata nigricans nitidissima;
peristoma subincrassatum reflexum. — Long. testae 51,
ejusque latit. 28 mm.

Prope Pasto Columbiae australis. F. C. Lehmann.

Haec species quantum scio, nondum descripta, habitu
Bulimo Blainvilleano Pfeifferi proxima est, sed sculp-
tura aliena et plica columellae valida deficiente satis
differt; praeterea sub epidermide obscuriore maculae
strigaeque irregulares neque lineae fulgureae trans-
lucent.

Cochlea nostra ad sectionem Charitis Albersii pertinet
ideoque haud commutari debet cum Bulimo lugubri
Férussaci, qui Achatinellis injungendus est.

3. *Bulimus albo-balteatus* Dkr.

Tab. 11, fig. 7. 8.

Testa parva tenuis, oblongo-ovata subfusiformis, vix
rimata, anfractibus inclusa nucleo obtuso senis modice
convexis glabratis fulgentissimis infra suturam sub-
plicatis instructa; color niger subviride translucens;
anfractus ultimus fascia alba distincte terminata
signatus; columella subreflexa alba; labrum simplex
acutum; apertura basiu versus subangusta. — Long.
13 mm.

In sylvis humosis prope Pasto Columbiae a clar. F. C. Lehmann lecta est.

Haec species singularis respectu habito aperturae ad Limicolarias prope accedit, sed cochleola nostra tota structura valde differt. Fascia alba in anfractu tantum ultimo integra conspiciens, at anfractibus superioribus maximam partem obtecta est. In specimine, quod exstat unico ovula duo nitentia flavidio-alba reperta sunt margaritis similia. Diam. eorum 2 mm aequat. Sane haec testa ad sectionem Bulimorum propriam referenda est.

4. *Bulimus Powisianus* Petit.

Tab. 11, fig. 3. 4.

Icones nostrae varietatem hujus speciei in collectionibus rarae ante oculos ponunt strigis irregularibus obliquis paucis pallidioribus notatam. Specimina quoque obveniant strigis vel flammis istis oлиquis prorsus carentia, sed fascia transversa nunquam deesse videtur.

In sylvis prope Rio Cauca Novae Granadae. F. C. Lehmann.

5. *Bulimus iostoma* Sow.

Haec species satis cognita pictura vividiore et languida varians, in regione calida et sterili prope Monte Christi Aequatoris in dumetis spinosis praesertim in Cereo arboreo frequentissima obvenit. Varietas minor in sylvis prope Esmeraldas. Lehmann.

6. *Bulimus Quitensis* Pfr.

Monogr. Hel. vide vol. 2. pag. 182. Locus natalis Quito reipublicae Aequatoris.

In pratis humidis prope Pasto una cum Bulimo laeto legit clar. Lehmann.

7. *Bulimus tribalteatus Reeve var.*

Conch. icon. Bul. spec. 269 Sta Fé di Bogota.

Varietatem hujus speciei venustae clar. Lehmann in sylvis umbrosis prope Santiago Columbiae australis legit lacteam roseo labiatam, sed balteis prorsus carentem. Apex colore corneo insignitur.

8. *Bulimus laetus Reeve.*

Conch. icon. spec. 616.

Color iconis Reeveanae nostro specimine multo pallidior est. Hanc speciem in dumetis Agaves et in gramine prope Pasto legit clar. Lehmann.

9. *Achatina magnifica Pfr.*

Proc. Zool. Soc. 1847. pag. 232. Mon. Hel. viv. vol. VI.
pag. 217. Reeve Conch. icon. Achat. sp. 33. Respu-
blica Aequatoris.

Hanc speciem clar. Lehmann in sylvis humosis Columbiae australis invenit.

10. *Clausilia cyclostoma Pfr.*

Hanc speciem ad Nenias pertinentem, in pratis humidis prope Pasto Columbiae australis satis frequentem invenit clar. Lehmann.

L iteratur.

Mollusca of H. M. S. „Challenger“ Expedition. — By the Rev. Robert Boog Watson. — Parts IV—XIV.

Wir haben über diese wichtige Publication, welche die Zahl der bekannten Arten sehr erheblich vermehrt, zum letzten Mal in den Jahrbüchern 1879 berichtet. Seitdem ist die Veröffentlichung regelmässig fortgesetzt worden und liegen uns nun die Abtheilungen V—XIV vor, noch sämmt-



Kobelt del.

Lith. v Werner & Winter, Frankfurt 1882

1.2. *Bul. lugubris* Dkr. 3.4. *Bul. Povisianus* var. 5.6. *Helix neogranadensis* var.
7.8. *Bul. albobaralteatus* Dkr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Dunker Wilhelm (Guilielmus) Bernhard

Artikel/Article: [de Molluscis nonnullis terrestribus Americae australis. 377-380](#)