5. Fouragier-Gemeinschaften von Wintergoldhähnchen, Haubenmeisen und Baumläufer

Im Winter 2012/13 konnten in der Steppenheide auf der Höhfeldplatte/Thüngersheim dreimal (am 24.12.2012, am 20. und 24.02.2013) beobachtet werden, dass ca. 6 Wintergoldhähnchen, 2 bis 4 Haubenmeisen und ein Waldbaumläufer gemeinsam die Krüppelföhren nach Insekten absuchten. Kontaktrufe waren nicht häufig und sehr leise. Die Gruppe flog recht quirlig von Föhre zu Föhre. Bemerkenswert ist die gemeinsame Bevorzugung der Nadelbäume. Auch die Art, kopfunter die Äste von unten her abzusuchen, haben beide Arten gemeinsam. Die Haubenmeisen suchten mehrfach am Boden oder knapp über dem Boden nach Futter und prompt ahmten das einige Goldhähnchen nach. Dass auch ein Baumläufer sich stets an die Gruppe hielt, war überraschend.

Diskussion: Gemischte Trupps von Singvögeln werden außerhalb der Brutzeit häufig beobachtet. Die Fouragiergemeinschaft im vorliegenden Fall umfasst sympatrische[21] Arten, die das selbe Habitat bevorzugen und sich bei der Futtersuche sogar auf ähnliche Weise bewegen. Der Vorteil liegt vermutlich darin, dass sie sich vor dem Sperber gegenseitig besser warnen können. Vielleicht haben sie auch Warnrufe im Ultraschall-Bereich, die auch Sperber nicht mehr auf größere Distanz hören können.

Haubenmeise. Höhfeldplatte. 20.02.2013. Alle Photos: H. Schaller.

[21] Sympatrisch: Syn = zusammen, patria = Vaterland. Im selben Lebensraum vorkommend.

Wintergoldhähnchen. Höhfeldplatte. 20.02.2013.

Der Waldbaumläufer besuchte kurzfristig als einziger auch einen Laubbaum. Ansonsten hielt er sich eng an die Gruppe und in den Föhren. 24.12.2012. Höhfeldplatte.

6. Wassereis oder Baumsaft?

Wenn im Frühjahr der Saft in die Bäume steigt, dann tritt nährstoffreicher Saft aus und rinnt den Baumstamm herunter oder tropft auf den Boden. V. a. Buntspechte hängen dann in ungewohnter Position am Baumstamm und lecken mit ihrer langen Zunge den Saft. Ob die Blaumeise auf dem folgenden Photo nun gefrorenes Regenwasser oder Baumsaft lecker findet, konnte nicht geklärt werden.

Blaumeise leckt Eis am Stiel. Photo: M. Gläßel.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft in Unterfranken Region 2

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: 2013

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: 5. Fouragier-Gemeinschaften von Wintergoldhähnchen, Haubenmeisen und Baumläufer; 6. Wassereis oder Baumsaft? 133-135