

2. Baltische Heringsmöwe *Larus fuscus* ssp. *fuscus*

Steckbrief

Vergleich mit *Larus fuscus* ssp. *graellsii*

Armschwingen und Rückengefieder sind bei *L.f.ssp. graellsii* schiefergrau und kontrastieren mit den schwarzen Handschwingen. Vorsicht: bei greller Beleuchtung kann im Feld das Schiefergrau auch schwarz wirken.



***Larus fuscus* ssp. *graellsii* im abgenutzten Brutkleid. Die abgenutzten weißen Spitzen der Handschwingen sind im Feld fast nicht zu sehen. Runde / Norwegen. Alle Photos: H. Schaller.**



Baltische Heringsmöwe *L. f. ssp.fuscus* im abgetragenen Brutkleid. Gotland.

Vergleich mit der Mantelmöwe *Larus marinus*

Die Mantelmöwe hat auch einen schwarzen Rücken und eine schwarze Flügeloberseite. Das tiefe Schwarz der Handschwingen-Spitzen kontrastiert mit dem matteren Anthrazitschwarz der Armschwingen. Die Mantelmöwe hat auch im adulten Kleid mattrosa Beine, ist massiger als die Heringsmöwe, hat auf der 1. Hs. einen langen weißen Apikalfleck und auf der 2. Hs. einen großen Subapikalfleck. Alle anderen Hs. haben ebenfalls weiße Spitzen, so dass im Feld der weiße Flügelhinterrand durchgängig ist.



Mantelmöwe zeigt große weiße Spitzen der Handschwingen. Blassrosa Schwimmhäute.

Bei der Baltischen Heringsmöwe ist v.a. im abgetragenen Brutkleid der weiße Flügel-Hinterrand nicht durchgehend.

Bei der *Larus fuscus intermedius* sind im adulten Kleid die Armschwingen und Armdecken nicht so tiefschwarz wie bei der Baltischen Heringsmöwe.



Intermediäre Heringsmöwe *Larus fuscus intermedius*. 22.08.2014. Pellworm. Photo: M. Gläbel.

Die weiße Basis der Hand- und Armschwingen ist im aktuellen Stand der Mauser von den Arm- bzw. Handdecken noch nicht verdeckt.



Mantelmöwe. Weiße Flecken und Säume auf allen Spitzen der Handschwingen. Langer weißer Apikalfleck an vorderster Hs, großer Subapikalfleck an Hs 2.




Baltische Heringsmöwe. Die feinen weißen Federspitzen der ersten 6 Handschwingen sind abgenutzt, daher endet dort der weiße Flügelhinterrand.



Mantelmöwe. Beine sind blassrosa.

Bei allen Unterarten der Heringsmöwe sind die Beine kräftig gelb, aber nur im adulten Brutkleid. Noch im dritten Kalenderjahr sind die Beine nur blassgelb.



Baltische Heringsmöwen in einer kleinen Brutkolonie auf Gotland.

Der hintere Vogel verrät mit der Farbkombination der Schnabelspitze sein Alter: Er ist im dritten Kalenderjahr. Die Beinfarbe ist blassgelb.

a. Die Alterskleider der Baltischen Heringsmöwe.

Diesjährige Vögel: Alle hier gezeigten Kleider stammen aus der zweiten Juliwoche. Die Beine sind blassgrau, der Schnabel schwarz, die Handschwingen schon ganz dunkel. Diffus abgegrenzte dunkle Schwanz-Endbinde!



Diesjähriger Jungvogel (rechts) mit vorjährigem Vogel (links).



Diesjährige Baltische Heringsmöwe. 13.07.2014. Gotland. Schwarzer Schnabel.



Diesjährige Baltische Heringsmöwe. Die mittleren Steuerfedern sind noch nicht ganz herausgewachsen. Der Schnabel ist ganz schwarz.

Zum Vergleich eine etwa gleichaltrige Sturmmöwe. Sturmmöwen brüten gemeinsam mit den Heringsmöwen in der selben Kolonie auf Gotland.



Diesjährige Sturmmöwe. 11.07.2014. Gotland.

Zum Vergleich: diesjährige Mantelmöwe. Die Beine sind bis zum Tarsusgelenk schon leicht rötlich.



Diesjährige Mantelmöwe, noch nicht voll flugfähig. 06.07.2014. Gotland.

Auf der Nordspitze Gotlands befindet sich eine kleine, einsehbare Kolonie von ca. sieben Brutpaaren (2014) der Baltischen Heringsmöwe, die dort gemeinsam mit Sturmmöwen brüten. Zwei Mantelmöwen mit einem Jungvogel hielten sich ebenfalls dort auf. Eine weiterer ebenfalls kleiner Brutplatz der Baltischen Heringsmöwe mit ca. acht Brutpaaren (2014) befindet sich auf der Südostecke der Insel Fårö. Die Jungvögel aller drei Arten hielten sich im selben Gebiet auf, konnten aber in der Bettelphase den Altvögeln zugeordnet werden.

Die **Baltische Heringsmöwe** im **zweiten Kalenderjahr** zeigt **schokoladenbraun gefleckte Flügeldecken**.



Baltische Heringsmöwe im 2. Kj. mit Altvogel. Die Beine sind nicht gelb, sondern rosa bis bleigrau. Im Hintergrund zum Vergleich die massigere diesjährige Mantelmöwe.



Baltische Heringsmöwe im 2. Kj. Dunkle Schwanz-Endbinde. 13.07.2014.



Baltische Heringsmöwe im 2. Kj. Gotland. Der Schnabel ist nur noch an der Spitze schwarz.

Die **Baltische Heringsmöwe im dritten Kalenderkleid** hat eine besondere Schnabelspitze. Der Nagel ist weiß, die Spitze des Oberschnabels ist noch schwarz, aber der rote Gonysfleck auf dem Unterschnabel ist schon entwickelt. Die dunkle Schwanz-Endbinde ist noch vorhanden, die Flügeldecken sind noch nicht tiefschwarz.



Baltische Heringsmöwe im 3. Kj.. Weiß-schwarz-rote Schnabelspitze. Flügel und Rücken noch nicht tiefschwarz, sondern noch mattschwarz und zu Handschwingen kontrastierend.

Auch in diesem Alterskleid ist die Beinfarbe nicht kräftig gelb, sondern nur blassgelb. Die dunkle Schwanzendbinde ist noch vorhanden. Dieses Kleid wirft Probleme bei der Bestimmung auf, wenn man die Schnabelspitze nicht klar sehen kann. Denn das noch eher matte Schwarz der Handschwingen kontrastiert zu den tiefschwarzen Handschwingen. Da sollte man nicht allzu voreilig auf eine *Larus fuscus ssp. intermedius* oder *graellsii* tippen.



**Baltische
Heringsmöwe im 3.
Kj. Gotland.
12.07.2014.
Kontrast zwischen
Hand- und Arm-
schwingen!
Schwanz-Endbinde.**

Status in Bayern:

Die Baltische Heringsmöwe ist Langstreckenzieher und überquert auf dem Weg in die ostafrikanischen Winterquartiere das östliche Mitteleuropa³⁸. Daher taucht sie in Bayern selten auf. An der Donau bei Straubing wurde am 29.03.2008 ein Exemplar gesichtet (Robert Selch in Naturgucker.de). Ein Erstnachweis in Unterfranken gelang am 14.04.2014 bei Dettelbach. Siehe unter „Besondere Beobachtungen“!

³⁸ Nach P. Hayman&Rob Hume: Vögel. Kosmos-Vlg. 2009. S.272.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft in Unterfranken Region 2](#)

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: [2014](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [2. Baltische Heringsmöwe *Larus fuscus* ssp. *fuscus* 161-172](#)