

6. Gebietsstatus des Wiedehopfs

Zur Situation des Wiedehopfs (*Upupa epops*) in den unterfränkischen Landkreisen Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart

Markus Gläsel

1. Keine Brutnachweise in den Landkreisen Würzburg und Kitzingen

Erstmals seit 2013 konnte im Landkreis Würzburg kein Wiedehopf-Brutpaar festgestellt werden. Die beiden bisher genutzten Brutplätze waren 2018 vakant. Auch im Landkreis Kitzingen, in dem seit 2005 regelmäßig Bruten nachgewiesen werden konnten, blieben die beiden vorjährigen Brutplätze unbelegt. Andernorts konnten ebenfalls keine Bruten entdeckt werden.

2. Ungewöhnlich viele Wiedehopfbeobachtungen in den Landkreisen MSP und WÜ

Im Vergleich zu den letzten sieben Jahren, aus denen kaum Beobachtungen zum Frühjahrszug in den Landkreisen Würzburg und Main-Spessart vorliegen (vgl. Tab 1), wurden 2018 ungewöhnlich viele Wiedehopf-Sichtungen gemeldet.

Zwischen dem 05.04. und dem 11.06. 2018 wurden mindestens elf rastende Wiedehopfe beobachtet – stets einzelne Exemplare. Der Schwerpunkt der Sichtungen lag zwischen dem 08.05. und dem 11.06., einem Zeitraum, in dem sich frühere Wiedehopf-Paare im Landkreis Würzburg in der Brut befanden bzw. Mitte Juni bereits abgeschlossen hatten.

Alle Wiedehopfe, die ab dem 16.05. angetroffen wurden, riefen und waren demnach auf der Reviersuche. Allerdings wurde nur ein Exemplar drei Tage lang am selben Ort beobachtet. Für zwei weitere Einzelexemplare besteht der Verdacht eines längeren Aufenthalts in einem größeren Umfeld. Allerdings wurden diese beiden einzelnen Wiedehopfe an exponierten Standorten in höheren Lagen des Maintals gesichtet, die einen Rasthabitat-Charakter aufweisen, weshalb ein Durchzug nicht ausgeschlossen werden kann.

Jahr	Anzahl der gesichteten Exemplare auf dem Frühjahrszug (inkl. reviersuchende Männchen mit längerer Aufenthaltsdauer)
2018	≥ 11
2017	3
2016	1
2015	1
2014	2
2013	1
2012	3

Tab 1: Meldungen von Wiedehopfen auf dem Frühjahrszug bzw. der Reviersuche in den Landkreisen Würzburg und Main-Spessart. Daten aus *Ornitho*, *Naturgucker* und pers. Mitteilungen.

Ob es einen wetterbedingten Zusammenhang zwischen dem Ausbleiben von Brutpaaren und dem hohen Aufkommen von Einzelexemplaren gibt, konnte nicht geklärt werden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft in Unterfranken Region 2](#)

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: [2018](#)

Autor(en)/Author(s): Gläßel Markus

Artikel/Article: [6. Gebietsstatus des Wiedehopfs 129](#)