

## VII. Reproduktion

### 1. Gruppenbalz der Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Helmut Schwenkert

**Einleitung:** Die Gruppenbalz oder kollektive Balz, bei der mehr als zwei Individuen beteiligt sind, wird nicht nur bei Entenartigen bei winterlichen Ansammlungen beobachtet<sup>137</sup>, sondern auch bei geselligen Arten wie den Krähenvögeln. Dabei werden z. B: Flugmanöver synchronisiert und die Rangfolge zwischen den Männchen ausgekämpft, besonders spektakulär in der Arenabalz der Birk- und Auerhühner. Weniger spektakulär, aber auch selten zu beobachten ist die Gruppenbalz der Kernbeißer, weil sie sich meist in den Baumkronen abspielt. Selten hat man das Glück, dieses Verhalten auf Augenhöhe zu verfolgen.<sup>138</sup>

**Feldprotokoll:** 14.04.2018, Garten in Würzburg/Frauenland, 7°C, sonnig. Dauer der Beobachtung: ca. 3 Stunden: Vom 30.03.2018 bis 15.04.2018 wurde bis zu acht Kernbeißer bei einer hektischen Balz beobachtet. Einige wenige Male zeigte ein Männchen eine Imponierhaltung: gesträubtes Kopfgefieder und gespreizte, etwas herabhängende Schwingen und ein gespreizter Schwanz, wobei der Körper hin- und herpendelte. Bei einzelnen Paaren bettelten die Weibchen, übernahmen das Futter und schnäbelten mit dem Männchen. Männchen und Weibchen jagten sich gegenseitig. Manche der einzeln sitzenden Männchen rissen den Schnabel wiederholt unterschiedlich weit auf, wobei keine Lautäußerungen zu hören waren. Eine Kopula konnte nicht beobachtet werden.



*Abb.1 Kernbeißer balzt mit gespreizten, hängenden Flügeln und gespreizten Kopf- und Schwanzfedern.*

<sup>137</sup> Siehe dazu auch: Herbstbalz der Höckerschwäne und Kolkraben. OAG Jahrbuch 2017, S. 128. Link: <http://naturwerke.net/naturwerke.dll/downloads/pdfE24A.pdf>

<sup>138</sup> Zur Balz von Haubentaucher, Graureiher, Stockenten, Schellenten, Flussregenpfeifer, Rothschenkel, Wasserramsel, Gänsesäger und Star siehe OAG Jahrbuch 2012, S. 169 -215. Link: <http://www.naturgucker.de/files/Publikationen/Jahrbuch2012-121229-klein.pdf>



*Abb. 2: Weibchen bettelt mit offenem Schnabel und vibrierenden Flügeln.*

*Abb. 3: Männchen sperrt den Schnabel auf.*



**Diskussion:** Bemerkenswert ist der späte Zeitpunkt Mitte April,

denn meist findet die Balz in Mitteleuropa schon ab Mitte Februar und hauptsächlich im März statt. Der Februar und März 2018 war im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt sehr kalt, so dass vermutlich deshalb erst im April die Balz in Gang kam. Auch Wanderfalke, Uhu und Kiebitz begannen 2018 spät mit der Brut. Das Schnabelsperrn des Weibchens kann als Bettelgeste verstanden werden. Wenn das Männchen den Schnabel sperrt, dann als Drohgeste gegenüber den anderen Männchen. Die Gruppenbalz legt diese Interpretation nahe.

**Photonachweis:** Alle Photos: Helmut Schwenkert.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft in Unterfranken Region 2](#)

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: [2018](#)

Autor(en)/Author(s): Schwenkert Helmut

Artikel/Article: [VII. Reproduktion 1. Gruppenbalz der Kernbeißer \*Coccothraustes coccothraustes\* 166-167](#)