VI.

**Systematische Aufzählung der in Kärnten
wildwachsenden Gefäßpflanzen**

bearbeitet von

Dechant David Pacher.

II. Abtheilung.

Dicotyledones.

Familie: Cucurbitaceae bis Rosaceae.

84. Familie: **Cucurbitaceae Juss.** Kürbisgewächse.
(Tabell. Uebers. 72. Fam.)

DI. Cucurbita L. Kürbis.

(XXI. 6. n. 585.)

1698. 1. Cucurb. Pepo L. Gemeiner Kürbis.

Koch p. 293; Neilr. p. 776; Grke. p. 150.

Stengel kletternd, steifhaarig; Blätter herzförmig, fünflappig, rauh, Wickelranken ästig; Früchte rundlich oder länglich, glatt; Blume gross, gelb.

Culturpflanze aus Mittelasien, meist in Maisfeldern als Zwischenfrucht angebaut und mit der Maiscultur begrenzt.

☉ Juli bis August.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., Tiffen D. P., Malthal wenig cultivirt Khlmr., Möllthal bis Winklern, im ganzen Oberdrauthale, Gailthale und Kanalthale, im Lesachthale sehr wenig, nur in sehr geschützten, der Sonne zugeneigten Culturflächen D. P., Bleiberg Mar.

DII. Cucumis L. Gurke.

(XXI. 6. n. 586.)

1699. 1. Cucum. sativus L. Gemeine Gurke, Murggen.

Koch p. 294; Neilr. p. 776; Grke. p. 150.

Stengel kletternd, steifhaarig; Blätter herzförmig, fünfeckig, Wickelranken einfach; Früchte länglich, höckerig; Blume gelb.

Culturpflanze aus Ostindien, deren Anbau sich wohl meistens auf die Gärten beschränkt. ☉ Juli bis August.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., Feldkirchen, Obervellach D. P., Berg Khlmr., Lesachthal Jab., Villach Hsr.

DIII. Bryonia L. Zaunrübe.

(XXI. 6. n. 587.)

1700. 1. Bryon. dioica Jacq. Rothbeerige Zaunrübe.

Koch p. 294; Rchb. ic. tab. 260; Neilr. p. 776; Grke. p. 151.

Stengel kletternd; Blätter herzförmig, fünflappig, gezähnt, schwielig rau; Blüten zweihäusig, traubig ebensträussig; Kelch der weiblichen Blüten halb so lang als die Krone, Kronblättchen grünlich gelb; Narben rauhhaarig; Beeren kirschroth.

Zäune, Hecken. 4 Juli bis September.

Klagenfurt, Gntr. fand selbe an einem Gartenzaune an der St. Veiterstrasse, Wolfsberg bei Bauernhöfen Hfnr., Südseite des Dobratsch bei Wasserleonburg Mar.

1701. 2. Bryon. alba L. Schwarzfrüchtige Zaunrübe.

Koch p. 294; Rchb. ic. tab. 259; Neilr. p. 776; Grke. p. 151.

Blüte einhäusig; Kelch der weiblichen Blüten so lang als die Blumenkrone; Narben kahl; Beeren schwarz; s. w. v. Gartenzäune, Hecken. 4 Juli bis September.

Maria Saal und Zollfeld Kkl., Wolfsberg Hfnr., Friesach Kkl., Waiern und Tobitsch zwischen Feldkirchen und Himmelberg, Obervellach D. P., Villach Hsr.

85. Familie: **Portulacaceae Juss.** Portulak-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 94. Fam.)

DIV. Portulaca Tournef. Portulak.

(XI. 1. n. 296.)

1702. 1. Portul. oleracea L. Gemeiner Portulak.

Koch p. 295; Neilr. p. 777; Grke. p. 151.

Stengel nebst den Aesten niedergestreckt; Blätter länglich-keilig, fleischig; Blüten gabelständig oder einzeln, zu zwei bis drei in den Blattwinkeln sitzend; Kelchzipfel stumpf-gekielt; Blume gelb.

Strassenränder bei Dörfern, Gartenunkraut. ☉ Juli bis September.

Klagenfurt Kkl., Tiffen, Obervellach D. P.

DV. Montia Mich. Montie.

(III. 1. n. 30.)

1703. 1. Mont. fontana L. Quellen-Montie.

Wulf. p. 180; Koch p. 296; Neilr. p. 778 α et β ; Grke. p. 151.

Stengel niedergestreckt, wurzelnd, dann aufstrebend, dichtrasig, im Wasser halb untergetaucht flutend, kahl wie die ganze Pflanze; Blättchen gegenständig, lineal-keilig, stumpf, ganzrandig; Blüten endständig oder in den Blattwinkeln, nach dem Verblühen herabgekrümmt, weiss, sehr klein, nur zur Mittagszeit offen.

In Quellen, Bächen mit klarem Wasser bis in die Alpen. ☉ April bis September.

Unteres Lavantthal, Lorenzibrunnen Grf., Stigl beim Ossiachersee, Holzgrenze an der Görlitzen, Grilz bei Himmelberg, Lorenzenbrunnen am kleinen Speickkogel in der Reichenau D. P., Kreuzschlacher - Alm und Stubeneck bei Gmünd Hllbrd., Traxalm im Maltathale Str., Quellen nahe der Möll bei Sagritz D. P.

86. Familie: *Paronychiaceae St. Hil.* Paronychien-Gewächse.
(Tabell. Uebers. 96. Fam.)

DVI. Herniaria Tournef. Bruchkraut.

(V. 1. n. 95.)

1704. 1. Hern. glabra L. Kahles Bruchkraut.

Wulf. p. 321; Koch p. 297; Neilr. p. 779; Grke. p. 152.

Stengel niedergestreckt; Blättchen elliptisch oder länglich, nach dem Grunde verschmälert, kahl; Blütenknäuelchen blattwinkelständig, meist zehnbütig; Kelch kahl.

Auf sandigen, kiesigen Triften, trockenen Haiden. 7 Juli bis Herbst.

Ebenthal an der Glan Kkl., Ulrichsberg an der Lavant und deren Nebenbächen Grf., Bahnhof bei St. Paul Hfnr., Tiffen bei der Kirche und an der Feldkirchner Strasse D. P., Maltathal Khlmr., Möllthal häufig bis Döllach D. P., Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Villacher Bad Grf., all dort auf der Napoleons-Höhe J a b., Globasnitzer Graben gegen die Petzen Jsch.

Anmerkung. Am Glockner und in der Dorfer-Alm (Kalsenthal in Tirol) haben Hinterhuber und Huter auch *Herniaria alpina* Vill. gesammelt. Da diese Pflanze möglicher Weise auch auf der Kärntner Seite des Glockners gefunden werden könnte, so folgt deren Diagnose: Blättchen verkehrt-eiförmig oder länglich, gewimpert, die blattwinkelständigen Knäuelchen ein- bis armbütig, an der Spitze der Aestchen gehäuft; Kelch kurzhaarig, Haare gleich.

87. Familie: *Scleranthaceae Lk.* Knäuelgewächse.
(Tabell. Uebers. 34. Fam.)

DVII. Scleranthus L. Knäuel.

(X. 2. n. 265.)

1705. 1. Scleranth. annuus L. Jähriger Knäuel.

Koch p. 299; Neilr. p. 783; Grke. p. 153.

Blätter schmal, lineal; Blüten meist zehnmännig; Kelchzipfel eiförmig, ziemlich spitz, sehr schmal häutig berandet, so lang als die Röhre, die fruchttragenden etwas abstehend.

Felder und andere cultivirte Orte. ☉ Juni bis Herbst.

Klagenfurt, Krastowitz Trflnr., Grf., Viktring Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Glödnitz, Tiffen, Teichen, am Wöllanernock an der Holzgrenze, Leoben D. P., Umgebung Kanning und Maltathal Khlmr., Obervellach, Sagritz D. P., Bachschutt bei Greifenburg Khlmr., Angeralm in Plöcken B. R.

1706. 2. Scleranth. perennis L. Ausdauernder Knäuel.

Koch p. 299; Neilr. p. 783; Grke. p. 153.

Blätter lineal-pfriemlich; Kelchzipfel lineal-länglich, abgerundet stumpf, mit einem breiten weissen Rande, zur Fruchtzeit fast geschlossen.

Sonnige Hügel, trockene felsige Plätze. 4 Mai bis October.

Pölling unter der Saualm Gntr., Eberstein Js.

Anmerkung. Reichenbach hat die Gattung *Scleranthus* einer Revision unterzogen, aber die Bearbeitung ist, so weit uns bekannt, nicht veröffentlicht worden, sondern nur eine Aufzählung. Die österr. bot. Zeitschrift, Jahrg. 1876, S. 152, enthält aus der Feder des Herrn P. Joh. Wiesbauer S. J. eine Notiz, in welcher auch aus dem Lavantthale drei Arten *Scleranthus* aufgezählt werden, nämlich:

Scleranthus brachyodon Rehb. Auf dem Burgstall bei St. Andrä Wsbr.

Scleranthus obsoletus Rehb. Am Waldrande bei St. Andrä Baumgartner S. J.

Scleranthus stenoleucus Rehb. Am Burgstall bei St. Andrä Wsbr.

88. Familie: ***Alsineae* D. C.** Mierengewächse.

(Tabell. Uebers. 95. Fam.)

1. Gruppe: ***Polycarpeae* D. C.** Blätter mit häutigen Nebenblättchen.

DVIII. Spergula L. Spark.

(X. 5. n. 289.)

1707. 1. Sperg. arvensis L. Acker-Spargel, Spargel, Ackermies.

Wulf. p. 491 Sperg. laricina L.; Koch p. 127; Neilr. p. 781; Grke. p. 68.

Blätter lineal-pfriemlich, gebüschelt-quirlig, unbegrant, oberseits convex, unterseits mit einer Furche durchzogen; Blütenstiele nach dem Verblühen herabgeschlagen; Same kugelig-linsenförmig, von feinen Körnchen etwas rauh, mit einem schmalen, glatten Flügelrande umzogen; Blume weiss.

Unkraut in Aeckern, stellenweise in Menge. ☉ Juli bis October.

Klagenfurt Kkl., Goding im Lavantthale Grf., Eberstein Wulf., Umgebung Tiffen in Flatschach, Leinig, Steindorf D. P., Kanning und Maltathal Khlmr., Möllthal in Teichl, bei Penk D. P., Malnitz Berr., Berg und Weissbriach Khlmr., Loibl Hsr.

1708. 2. Sperg. pentandra L. Fünfmänniger Spark.

Koch p. 128; Neilr. p. 781; Grke. p. 68.

Blätter unterseits glatt, ohne Furche; Same flach zusammengedrückt, glatt, mit einem verbreiterten strahligerieften Flügelrande umzogen; s. w. v.; Blume weiss.

Felder auf sandigem Boden. ☉ Mai bis Juni.

Maltathal Khlmr.

DIX. Spergularia Presl. Salzmiere.

(X. 3. n. 278.)

1709. 1. Sperg. rubra Presl. Rothe Salzmiere.

Koch p. 128 Lepigonum rubrum Wahlbnrg.; Neilr. p. 782; Grke. p. 69 Alsine r. Wahlbnrg.

Stengel gestreckt, aufstrebend; Blätter lineal-fadenförmig, stachelspitzig, etwas fleischig, beiderseits flach; Kelchblättchen lanzettlich, stumpf, nervenlos, am Rande häutig; Kapsel so lang als der Kelch; Same fast dreieckig, fein runzelig, ungeflügelt; Blume rosenröthlich.

Sandige trockene Plätze bis in's Gebirge. ☉ Mai bis September.

Kreuzbergl Grf., Siebenhügel Kkl., Waidmannsdorf Js ch., Sandstellen an der Lavant und deren Nebenbächen Grf., Bahnhof St. Paul Hfnr., Neualbeck bei Sirnitz, Tiffen im Winkl und auf der Manessen D. P., Kanning und Maltathal Khlmr., Winklern an der Iselsberger Strasse, Tröpolach D. P., Napoleonswiese beim Warmbad Villach Preissm.

2. Gruppe: **Sabulineae Fenzl.** Blätter nebenblattlos; Kapsel mit so vielen Klappen aufspringend, als Griffel vorhanden sind; Klappen ungetheilt.

DX. Sagina L. Mastkraut.

(X. 5. n. 288.)

1. Rotte: **Saginella Koch.** Kelch- und Blumenblätter, Staubfäden und Griffel 4; Kapsel vierklappig.

1710. 1. Sag. procumbens L. Niederliegendes Mastkraut.

Wulf. p. 222; Koch p. 125; Rehb. ic. fig. 4959; Neilr. p. 784 *a* glaberrima; Grke. p. 67.

Stengelchen niederliegend, wurzelnd; Aestchen aufstrebend; Blätter lineal, stachelspitzig, ganz kahl, abgeblühte Blütenstiele an der Spitze hackig, fruchttragende aufrecht; Kelchblättchen stumpf, grannenlos; Kronblättchen stumpf, grannenlos, drei- bis viermal kürzer als der Kelch; Blume weiss.

Verlassene Kohlstätten, Holzlagerplätze, feuchte Wege, Teichdämme bis in die Alpen. ☉ Mai bis Herbst.

Landhaushof Zwgr., am Wörthersee bei Loretto, bei den Sieben Hügeln Kkl., Koralm Gntr., Lavantthal Grf., Tiffen, Saureggen in Reichenau, Leoben, St. Peter im Katschthale D. P., Sauleiten bei Heiligenblut B. R., durch's Möllthal bis in die Gamsgrube D. P., Berg und Weissbriach Khlmr., Tröpolacher Alm, Bombaschgraben D. P., Warmbad Villach Preissm.

1711. 2. Sag. bryoides Frölich. Moosartiges Mastkraut.

Koch p. 125; Rchb. ic. fig. 4955; Neilr. p. 784
S. procumbens L. β ciliata.

Stengel kriechend; Blättchen schwach gezähnt, fein gewimpert, nur bei jüngeren Blättchen bemerkbar; Kronblättchen eiförmig, spitz, um die Hälfte kürzer und schmaler als der Kelch, weiss; s. w. v.

Im feuchten Sande oder auf faulendem Holze. ☉ Mai bis August.

An der Drau bei Oberdrauburg bis zur Tiroler Grenze Jab.

1712. 3. Sag. apetala L. Blumenblattloses Mastkraut.

Wulf. p. 223; Koch p. 125; Rchb. ic. fig. 4958; Neilr. p. 785; Grke. p. 67.

Stengel aufrecht, vom Grunde an ästig; Seitenästchen aufstrebend; Blättchen lineal, begrannt, am Grunde gewimpert; abgeblühte Blütenstielchen aufrecht, kaum einwärts geneigt; zwei äussere Kelchblättchen kurz, stachelspitzig, Spitzchen einwärts gekrümmt; Kronblättchen lanzettlich, sehr klein, vielmal kürzer als der Kelch, weiss.

Auf Aeckern, Weiden. ☉ Mai bis Juli.

Sveta Petsch (Heilige Wand) zwischen Loibl- und Bodenthal in den Karawanken Hsr. 1814.

2. Rotte: Spergella Rchb. Kelch- und Kronblättchen, Staubfäden und Griffel 5; Kapsel fünfklappig.

1713. 4. Sag. Linnaei Presl. Linnè's Mastkraut.

Wulf. p. 490 Spergula saginoides L.; Koch p. 125 Sagina saxatilis Wimmer; Rchb. ic. fig. 4962 Sag. sagin.; Neilr. p. 785; Grke. p. 67.

Stengelchen niederliegend, aufstrebend; Blättchen lineal kurz stachelspitzig; Blütenstielchen nebst Stengel kahl, abgeblühte nickend, fruchttragende aufrecht; Kronblättchen kürzer als der Kelch, weiss.

Auf feuchten Stellen auf Alpen und Voralpen. ☉ Juni bis August.

Am Wege von Wolfsberg auf die Koralm Preissm., Saualm Jsch., Flatnitz und beim Bade St. Leonhard in Benesirnitz D. P., Malnitz am Thörlkopf, Sickerköpfl Hkl., Zechneralm Berr., Astenalm bei Sagritz, Tröpolacher-Alm, Bombaschgraben D. P., Kühweger-Alm und Luschariberg Kkl., Karawanken Jab., Seleniza Jsch., Loibl, Baba Kkl., Grf. als *Sag. glabra* Koch.

1714. 5. *Sag. macrocarpa* Rchb. Grossfrüchtiges Mastkraut.

Rchb. ic. fig. 4963 b. *Spergella macrocarpa*; Neilr. p. 785 *Sag. saxatilis* Wimmer.

Kahl; Blätter lineal; Blütenstielchen sehr lang, verblüht nickend, später aufrecht; Kelch- und Kronblättchen abgerundet, fast gleichlang; Kapsel doppelt so lang; Blume weiss.

In sandigen Vertiefungen auf Alpen. ☉ Juni bis Juli.

Höhe der Görlitzen sehr selten, Malnitzer Tauern, Zirknitzalm bei Sagritz D. P.

DXI. *Facchinia* Rchb. *Facchinie*.

(X. 3. n. 279.)

1715. 1. *Facch. lanceolata* M. et K. Lanzettblättrige *Facchinie*.

Koch p. 129; Rchb. ic. fig. 4940. *Arenaria cherleroides* Vill.

Stämmchen rasig, gestreckt; Stengelchen aufstrebend; Blättchen aus abgerundetem Grunde lanzettlich, spitz, flach, unterseits mehrnervig, kurz gewimpert; Blütenstielchen endständig, ein- bis dreiblütig; Kelchblättchen lanzettlich, spitz, meist fünfnervig, ungefähr so lang als die weissen Kronblättchen.

Auf und zwischen Felsen auf Alpen, kalkliebend. ☿ Juli bis August.

Gamsgrube bei Heiligenblut Hppe., Grf. *forma laxa* Koch, Ostseite des Polinik im Gailthale D. P. *Forma condensata* Koch.

DXII. *Alsine* Wahlb. *Miere*.

(X. 3. n. 277.)

a. Blätter elliptisch, lanzettlich oder länglich.

1716. 1. *Als. octandra* Sieber. Achtmännige *Miere*.

A. Kerner Schedae N. 564 *Sommerauera quadrifaria* Hppe.; Koch p. 130 *Alsine aretioides* M. et K.;

Rehb. ic. fig. 4902 Siebera cherlerioides Schrader;
Cherleria octandra Jacq.

Rasig; Blättchen stumpf, kurz stachelspitzig, oberseits tiefrinnig, unterseits convex, kahl, dachig sich deckend; Blüten einzeln, endständig, sitzend, vierblättrig, achtmännig, weiss; Kapsel dreiklappig, vieleiig.

Felsen der höchsten Kalkalpen. 4 Juni bis Juli.

Heiligenblut Hppe., Grf., Rudnikofel und Hochstadl bei Pirkach, Lamprechtskofel Jab., Plöcken Hrnschch., Hsr., Jab., Lesachthal hinterm Tuffbade gegen die Kerschbaumer-Alm, Polinik und Gartnerkofel im Gailthale D. P., Kühweger-Alm Hrnschch., Koch, Wischberg zwischen Wolfsberg und Raibl Mrchs., Obir am Nordabhange des Gipfels Vst., Hsr.

b. Blätter schmal-lineal oder pfriemlich, einnervig oder nervenlos auch im getrockneten Zustande.

1717. 2. Als. biflora Wahlbrg. Zweiblütige Miere.

Koch p. 130; Rehb. ic. fig. 4939 Alsinanthe biflora Sw.;
Stellaria bifl. L.

Stämmchen gestreckt rasig; Blättchen schmal-lineal, unbewehrt, nervenlos, unterseits etwas convex; Aestchen ein- bis zweiblütig; Kelchblättchen lineal, kappenförmig zusammengezogen, sehr stumpf, dreinervig; Kronblättchen länglich keilförmig, wie die Kapsel anderthalbmal so lang als der Kelch; Blume weiss.

Abhänge hoher Alpen. 4 Juli bis August.

Kapponigalm bei Obervellach, Astenalm bei Sagritz D. P., Kalserthörl 2400 m. an der Grenze gegen Tirol Htr., Kreuzkofelgruppe 2100 m. im Lesachthale Jab.

1718. 3. Als. laricifolia Wahlbrg. Lerchenblättrige Miere.

Koch p. 131; Rehb. ic. fig. 4932 Wierzbickia striata Kit.;
Neilr. p. 788 α puberula.

Blätter lineal-pfriemlich, nervenlos; Stämmchen rasig, aufstrebend, ein- bis vielblütig; Kelchblättchen lineal-länglich, abgerundet stumpf, dreinervig, Kronblättchen keilig, noch einmal so lang als der Kelch; Blume weiss.

Auf trockenen Plätzen der Alpen und Voralpen. 4 Juli bis August.

Reichenauer Alpen Rehb. Fl. germ. p. 92 Text, Pasterze Hppe. als Arenar. striata L., Bleiberg gegen den Dobratsch Mar.

c. Blätter wie b. v., aber dreinervig, wenigstens im getrockneten Zustande.

1719. 4. Als. austriaca M. et K. Oesterreichische Miere.

Wulf. p. 480 *Arenaria austriaca* Jacq.; Koch p. 131; Rchb. ic. fig. 4925 *Neumayera austriaca*; Neilr. p. 787.

Stämmchen niedergestreckt, sehr ästig, Stengelchen aufrecht, oberwärts nackt, zweiblütig; Blätter schmal-lineal, dreinervig, aderlos; Blütenstielchen endständig, gepaart, sehr lang; Kelchblättchen lanzettlich spitz, dreinervig, am Rande häutig, kürzer als die Kapsel; Kronblättchen länglich, an der Spitze gezähnt oder gestutzt, am Grunde keilig, beinahe noch einmal so lang als der Kelch, weiss.

Im Gerölle auf Kalkalpen. 4 Juli bis August.

Alpen um Kanning Khlmr., Hofalm im Leobengraben, Mussenhöhe, Lesachthal im Tuffbad-Graben gegen die Kerschbaumer-Alm, Wolaja, Polinik, Rosskofel im Gailthale D. P., Dobratsch Wulf., Karawankenkette Jsch., Kotschna im Bärenthale Jab., Loibl Hppe 1802, Kkl., Ortatscha, Seleniza, Obir Kkl., Petzen beim Signale Weld.

1720. 5. Als. Villarsii M. et K. Villars Miere.

Koch p. 131; Rchb. ic. fig. 4926 *Neumayera Villarsii*.

Stengelchen aufrecht, drei- bis siebenblütig; Blätter entfernt aderig; Blütenstiele flaumig; Kelchblättchen länger als die Kapsel; s. w. v.

Gerölle der Kalkalpen. 4 Juli bis August.

Ortatscha Kkl., Ursulaberg im Miesthale Jab.

1721. 6. Als. verna Bartling. Frühlings-Miere.

Wulf. p. 481 *Arenaria verna* L.; Koch p. 131; Rchb. ic. fig. 4929 *Tryphane verna*; Neilr. p. 786 α collina; Grke. p. 70; *Arenaria caespitosa* Ehrh.

Stämmchen rasig, blühende Stengelchen aufstrebend oder aufrecht, ein- bis vielblütig; Blättchen lineal-pfrienlich, dreinervig; Kelchblättchen eiförmig, lanzettlich spitz, dreinervig, am Rande häutig; Kronblättchen kurz benagelt, länglich, am Grunde beinahe herzförmig, kürzer als der Kelch, weiss.

Sandhügel und trockene Weiden. 4 Mai bis Juli.

Dorf Berg ober der Satnitz Hppe. 1802, Kkl., Buttergraben gegen Maria Rain Zwgr., Maria Rain Kkl., Hollenburg Grf., Gurnitz Drechnr., Rabensteiner Berg im Lavantthale Grf., Eberstein Js., Kuppe des Ulrichsberges Wulf., Osterwitz und bei Feldkirchen D. P., Kребenzen Vst., Malnitzer

Tauern als *Aren. caesp.* Bs chf., Raibl Wulf., Bleiberg Mar., häufig bei Eberndorf Wulf.

1722. 7. Als. Gerardi Willd. Gerards Miere.

Koch p. 132 Als. verna β alpina; Rchb. ic. fig. 4928
Triphane Gerardi; Neilr. p. 787 Als. verna β . alpina;
Arenaria liniflora Jacq.

Hellgrün, rasig; Stengelchen steifaufrecht, ein- bis dreiblütig, Blütenstielchen endständig; Kronblättchen breit-eirund, länger als die eirund spitzigen, geradnervigen Kelchblättchen; Blume weiss; s. w. v.

Kiesige, steinige Stellen auf Alpen. 4 Juli bis August.

Krebenzen B. R., Winterthal, Leitersteig, Reichenauer Alpen, Wöllanernock D. P., Alpen um Kanning, Faschaun in der Maltein Khlmr., Malnitzer Alpen Hkl., Malnitzer Tauern fl. pleno Breidler, Asten, Pasterze, Leiter D. P., Brennkogel Mldo., Fragant Grf., Stogar, Reisskofel Khlmr., Mussen D. P., Plöcken B. R., Rosskofel D. P., Kanalthaler Alpen Rssmn., Raibl aufden Galmeihalden Zwgr., Gailitz-Gries bei Arnoldstein Jab., Dobratsch Mar., Obir Preissm., Petzen bei der Pyramide Weld., Einsattlung Veški Legar Krstf., Oistriza und Rinka Weiss.

1723. 8. Als. sedoides Fröhlich. Fetthennähnliche Miere.

Koch p. 132; Rchb. ic. fig. 4961 *Sagina decandra* Rchb.

Stengelchen sehr ästig; Aestchen aufrecht, gleichhoch; Blättchen lanzettlich-lineal, dreinervig, kahl; Blütenstielchen endständig, ungefähr so lang, als der Kelch, einzeln oder gepaart; Kelchblättchen eiförmig, spitz, dreinervig, am Rande häutig; Kronblättchen eiförmig, am Grunde abgerundet, kurz benagelt, länger als der Kelch, weiss.

Auf Hochalpen. 4 Juli bis August.

Luschariberg Kkl.

1724. 9. Als. recurva Wahlbrg. Krummblättrige Miere.

Koch p. 132; Rchb. ic. fig. 4930 *Tryphane recurva* All.

Wurzel holzig, vielästig; Stengel aufsteigend, wenigblütig; unterste Blättchen dicht ziegelständig und gekrümmt; Kelchblättchen eilanzettlich, spitz, dreinervig, die beiden äussern fünf- bis siebennervig; Kronblättchen breitoval, länger als der Kelch, weiss.

Sonnige, felsige Plätze auf Alpen. 4 Juli bis August.

Krebenzen Grf., Thorwand und Rodresnock (Moschelitzen) in der Reichenau D. P., Malnitz am Sickerköpfel und Thorkopf Hkl., Astenalm und an der Möll bei Sagritz herabgeschwemmt D. P., Kreuzeck bei Greifenburg Preissm.,

Polinik bei Mauthen Jsch., Raibl auf den Galmeihalden
Z w g r.

1725. 10. Als. setacea M. et K. Borstige Miere.

Koch p. 132; Rchb. ic. fig. 4921 *Sabulina setacea*
Thuill.; Neilr. p. 787; Grke. p. 70.

Stengelchen oberwärts rispig; Blättchen pfriemlich borstig;
Blütenstielchen länger als der Kelch, dessen Blättchen eiförmig,
spitz, kreideweiss, fast knorpelig, mit krautigen einnervigen
Rückenstreifen; Kronblättchen oval, wenig länger als der
Kelch, weiss.

An felsigen Plätzen. ☿ Juli bis August.

Eberndorf Grf.

1726. 11. Als. Jacquini Koch. Büschelblütige Miere.

Koch p. 133; Rchb. ic. fig. 4919 *Minuartia fastigiata*
Smith.? Rchb.; Grke. p. 70; Neilr. p. 787 *Als. fasti-*
giata M. et K.

Stengel oberwärts ästig; Blüten büschelig ebensträussig;
Blütenstielchen kürzer als die Deckblättchen; Kelchblättchen
ungleich, lanzettlich-pfriemlich, sehr spitz; Kronblättchen drei-
mal kürzer als der Kelch, weiss.

Trockene Hügel und Sandfelder. ☉ Juli bis August.

Kärnten Koch l. c.

DXIII. Cherleria L. Cherlerie.

(X. 3. n. 276.)

1727. 1. Cherl. sedoides L. Fetthennähnliche Cherlerie.

Wulf. p. 485; Koch p. 134; Rchb. ic. fig. 4903; Neilr.
p. 786 *Alsine Cherleri* Fenzl.

Sehr dichtrasig; Aestchen mit den abgedorrten Blättchen
früherer Jahre besetzt; Blättchen lineal-pfriemlich, unterseits
convex, oberseits flach, glatt, glänzend; Blüten gipfelständig;
Kelchblättchen länglich, eiförmig, spitz; Kronblättchen fehlen,
statt denselben fünf sehr kurzgestielte Honiggefässe; Kapsel
dreifächerig, vielsamig.

β. ciliata. Blättchen gefranst-gewimpert.

Felsen auf Alpen, meist in grossen Rasen. ☿ Juni bis
August.

Gipfel der Koralm Grf., Winterthal, Leitersteig,
Reichenauer Alpen, Falkart, Stangalm, Stern im Katschthale
D. P., Alpen um Kanning, Faschaun und Elend in der Maltein
Khlmr., Alpen um Malnitz Hkl., Tauern Gntr., Lonza,
Ruden D. P., Mochar und Waschgang Wulf., Pasterze
Hppe., BsCHF., Reisskofel, Rosskofel, Wolaja D. P., Küh-
weger-Alm B. R., Auernig bei Pontafel Preissm., Wischberg

Schnk., Dobratsch Mar., Kotschna Jab., kleine Baba Vst., Erjauza, Ortatscha, Koschuta, Obir Kkl., Zwrg., Petzen W el d.
β. Rudnikkofel bei Pirkach Jab.

3. Gruppe: **Stellarineae Fenzl.** Kapsel entweder mit ebensovielen an der Spitze zweispaltigen oder mit doppelt sovielen ungetheilten Klappen aufspringend, als Griffel vorhanden.

DXIV. *Moehringia* L. *Moehringie*.

(X. 3. n. 280.)

1728. 1. **Moehr. muscosa** L. Gemeine Moehringie.

Koch p. 134; Rehb. ic. fig. 4900; Neilr. p. 789;
Grke. p. 71.

Stengel rasig, gestreckt; Blätter fädlich, spitzlich, halbstielrund, nervenlos, kahl, grasgrün; Blütenstiele endständig, zwei- bis siebenblütig; Kelchblättchen eilanzettlich, spitz, einnervig; Blüten vierblättrig, achtmännig, länger als der Kelch, weiss.

Feuchte, schattige Felsen auf Voralpen, steigt tief herab.
4 Mai bis Juli.

Satnitz Kkl., Zwgr., Unterlavanththal Grf., Hüttenberg gegen Heft, Flatnitz D. P., Krnbrgr., Kanning und Malthal Khlmr., Katschthal D. P., Malnitz Hkl., Obervellach in schattseitigen Gräben, Sagritz, Heiligenblut D. P., Oberdrauthal, Latschur, Weissbriach Khlmr., Radegund-Graben im Lesachthale sehr häufig D. P., am kleinen Zelon in der Plöcken B. R., Schattseite bei Tröpolach D. P., Garnitzenschlucht bei Hermagor Preissm., Kanalthal Rssmn., Raibl am Fusse des Königsberges Zwgr., Bleiberg und Dobratsch Mar., Strassenmauer nächst dem Villacher Bade D. P., durch die ganze Karawankenkette bis in die subalpine Region häufig Jab., Bärenthal, Loibl Kkl., Koschuta Drchnr.

1729. 2. **Moehr. Ponaë Fenzl.** Fleischigblättrige Moehringie.

Koch p. 134; Rehb. ic. fig. 4936; Neilr. p. 789.

Blätter stielrund, stumpf, kurz stachelspitzig, nervenlos, fleischig, kahl, meergrün; Stengel rasig gestreckt; Blütenstielchen endständig, meist zweiblütig; Kelchblättchen eilanzettlich, stumpf, dreinervig; Blüte zehnmännig, Krone fünfblättrig, Blättchen länger als der Kelch, weiss.

In Kalkgebirgen. 4 Juli.

Santern auf der Plöcken B. R., 2. Band, S. 140, als *Arenaria bavarica*. Wohl die folgende Art.

1730. 3. Moehr. polygonoides M. et K. Knöterichartige Moehringie.

Wulf. p. 482 *Arenaria polygon.*; Koch p. 134; Rchb. ic. fig. 4937; Neilr. p. 789.

Blätter lineal-fädlich, etwas fleischig, nach dem Grunde verschmälert, nervenlos; Blütenstielchen seitenständig, ein- bis mehrblütig; Kelchblättchen eilanzettlich, stumpf, im getrockneten Zustande dreinervig; Kronblättchen länger als der Kelch, weiss.

Felsige Weiden und Gerölle auf Alpen und an Alpenbächen im Hochgebirge. ♀ Juni bis Juli.

Lonza in Malnitz Hkl., Polinig bei Obervellach, Schober, Astenalm, Möllufer bei Sagritz D. P., Hochsattel auf der Pasterze Hppe., D. P., Lesachthal Jab., Frohn- und Luggauer Alpen, Plöcken B. R., Reisskofel, Weissbriach Khlmr., Rudnigalm, Rosskofel, Kühweger-Alm, Gartnerkofel, Rattendorfer-Alm D. P., Jab., Kaltenbrunn bei Malborgeth Rssmn., Wischberg Schnk., Geröllfelder beim Raiblersee Preissm., Bleiberg gegen den heiligen Stein Wulf., Kum, Mittagkogel Vst., Karawanken, Stougruppe Jab., Koschuta Drehr., Petzen Weld., Oistriza und Rinka Weiss.

1731. 4. Moehr. villosa Fenzl. Zottige Moehringie.

Arenaria villosa Wulf. p. 797; Koch p. 134; Rchb. ic. fig. 4947.

Blätter lanzettlich-lineal, spitz, nach dem Grunde verschmälert, nervenlos, unterste viel kleiner, elliptisch, in den Blattstiel zusammengezogen, nebst Stengel überall flaumig; Stengel rasig, aufstrebend; Blütenstielchen endständig, ein- bis dreiblütig, Stielchen nach dem Verblühen zurückgeschlagen; Kelchblättchen lanzettlich, spitz, nervenlos; Kronblättchen länger als der Kelch, weiss.

In Kalkgebirgen. ♀ Juli bis August.

Loibl Grf.

1732. 5. Moehr. sphagnoides Froel. Moos-Moehringie.

Rchb. ic. fig. 3938.

Dicht polsterförmig; Blättchen gleichbreit, dreikantig-rundlich, stumpf spitzlich, dachziegelständig; Blütenstielchen paarig, fast endständig, kürzer als die Blüte; Kronblättchen doppelt so lang als der stumpfblättrige Kelch, weiss; Kapsel länger, vorgestreckt.

Auf Kalkalpen. ♀ Juli bis August.

Rosskofel 1860 D. P. mit Schweizer Exemplaren vergleichen.

1733. 6. Moehr. diversifolia Dolliner. Verschiedenblättrige Moehringie.

Koch p. 135; Rchb. ic. fig. 4947 b. M. heterophylla Dolliner.

Blätter lineal-lanzettlich, spitz, am Grunde in den Blattstiel verschmälert, unterste eiförmig, spitz, gestielt; Blütenstiele drei- bis viermal länger als das Blatt, ein- bis dreiblütig, nach dem Verblühen gerade vorgestreckt; Kelchblättchen eiförmig, einnervig, äussere spitz, innere stumpf, Kronblättchen so lang als der Kelch, weiss.

In Urgebirgen. 4 Juni bis Juli.

Waldregion der Koralm Js ch., nächst der Bodenhütte all dort Preissm., Hartneidstein und bei Preblau Grf., Twimberger Graben und bei St. Gertraud J a b., Waldensteiner Graben Hf n r., Hartelsberg im Oberlavanthtal Grf.

1734. 7. Moehr. trinervia Clairv. Dreinervige Moehringie.

Wulf. p. 483 Arenaria trinerv. L.; Koch p. 135;

Rchb. ic. fig. 4943; Neilr. p. 790; Grke. p. 71.

Stengel ästig, Blätter sämtlich eiförmig, spitz, drei- bis fünfnervig, untere gestielt, Blattstiel so lang als das Blatt; Kelchblättchen spitz, dreinervig, Nerven genähert, der mittlere stärker; Kronblättchen kürzer als der Kelch, weiss.

An Zäunen, in feuchten Gebüsch, Waldblößen.

☉ Mai bis Juli.

Klagenfurt Kkl., Satnitz Gfr., Zwgr., Lavanthtal, Umgebung von St. Paul Grf., Wolfsberg Hf n r., Lölling sehr üppig, Tigring, Glödnitz, Sirnitz, Tiffen D. P., Kanning Khl m r., Leoben, Wolfsbach im Katschthale bei 1500 m. nur 2·7 cm. hohe Exemplare, Obervellach sehr selten D. P., Berg, Weissensee, Kreuzberg, Weissbriach Khl m r., Malborgeth, Raibl Rss m n., Bleiberg Mar.

DXV. Arenaria L. Sandkraut.

(X. 3. n. 281.)

1735. 1. Aren. serpyllifolia L. Quendelblättriges Sandkraut.

Wulf. p. 483; Koch p. 135; Rchb. ic. fig. 4941;

Neilr. p. 790; Grke. p. 71.

Stengel aufrecht, gabelspaltig; Blätter eiförmig, zugespitzt, sitzend, unterste in einen kurzen Blattstiel zusammengezogen; Blüten zerstreut, einzeln in den Gabeln und Blattwinkeln; Kelchblättchen lanzettlich, zugespitzt, dreinervig, anderthalbmal so lang als die Krone, der trockenhäutige Rand der inneren so breit als der grüne Theil; Kronblättchen oval, nach dem Grunde verschmälert, weiss.

Aecker, sandige Raine, Mauern, bis auf die Alpen.

⊙ Mai bis August.

Klagenfurt Kkl., Ebenthal, Feldkirchen einmal ein Stoppelfeld ganz besetzt, Glödnitz D. P., Maltathal Khlmr., Malnitz Hkl., durch's Möllthal, jedoch nicht häufig D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Tröpolach D. P., Bleiberg Mar.

Anmerkung. *Arenaria sphaerocarpa* Tenore ist nach Rehb. nur eine kräftige *Aren. serpyllifolia*. Obir Jab.

1736. 2. Aren. Marschlinsii Koch. Marschlins Sandkraut.

Koch p. 135; Gaudin fl. helv. III., p. 192. *Aren. serpyllif. β. alpina*.

Zwergig, sehr ästig, behaarter als vorige; Kelchblättchen haarspitzig, der häutige Rand derselben um die Hälfte schmaler als der krautige; Kronblättchen eiförmig, weiss.

In der Nähe der Gletscher bei Felsblöcken. ⊙ Juli bis August.

Am hohen Sattel (Franz Josefs - Höhe) in der Pasterze D. P.

1737. 3. Aren. ciliata L. Gewimpertes Sandkraut.

Koch p. 136; Rehb. ic. fig. 4942; Neilr. p. 790 *β. multiflora*.

Stengel rasig aufstrebend, an der Spitze drei- bis siebenblütig; Blättchen eilanzettlich, spitzlich, in einen kurzen Blattstiel herablaufend, am Grunde borstig gewimpert; Blüten endständig; Kelchblättchen im trockenen Zustande mehrnervig; Kronblättchen länger als der Kelch, eiförmig, kurz benagelt, weiss.

β. frigida. Koch p. 136; *Aren. multicaulis* Wulf. als Art; Neilr. p. 790 *α pauciflora*; Rehb. ic. fig. 4950 als Art. Blätter fast sitzend, breit eiförmig, Stengelchen wenig-, oft nur einblütig. Wohl eine *forma compacta* der *Aren. ciliata*.

Felsige, kiesige Plätze auf Hochalpen. 4 Juli bis August.

Winterthal, Reichenauer Alpen, Falkart D. P., Bockalm und Stinigeck in Kanning Khlmr., Wolfsbachalm im Katschthale D. P., Alpen um Malnitz Hkl., Lonza bei Obervellach D. P., Pasterze Hppe., D. P.

β. Thorwand ob dem Ursprung der Gurk D. P., Malteiner Alpen Khlmr., Hofalm im Leobengraben D. P., Malnitzer Tauern Wulf., BsCHF., Pasterze BsCHF., Dbnr., Kapponiger- und Fraganter Alpen, Wurten, Ruden, Waschgang, Mocharkopf D. P., kleine Zirknitz und kleine Fleiss

Wulf, Lanischalpe im Katschthale, Rudnikkofel, Hochstadl, Lamprechtskofel J a b., Wolfsbach und Wischberg M r c h s., Erjauza K k l., Obir J s c h.

1738. 4. Aren. biflora L. Zweiblumiges Sandkraut.

Wulf. p. 484; Koch p. 136; Rchb. ic. fig. 4949; Neilr. p. 791.

Stämmchen gestreckt, ausläuferartig; blüentragende Aestchen seitenständig, sehr kurz, dicht beblättert, an der Spitze ein- bis zweiblütig; Blättchen rundlich, stumpf, kurzgestielt, am Grunde borstig gewimpert; Kelchblättchen schwach einnervig; Kronblättchen länger als der Kelch, oval, nach dem Grunde verschmälert, weiss.

Felsige, sandige Plätze auf Alpen. 7 Juli bis August.

Kor- und Saualm K k l., Gertruskogel Strnbg. 1808, Hfnr., Reichenauer Garten Vst., D. P., Winterthal, Leitersteig, kleiner Speickkogel, Kruken, Wöllanernock, Stangalm, Katschthaler Alpen D. P., Faschaun und gegen das kleine Elend in der Maltein K h l m r., Alpen um Malnitz H k l., um Obervellach D. P., Fraganter Alpen G u s s b r., Möllgries bei Sagritz D. P., Mochar, Waschgang, kleine Fleiss Wulf., Franz Josefs-Höhe auf der Pasterze Preissm., Oberdrauthaler Alpen K h l m r., Polinig D. P., Kreuzeck Preissm., Frohn- und Luggauer Alpen B. R., Mussen, Plöcken, Grossrudnig und Tresdorfer-Alm im Gailthale D. P., Obir Grf.

1739. 5. Aren. grandiflora All. Grossblumiges Sandkraut.

Koch p. 136; Neilr. p. 791; Rchb. ic. fig. 7946.

Stämmchen rasig; Stengelchen aufstrebend, ein- bis dreiblütig; Blätter lanzettlich - pfriemlich, begrannt, am Rande verdickt, unterseits einnervig, Nerven stark; Kelchblättchen lanzettlich, zugespitzt, begrannt, einnervig; Kronblättchen länglich, verkehrt-eiförmig, noch einmal so lang als der Kelch, weiss.

Felsige Gebirgswiesen. 7 Juli.

Sauleiten und Pasterze B. R. als *Aren. juniperina* Vill. Jsch., Dobratsch Hsr. als *Cerastium strictum*, Petzen W e l d.

DXVI. Holosteum L. Spurre.

(X. 3. n. 282.)

1740. 1. Holost. umbellatum L. Doldenblütige Spurre.

Wulf. p. 180; Koch p. 137; Rchb. ic. fig. 4901; Neilr. p. 791; Grke. p. 71.

Blätter sitzend, eiförmig, stumpflich, unterste länglich; Blütenstiele in Dolden, nach dem Verblühen zurückgeschlagen; Blume weiss.

Wiesen, Aecker zwischen Getreide. ☉ Mai bis Juni.

Malnitz Berr. Wohl nur mit Getreide eingeschleppt und wieder verschwunden, wächst aber höchst wahrscheinlich im Lavantthale.

DXVII. *Stellaria* L. Sternmiere.

(X. 3. n. 283.)

1. Rotte: **Dichodon Bartl.** Kapsel an der Spitze in Zähnen aufspringend; Samensäulchen lineal, verlängert.

1741. 1. **Stell. cerastoides L.** Hornkrautähnliche Sternmiere. Wulf. p. 488 *Cerastium refractum* All.; Koch p. 137; Rchb. ic. fig. 4915 *Dichodon cerastoides* Bartling; Neilr. p. 796 *Cerast. trigynum* Vill.; *St. multicaulis* Vill. und *Centunculus alpinus* Scop. nach Vst. in Flora 1820, S. 359.

Stengel stielrund, gestreckt, an der Spitze aufstrebend und mit einer herablaufenden Haarlinie besetzt, drei- bis vielblütig, Blütenstielchen flaumig, nach dem Verblühen herabgeschlagen; Blätter sitzend, länglich-lanzettlich, kahl, untere stumpf, am Grunde verschmälert, oberste beinahe eiförmig, spitz; Kronblättchen weiss, länger als der Kelch.

Grasige, steinige Alpenweiden auf mehr feuchtem Boden. 4 Juli bis August.

Winterthal D. P., Kanning, Faschaun, Glockscharte, Elend Khlmr., Rchrdt., Malnitzer Tauern Sns. 1799, Luckenwände, Rometerspitz in Malnitz Hkl., Kaponigalm bei Obervellach, Göritzalbl ob Sagritz, Hochsattel der Pasterze D. P., Pasterze und Gamsgrube Dbnr., Plöcken, Rudnigalm bei Tröpolach, Roskofel D. P., Kaltwasser bei Raibl Wulf., Ortatscha Hsr.

Anmerkung. Schunk will in Saifnitz gegen den Luschariberg auch *Stellaria viscida* M. v. Bieberst. = *Cerastium anomalum* W. et K. gefunden haben. Ob eine Verwechslung mit *Cerast. semidecandrum* L. = *Cerast. viscidum* Lnk. stattfand? Bei *Stell. viscida* ist der Stengel stielrund, gerillt, oberwärts gabelrispig, vielblütig; Blätter lineal, untere gestielt, fast spatelig, Blattrand, Blütenstielchen und Kelch klebrig-flaumig; Krone länger als der Kelch, weiss.

2. Rotte: **Hyleria Koch.** Kapsel bis zur Mitte und darüber in Klappen aufspringend, s. w. 1. Rotte.

1742. 2. **Stell. nemorum L.** Wald-Sternmiere.

Koch p. 137; Rchb. ic. fig. 4906; Neilr. p. 794; Grke. p. 72.

Stengel aufstrebend, oberwärts zottig; Blätter gestielt, herzförmig, zugespitzt, die an den Aesten sitzend; Rispe gabelspaltig; Kelchblättchen lanzettlich; Kronblättchen tief zweispaltig, noch einmal so lang als der Kelch, weiss; Kapsel länglich, länger als der Kelch.

Feuchte Plätze in Wäldern, Gebirgen bis in die Alpen.
 4. Mai bis Juli.

Satnitz Kkl., zwischen Gurnitz und Mieger Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Lölling, Tiffen, Sirnitzer Bad D. P., Kanning Khlmr., Malnitz gemein Hkl., Obervellach bis Heiligenblut D. P., Berg und Weissbriach Khlmr., Kanalthal Rssmn., Wischberg Mrchs., Dobratsch Mar., Rubland Zwgr., Loibl Hsr., Nordseite des Ursulaberges bei Prevali J a b.

3. Rotte: **Stellaria Koch.** Kapsel am Grunde abgerundet oder wenig verschmälert; Samensälulchen sehr kurz; s. w. v.

1743. 3. **Stell. media Vill.** Gemeinste Sternmiere, Hühnerdarm.
 Wulf. p. 484 *Alsine media* L.; Koch p. 137; Rchb. ic. fig. 4904; Neilr. p. 793 α *oligandra*; Grke. p. 72.

Stengel aufstrebend, gabelspaltig, einzeilig behaart; Blätter eiförmig, kurz zugespitzt gestielt, obere sitzend, Blüten gabel- und endständig; Kronblättchen tief zweitheilig, so lang oder kürzer als der Kelch, weiss; Kapsel länglich, länger als der Kelch; Blüte drei- bis fünfmännig, auch unterm Schnee grün.

β . *neglecta* Weihe Grke. p. 72; Rchb. ic. fig. 4905; Koch β *major*; Neilr. β *decandra*. Pflanze in allen Theilen grösser, Blüte zehnmännig; verschwindet im Herbste.

An Wegen, in Gräben, auf Aeckern oft zahllos, als Gartenunkraut sehr lästig. ☉ Februar bis November.

Durch ganz Kärnten verbreitet bis zu den Alpenhütten Kkl., Hfnr., Zwgr., Khlmr., Mar., D. P.

β . Auf feuchtem Gailgries bei Watschig D. P.

1744. 4. **Stell. Holostea L.** Grossblütige Sternmiere.
 Koch p. 138; Rchb. ic. fig. 4908; Neilr. p. 792; Grke. p. 72.

Stengel aufstrebend, vierkantig; Blätter sitzend, lanzettlich, lang zugespitzt, am Rande und auf dem Kiele rau; Ebenstrass gabelig; Deckblättchen krautig; Kelchblättchen nervenlos; Kronblättchen zweispaltig, noch einmal so lang als der Kelch, weiss; Kapsel kugelig, so lang als der Kelch.

Grasreiche Plätze, Gebüsch, Ufer. 4 April bis Mai.

Ufer der Lavant bei St. Paul Grf., Wolfsberg häufig Hfnr., Trixen Kkl., Raibl? Mrchs.

1745. 5. Stell. graminea L. Grasartige Sternmiere, weisser Hühnerdarm.

Koch p. 138; Rchb. ic. fig. 4911; Neilr. p. 793; Grke. p. 72.

Stengel ausgebreitet, viereckig, kahl; Blätter sitzend, lanzettlich, spitz, kahl, am Grunde wimperig; Ebenstrauß gabelig; Deckblättchen trockenhäutig, am Rande gewimpert; Kelchblättchen dreinervig; Kronblättchen zweitheilig, so lang als der Kelch, weiss; Kapsel länglich, länger als der Kelch.

β. Kronblättchen fast noch einmal so lang als der Kelch.

Ackerränder, Gebüsch, Wiesen, sehr verbreitet. 4 Mai bis August.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., Kanning, Maltathal Khlmr., Obervellach, Sagritz D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Bleiberg Mar.

β. Tiffen, Flatschach, Teichen D. P.

4. Rotte: **Larbrea St. Hilaire.** Kapsel am Grunde verschmälert, daher der Grund des Kelches trichterförmig.

1746. 6. Stell. uliginosa Murray. Schlamm-Sternmiere.

Koch p. 139; Rchb. ic. fig. 3669 *Larbrea uliginosa* Murr.; Neilr. p. 793; Grke. p. 73.

Stengel ausgebreitet, viereckig, kahl; Blättchen sitzend, länglich-lanzettlich, kahl, am Grunde bewimpert; Rispe gabelig; Deckblättchen trockenhäutig, am Rande kahl; Kelchblättchen dreinervig; Kronblättchen zweitheilig, kürzer als der Kelch, weiss; Kapsel eiförmig, ungefähr so lang als der Kelch.

Bei Quellen, in Gräben, sumpfigen Wiesen. 4 Juni bis August.

Klagenfurt, Gössling Kkl., Ufer der Lavant und Nebenbäche Grf., Saualm Kkl., Flatnitz, Glödnitz, Sirnitz, Görkitzen an der Holzgrenze D. P., Maltathal Khlmr., Malnitz, Sagritz D. P.

DXVIII. Malachium Fries. Weichkraut.

(X. 5. n. 291.)

1747. 1. Malach. aquaticum Fries. Wasser-Weichkraut.

Wulf. p. 490 *Cerast. aquaticum* L.; Koch p. 140; Rchb. ic. fig. 4967; Neilr. p. 794; Grke. p. 73.

Stengel gestreckt und kletternd, am Grunde wurzelnd; Blätter herz-eiförmig, zugespitzt, sitzend, die der unfrucht-

baren Stengel gestielt, Blattstiel ungefähr so lang als das Blatt; Rispe gabelig, spreitzend, drüsenhaarig; Deckblättchen krautig; Kronblättchen zweitheilig, weiss.

Feuchte Gebüsche, Ufer, Gräben. 4 Juni bis September.

Satnitz Wulf., Wolfsberg Hfnr., Tiffen D. P., Kanning Khlmr., Obervellach D. P., Berg Khlmr., Tröpolach, Villacher Bad D. P., Villach Hsr.

DXIX. *Cerastium* L. Hornkraut.

(X. 5. n. 290.)

1. Rotte: **Orthodon Ser.** In der Regel 5 Griffel, die Kapsel mit 10 Zähnen aufspringend.

a. Wurzel einjährig, einfach; Stengel nicht wurzelnd, unfruchtbare Schösslinge und ausdauernde Stämmchen fehlen, ebenso die Knospen in den Blattwinkeln.

1748. 1. *Cerast. brachypetalum* Desp. Kurzblütiges Hornkraut.

Koch p. 140; Rchb. ic. fig. 4971; Neilr. p. 796; Grke. p. 74.

Kraut graugrün, Haare grau; Blätter länglich-eiförmig, untere in den Blattstiel verschmälert, nur die obersten Aestchen der Rispe einander genähert; Deck- und Kelchblättchen abstehend behaart, fruchttragende Blütenstielchen zwei- bis dreimal länger als der Kelch; Blume weiss.

Grasige Hügel, Raine, Aecker in sonnigen Lagen. ☉ April bis Juni.

Kreuzbergl Kkl., Osterwitz, St. Urban ober Glanegg, Tiffen D. P., Kanning Khlmr.

Anmerkung. Im Jahre 1866 trat dieses Hornkraut mit *Alchemilla arvensis* L. um Tiffen in Menge auf, im Jahre 1867 war von beiden keine Spur zu finden. Auch stimmt dieses *Cerastium* mit dem in der Fl. exsicc. austro-hung. von A. Kerner nicht, wohl aber mit Reichenbachs Abbildung überein.

1749. 2. *Cerast. glomeratum* Thuill. Geknäultes Hornkraut.

Koch p. 140; Rchb. ic. fig. 4970 *Cerast. vulgatum* L.; Neilr. p. 797; Grke. p. 74.

Kraut blass, fast gelbgrün; Blättchen rundlich eiförmig, seltener länglich, untere in den Blattstiel verschmälert; Blüten geknäult; Deck- und Kelchblättchen behaart; fruchttragende Blütenstielchen und Kronblättchen etwa so lang als der Kelch; Blume weiss.

Aecker, Raine, dürre Weiden. ☉ Mai bis Juli.

St. Martin bei Klagenfurt Gntr., Tiffen D. P., Um-

gebung Kanning, Maltathal Khlmr., Obervellach D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Gailthal bei Watschig D. P.

1750. 3. Cerast. semidecandrum L. Fünfmänniges Hornkraut. Wulf. p. 488 Cerast. pentandrum L.; Koch p. 140; Rchb. ic. fig. 4968; Neilr. p. 797; C. viscidum Lk.; Grke. p. 74.

α. scarioso-bracteatum Fenzl.

Stengel aufrecht oder aufstrebend; Blättchen länglich und oval, untere in den Blattstiel verschmälert, obere sitzend; Aestchen der Rispe gehäuft; Deckblättchen sämtlich nebst Kelchblättchen halbtrockenhäutig, an der Spitze kahl, ausgebissen gezähnt; fruchttragende Blütenstielchen zwei- bis dreimal länger als der Kelch, herabgebogen; Kronblättchen fast so lang oder kürzer als der Kelch, weiss.

β. pallens. Blassgrün, obere Deckblättchen sehr breit, trockenhäutig berandet, ohne auslaufenden Mittelnerv, fruchttragende Blütenstielchen zurückgebogen.

Brachäcker, Haiden, sonnige trockene Hügel. ☉ März bis Juni.

α. Kreuzbergl Kkl., einst auf den Stadtmauern in Klagenfurt Wulf., Tiffen, Obervellach D. P., Malnitz Berr., Berg Khlmr.

β. Am Pfaffenberge in der Nähe der Ruine Oberfalkenstein im Möllthale D. P.

1751. 4. Cerast. glutinosum Fries. Niedriges Hornkraut.

Koch p. 141; Rchb. ic. fig. 4969; Neilr. p. 798 Cerast.

semid. β. herbaceo-bracteatum Fries; Grke. p. 74

Cerast. semid. β. glutinosum.

Deckblättchen krautig, obere nebst dem Kelche am Rande trockenhäutig, an der Spitze kahl nebst einem krautigen beinahe auslaufenden Mittelstreifen; fruchttragende Blütenstielchen wagrecht abstehend s. w. v.; wohin wohl sehr wahrscheinlich als Varietät gehörig.

Brachäcker, Weiden auf sehr trockener Unterlage. ☉ März bis Mai.

Klagenfurt Wulf., Glödnitz, Tiffen, Tröpolach D. P.

b. Wurzel zwei- oder mehrjährig, aber von keiner langen Dauer, nebst den blühenden Stengeln unfruchtbare Schösslinge treibend; Stengel zuletzt am Grunde wurzelnd oder wagrecht kriechend; manchmal fehlen die unfruchtbaren Schösslinge, dann finden sich aber bei der verblühten Pflanze in den untersten Blattwinkeln Knospen für's nächste Jahr vor.

1752. 5. Cerast. triviale Link. Gemeines Hornkraut.

Koch p. 141; Rchb. ic. fig. 4972; Neilr. p. 798; Grke. p. 74.

Stengel aufstrebend; Blätter länglich oder eiförmig, untere in den Blattstiel verschmälert, obere sitzend; obere Aestchen der Rispe gehäuft; Deckblättchen nebst dem Kelche am Rande trockenhäutig, an der Spitze kahl; fruchttragende Blütenstielchen zwei- bis dreimal so lang als der Kelch; Kronblättchen so lang als der Kelch, weiss.

α. *hirsutum*. In allen Theilen gleichförmig kurzhaarig, nicht klebrig.

β. *glandulosum*. Haare der Blütenstiele und Kelche drüsig klebrig.

γ. *glabratum*. *Cerast. holosteoides* Fries? Stengel einreihig behaart, nicht klebrig, Blättchen und Kelche ziemlich kahl.

Sehr verbreitet in Aeckern, auf Wiesen, Weiden, durch ganz Kärnten. ☉—4 Mai bis September.

Klagenfurt Kkl., Kreuzbergl Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Lölling, Gurkthal, Tiffen, durch's Möllthal allenthalben D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Gailthal und Villach D. P., Hsr. als *Cerast. vulgatum*, Heiligengeist und Bleiberg Mar.

β. Am Goggowitsch bei Tiffen und Tröpolach D. P.

γ. Bei St. Peter im Katschthale D. P.

1753. 6. *Cerast. macrocarpum* Schur. nicht Boiss. Grossfrüchtiges Hornkraut.

Oesterr. bot. Zeitschrift XXVI., S. 177 *Cer. longirostre* Wichura; *Cer. triviale* var. *alpestre* Lindbl. Hartm.; Koch p. 142 *Cer. triv. alpinum*.

Stengel und Blätter mehr weniger lang behaart; Blätter auch breiter als bei *C. triviale*; Blütenstand wenigblütig, Rispe aufgelöst; Deck- und Kelchblättchen halbtrockenhäutig; Blütenstielchen zweimal so lang als der Kelch, fruchttragende herabgebogen; Kronblättchen etwas länger als der Kelch, weiss; Samen beträchtlich grösser als bei *C. triviale*.

Alpen- und Voralpenwiesen und Weiden. 4 Juni bis August.

Moschelitzen in der Reichenau 1863, Wallnock bei Obervellach, Albitzen bei Sagritz 1850 D. P., nach von Uechtritz ein im Jahre 1816 von Hoppe bei Heiligenblut gesammeltes Exemplar.

1754. 7. *Cerast. subtriflorum* Rchb. Dreiblütiges Hornkraut.

Rchb. ic. fig. 4975 b.

Blätter breit oval; Blütenstand schon vor der Blüte ganz auseinandertretend, meist dreiblütig; das Grün der Pflanze

dunkel, Behaarung schwach; Kronblättchen doppelt so lang als der Kelch, weiss.

Auf Alpen. 4 Juli.

Wischberg in Raibl bei 2000 Meter Juli 1882 Huter. Diese Pflanze stimmt mit der oben citirten Abbildung von Reichenbach in der kleinern Figur gut.

Anmerkung. Schunk will im Römerthal und -Pass auch *Cerastium sylvaticum* W. et Kit. gefunden haben. Die Diagnose dieser Pflanze lautet: Unterste Blätter eiförmig, spitz, plötzlich in den Blattstiel zusammengezogen, mittlere länglich, obere lanzettlich verschmälert, zugespitzt; Rispe reichblütig, ausgebreitet; untere Deckblätter krautig, obere schmal trockenhäutig; Fruchtsiele verlängert, abstehend; Blume weiss.

c. Wurzel über der Erde ausdauernde, ästige Stämmchen treibend, einen Rasen blühender und unfruchtbarer Stengel bildend.

1755. 8. *Cerast. arvense* L. Acker-Hornkraut.

Koch p. 143; Rchb. ic. fig. 4980 α ; Neilr. p. 799 α ; Grke. p. 75.

Stämmchen gestreckt, am Grunde wurzelnd; Stengel aufstrebend, vielblütig; Blättchen lineal-lanzettlich oder lineal; Deckblättchen breit trockenhäutig berandet; Blütenstiele kurzhaarig flaumig, nach dem Verblühen aufrecht; Kelch nickend; Kronblättchen doppelt so lang als der Kelch; weiss.

β . *strictum* Haenke als Art, Wulf. p. 489; Koch p. 144; Rchb. ic. fig. 4980 β ; Neilr. p. 799 C. *arv.* β *glabrescens*. Stengel und Blätter kahl, letztere am Grunde gewimpert; Wachstumsverhältniss gedrängt.

Sonnige Hügel, Wegränder, Ackerraine bis in die Alpen, wo β vorkommt. 4 April bis August.

α . Klagenfurt Kkl., Strassenrain beim Schrotthurm Js ch., Annabrücke Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Kребenzen-Bachgerölle bei St. Salvator Zwgr., nordwärts von St. Veit Js ch., Bleiberg Mar., Villach Js ch., Hollenburg Hsr., Kirschentheur Kkl.

β . Winterthal, Reichenauer Garten, Katschthaler Alpen D. P., Kanninger- und Malteiner Alpen Khlmr., Möllthal auf der Pfaffenberger-Alm und Lonza D. P., Fraganter Alpen Gussbr., Tauern, Pasterze, Grossglockner Wulf., Wangernitzen bei Sagritz D. P., Pirkacher Bergwiesen Jab., Kühweger-Alm Wulf., Vst., Bombaschgraben D. P.,

Kanalthal Rssmn., Wischberg Mrchs., Dobratsch Mar., Loibl Kkl., Baba Vst., Obir Trflnr., Hochpetzen Jab., Steiner Alpen Freyer, Oistriza Weiss.

Anmerkung. Nach Preissmann ist die Pflanze vom Obir *Cerast. arv. γ suffruticosum*, wohl nach Koch p. 144, bei welchem die Blätter aufrecht, steifer, die Deckblätter mit einem trockenhäutigen, breitem Rande umzogen und nur am Grunde gewimpert, aber am Rande fast ganz kahl sind.

1756. 9. *Cerast. alpinum* L. Alpen-Hornkraut.

Koch p. 143; Rchb. ic. fig. 4977; Neilr. p. 800; Grke p. 75.

Stämmchen kriechend; blühende Aestchen aufstrebend, eip- bis fünfblütig; Blätter elliptisch oder lanzettlich; Deckblättchen krautig, an der Spitze schmal trockenhäutig; Blütenstielchen nach dem Verblühen schief abstehend; Kronblättchen noch einmal so lang als der Kelch, weiss.

α. *genuinum*. Ganze Pflanze graulich weiss, anliegend behaart.

β. *glabratum* Wahlb. Ganze Pflanze kahl.

γ. *glanduliferum*. Stengel oberwärts nebst Blütenstielchen drüsig behaart.

Grasige Stellen auf Alpen und Voralpen. 4 Juni bis August.

Winterthal, Reichenauer Garten, Moschelitzen D. P., Faschaun, Glockscharte und Langwand bis zum Kleinelenzbach in der Maltein Khlmr., Malnitzer Tauern Dbnr., Hochtriften in der Malnitz, Lonza Hkl., Astenalm und Zirknitz bei Sagritz D. P., Pasterze B. R., Bs chf., grüne Thür Dbnr., Latschur 2200 m. Khlmr., Zoche K., Frohn- und Luggauer Alpen, Plöcken B. R., Luschariberg, Wischberg Schnk., Geröllfelder am Raiblersee Preissm., Dobratsch Hsr., Mar., Karawanken Jab., Seleniza Js ch.

β. Kребenzen B. R., Malnitzer Tauern D. P., Spitze der Obir Jab.

γ. Seleniza Js ch.

1757. 10. *Cerast. lanatum* Lam. Wolliges Hornkraut.

Wulf. p. 489 C. *alpinum* L.; Koch p. 143 C. *alp. γ. lanatum*; Rchb. ic. fig. 4976.

Stämmchen niedergestreckt; Blätter an den nichtblühenden Aestchen rosettig, in krause weisse Wolle eingehüllt, eirund; Stengel und Blättchen der blühenden Aestchen wollig-

zottig; s. w. v. Wenigstens eine sehr auffallende Varietät von *C. alpinum*?

Felsige Stellen und steinige Triften auf Alpen. 4 Juli bis August.

Krebenzen Steyr., Reichenauer Garten, auf den ersten Blick von *C. alpinum* zu unterscheiden Wulf., Hppe., D. P., Rinsenock an der Turracher Höhe Jab., Glockscharte in der Maltein Khlmr., Zietenhöhe sowohl auf der Möllthaler als Tiroler Abdachung Jab.

1758. 11. *Cerast. carinthiacum* Vest. Kärntnerisches Hornkraut.

Koch p. 143 *C. ovatum* Hppe.; Rchb. ic. fig. 4977 b; Neilr. p. 800.

Stämmchen am Grunde wurzelnd, blühende Stengelchen aufstrebend, sechs- bis neunblütig; untere Blätter lanzettlich, obere am Grunde eiförmig, verschmälert, spitz; Deckblättchen mit trockenem, breiten Hautrande, kahl, am Grunde etwas wimperig; Blütenstiele kurzhaarig flaumig, nach dem Verblühen schief abstehend; Kronblättchen noch einmal so lang als der Kelch, weiss.

β. angustifolium. Blätter schmal lanzettlich.

Im feuchten Kiese der Kalkalpen. 4 Juli bis August.

Bockalm und Stinigeck in Kanning Khlmr., Lesachthaler Alpen Jab., Plöcken Vip., Rattendorfer-Alm Jab., Rosskofel, Grossrudnig, Watschiger-Alm D. P., Kühweger-Alm Kkl., Kanalthal in Wolfsbach Mrchs., Wischberg Mrchs., Schnk., Raibl und Kaltwasser Zwgr., Karawanken Js ch., Koschuta Vst., Kum, Ortatscha, Loibl, Seleniza Hppe., Kkl., Kotla, Obir Kkl., Rinka Weiss.

1759. 12. *Cerast. latifolium* L. Breitblättriges Hornkraut.

Wulf. p. 489; Koch p. 142; Rchb. ic. fig. 4975; Neilr. p. 800.

Stämmchen rasig, gestreckt; blühende Stengelchen an der Spitze aufstrebend, ein-, selten mehrblütig; Blättchen elliptisch oder länglich, stumpf abgerundet; Deckblättchen krautig; Blütenstielchen nach dem Verblühen eingeknickt; Kronblättchen noch einmal so lang als der Kelch, Kelchblättchen stumpf; Blume weiss. Blätterform ziemlich veränderlich mit Uebergängen:

α. Blättchen breiteförmig; Blütenstielchen kurz.

β. Blättchen länglich, schmal, stumpf; Blütenstielchen verlängert.

γ. Blättchen klein, oboval; Blütenstielchen im Verhältnisse sehr lang, einblütig, wohl kaum *Cerast. uniflorum* Murr., welches nach Gaud. Fl. helv. Tom. III, p. 251, sehr kurze, fast in dem obersten Blätterpaar ver-

steckte Blütenstielchen hat, wie auch Rchb. ic. fig. 4975 c. solches abbildet.

Kiesige Stellen auf Hochalpen sehr verbreitet. 7 Juli bis August.

Winterthal, Stangalm, Lanisch gegen den Hafner D. P. und Stern im Katschthale Jab., Malteiner Alpen Khlmr., Malnitzer Tauern Bschr. 1822 D. P., Alpen um Malnitz Hkl., Alpen bei Spittal, Mochar, Waschgang, kleine Zirknitz, kleine Fleiss Wulf, Wolligger-, Fraganter- und Astner Alpen D. P., Sauleiten und Trog bei Heiligenblut B. R., Salmshöhe am Glockner, Pasterze Hppe., Harg., grüne Thür Dbnr., Lesachthaler Alpen Jab., Reisskofel Khlmr., Plöcken B. R., Watschiger Alm Vlp., Kühweger-Alm B. R., Mangart Freyer, heilige Wand in den Karawanken Zwgr.

β. Thorwand ob dem Ursprung der Gurk, Kapponiger-Alm bei Obervellach, Malnitzer Tauern D. P., hoher Sattel in der Pasterze Hppe., D. P., unter dem Schwertek bei 8800' Mldo. als *C. glaciale* Gaud., Dobratsch Hsr.

γ. Heiligenbluter Tauern auf dem magern Joche gegen die grosse Fleiss D. P. 1847, Gamsgrube Preissmann als *Cerast. uniflorum* Murr.

Anmerkung. Die Form eines *C. latifolium*, welche A. Kerner in seiner *Fl. exsicc. austr.-hung.* N. 56 bringt, ist, so weit dem Verfasser bekannt, in Kärnten noch nicht beobachtet worden. Sie ähnelt sehr unserm *C. carinth. latifolium*, während Blütenstand und Blüte doch zu *C. latif. L.* gehört.

2. Rotte: **Strephodon Seringe.** Kapsel gerade mit zirkelförmig zurückgerollten Zähnen.

1760. 13. **Cerast. grandiflorum W. et Kit.** Grossblütiges Hornkraut.

Koch p. 144; Rchb. ic. fig. 4987.

Stämmchen gestreckt, am Grunde wurzelnd; Stengel aufstrebend, knotig-gegliedert, die nichtblühenden dicht-rasig, blühende aufrecht, sieben- bis fünfzehnblütig; Blätter schmal-lineal, etwas fleischig, unterseits convex, getrocknet am Rande zurückgeschlagen; Blume weiss.

Auf Alpen. 7 Juli bis August.

Pasterze B. R., jedoch in neuerer Zeit nicht mehr gefunden.

Anmerkung. Das auf der Kребenzen angegebene *C. tomentosum* L. wird wohl mit *C. lanatum* Lam. zusammenfallen.

89. Familie: *Sileneae* **De C.** Taubenkropfgewächse.
(Tabell. Uebers. 92. Fam.)

1. Gruppe: **Diantheae** **Alex. Braun.** Kelch verwachsenblättrig, Kelchblätter ein-, drei- bis eilfnervig, die zwei äussersten Nerven vor den Rand gestellt, die Verbindungslinie zweier Kelchblätter immer zwischen zwei Nerven fallend; Narben in der Regel zwei; Keim kreisförmig, gekrümmt.

DXX. Gypsophila L. Gipskraut.

(X. 2. n. 268.)

1. Rotte: **Struthium** **Ser.** Wurzel ausdauernd; Blüten in rispig zusammengesetzten Trugdolden.

1761. 1. Gyps. repens L. Kriechendes Gipskraut.

Wulf. p. 464; Koch p. 108; Rchb. ic. fig. 5000; Neilr. p. 801; Grke. p. 59.

Stengel oberwärts locker ebensträussig, nebst Aestchen kahl; Blätter lineal, nach beiden Enden verschmälert; Kelch kreiselförmig glockig; Zipfel eiförmig; stumpf; Staubgefässe und Griffel kürzer als die weisse oder röthliche Krone.

Steinige Abhänge auf Alpen und mit den Alpenbächen in die Thäler herabsteigend. 4 Mai bis August.

Katschthal J a b., Maltathal K h l m r., Malnitz im Thale und den umliegenden Höhen H k l., Gräben bei Obervellach und am Ufer des Malnitzbaches bei Raufen D. P., Ufer der Möll bei Sagritz, an der Fleiss bei Pockhorn und auf allen Alpen Möllthals Wulf., Trflnr., Blm fld., Jsch., Gussbr., Stogar und Grakofel im Oberdrauthale, Latschur, Weissbriach K h l m r., Lesachthal J a b., Wolaja D. P., Plöcken, Tröpolacher-Alm B. R., Pontebbaner Gebirge Wulf., Bombasch-Graben D. P., Kanalthal R s s m n., Wischberg Schnk., Ortatscha, Bärenthal K k l.

2. Rotte: **Dichoglottis** **Fisch. et Meyr.** Wurzel jährig; Blüten über die ganze Pflanze trugdoldig zerstreut.

1762. 2. Gyps. muralis L. Mauer-Gipskraut.

Wulf. p. 465; Koch p. 108; Rchb. ic. fig. 4997; Neilr. p. 802; Grke. p. 59.

Stengel aufrecht, fast gabelspaltig, ästig-rispig, am Grunde etwas rauh; Blätter lineal; Blüten zerstreut; Kelch

kreiselförmig fünfzählig, Zähnchen abgerundet, stumpf; Kronblättchen gekerbt oder ausgerandet, hellpurpurn mit gesättigten Aederchen.

Sonnige, sandige Raine. ☉ Juni bis October.

Auf der Platten bei Freienthurn und bei Waidmannsdorf Js ch., bei der Kirche St. Martin bei Klagenfurt Wulf., Satnitz Kkl., Glanhofen, Umgebung Tiffen, Steindorf, überall selten D. P., Friedhofmauer in Berg Khlmr., Loibl Hsr., im Walde vor dem Kleperdig am Wege Grf.

DXXI. Tunica Scop. Felsnelke.

(X. 2. n. 269.)

1763. 1. Tun. Saxifraga L. Steinbrech-Felsnelke.

Koch p. 109; Rchb. ic. fig. 5006b; Neilr. p. 804

Dianth. saxifragus L.; Grke. p. 59.

Stengel nach allen Seiten hin ausgebreitet; Blätter lineal, spitz, am Rande rauh, am Grunde häutig berandet; Kelch glockig, stumpf, fünfzählig, Krone bleichpurpurn, ausgebreitet.

Auf Felsen, Mauern, trockenen sonnigen Hügeln, im Schotter und Sande an Bach- und Flussufern. 7 Juni bis October.

Umgebung Klagenfurt Js ch., Kkl., Theaterschütt, Kreuzbergl Zwgr., St. Martin Wulf., Wolfsberg Hfnr., Friesach Preissm., Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., durch's ganze Möllthal D. P., Malnitz Hkl., Heiligenblut Blmfl., Oberdrauburg Zwgr., Berg, Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Raibl Zwgr., Sonnseite Bleiberg Mar., Föderaun D. P., Loibl Hsr., Strassenmauer bei Unterloibl J a b.

DXXII. Dianthus L. Nelke.

(X. 2. n. 270.)

1. Rotte: **Kohlrauschia Fenzl.** Blüten gebüschelt, kopfförmig zusammengezogen; Büschel von sechs bis acht und jede einzelne Blüte von zwei trockenen, häutigen Deckblättern eingehüllt; Kelche walzig; Kelchblättchen dreinervig, durch häutige Randstreifen verbunden; Kronblättchen in einen linealen Nagel zusammengezogen; Kapseln bei der Fruchtreife den Kelch seitlich durchreissend.

1764. 1. Dianth. prolifer L. Sprossende Nelke.

Koch p. 109; Rchb. ic. fig. 5009 Kohlrauschia prolifera Knth.; Neilr. p. 804; Grke. p. 59 Tunica prolifera Scop.

Stengel kahl; Blätter lineal; die zwei äussern Hüllschuppen um die Hälfte kürzer, stachelspitzig, innere stumpf, länger als der Kelch; Krone rosenroth oder röthlichlila.

Sonnige trockene Raine. ☉ Juni bis Juli.

Strassenrand bei Tiffen und auf der Fressen ob Tiffen
D. P.

2. Rotte: **Armeriastrum Seringe**. Blüten gebüschelt, mehr oder weniger zusammengezogen; Kelche walzig, am Grunde mit zwei oder mehreren krautartigen oder trockenhäutigen Deckblättern umgeben; Kelchblättchen sieben-, neun- bis eilfnervig, ohne häutigen Randstreifen; Kapsel den Kelch nicht durchreissend.

1765. 2. Dianth. Armeria L. Rauhe Nelke.

Wulf. p. 466; Koch p. 110; Rchb. ic. fig. 5011; Neilr. p. 805; Grke. p. 60.

Blätter kurzgestielt, lineal-lanzettlich, nebst dem Stengel weichhaarig; Blattscheiden so lang als die Blattspreite; Kelchschuppen und Deckblättchen lanzettlich, pfriemlich, krautig, rauhaarig; Blume hellkarminroth, dunkel punktirt. Gebüschel, Waldränder. ☉ Juni bis August.

Gurlitsch bei Krumpendorf J. ab., Grutschen bei St. Paul im Lavantthale Grf., Tiffen gegen Sallach, Sonnberg und Steindorf D. P., Hermagor Wulf., Villach H. s. r.

1766. 3. Dianth. barbatus L. Bart-Nelke.

Wulf. p. 467; Koch p. 110; Rchb. ic. fig. 5013; Neilr. p. 806; Grke. p. 60.

Blätter kurzgestielt, lanzettlich; Kelchschuppen krautig, eiförmig, begrannt; äussere Deckblätter lineal-lanzettlich, sehr spitz, zurückgebogen, absteheud; Blume dunkel- oder hellroth.

Gebirgs- und Alpenwiesen. ☿ Juni bis Juli.

Satnitz Wulf., Trflln. r., Kkl., Grf., Jsch., Abhänge der Goding und Unterhausschlucht hinter dem Rabenstein im Lavantthale Grf., Pasterze D. P., Astenalm Hppe., Bschf. 1822 zum ersten Male hier blühend, D. P., Alpen bei Berg und Weissbriach Khlmr., Lesachthal J. ab., Mussen und Plöcken D. P., Kreuzberg bei Mauthen auf Kohlenkalk Str., Kanalthal Rssmn., Karawanken J. ab., Bahouz Grf.

1767. 4. Dianth. Carthusianorum L. Karthäuser-Nelke, Buschnagelan.

Wulf. p. 467; Koch p. 110; Rchb. ic. fig. 5019; Neilr. p. 805; Grke. p. 60.

Stengel kahl, Blätter lineal, ihre Scheiden viermal länger als die Blattspreite; Kelchschuppen lederartig, braun, trockenhäutig, verkehrt-eiförmig, pfriemlich-begrannt; Deckblättchen fast gleichgestaltet, Platte des Kronblättchens so lang als der Nagel; Blume blutroth.

Trockene Hügel bis in die Alpen, hier sogar öfters einblütig. 4 Juni bis September.

Satnitz Kkl., Gurnitz Zwgr., um St. Paul im Lavantthale Grf., Wolfsberg Hfnr., Friesach Preissm., Osterwitz, Kraig Ende September die Form *pratensis* Neilr., Tiffen, Reichenauer Garten sogar einblütig, Form *nanus* Neilr., Leoben D. P., Katschthal Jab., Maltathal Khlmr., Malnitz Berr., durch's ganze Möllthal, jedoch nicht häufig D. P., Oberdrauthal Khlmr., Pasterze Preuer als *D. vaginatus* Vill., Tröpolach D. P., Bleiberg Mar., Villach Hsr.

1. Anmerkung. Schunk will bei Tarvis auch *Dianthus collinus* W. et Kit. gefunden haben, den Koch p. 111 als Varietät γ zu *D. Seguierii* Villars zieht. Neilreich schreibt von *D. collinus*, er sei dem *Carthusianorum pratensis* sehr ähnlich und unterscheide sich von ihm nur durch die kaum eine Linie langen Blattscheiden.

2. Anmerkung. Wulfen gibt an sonnigen grasigen Hügeln bei Klagenfurt, z. B. am Schmalzbergel, *Dianthus atrorubens* All. an. *D. atrorubens* hat ein sehr blütenreiches, zwölf- bis dreissigblütiges Köpfchen und die Platte des Kronblättchens ist nur halbsolang als der Nagel.

3. Rotte: **Caryophyllum Seringe.** Blumen einzeln oder in einer endständigen, unregelmässigen, lockern, meist armbblütigen Trugdolde, oder der Stengel nur einblütig; Kelch walzig, am Grunde mit zwei krautigen Deckblättern.

α . Blumenkrone gezähnt oder fast ganzrandig.

1768. 5. **Dianth. deltoides L.** Deltafleckige Nelke.

Wulf. p. 470; Koch p. 112; Rchb. ic. fig. 5040; Neilr. p. 806; Grke. p. 61.

Blätter lineal-lanzettlich, untere stumpf, nach dem Grunde verschmälert; Stengel flaumig, rauh; Blüten einzeln; Kelchschuppen elliptisch, begrannt, Granne pfriemlich, um die Hälfte kürzer als der Kelch; Kronblättchen verkehrt-eiförmig, gezähnt, hell purpurroth mit weissen und dunkleren Punkten, oder weiss mit purpurrothem Ringe. Letztere Färbung selten.

Trockene Raine, Wiesen, Waldränder. 4 Juli bis September.

Klagenfurt Gntr., Nordseite des Lendkanals Kkl., Annabichl und Satnitz Grf., Hallegg Wulf., Gurlitsch bei Krumpendorf Jab., Gurkthal Js ch., Glödnitz, Tiffen D. P., Maltathal Khlmr., Pusarnitz, Obervellach D. P., Malnitz ober der Rosskopfhube 1400 m. Berr., Oberdrauthal und Weissbriach Khlmr., Paternion und Hermagor Wulf., zwischen Kötschach und Luggau Zwgr., Plöckenweg ober Mauthen Preiss m., Tröpolach D. P., Förolach B. R., Bartolo-Graben bei Saifnitz Schnk., Villach gegen Heiligengeist Hsr., Bleiberg Js ch.

1769. 6. Dianth. alpinus L. Alpen-Nelke.

Wulf. p. 469; Koch p. 112; Rehb. ic. fig. 5036; Neilr. p. 806.

Stengel einblütig; Blätter lanzettlich-lineal, stumpf, nach dem Grunde verschmälert; Kelchschuppen lanzettlich, begrannt, Granne lanzettlich, krautig, ungefähr so lang als die Röhre; Kronblättchen gekerbt, noch einmal so lang als der Kelch, oben fleischfarbig mit einem purpurnen und weiss gefleckten Ringe am Schlunde, unterseits grünlichweiss.

Auf Alpen und Voralpen der südlichen Kette. 7 Juli bis August.

Nordzug der Lesachthaler Alpen Jab., Wischberg Schnk., ober der Holzgrenze am Dobratsch Hsr., Mar., Südabhang der Baba Jab., Sattel der Steiner-Alpen Grf. Die Angaben: Malnitzer Tauern, Heiligenbluter Tauern, Sau-leiten, Scheidecker-Alm, schattseitige Pasterze Wulf. und B. R., dann norische Alpen Js ch. sind wohl irrthümlich und beziehen sich auf folgende Art.

1770. 7. Dianth. glacialis Haenke. Eis-Nelke.

Wulf. p. 470; Koch p. 112; Rehb. ic. fig. 5037.

Stengel meist sehr kurz, dichtrasig; Kelchschuppen länger als die Kelchröhre; Kronblättchen anderthalbmal so lang als der Kelch, einfarbig purpurn; s. w. v.

Hochalpenwiesen und Weiden der Central-Gebirgskette. 7 Juli bis August.

Winterthal sehr selten, Stern im Katschthale D. P., Grf., Lanisch in der Pölla, Poissenek im Katschthale auf Kalkglimmerschiefer Str., Kreuzschlacher-Alm und Stubeneck Hllbrd., Faschaun und Maltaberger-Alm Khlmr., Malnitzer Tauern Bs chf. 1822, Alpen um Malnitz Hkl., Kapponiger-Alm, Lonza, Pollinig bei Obervellach D. P., Alpen um Fragant Gussbr., Kolmitzen Khlmr., Schober, Asten, Mochar, Heiligenbluter Tauern Hppe. 1798 als *D. alpinus*, D. P., Fleiss, Goldzeche Wulf., Pasterze Hppe., Bs chf.,

Gamsgrube Hppe., Bs chf., Leiter Jab., Kreuzeckgruppe im Oberdrauthale Khlmr.

1771. 8. Dianth. sylvestris Wulf. Wilde Nelke, Stainnagel, Felsennagel.

Koch p. 112; Rchb. ic. fig. 5039.

Stengel ein- bis mehrblütig; Blüte einzeln; Blätter lineal, spitz, am Rande rauh, grasgrün; Kelchschuppen angedrückt, breiteiförmig, abgestutzt, stumpf, kurz begrannt, bis viermal kürzer als die Röhre; Platte der Kronblättchen verkehrt-eiförmig, gekerbt, bartlos; Blume hellroth.

α. Stengel hoch, mehrblütig, bis kurz, einblütig; Kelch ziemlich weit, kaum etwas über dreimal so lang als die Schuppen; Blume schwach wohlriechend. Diese Form wohl *D. sylvestris elatior* oder *D. Caryophyllus* L. Wulf. p. 472.

β. Stengel niedrig, einblütig; Kelch enger als bei voriger Form, länger, wenigstens viermal so lang als dessen Schuppen; Blume geruchlos. *D. inodorus* L. A. Kerner Schedae ad fl. exsicc. austr.-hung. Nr. 543, Wulf. p. 471 *D. sylvestr. humilior*.

Felsige Stellen in Gebirgen, Voralpen und Alpen.
4. Juni bis August.

α. In Schiefer-Gebirgen und Alpen und auf Kalkglimmer der Centralkette.

Reichenauer Garten D. P., Bockalm und Stinigeck in Kanning, Maltathal Khlmr., Katschthal Gussbr., Obervellach bei der Ruine Oberfalkenstein und auf der Pfaffenberger-Alm, Wolligger-Alm D. P., Gebirge in Malnitz Hkl., im Thale von Heiligenblut Bs chf., Blm fld., Rprcht., hoher Sattel und Pasterze Hppe., Preuer, Gamsgrube Bs chf., Rosenstein bei Oberdrauburg, Ameisbüchl? Khlmr.

β. Im Kalkgebirgszuge südlich der Drau, Weissbriach, Latschur Khlmr., Reisskofel D. P., Plöcken B. R., Königsberg bei Raibl Zwgr., Kanalthal Rssmn., Pontafel Hsr., Bleiberg häufig Hppe., Zwgr., Mar., Dobratsch Wulf., Grf., Luschariberg, Raiblthal, Arnoldstein Wulf., Karawanken Jab., Bodenthal Hppe. 1802 als *D. caryophyllus*, Baba Strnbg. als *D. virgineus*, Ortatscha, Schlucht am Harlouz Kkl., Obir Preissm., Petzen Weld., Felsen am Seeberge bei Seeland Zwgr., Oistriza Weiss.

Anmerkung. Wohin wohl *D. virgineus* von Kokeil aus der Schlucht bei Gurnitz und von Maria Rain gehört, ist zweifelhaft. Kokeil schreibt: verschieden von *D. sylvestris* durch höheren Stengel, mehrfache Blumen und breitere Blätter.

1772. 9. Dianth. Caryophyllus L. Garten-Nelke.

Koch p. 113; Rchb. ic. fig. 5051.

Stämmchen niederliegend, sehr ästig, Blätter meergrün, am Rande glatt, nur am Grunde etwas rauh; Kelchschuppen angedrückt, fast rautenförmig, kurz begrannt; Blume sehr verschiedenfärbig, Geruch angenehm würzig. Die gefüllte Garten-Nelke *D. Caryophyllus imbricatus* L. kann wohl nicht als Abart betrachtet werden.

β. Kronblättchen fingerig oder fiederspaltig eingeschnitten.

1773. 10. Dianth. plumarius L. Feder-Nelke.

Wulf. p. 473?; Koch p. 113; Rchb. ic. fig. 5030; Neilr. p. 807 α.

Blätter lineal-pfriemlich, meergrün, am Rande rauh; Blüten einzeln, Kelchschuppen rundlich eiförmig, kurz stachelspitzig, viermal kürzer als die Röhre; Kronblättchen bis zur Mitte fingerig vielspaltig, Mittelfeld verkehrt-eiförmig; Blume rosenroth oder weiss, am Schlunde oft gefleckt.

Felsige Hügel und Berge. ♣ Juni bis Juli.

Südseite der Rabensteiner Felsen im Lavantthale in dichten Rasen Grf.

Anmerkung. Nach Koch der westlichste Standort in Deutschland. Als Einfassung bei Gartenbeeten, auf Gräbern nicht selten. Wulfen's Standort: Predil gehört wohl zur folgenden Art.

1774. 11. Dianth. Sternbergii Sieber. Sternbergs-Nelke.

Dianth. alpestris Hppe. A. Kerner Schedae in fl. exsicc. austr.-hung. N. 548; Koch. p. 114 *D. monspessulanus* γ *alpicola*; Rchb. ic. fig. 5032 α *D. speciosus* α *minor*; *D. alpestris* Sternberg.

Blätter seegrün, steif, an den unfruchtbaren Blattbüscheln kurz und abstehend, unterseits mit einem stärkern vorspringenden mittlern und mehreren schwächern parallel laufenden seitlichen Nerven; Kelchschuppen plötzlich in eine grüne Spitze zusammengezogen und mit dieser zusammen nur ein Drittel so lang als der Kelch, meist ein-, selten zweiblütig; Blume schwachpurpurn, wohlriechend.

Kiesige und felsige Stellen in den südlichen Gebirgstälern. ♣ Juli bis August.

Kanalthal, Pontafel, Malborgeth Rssmn., Pchl r., Predil Zwgr., Raiblersee Jab., Bichl bei Tarvis und Römerthal und -Pass alldort Schnk. als *D. collinus*, Mittagkogel Rab. als *D. plumarius*, Loibl Hppe. als *D. arenarius*, Ortatscha Vst.

als *D. plumarius*, Kkl., Jsch. als *D. monspess. alpicola* Koch., Obir Trflnr., Grf., Baba Hppe., Vst. als *D. alpestris*, Drchnr. als *D. plumosus*, Predil und Vellacher Kotschna Kerner Schedae, Obir Grf.

1775. 12. *Dianth. superbus* L. Pracht-Nelke, Zottennagel.

Wulf. p. 474; Koch p. 114; Reh. ic. fig. 5032; Neilr. p. 808; Grke. p. 62.

Stengel locker gipfeltraubig; Blätter lineal-lanzettlich, scharflich gerandet; Kelchschuppen eirund, kurz zugespitzt, angedrückt, etwa ein Viertel so lang als der Kelch, dieser sechsmal so lang als dick; Platte der Kronblättchen mit lineal keilförmigem bärtigen Mittelstücke; Fiederchen weit auseinanderstehend, fast haarförmig, tief über die Mitte zerschlitzt; Blume blassrosafärbig, wohlriechend.

Feuchte, grasige Plätze in Gebirgstälern und auf Alpenweiden. 7 Juni bis August.

Satnitz Jsch., Zwgr., Ebenthal Wulf., Umgebung St. Paul und an der Goding Grf., Wolfsberg Hfnr., Säualm Wulf., Jab., Flatnitz, Reichenau, Görlitzen, Hofalm im Leobengraben D. P., Stern im Katschthale Jab., Kanning, Perschitz-Alpe im Maltathale Khlmr., Elend Rchrdt., Malnitz auf Alpen allenthalben Hkl., Lonza, Fraganter Alpen, Egger-Almwiesen bei Sagritz D. P., Oberberger-Alm im Drauthale Khlmr., Lesachthal Jab., Kanalthal Rssmn., Wischberg Schnk., Bleiberg und Heiligengeist Mar., Karawankenette Jab., Bodenthal Hsr.

1776. 13. *Dianth. speciosus* Reh. Ausgezeichnete Nelke.

Reh. ic. fig. 5032 b.; A. Kerner Schedae N. 549.

Stengel steif aufrecht, ein- oder wenigblütig; Kelchschuppen ovallanzettlich, zugespitzt, halb oder ein Drittel so lang als der Kelch, welcher viermal so lang als dick ist; Platte der Kronblättchen länglich rhomboidisch, bis zur Mitte linealisch gabeltheilig zerschlitzt.

Auf grasigen Abhängen. 7 Juli bis August.

Häufig auf der Koralm Preissm.

1. Anmerkung. Die Diagnosen dieser beiden Nelken N. 12 und 13 sind aus Reichenbachs Deutschlands Flora: Nelkengewächse S. 134 und 135 entnommen, wo der Autor noch anmerkt: Von *D. superbus* unterscheiden unsere Pflanze schon die mehr nelken- und nicht grasartigen Blätter, der steifere Stengel und die wenigstens noch einmal so grossen sehr wohlriechenden Blumen, welche meistens an der Basis der Platten mit einem Flecke aus schwarzen Atomen auf dem übrigens rosafarbigem Grunde gezeichnet sind.

2. Anmerkung. Wulfen führt *D. arenarius* L. auf der Luschniker- und Matschacher Alpe und in höhern Lagen

des Loibls auf; nach Koch ist aber diese Nelke eine norddeutsche Pflanze auf Sandfeldern zwischen Niederlausitz, Pommern, Königsberg. Botaniker, welche obige Standorte Wulfens zu besuchen Gelegenheit finden, werden auf diese Pflanze aufmerksam gemacht. Ist wohl nur *D. Sternbergii* Sieb.

DXXIII. Saponaria L. Seifenkraut.

(X. 2. n. 271.)

1777. 1. Sap. officinalis L. Gemeines Seifenkraut.

Koch p. 115; Rchb. ic. fig. 4995; Neilr. p. 808; Grke. p. 62.

Blätter länglich elliptisch; Stengel aufrecht; Blüten büschelig-ebensträussig; Kelch walzig, kahl; Kronblättchen gestutzt, mit Nebenkrönchen, aufblühend hellröthlich, später weiss.

Trockene Felldraine, Gebüsch, auf Mauern. 7. Juli bis September.

Klagenfurt an der Hollenburger Strasse bei der Schmelzhütte Kkl., Zwgr., Buttergraben in der Satnitz Grf., Wolfsberg Hfnr., Eberstein Js., Feldkirchen gegen Poitschach D. P., Umgebung Kanning und Maltathal Khlmr., im Möllthale bis Rangersdorf sehr häufig D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Tröpolach, Villacher Bad D. P., Tarvis Zwgr., Bleiberg-Kreuth Wldnr., Mar.

1778. 2. Sap. ocymoides L. Rundblättriges Seifenkraut.

Wulf. p. 465; Koch p. 115; Rchb. ic. fig. 4994; Beotia ocym.

Kurzhaarig; Blätter lanzettlich oder elliptisch, untere in den Blattstiel verschmälert, verkehrt-eiförmig; Stengel niedergestreckt; Kelch walzig, zottig; Kronblättchen stumpf oder seicht ausgerandet, rosenroth, höchst selten fast weiss.

Sandige, sonnige Bergabhänge bis in die Voralpen. 7. Mai bis August.

Von Oberdrauburg bis gegen Steindorf im Oberdrauthale D. P., Gailberger Strasse bei der Ruine Pittersberg auf Dolomit des schwarzen Kalkes Str., Lesachthal Jab., Wolaja D. P., Weissbriach Khlmr., unteres Gailthal Jab., Kanalthal Wulf., Rssmn., Kirche am Luschariberge Wulf., Brücke vor Flitschl bei Tarvis Schnk., Raibl Ndrst., Schütt unterm Dobratsch Jab., Arnoldstein Wulf., Gailitz Hsr., Steinbrüche beim Villacher Bade, Hallstädter Kalk Str., zwischen Villach und Heiligengeist häufig Hsr., Bleiberg Mar., Sonnseite sehr häufig, ein Exemplar fl. albo bei Kreuth Zwgr.

DXIV. Vaccaria Med. Kuhkraut.

(X. 2. n. 272.)

1779. 1. Vacc. parviflora Mnch. Gemeines Kuhkraut.

Grke. p. 62; Koch p. 115 Sapon. *Vaccaria* L.; Rchb. ic. fig. 4996 *Vacc. pyramidata* G. M. S.; Neilr. p. 808 Sap. *Vacc.*

Blätter lanzettlich, am Grunde zusammengewachsen; Stengel aufrecht, kahl; Blütenstand locker ebensträussig; Kelch geflügelt, kantig; Kronblättchen klein, gekerbt, ohne Nebenkrönchen, fleischfärbig.

Aecker unter Getreide, Brachfelder. ☉ Juni bis Juli.

Von Zlapp bis Heiligenblut häufig Mldo. Flora 1866, S. 425, kann höchstens mit Getreide eingeschleppt worden sein. Verfasser sah diese Pflanze dort niemals, obwohl er oft nach Heiligenblut kam und noch fast jährlich kömmt (vielleicht *Silene rupestris* L.), Malnitz Berr., wohl nur mit fremdem Getreide eingeschleppt und wieder ausgestorben. Sehr wahrscheinlich in Unterkärnten, Lavantthal.

2. Gruppe: **Lychnideae Alex. Braun.** Kelch verwachsenblättrig, zehn- bis dreissignervig, fünf Nerven genau in die Verbindungslinien der Kelchblätter fallend; jeder dieser fünf Nerven zwei Kelchblättern zugleich angehörend; Narben in der Regel drei bis fünf; Keim gekrümmt, fast kreisförmig.

DXV. Cucubalus Tournef. Taubenkropf.

(X. 3. n. 275.)

1780. 1. Cucub. baccifer L. Beerentragender Taubenkropf.

Wulf. p. 475; Koch p. 115; Rchb. ic. fig. 5122; Neilr. p. 809; Grke. p. 62.

Stengel schwach, kletternd, weitästig; Blätter länglich-eiförmig, spitz; Blüten end- und blattwinkelständig; Kelch bauchig-glockig; Kronblättchen zweispaltig; Beere kugelig, schwarz, glänzend; Blume grünlich-weiss.

Hecken, Gebüsche an Ufern oder sonstigen feuchten Plätzen. 4 Juli bis September.

Goritschitzen Kkl., Satnitz, Ebenthal, Strasse nach Freudenberg und in's Glanthal J s ch., Weg auf den Radsberg Grf., Haarbach an der Glan Zwgr., Hollenburger Strasse gegen die Satnitzhöhen Kkl., Zwgr., Lavantthal um St. Paul Grf., Wolfsberg Hfnr., zwischen Osterwitz und St. Georgen am Längsee Wulf., Südwestabhang des Dobratsch Mar., zwischen Hermesberg und Wasserleonburg Wldnr.

DXXVI. Silene L. Leimkraut.

(X. 3. n. 273.)

1. Rotte: **Otites Koch.** Blütenstand aus ein- bis vielblütigen, gegenständigen Trugdolden in den Winkeln der oberen Stengelblätter, die meistens auf Deckblätter zurückgeführt sind, zusammengesetzt. Sind diese Trugdolden armblütig und sehr kurz gestielt, so bilden je zwei einen Scheinquirl und es entsteht eine endständige, scheinquirlige Traube, sind sie vielblütig, länger gestielt und wiederhohlt verästelt, so fließen sie in eine endständige, oft pyramidenförmige Rispe zusammen.

1781. 1. Sil. viscosa Pers. Klebriges Leimkraut.

Koch p. 117; Rchb. ic. fig. 5099; Neilr. p. 811; Grke. p. 63.

Klebrig-zottig; Blätter wellig; Blütentraube quirlig; Blütenstiele gegenständig, ein- bis dreiblütig; Kelch walzenförmig; Krone weiss.

Wege, Zäune, sandige Weiden. ☉ Juni bis Juli.

Petzen Schnerich im Herb. car.

1782. 2. Sil. Italica Pers. Italisches Leimkraut.

Wulf. p. 478; Koch p. 117; Rchb. ic. fig. 5110; Grke. p. 63.

Flaumig; Blätter am Grunde gewimpert, untere spatelig-lanzettlich, in den Blattstiel herablaufend; Rispe aufrecht, locker; Aeste derselben gegenständig, dreigabelig verzweigt, klebrig beringelt, drei- bis vielblütig; Blüten gerade vorgestreckt; Kelch keilig, Zähne stumpf; Kronblättchen zweispaltig, nackt, oben weiss, unterseits mit hellvioletten, bleigrauen oder grasgrünen Adern.

Steinige, sonnige Hügel. ♀ Juni bis Juli.

Zigguln und hinterm Kalvarienberg Wulf.

1783. 3. Sil. nutans L. Nickendes Leimkraut.

Koch p. 117; Rchb. ic. fig. 5108; Neilr. p. 812; Grke. p. 64.

Flaumig, oberwärts drüsig-klebrig; untere Blätter lanzettlich-elliptisch, in den Blattstiel hinablaufend; Rispe einerseitswendig, während des Aufblühens einwärts geknickt, überhängend; Kelch röhrig, schwach keilig, Zähne spitz; Kronblättchen zweispaltig, bekrönt, weiss, unterseits manchmal mit bleigrauen oder grünen Streifen; Fruchträger kaum

den dritten Theil so lang als die Kapsel, deren Zähne zurückgerollt.

β. rosea. Blüten rosenroth.

γ. livida. Blütenblätter unterseits olivengrün. *S. livida* Willd.

Sonnige, trockene Hügel, Vorwälder bis in die Alpen. 4 Mai bis Juli.

Durch ganz Kärnten verbreitet. Klagenfurt Kkl., Kreuzbergl Zwgr., Satnitz Drehr., Umgebung St. Paul Grf., Wolfsberg Hfnr., Osterwitz, Glödnitz, Tiffen, Leoben D. P., Umgebung Kanning, Maltathal Khlmr., durch's ganze Möllthal D. P., Oberdrauthal, Gitschthal Khlmr., Gailthal D. P., Kühweger - Alm 2000 m. Kkl. Herb., Kanalthal Rssmn., Raibl Zwgr., Bleiberg Mar., Villach D. P.

β. Tiffen und Sagritz, jedoch an beiden Orten selten D. P.

γ. Kadutschen bei Bleiberg Mar., Loibl Grf.

Anmerkung. Dr. Lorenz Chrysanth Edler v. Vest beschreibt in der Regensburger Flora 1821, Bd. 1, S. 150, eine um Klagenfurt wachsende *Silene*, die der *S. nutans* ungemein ähnlich ist, deren rother Kelch ihm aber auffiel und von welcher sie sich durch den Mangel der Schlundkrone, des Gynophorums und der Drüsen des Fruchtknotens, sowie den rothen, rauhaarigen Kelch und die zuweilen röthlichen Blütenblätter unterscheidet, als *Silene rubens* Vest. Gehört wohl zu *S. nut.* L. *β rosea.* ?

1784. 4. *Sil. pelidna* Rchb. Schwarzbräunliches Leimkraut.

Rchb. ic. fig. 5105.

Stengel kurz feinbehaart, klebrig; Rispe ziemlich einfach, überhängend; Kronblättchen oben weisslich, unterseits bräunlich mit dunkleren Adern, Platte derselben zweitheilig, linealisch, lang bekrönt; Fruchtkapsel abgestutzt.

In Kalkgebirgen und Alpen, jedoch selten. 4 Juli bis August.

Plöcken, Achernach bei Grafendorf, Kühweger - Alm D. P., Malborgeth Rssmn., Loibl Kkl.

2. Rotte: *Atocion* Koch. Stengel an der Spitze ein- bis dreiblütig oder in eine endständige, mehrgablige, öfter rispenförmige, lockere oder gebüschelte Trugdolde übergehend.

α. Wurzel einfach, einjährig.

1785. 5. *Sil. linicola* Gmel. Flachs-Leimkraut.

Koch p. 120; Rchb. ic. fig. 5076; Neilr. p. 814.

Stengel gabelspaltig, ebensträussig rispig und nebst Blütenstielen und Kelch von sehr kurzem Flaume etwas rau; Blätter lineal-lanzettlich, untere verkehrt-eiförmig; Kelch röhrig, zehnstreifig, fruchtragender eiförmig-keilig, zwischen den Streifen aderig, Zähne eiförmig, stumpf; Kronblättchen ausgerandet, bekrönt, blass fleischroth; Kapsel noch einmal so lang als der Fruchträger.

Unter Leinsaat. ☉ Juni bis Juli.

Bei Globasnitz, St. Stefan und Waggendorf im Jaunthale Jsch.

1786. 6. Sil. Armeria L. Garten-Leimkraut.

Wulf. p. 477; Koch p. 120; Rchb. ic. fig. 5079;

Neilr. p. 814; Grke. p. 65.

Völlig kahl, obere Glieder des Stengels klebrig be- ringelt; Blätter eiförmig; Rispe endständig, büschelig, gedrun- gen reichblütig; Kelch röhrig-keilig; Krone rosenroth; Fruchträger so lang oder länger als die Kapsel; s. w. v.

Meist nur in Gärten verwildert und sich selbst aussäend.

☉ Juli bis September.

Klagenfurt und Ebenthal Wulf., Obervellach D. P.

β. Wurzel holzig, Stämmchen ausdauernd, Kelch aufgeblasen.

1787. 7. Sil. Pumilio Wulf. Niedriges Leimkraut, Saupeterstamm.

Wulf. p. 479; Koch p. 119; Rchb. ic. fig. 5115;

Cucubalus Pum. L.

Dichtrasig, hingestreckt; Blätter lineal stumpflich, nach dem Grunde etwas verschmälert; Blüten endständig, einzeln, kurzgestielt; Kelch länglich-glockig, vielstreifig, rauhhaarig, Zähne stumpf, eiförmig, Platte der Kronblättchen ungetheilt; Nebenkrone borstlich, Fruchtknoten fast sitzend; Blume rosenroth, trocken nach Erdbeeren duftend.

Diese Pflanze ist ein Mittelglied zwischen Saponaria und Silene, wofür der Verfasser einst im Briefe an Alex. Braun den Namen *Hohenwarthia* in Vorschlag brachte. Siehe Flora v. Regensburg 1843, Nr. 48.

Auf Schiefer- und Urgebirgs-Alpen sehr verbreitet.

♂ Juli bis August.

Auf dem Gebirg in Kärnten, Tabernaemontanus Kräuter- buch Bauhin'sche Ausg. Basel 1687, p. 668, Abldg. als *Caryophyllus montanus* III, Südabhang der Koralm Grf., Gntr., Saualm Wulf., Strnbg., Kkl., Hfnr., Bret Vst., Winterthal, Haidnerhöhe, beim weissen Kreuz sehr schön, Leitersteig, auf beiden Speickkogeln in der Reichenau, Falkart, Stangnock D. P., Winkel Reichenau

Saut., Kremsalm, Stern im Katschthale D. P., Alpen um Kanning, Faschaun und gegen das Elend Khlmr., Malnitzer Tauern Sns. 1799 als Cucub. Pum., BsCHF. 1822, Dbnr., Alpen um Malnitz Hkl., gleich hinterm See Jab., Kapponiger-Alm, Lonza, Pollinig, Schober, Asten-Alm D. P., Kleinzirknitz Wulf., grosse Fleiss Hppe., Leiterthal Hrnsch., Heiligenbluter Tauern D. P., Kreuzeck Preissm., Stogar Khlmr., Lesachthaler Alpen Jab.

1788. 8. Sil. inflata Sm. Aufgeblasenes Leimkraut, Klepfkraut, Wiesenspinat, Grumkraut, Feldspinat.

Koch p. 119; Rehb. ic. fig. 5120; Neilr. p. 813; Grke. p. 64; Cucubalus Behen L.

Zweihäusig oder vielehig; Blätter elliptisch oder lanzettlich zugespitzt; Rispe endständig, gabelständig; Kelch eiförmig, vielstreifig netzig-aderig, kahl, Zähne eiförmig, spitz; Platte der Kronblättchen zweitheilig, am Grunde zweihöckerig; Fruchträger halb so lang als die Kapsel; Blume weiss.

β . *angustifolia*. Blätter lineal oder lineal-lanzettlich, oft kaum 2 bis 3 mm. breit. S. *glareosa* Jord.

γ . *alpina*. Stengel niederliegend, aufstrebend, wenigblütig; Blätter länglich oder elliptisch, meergrün.

Trockene Wiesen bis in die Alpen, β meist in Kalkgerölle. 7 Juni bis August.

Sehr verbreitet. Klagenfurt Kkl., Satnitz Zwgr., Lavantthal um St. Paul Grf., Wolfsberg Hfnr., Gurkthal, Tiffen D. P., um Kanning und im Maltathale Khlmr., Malnitz Berr., durch's ganze Möllthal häufig D. P., Pasterze B. R. als Cucubalus Behen L., Oberdrauthal, Gitschthal Khlmr., Mussen und Gailthal D. P., Bleiberg gemein Mar., Villach D. P.

β . Kalkgerölle um Pirkach am Fusse des Schoberkopfes bei 700 bis 1000 m., Lamprechtkofel in der Plöcken bei 2000 m. Jab., Grossrudnig beim Trogkofel nächst Tröpolach D. P., Malborgeth Rssmn., Predilstrasse Preissm., Föderaun auf Hallstädter Kalk Str.

γ . Sehr gemein auf Galmeihalden in Raibl Zwgr. und in den Karawanken Jab.

Anmerkung. Dr. Lorenz Chrysanth Edler v. Vest beschreibt in der Regensburger Flora 1821, Bd. 1, S. 149, eine Alpenform von *Sil. inflata* als *Cucubalus Antelopum* Vest von den höchsten Alpenwiesen der Baba, welche sich von C. Behen durch rauhen, etwas gefurchten Stengel, bis daumenbreite und breitere, meergrüne, unterhalb rauhe Blätter, die genau so sind wie von *Convallaria latifolia*, unterscheidet. Sie kommt auch auf den benachbarten Bergen vor, wird gern

von den Gemsen gefressen, heisst bei den Einwohnern Skerpez und steigt nie in die Ebene herab. Ist wohl *S. infl. L. γ. alpina*.

γ. Kelch kaum oder nicht aufgeblasen, s. w. v.

1789. 9. Sil. Saxifraga L. Steinbrechartiges Leimkraut.

Koch p. 121; Rechb. ic. fig. 5085; Neilr. p. 813.

Stengel von sehr kurzem Flaum etwas rauhaarig; Blätter lineal, nach dem Grunde verschmälert; Blütenstiele endständig, einzeln oder gepaart; Kelch keilig, kahl, zehnstreifig, adernlos, Zähne eiförmig, stumpf; Kronblättchen tief zweispaltig, bekrönt, oberseits weiss, unterseits rötlich oder gelblich-grün.

Auf und zwischen Felsen auf Kalkgebirgen und Alpen. 4 Juli bis August.

Bei Oberdrauburg Zwgr., Plöcken an der Römerstrasse B. R., D. P. und auf der Rattendorfer-Alm mit *Serratula Vulpii* D. P., Raibl häufig an den östlichen Wänden des Königsberges und auf Kalkschutt des Seebaches Zwgr., Predilpass und Graf Karl-Steig und -Büchel bei Tarvis Schnk., Sonnseite Bleiberg Mar., Zwgr., Ruinen von Föderaun und am Wege nach Finkenstein bei der Filiale St. Kanzian Grf., Bärenthal, Sapotnizza und bei der Teufelsbrücke am kleinen Loibl, Harlouzschlucht Kkl., Mozhnigalm in Waidisch B. R., Felsen an der Fellach bei Rechberg Grf., Petzen gegen die Höhe Weld., Krstf.

1790. 10. Sil. rupestris L. Felsen-Leimkraut.

Koch p. 122; Rechb. ic. fig. 5091.

Stengel gabelspaltig, völlig kahl; Blätter eiförmig, spitz, sitzend, untere lanzettlich, am Grunde verschmälert; Blüten gabel- und endständig; Kelch kreiselförmig, zehnrifig, Zähnen eiförmig, stumpf; Kronblättchen verkehrt herzförmig, bekrönt, weiss.

Auf trockenen, sonnigen Rainen und Bergabhängen bis in die Alpen. 4 Mai bis September.

Klagenfurt, Kreuzbergl, Siebenhügel Kkl., Zwgr., St. Martin Jab., Ulrichsberg Drchnr., Kor- und Saualm Hfnr., Lölling, Hüttenberg, Glödnitz bis auf die Flatnitz, Wöllanernock, Tiffen häufig D. P., Felsen am Ossiachersee, Kreuschlacher-Alm, Stubeneck Hillbrd., Kanning, Maltathal Khlmr., Gmünd und Katschthal, durch's ganze Möllthal D. P., im Thale von Heiligenblut Hppe., Dbnr., Pasterze B. R., zwischen Mohar und Waschgang Wulf., Spittal, Greifenburg Preissm., Berg, Weissensee Khlmr., Lesach-

thal Zwgr., Tröpolach D. P., Hermagor Preissm., Kreuthgraben, Hermesberg, Südseite des Dobratsch Zwgr., Mar., Loibl Hsr.

1791. 11. Sil. acaulis L. Stengelloses Leimkraut, Zigeunerkraut.

Koch p. 122; Rchb. ic. fig. 5084; Neilr. p. 813.

Sehr gedrungen rasig, polsterförmig, kahl; Blättchen lineal-pfriemlich; Blüten einzeln; Kelch glockig, Zähnen eiförmig, stumpf oder ausgerandet; Kronblättchen verkehrt-eiförmig, seicht ausgerandet, bekrönt, satt rosenroth, selten fast weiss; Kapsel länglich, noch einmal so lang als der Kelch.

β. exscapa. Kapsel oval, nur wenig länger als der Kelch.

Auf Alpen und Voralpen durch ganz Kärnten. 4 Juni bis August.

Nordabhang der Koralm Grf., Saualm Jab., Flatnitzer- und Reichenauer Alpen D. P., Eisenhut fl. albo Fürstenw., Kanning-, Millstätter- und Malteiner Alpen Khlmr., Krems- und Katschthaler Alpen D. P., Malnitzer Tauern Sns. 1799, Gebirge um Malnitz Hkl., durch's ganze Möllthal oft schon unter der Holzgrenze D. P., Pasterze B. R., Pfandlscharte, Kreuzeck Preissm., Knoten und Stogar Khlmr., Frohn- und Luggauer Alpen, Plöcken B. P., Mussen, Alpen bei Tröpolach D. P., Kanalthal Rssmn., Raibler Alpen Schnk., Dobratsch Mar., Karawankenzug, Kotschna auch fl. albo Jab., kleine Baba Vst., Südwestgrat am Obir Zwgr., Petzen Weld., Einsattlung veski legar Krstf., Oistriza Weiss fl. albo.

Anmerkung. In den Kärntner Alpen ist die Form *β. exscapa* viel verbreiteter als die als Stammform beschriebene, welche in den Kalkgebirgen vorzuherrschen scheint, wie z. B. Zunderwand bei Kanning Khlmr., Rosskofel im Gailthale D. P., Baba Drehr., Vellacher Kotschna Jschn., Einsattlung veski legar auf der Petzen Krstf., Oistriza und Rinka Weiss, sämmtlich als *S. forma caulescens* oder *pedunculosa* in den Kärntner Herbarien.

DXCVII. Heliosperma Rchb. Strahlensame.

(X. 3. n. 274.)

1792. 1. Heliosp. alpestre Alex. Braun. Voralpen-Strahlensame.

Wulf. p. 478 *Silene alpestris* Jacq.; Koch p. 122; Rchb. ic. fig. 5083; Neilr. p. 815.

Rasig; Stengel gabelspaltig; Blätter lanzettlich; Kronblättchen verkehrt-eiförmig, vierzählig, bekrönt, weiss; Kapsel länglich, noch einmal so lang als der Kelch.

β. flore roseo. Blüten rosafarbig.

Kiesige Plätze auf Alpen und Voralpen und an Bächen in Gebirgstälern. 4 Mai bis Juli.

Schlucht bei Gurnitz Kkl., Grf., lange Wiese auf der Koralm Grf., Flatnitz bei den Kalköfen, Leobengraben am Bachschutt D. P., Mühlendorf im Möllthale Rabitsch, Malnitzer Tauern Bs chf. als *Sil. quadridentata*, Waisacher-Alm im Oberdrauthale, Weissbriach Khl m r., Kanalthal Rss m n., Kühweger-Alm, Karlsteig bei Tarvis Preiss m., Saifnitz gegen den Luschariberg, Wischberg Schnk., Predil Strnb g., Schnk., Raibl sehr häufig, auf dem Kies des Grüngrabens all dort eine Spielart mit grünen, um die Hälfte kleineren Blumenblättern Zwgr., Bleiberg und Dobratsch gemein Hs r., Mar., Karawanken Jab., Bodenthal Hppe., heilige Wand Zwgr., Schlucht am Harlouz und Vorderloibl Kkl., Loibl Wulf., Baba Hppe., Wildensteiner Graben bei Galizien Zwgr., zwischen Rechberg und Kappel am Obir Wulf., Petzen vom Fuss bis zum Gipfel Weld., Uschowa, Rinka, Oistriza Weiss, untere Gehänge des Ursulaberges bis Liescha Jab.

β. Am Fusse der Grazerza am Klopeinersee bei Eberndorf Grf.

1793. 2. Heliosp. quadrifidum Alex. Braun. Vierzähliges Strahlensame.

Wulf. p. 479 *Silene quadrifida* L.; Koch p. 121;

Rchb. ic. fig. 5081; Neilr. p. 815.

Rasig; Stengel gabelspaltig, obere Glieder und Blütenstiele klebrig beringelt; Blättchen lineal, unterste spatelig; Blüten gabel- und endständig; Kelch kreiselförmig, zehnstreifig, Zähnchen eiförmig, stumpf; Kronblättchen verkehrt-eiförmig, vierzählig, bekrönt; Kapsel oval, ungefähr so lang als der Kelch; Strahlschüppchen der schwarzen Samen so lang als der Querdurchmesser; Blume weiss.

β. pudibunda Hoffmannsögg. Blüten sanft rosa; Kronblättchen in der Regel breiter; Kapsel etwas länger als bei α.

γ. pusilla W. K. Rchb. ic. fig. 5080. Stengelchen fein behaart, unterste Blättchen fein bewimpert; Strahlschüppchen der Samen kürzer als der Durchmesser; das ganze Pflänzchen zwergig.

An Quellen von Alpenbächlein, an schattigen feuchten Plätzen in Alpen und Voralpen. 4 Juni bis August.

Flatnitz, Reichenauer Garten, Katschthaler Alpen D. P., Alpen um Kanning Khlmr., Kapponiger-Alm D. P., Malnitzer Tauern Wulf., Fraganter Alpen Gussbr., im Thale von Heiligenblut Hppe., schattseitige Pasterze B. R., Leiter D. P., Frohn- und Luggauer Alpen, Plöcken B. R., Wolaja D. P., Reisskofel und Latschur, bei Weissbriach Khlrm., Kühweger-Alm B. R., Garnitzen-Graben und Raiblersee Preissm., Kanalthal Rssmn., Wolfsbach und Wischberg Mrchs., Luschariberg Kkl., Bleiberg Mar., Dobratsch Hsr., Geröll der Steiner Alpen Grf., Ursulaberg bei 1700 m. Jab.

β. Unter voriger, doch nicht überall. Faschaun und Maltaberg Khlmr., Malnitz in der Lugge Hkl. und unter den Jamniger Hütten am niedern Tauern, wohl Wulfen's Standort D. P., Heiligenblut Hppe., am Wege in die grosse Fleiss und bei der Bricciuscapelle am Wege in die Pasterze D. P.

γ. Vorzüglich in den Kalkgebirgen an mehr trockenen Standorten.

DXXVIII. *Melandrium* Roehl. Lichtnelke.

(X. 5. n. 284.)

1794. 1. *Melandrium pratense* Roehl. Wiesen-Lichtnelke.

Lychnis dioica L., *Lychn. vespertina* Sibth. Koch p. 123; Rchb. ic. fig. 5125; Grke. p. 66 *Melandr. album*; Neilr. p. 816.

Stengel unterwärts zottig; obere Blätter eiförmig-lanzettlich, verschmälert zugespitzt, nebst Blütenstielen und Kelchen drüsig kurzhaarig; Blüten zweihäusig, weiss, selten röthlich, Abends geöffnet, wohlriechend; Kapselzähne vorgestreckt.

Gebüsche, Raine, Aecker. ☉ Juni bis Herbst.

Klagenfurt Kkl., Zwgr., Twimberger Graben gegen Waldenstein im Lavantthale Hfnr., Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Obervellach ziemlich selten D. P., Nöranacher Wiesen bei Berg, Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Raibl Zwgr., Dobratschgehänge in Bleiberg Mar., Villach Hsr.

1795. 2. *Melandr. sylvestre* Roehl. Wald-Lichtnelke.

Neilr. p. 816; Rchb. ic. fig. 5126 *Lychn. diurna* Sibth.; Koch p. 123; Grke. p. 66 *Melandr. rubrum*.

Stengel, Blätter, Blütenstiele und Kelche von drüsenlosen Haaren zottig, obere Blätter eiförmig, plötzlich zugespitzt; Krone schön purpurroth, selten weiss, am Tage geöffnet, geruchlos; Kapselzähne zurückgerollt.

In Gebirgstälern auf Brachäckern und Wiesen oft sehr häufig. 4 Mai bis Juli.

Klagenfurt Hnrc h., Lavantthal im Granitzthale und der Unterhausschlucht Grf., Twimberger Graben gegen Waldenstein Hfnr., Lölling, Gurkthal sehr gemein, Tiffen selten, auch fl. albo D. P., Katschthal Jab., Kanning, Maltathal Khlmr., Malnitz bis auf den Schwarzkopf und Auernig (Holzgrenze) Berr., Brachäcker und Wiesen bei Sagritz gegen Heiligenblut sehr häufig Khlmr., Lesachthal Jab., Kanalthal Rssmn., Bleiberg Mar., Karawanken Jab., Unterbergen Kkl., Loibl Js ch.

DXIX. Viscaria Roehl. Pechnelke.

(X. 5. n. 285.)

1796. 1. Viscaria vulgaris Roehl. Gemeine Pechnelke.

Lychnis Viscaria L. Koch p. 122; Rechb. ic. fig. 5131; Neilr. p. 817; Grke. p. 65.

Blätter lanzettlich, kahl, am Grunde gewimpert; Stengel unter den Gelenken klebrig, sonst kahl; Blüten traubig rispig, fast quirlig; Kronblättchen ungetheilt, bekrönt, freudig purpurn.

Trockene Raine, Wiesen. 4 Mai bis Juni.

Kreuzbergl Kkl., Zwgr., Satnitz auf Chloritschiefer ober Neudorf Zwgr., Lavantthal, Umgebung St. Paul Grf., Twimberger Graben Hfnr., Osterwitz, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Malnitz Berr., Möllthal häufig noch bei Sagritz D. P., Heiligenblut Blm fld., Oberdrauthal Khlmr., Lesachthal Jab., Gailthal häufig D. P., Thal von Stockenboi, Bleiberg, Warmbad Villach Mar., Rubland Zwgr.

1797. 2. Visc. alpina L. Alpen-Pechnelke.

Lychn. alp. L. Koch p. 123; Rechb. ic. fig. 5130.

Blüten dichtdoldig köpfig; Stengel kahl, nicht klebrig; Blätter am Grunde rosettig zusammengedrängt, kahl, lanzettlich; Kronblättchen halb zweispaltig, nackt, fleischroth.

Hochalpenwiesen und Weiden in der Centralkette. 4 Juni bis Juli.

Astenalmwiesen und Göritzalm bei Sagritz D. P., Alpen um Heiligenblut Js ch., Krammerhütte in der Pasterze Hppe., Bergerthörl zwischen der Leiter und Kals auf Kalkglimmerschiefer bei 2000 bis 2300 m. Str.

Anmerkung. In Gärten findet man ziemlich häufig als Zierpflanze die aus Sibirien und Podolien stammende:

Lychnis chalcidonica L. Brennende Liebe genannt, deren Kennzeichen beiläufig folgende sind: Saftgrün, rauh behaart; Blätter eilanzettlich; Blüten büschelig; Kelchzähne lang zugespitzt; Kronblättchen jederseits mit einem Zähnchen, zweispaltig, scharlachroth; Kapsel eiförmig, etwas länger als der Träger, Zähne feinspitzig, umgebogen.

DXXX. Coronaria L. Kranzrade.

(X. 5. n. 287.)

1798. 1. Coron. flos Cuculi Al. Braun. Kukuks-Kranzrade.

Lychnis flos Cuculi L. Koch p. 123; Rechb. ic. fig. 5129; Neilr. p. 817; Grke. p. 65.

Stengelblätter lineal-lanzettlich; Kronblättchen fleischroth, bis über die Mitte vierspaltig, Zipfel lineal, handförmig auseinandertretend.

Feuchte Wiesen oft sehr häufig, feuchte Waldplätze bis in die Alpen. 4 Mai bis Juli.

Waidmannsdorf, Siebenhügel Kkl., Satnitz Zwgr., Lavanththal um St. Paul Grf. und Wolfsberg Hfnr., Gurkthal noch auf der Flatnitz, Launsdorf, Glanthal, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Malnitz Berr., durch's ganze Möllthal bis auf die Pasterze D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Lesachthal Jab., Gailthal D. P., Bleiberg, nicht häufig, mehr in Rubland und gegen das Gailthal Zwgr., Mar.

1799. 2. Coron. tomentosa Alex. Braun. Echte Kranzrade.

Lychnis coronaria L.; *Agrostemma coronaria* L., Koch p. 123; Rechb. ic. fig. 5133; Grke. p. 65.

Blätter und Stengel dicht weissfilzig; Blütenstiele mehrfach länger als der Kelch; Kronblättchen ungetheilt, ansehnlich, purpurn.

In Gärten nicht selten und sich selbst versäend. 4 Juli bis August.

Tiffen, Obervellach D. P.

DXXXI. Agrostemma L. Kornrade.

(X. 5. n. 286.)

1800. 1. Agrost. Githago L. Gemeine Kornrade, Raten, Raden.

Koch p. 124; Rechb. ic. fig. 5132; *Githago segetum* Desf. Neilr. p. 818; Grke. p. 66.

Kelchzipfel noch einmal so lang als die Platte der Kronblättchen, diese abgestutzt; Blume purpurn.

Unkraut zwischen Getreide oder an Ackerrändern.

⊙ Juni bis Juli.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg häufig Hfnr., Görtschitzthal, Gurkthal, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr.,

Malnitz Berr., Obervellach, Sagritz selten D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Gailthal D. P.

90. Familie: *Phytolaccaceae R. Brown.* Kermes-
Gewächse.

(Tabell. Uebers. 33. Fam.)

DXXXII. Phytolacca L. Kermesbeere.

(X. 6. n. 294.)

1801. 1. *Phytol. decandra L.* Gemeine Kermesbeere.

Koch p. 711.

Blätter breit eilanzettlich; Blüten zehnmännig, zehnwellig, purpurfärbig.

In Gärten hie und da des rothen Saftes der Beeren wegen cultivirt. 4 Juli bis August.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., Obervellach D. P.

91. Familie: *Malvaceae R. Brown.* Malven-
Gewächse.

(Tabell. Uebers. 85. Fam.)

DXXXIII. Althaea L. Eibisch.

(XVI. 3. n. 433.)

1802. 1. *Alth. officinalis L.* Gebräuchlicher Eibisch.

Koch p. 151; Rchb. ic. fig. 4849; Neilr. p. 819; Grke. p. 79.

Stengel aufrecht, filzig zottig; Blätter ungleich zahnartig gekerbt, auf beiden Seiten dicht sammtartig filzig, untere herzförmig fünflappig, obere länglich-eiförmig, dreilappig; Blütenstiele reichblütig, kürzer als das Blatt; Blüten röthlich-weiss; Nüsschen randlos.

In Gärten ziemlich häufig ihrer Arzneikräfte wegen cultivirt. 4 Juli bis Herbst.

Wolfsberg Hfnr., Maltathal Khlmr., Möllthal D. P., Lesachthal Jab., Gailthal D. P.

Anmerkung. Häufig findet man in Gärten auch die Stockrose, *Althaea rosea L.*; Rchb. ic. fig. 4851. Mannshoch und höher; Stengel steif, sternfilzig; Blätter herzförmig, fünf- bis siebenlappig, runzlig gekerbt; Blumenblätter gross, breit, dunkelroth, rosa, gelb, weiss, meist gefüllt.

Stammt aus Syrien. 4 Juli bis Herbst.

DXXXIV. Malva L. Malve.

(XVI. 3. n. 434.)

1. Rotte: **Fasciculatae D. C.** Blütenstiele zu zwei bis sechs in den Blattwinkeln gehäuft.

1803. 1. Malv. sylvestris L. Wilde Malve, Rosspappel.

Koch p. 150; Rchb. ic. fig. 4840; Neilr. p. 821; Grke. p. 78.

Stengel niederliegend aufsteigend, oft auch steifaufrecht, rauhaarig; Blätter herzförmig rundlich, fünf- bis siebenlappig; Blütenstiele nach dem Verblühen aufrecht; Kelchblättchen elliptisch länglich; Kronblättchen rosenroth mit Purpurstreifen, viel länger als der Kelch, tief ausgerandet, am Nagel gebärtet; Theilfrüchtchen am Rande grubig-runzlig.

Schutthaufen, Zäune, in Dörfern. 4 Juni bis September.

Klagenfurt, Ackerraine bei Pörtschach, Hollenburger Strasse Kkl., bei Stein auf Thonschiefer Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Feldkirchen, Buchscheiden, Tiffen gegen Steindorf D. P., Maltathal Khlmr., Obervellach häufiger als folgende D. P., Berg Khlmr., Tröpolach D. P., Raibl Zwgr., Föderaun D. P., Bleiberg Mar.

1804. 2. Malv. neglecta Wallr. Uebersehene Malve, Saupapelan.

Malv. rotundifolia Aut. non L.; Koch p. 151 M. vulgaris Fries; Rchb. ic. fig. 4836; Neilr. p. 821; Grke. p. 78.

Kelchblättchen lineal-lanzettlich; Kronblättchen zwei- bis dreimal so lang als der Kelch, tief ausgerandet, hell rosenroth oder fast weiss; Theilfrüchtchen auf dem Rücken abgerundet, glatt oder schwach runzlig; s. w. v.

Wegränder, Mauern, Schutt, in Dörfern. 4 Juni bis September.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., Lölling, Feldkirchen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Obervellach D. P., Berg Khlmr., Tröpolach D. P.

Anmerkung. Hierher gehören die in Gärten öfters vorkommenden:

Malva mauritiana L. Mauritanische Malve; Rchb. ic. fig. 4839; Grke. p. 78.

Stengel fast kahl; Blätter stumpf-lappig; Blütenstielchen kurz, kahl; Kronblättchen breit, wenig ausgerandet, fast blutroth. Stammt aus Südeuropa.

Malva crispa L. Krause Pappel; Rchb. ic. fig. 4834.

Aufrecht; Blätter krausrandig; Blüten knäuelartig, achselständig, sehr kurz gestielt; Kronblättchen anderthalbmal so lang als der Kelch, weiss; Theilfrüchten kahl, erhaben

querlinirt mit durchschneidender Mittellinie über dem Rücken. Stammt aus Syrien und kommt verwildert auf Garten- auswürfen vor.

2. Rotte: **Bismalva D. C.** Blütenstiele einzeln in den Blattwinkeln, aber der sehr verkleinerten obern Stengelblätter wegen in eine endständige Traube oder Doldentraube zusammenfliessend.

1805. 3. Malv. Alcea L. Spitzblättrige Malve.

Koch p. 150; Rchb. ic. fig. 4842; Neilr. p. 822; Grke. p. 78.

Stengel aufrecht, von anliegenden Haaren graugrün; Kronblättchen gross, rosenroth, geruchlos; Theilfrüchtchen kahl, fein querrunzlig, auf dem Rücken gekielt, am Rande abgerundet.

Trockene Hügel, Raine. 4 Juli bis September.

Maria Saal gegen Zollfeld Kkl., Drechnr., Hollenburger Strasse Kkl., Zwanzgerberg Drechnr., Gumitsch und Twimberger Graben im Lavantthale Hfnr., Tiffen gegen Sallach und St. Nikolai in Pernegg, doch beiderseits selten D. P., Maltathal Khlmr., Pusarnitz, Obervellach gegen Semslach D. P., Greifenburg Preissm., Berg Khlmr., Sonnseite bei Tröpolach D. P.

1806. 4. Malv. moschata L. Bisam-Malve.

Koch p. 150; Rchb. ic. fig. 4841; Neilr. p. 822; Grke. p. 78.

Stengel von abstehenden Haaren rauh; Kronblättchen rosenroth, aber viel kleiner als bei voriger; Theilfrüchtchen dicht rauhhaarig, glatt; die Pflanze riecht nach Moschus.

Zäune, Wegränder. 4 Juli bis Herbst.

Pontafel Grf., Villach? Kkl.

DXXXV. Hibiscus L. Stundenblume.

(XVI. 3. n. 435.)

1807. 1. Hibisc. Trionum L. Gelbe Stundenblume.

Rchb. ic. fig. 4860; Koch p. 152; Neilr. p. 823.

Untere Blätter fast ungetheilt, obere fünf- oder dreitheilig, Abschnitte rhombisch-lanzettlich, mittlerer länger, alle eingeschnitten gesägt; Kelch blasig, vielnervig; Kronblätter umgekehrt eirund, ockergelb, am Grunde mit einem grossen schwarzvioletten Flecken.

In Gärten als Zierpflanze und bereits eingebürgert. ☉ Juli bis August.

Klagenfurt und tieferes Unterkärnten Zwgr.

92. Familie: *Tiliaceae Juss.* Lindengewächse.
(Tabell. Uebers. 86. Fam.)

DXXXVI. Tilia L. Linde.

(XIII. 1. n. 325.)

1. Rotte: **Eutilia Neilr.** Staubgefäße frei; Nebenblumenblätter fehlend.

1808. 1. Til. platyphyllos Scop. Breitblättrige Linde.

Rchb. ic. fig. 5139; Koch p. 153 *Til. grandifolia* Ehrh.; Neilr. p. 824; Grke. p. 80.

Blätter schiefrechtlich herzförmig, zugespitzt, unterseits kurzhaarig und in den Achseln der Adern bärtig, beiderseits grün; Ebensträusse meist zwei- bis dreiblumig; Lappen der Narbe aufrecht; Nüsse holzig mit fünf starken Kanten; Blume weiss oder blassgelb.

In Wäldern, auch sehr häufig angepflanzt † Juni bis Juli.

Klagenfurt Alleebaum, Satnitz Kkl., Wolfsberg Hfnr., Kraig, Tiffen zwischen unzugänglichen Felsen D. P., Maltathal Khlmr., Möllthal bei Groppenstein wild, bei Döllach nur mehr angepflanzt D. P., Gries bei Greifenburg, Weissbriach Khlmr., Gailthal mit folgender eine Zierde eines jeden Dorfes D. P., Raibl nur im Pfarrhofgarten angepflanzt Zwgr., Bleiberg Mar., Villach Hsr.

1809. 2. Til. ulmifolia Scop. Kleinblättrige Linde, Steinlinde.

Koch p. 153 *Til. parvifolia*; Rchb. ic. fig. 5137; Neilr. p. 824; Grke. p. 80.

Blätter beiderseits kahl, unterseits meergrün; Ebensträusse fünf- bis siebenblütig; Lappen der Narbe zuletzt wagrecht auseinandertretend; Nüsse dünnschalig, mit vier bis fünf un- deutlichen Kanten; s. w. v.

In Laubwäldern und noch häufiger angepflanzt als vorige. † Juni bis Juli.

Klagenfurt Zwgr., Satnitz, Ebenthaler Allee Kkl., Wolfsberg Hfnr., Lölling, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Teichl im Möllthal D. P., Berg beim Pfarrhofe Khlmr., Lesachthal Jab., Gailthal minder häufig als vorige D. P., Bleiberg Mar.

2. Rotte: **Lindnera Rchb.** Staubgefäße in fünf Bündel verwachsen, mit fünf Nebenblumenblättern.

1810. 3. Til. argentea Desf. Silberblättrige Linde.

Rchb. ic. fig. 5150; Neilr. p. 825.

Blätter oberseits dunkelgrün, unterseits weissfilzig, an den Adern nicht gebartet; Ebenstrauss sechs- bis zwölfblütig; Nüsse kugelig, schwach fünfkantig, filzig; Blume gelblich.

Angepflanzt. † Juli.

Klagenfurt Kkl.

93. Familie: ***Hypericineae De C.*** Hartheu-
Gewächse.

(Tabell. Uebers. 100. Fam.)

DXXXVII. *Hypericum* L. Hartheu.

(XVIII. 1. n. 467.)

a. Kelchzipfel ganzrandig, drüsenlos (nur bei *Hyper. humifusum* bisweilen drüsig gezähnt).

1811. 1. *Hyper. humifusum* L. Niedergestrecktes Hartheu.

Wulf. p. 666; Koch p. 155; Rchb. ic. fig. 5176; Neilr. p. 825; Grke. p. 81.

Stengel niederliegend, fadenförmig, fast zweikantig; Blätter eiförmig, länglich, durchscheinend punctirt; Kelchblättchen länglich, stumpf, kurz stachelspitzig, doppelt so lang als der Fruchtknoten; Blume gelb.

An Feldmauern, lichten Waldstellen, auch auf feuchten lehmigen Boden. † Juni bis Herbst.

Umgebung Klagenfurt bei den Siebenhügeln, am Wörthersee, Waidmannsdorf, Satnitz, Krastowitz Kkl., um St. Paul am Rabenstein und bis zu der obersten Behausung an der Goding Grf., Steindorf am Ossiachersee D. P., Wälder zwischen Klagenfurt und Villach und bei Treffen Wulf., Kanning und Maltathal Khlmr., Berg im Oberdrauthale häufig, Weissbriach Khlmr., Sonnseite bei Rattendorf im Gailthale sehr selten D. P., Hermagor Preissm., Rosenbach Grf., in der Vellach Zwgr.

1812. 2. *Hyper. perforatum* L. Gemeines Hartheu, Johanniskraut.

Koch p. 155; Rchb. ic. fig. 5177; Neilr. p. 826 *α* vulgare; Grke. p. 80.

Stengel aufrecht, zweikantig; Blätter länglich-eiförmig, durchscheinend punctirt; Kelchblättchen lanzettlich spitz, so lang als der Fruchtknoten; Blume gelb.

β. veronense Rchb. *H. stenophyllum* Wimm. et Grab. Blätter länglich lineal; Trugdolde klein, armbütig; Kelchblättchen schmallanzettlich, spitz.

Trockene Hügel, Gebüsch, Vorwälder. 4 Juni bis August.

Satnitz Kkl., um St. Paul Grf., Wolfsberg Hfnr., Gurkthal, Tiffen, Himmelberg, Gmünd, Möllthal D. P., Berg häufig Khlmr., Gailthal D. P., Raibl Zwgr., Bleiberg Mar., Villach D. P.

β. Bei Freienthurn Kkl., Siebenhügel Zwgr., Tiffen gegen Steindorf D. P., sonnige Hügel bei Oberdrauburg, Laas bei Kötschach, in Menge bei Luggau Jab., Sand der Giessbäche bei Tröpolach, Föderaun D. P.

1813. 3. Hyper. quadrangulum L. Vierkantiges Hartheu.

Wulf. p. 668 H. perfoliatum L.; Koch p. 155 H. quadrangulare L.; Rchb. ic. fig. 5178; Neilr. p. 826; Grke. p. 80.

Stengel aufrecht, schwach vierkantig; Blätter eiförmig, zerstreut und durchscheinend gross punktirt; Kelchblättchen elliptisch, stumpf, etwa so lang als der Fruchtknoten; Blume gelb.

Feuchte Waldränder, an Quellen, Gräben, Ufern. 4 Juli bis August.

Klagenfurt am Lendcanal, Satnitz, Ebenthal Kkl., Grf., Wolfsberg Hfnr., Tiffen am Moose, Görlitzen, Teichen im Hinterwinkel D. P., Kanning, Maltathal bei der Langwand Khlmr., Malnitz Berr., Hauzendorf und Eggeralm im Oberdrauthale, Weissbriach Khlmr., Plöcken Wulf., Tröpolacher-Alm B. R., Dobratsch Mar., Ritschberg nebst der Petzen Weld.

1814. 4. Hyper. tetrapterum Fries. Vierflügliges Hartheu.

Wulf. p. 667 als Hyp. quadrangulum L.; Koch p. 155; Rchb. ic. fig. 5179; Neilr. p. 827; Grke. p. 81.

Stengel aufrecht, geflügelt kantig; Blätter eiförmig, dicht durchscheinend punktirt; Kelchblättchen lanzettlich zugespitzt, etwa so lang als der Fruchtknoten; Blume gelb.

Feuchte Wiesen, Gräben. 4 Juli bis August.

Krumpendorf, Gurnitz Kkl., Wolfsberg Hfnr., Buchscheiden, Steindorf am Ossiachersee D. P., Möllthal Grf., Wischbachalm in Raibl? Schnk.

b. Kelchzipfel drüsig gesägt oder gefranst.

1815. 5. Hyper. montanum L. Berg-Hartheu.

Koch p. 156; Rchb. ic. fig. 5187; Neilr. p. 827; Grke. p. 81.

Stengel aufrecht, stielrund, wenig beblättert; Blätter sitzend, aus herzförmigem Grunde eiförmig, am Rande schwarz

punktirt, nur die obersten durchscheinend punktirt, unterseits etwas rauh; Kelchblättchen lanzettlich spitz; Blüten gelb, fast kopffartig zusammengedrängt; Samen feinpunktirt.

Wälder, Gebüsche an sonnigen Abhängen. 4 Juni bis August.

Satnitz Grf., unter Ebenthal Kkl., Berge um St. Paul bis zur obersten Behausung an der Goding Grf., Lattenberg bei Wolfsberg Hfnr., Saualm Jab., Eberstein Js., Tiffen gegen Sallach, Obervellach jedoch selten, Flattach, Göritz ob Sagritz D. P., ob Berg, Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Wischberg Mrchs., Rubland und Heiligengeist vor Bleiberg Mar., Karawanken Jab., Ortatscha, Loibl, Obir und Voralpen bei Kappel Herb. Kkl.

1816. 6. Hyper. hirsutum L. Rauhhaariges Hartheu.

Koch p. 156; Rchb. ic. 5189; Neilr. p. 828; Grke. p. 81.

Stengel nebst den kurzgestielten eiförmigen oder länglichen Blättern weichhaarig; Blüten in langgestreckter Rispe; Samen sammtartig; s. w. v.

Laubwälder, buschige Hügel. 4 Juni bis August.

Satnitz gegen den Wasserfall Kkl., Zwanzgerberg, Wald gegen Gurnitz, Wildensteiner Graben, Voralpen der Petzen Js ch.

Anmerkung. Schunk will auch *Hyp. elegans* Steph. am Wege nach Kaltwasser bei Tarvis gefunden haben, ist indessen in Zweifel zu ziehen, da diese Pflanze nur in Weinbergen von Thüringen und Nordböhmen einheimisch ist und dürfte eine Verwechslung mit *Hyp. perforat. veronense* oder *humifusum* stattgefunden haben, von denen es durch drüsig gesägte Kelchblättchen und am Rande zurückgerollte Blätter abweicht.

94. Familie: ***Elatineae Cambess.*** Tännelgewächse.

(Tabell. Uebers. 106. Fam.)

DXXXVIII. *Elatine* L. Tännel.

(VIII. 3. n. 256.)

1817. 1. *Elat. Hydropiper* L. Pfefferfrüchtiger Tännel.

Koch p. 145; Neilr. p. 828; Grke. p. 75.

Blätter gegenständig; Blüten sitzend oder sehr kurz gestielt; Krone vierblättrig, achtmännig, blassroth oder weiss; Samen halbkreisförmig gekrümmt.

Ueberschwemmte, feuchte Orte. ☉ Juni bis August.

Wasserhofen nächst Eberndorf Grf.

Anmerkung. In Graf's Herbar erliegt eine El. mit der Bezeichnung El. Alsinastrum L. von Strassburg.

95. Familie: **Tamariscineae Desv.** Tamarisken-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 113. Fam.)

DXXXIX. Myricaria Desv. Myrikarie.

(XVI. 2. n. 430.)

1818. 1. **Myric. germanica Desv.** Deutsche Myrikarie, Tamarischn.

Wulf. p. 404 Tamarix germ. L.; Koch p. 292; Neilr. p. 830; Grke. p. 149.

Blätter lineallanzettlich; Blüten in Aehren; Deckblättchen länger als die Blütenstielchen; Krone blassroth; Fruchtkapsel aufrecht abstehend.

Im Kiese der Bäche und Flüsse. † Mai bis Juli.

Glanfurt, Glan bei Ebenthal, Gurk Kkl., Siebenhügel Zwgr., Inseln im Gurkflusse bei Grafenstein Grf., Drau bei Neudenstein Wulf, Ufer der Lavant und Nebenbäche Grf., Obervellach bis Malnitz Sns. 1799, Möllufer und im Schotter der Giessbäche häufig D. P., im Thale von Heiligenblut Hppe., Schutt am Gnoppnitzbache bei Greifenburg Khlmr., Malborgeth Hsr.

96. Familie: **Acerineae De C.** Ahorngewächse.

(Tabell. Uebers. 101. Famil.)

DXL. Acer L. Ahorn.

(VIII. 1. n. 252.)

1819. 1. **Ac. Pseudoplatanus L.** Weisser Ahorn.

Koch p. 157; Rchb. ic. fig. 4829; Neilr. p. 830; Grke. p. 82.

Blätter handförmig, fünfflappig, Lappen zugespitzt, ungleich gekerbt-gesägt, unterseits graugrün; Trauben hängend, verlängert; Staubgefässe doppelt so lang als die kleine grüne Blumenkrone; Flügel der Frucht etwas abstehend.

Gebirgswälder und Felldraine bis in die Voralpen. † Mai bis Juni.

Satnitz Kkl., zwischen Victring und Keutschach Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Lölling, Glödnitz gegen Flatnitz, Tiffen, Leoben-Graben, Katschthal D. P., Radenthain, Kanning, Maltathal noch im Gössgraben Khlmr., Kaponig bei Ober-

vellach bei 1300 m., Malnitz, Sagritz, Zirknitz, Heiligenblut bis 1200 m., Abhänge bei Berg, Oberdrauburg, Weissbriach Khl m r., Lesachthal J a b., Rattendorfer Graben im Gailthale D. P., Raibl vereinzelt Zw g r., Dobratschgehänge häufig M a r.

1820. 2. Ac. platanoides L. Spitzblättriger Ahorn.

Koch p. 158; Rchb. ic. fig. 4828; Neilr. p. 831; Grke. p. 82.

Blätter handförmig, buchtig gelappt mit fein zugespitzten drei- bis fünfzähligen Lappen; Ebensträusse aufrecht; Staubgefäße so lang als die gelbgrüne Blumenkrone; Flügel der Frucht wagrecht ausgespreizt.

Wälder niedriger Gebirge. † April bis Mai.

Umgebung Klagenfurt K k l., Satnitz Zw g r., Schlosspark in Wolfsberg H f n r., Lesachthal einzeln J a b.

1821. 3. Ac. campestre L. Feld-Ahorn.

Koch p. 158; Rchb. ic. fig. 4825; Neilr. p. 831; Grke. p. 82.

Blätter handförmig, fünfplappig, Lappen ganzrandig; länglich, mittlerer stumpf-dreilappig, Rinde glatt oder korkig; s. w. v.

Gebüsche, Zäune, Wegränder. † Mai.

Klagenfurt häufig Zw g r., Satnitz in der Gegend von Straschitsch K k l., St. Paul im Lavantthale Gr f., Eberstein J s., Osterwitz und unweit St. Gandolph im Glanthal D. P.

Anmerkung. *Acer Negundo L.* oder *Negundo aceroides Moench.* findet man nicht selten angepflanzt, durch seine zusammengesetzten, der Esche ähnlichen Blätter leicht zu erkennen. Stammt aus Nordamerika.

97. Familie: *Hippocastaneae De C.* Rosskastanien-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 90. Famil.)

DXLI. Aesculus L. Rosskastanie.

(VII. 1. n. 242.)

1822. 1. Aesc. Hippocastanum L. Gemeine Rosskastanie.

Koch p. 159; Rchb. ic. fig. 4822; Neilr. p. 832; Grke. p. 83.

Blätter fünf- bis siebenfingerig, mit verkehrt-ei-keilförmigen gezähnelten Lappen; Blume weiss mit rothen Flecken; Kapsel igelstachelig.

Stammt aus Griechenland und dem nördlichen Ostindien und ist häufig angepflanzt. † Mai bis Juni.

98. Familie: *Polygalaceae* **Juss.** Kreuzblumen-
Gewächse.

(Tabell. Uebers. 54. Fam.)

DXLII. Polygala L. Kreuzblume.

(XVII. 2. n. 438.)

4. Rote: **Polygalon D. C.** Kelchflügel gerade vorgestreckt, bei der Fruchtreife bleibend, grünblau oder röthlich; Anhängsel der Blume kammig-vielspaltig; Staubfäden in zwei Bündel verwachsen; Blätter abfallend.

1823. 1. Polyg. forojuliensis A. Kerner. Friaulische Kreuzblume.

A. Kerner Oesterr. bot. Zeitschrift 1874, p. 102, Schedae in Fl. exsicc. aust.-hung. Nr. 873.

Unterste Blätter spatelig, sehr stumpf, mittlere Stengelblätter lanzettlich, oberste sehr schmal lineal; Blütenstand gedrängt; Blütenstielchen kaum 1 mm. lang, vor dem Aufblühen nur halb so lang als die seitlichen Deckblättchen; Traube zur Fruchtreife nicht über 5 cm. lang; flügelartige Kelchblättchen plötzlich in einen kurzen Nagel zusammengezogen, fast kreisrund, von einem sehr zarten grünen Mittelnerv durchzogen, auffallend breiter als die kleine mit einem sehr schmalen Saume berandete Fruchtkapsel; Blume rosenroth, grösser als bei *P. comosa*.

Sonnige, magere Triften und Föhrenwälder auf feinen Kalksand. 7 Mai bis Juni.

Kanalthal von Pontafel aufwärts, sonnseitig bis Malborgeth J. a. b. 1882, R. s. s. m. n., Raiblthal Kr. n. b. r. g.

Anmerkung. Die *Polyg. major* von Herbieh in seiner Reise flora von Pontafel-Villach auf den Dobratsch ist sehr wahrscheinlich diese *P. forojul.* Ob auch die *Polygala speciosa* Kerner, welche Marchesetti am Wischberg anführt, dieselbe Pflanze, d. i. die *P. foroj.* sei, ist dem Verfasser unbekannt.

1824. 2. Polyg. vulgaris L. Gemeine Kreuzblume.

Koch p. 105; Rchb. ic. tab. 145, fig. I; Neilr. p. 833
α. *achaetes* Döll.; Grke. p. 57.

Blätter lanzettlich, spitz, unterste elliptisch, kürzer; Traube vielblütig, seitenständige Deckblättchen halb so lang als das Blütenstielchen; Krone mit vielspaltigem Anhängsel; Flügel elliptisch, verkehrt-eiförmig, dreinervig, Nerven an der

Spitze mit einer schiefen Ader ineinander fliessend, Seitennerven auswendig fünffaderig, Adern ästig, netzig verbunden; Stiel des Fruchtknotens während des Aufblühens von der Länge desselben oder kürzer; Blume blau, rosenroth oder weiss.

Wiesen auf mehr trockener Unterlage bis in's Hochgebirge. 4 Juni bis Juli.

Kreuzbergl Zwgr., Satnitz Drchnr., Wolfsberg Hfnr., Friesach Preissm., Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Obervellach am Launsberg und Rosskopfalbl in Malnitz D. P., Spittal Preissm., Berg, Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Bleiberg Mar., Zwgr.

1825. 3. Polyg. comosa Schkhr. Schopfige Kreuzblume.

Koch p. 105; Rchb. ic. tab. 145, fig. IV; Neilr. p. 834
P. vulg. *β. comosa*; Grke. p. 57.

Seitenständige Deckblättchen vor dem Aufblühen länger als die Blütenstielchen und der Blütenknopf, die Blütentraube daher an der Spitze schopfig; s. w. v.; meist blassroth oder weisslich, selten auch blau.

Sonnige, trockene Wiesen. 4 Juni bis Juli.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., Görtschitzthal, Osterwitz, Tiffen, Obervellach, Sagritz D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Lesachthal Jab., Tröpolach D. P., Kanalthal Jab., Predil Jschn., Villach D. P., kleiner Loibl Jab.

1826. 4. Polyg. microcarpa Gaud. Kleinfrüchtige Kreuzblume.

Gaud. Fl. helv. IV, p. 445; A. Kerner Schedae ad Fl. exsicc. austr.-hung. N. 869; Rchb. ic. fig. tab. 146, fig. III. P. *alpestris* Rchb.

Vielstengelig; unterste Blätter nicht grösser als folgende, breit, elliptisch, stumpf; Flügel doppelt so gross als die Fruchtkapsel, deren Rand sehr schmal; Blume verwaschen blau.

Auf Hochgebirgen und Voralpen. 4 Juli.

Grosszirknitz bei Sagritz, am Repp bei Tröpolach D. P. Mit Exemplaren aus Tirol vom typischen Standorte Kerner's ganz gut stimmend.

1827. 5. Polyg. amara L. Bittere Kreuzblume.

Wulf. p. 637?; Koch p. 106; Rchb. ic. tab. 147, fig. III, non bona; Neilr. p. 834 *α grandiflora*; Grke. p. 57.

Unterste Blättchen rosettig, viel grösser als die oberen, länglich-eiförmig, sehr stumpf abgerundet, obere lineal-lanzettlich; Krone so lang oder kürzer als die Flügel, diese länglich-

eiförmig, dreinervig, Seitennerven auswendig schwach aderig; Blume ziemlich gross, dunkelviolet; Pflanze mit bitterm Geschmack.

β. alpestris. Sehr gedungen, obere Stengelblättchen breiter, als bei Pflanzen in den Niederungen. *Polyg. amara* var *alpestris* Koch? non Rechb.

Auf feuchten Wiesen und Weiden bis in die Alpen. 4. Mai bis Juli.

Sumpfwiesen am Stadtcanal bei Klagenfurt Kkl., Satnitz Hnrch., Südseite des Kasbauersteines und Langenberges im Lavantthale Grf., Flatnitz, Tiffner Mooswiesen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Obervellach D. P., Lesachthal Jab., Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Kanalthal Rssmn., Wald in der Seisara? und am Luschariberg? Schnk., Raibl Jab., Bleiberg Mar., Singerberg bei Ebenau? Wulf.

β. Flatnitz D. P., Jauken Preissm., Latschur Khlmr., Dobratsch, Obir Hsr., Königsberg bei Raibl Schnk., Karawanken Jab., Wildensteiner Graben gegen die Obir Zwgr., Petzen Wulf., Oistriza Weiss.

1828. 6. *Polyg. amarella* Crantz. Kleinblütige Kreuzblume.

A. Kerner Schedae N. 512; Rechb. ic. tab. 147, fig. II, *Polyg. austriaca β uliginosa* Gren. et Godr.; Neilr. p. 834 *P. amara β. parviflora.*

Obere Stengelblättchen lanzettlich, stumpf; Blüten fast um die Hälfte kleiner als bei voriger, dunkelviolet oder weisslich; Kapsel gegen den Grund zu verschmälert, nicht kreisrund, breiter als die länglichen Flügel; Pflanze weniger bitter; s. w. v.

Sandboden auf Weiden und Wiesen der Gebirgsthäler bis in die Alpen. 4. April bis Juli.

An der Möll bei Obervellach, Malnitz gegen den niedern Tauern häufig D. P. Hicher wahrscheinlich die Standorte Wurten in der Fragant Gussbr., Pasterze Blmfld., Margaritzen Hppe.

1829. 7. *Polyg. austriaca* Crantz. Oesterreichische Kreuzblume.

A. Kerner Schedae N. 513.

Stengel ästig, Zweige verlängert, schlank, ruthenförmig, aufrecht; Traube locker; Blättchen elliptisch-lanzettlich; Blume weisslich; s. w. v.

Nasse Wiesen. 4. Mai bis Juni.

Sumpfwiesen diesseits der Glanfurt Kkl. als *P. uliginosa*; Appetig bei Tiffen D. P., Sumpfwiesen an der Drau bei Oberdrauburg Jab., Feistritz bei Berg? Khlmr., Predil? Preissm.

2. Rotte: **Chamaebuxus D. C.** Kelchflügel bei der Fruchtreife abfallend; Anhängsel der Krone vierlappig; Staubfäden nur am Grunde verwachsen; Blätter immergrün.

1830. 8. Polyg. Chamaebuxus L. Buxbaumblättrige Kreuzblume.

Koch p. 107; Rchb. ic. tab. 150, fig. II, III; Neilr. p. 835; Grke. p. 58.

Stengel strauchig, ästig, hingestreckt; Blätter elliptisch oder lanzettlich, stachelspitzig; Blütenstielchen blattwinkelständig, meist dreiblütig; Blume gelb oder purpurroth.

Haiden, Wälder auf trockenem Sandboden. ♪ März bis Juni.

Kreuzbergl, Maiernig Zwgr., Satnitz Kkl., Gurnitz D. P., Lavanthal um St. Paul Grf., Wolfsberg Hfnr., Mariahilferberg bei Guttaring, Osterwitz, Gurkthal, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., durch's ganze Möllthal D. P., Oberdrauthal, Gitschthal Khlmr., Mussen, Tröpolach D. P., Kanalthal Rssmn., Raibl in Fichtenwäldern mit langen schmalen Blättern Zwgr., Bleiberg Mar., Karawanken Jab., Weidisch Zwgr., Kolben bei Eberndorf, 16. November 1844 blühend Grf.

99. Familie: **Celastrineae R. Brwn.** Celaster-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 104. Fam)

DXLIII. Evonymus Tournef. Spindelbaum.

(V. 1. n. 146.)

1831. 1. Evonym. europaeus L. Gemeiner Spindelbaum, Pfaffenkappel.

Wulf. p. 292; Koch p. 170; Rchb. ic. fig. 5134; Neilr. p. 836; Grke. p. 89.

Blätter elliptisch-lanzettlich, kleingesägt, kahl; Aeste viereckig, glatt; Kronblättchen länglich, hellgrün; Kapsel rosenroth, meist vierklappig, stumpfkantig, glatt, flügellos; Mantel pomeranzengelb, den ganzen Samen einhüllend; Same weiss.

Gebüsche, Vorwälder. ♪ Mai bis Juni.

Klagenfurt Wulf., Satnitz Kkl., Wolfsberg Hfnr., Gurkthal, Tiffen, Leoben D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Möllthal D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Lesachthal Jab., Gailthal D. P., Kanalthal Rssmn., Bleiberg Mar., Villach D. P., Karawanken Jab.

1832. 2. Evonym. verrucosus Scop. Warziger Spindelbaum.
Wulf. p. 292; Koch p. 171; Rchb. ic. fig. 3135;
Neilr. p. 837; Grke. p. 89.

Blätter elliptisch, kleingesägt, kahl; Aeste stielrund, warzig; Kronblättchen rundlich, grün mit kleinen blutrothen Punkten; Kapsel vierklappig, stumpfkantig, flügellos, glatt, gelblich; Samenmantel blutroth, den halben Samen bedeckend; Samen kohlschwarz.

Gebirgswälder. † Mai bis Juni.

Satnitz und Zwanzgerberg Wulf., Kkl., Zwgr., Gurnitz D. P., Wälder im untern Lavantthale Grf., Karawanken Jsch.

1833. 3. Evonym. latifolius Scop. Breitblättriger Spindelbaum.
Wulf. p. 293; Koch p. 171; Rchb. ic. fig. 5136; Neilr. p. 836; Grke. p. 89.

Blätter länglich-elliptisch, kleingesägt, kahl; Aeste stielrund, etwas zusammengedrückt; Kronblättchen rundlich; Fruchtsiel blutroth; Kapseln gefügelt-kantig, purpurn; Samenmantel pomeranzengelb.

Gebirgswälder. † Mai bis Juni.

Satnitz und Ebenthaler Bergrevier Kkl., Grf., Zwgr., Weissbriach Khlmr., Raibl am östlichen Fuss des Königsbirges Zwgr., Karawanken Jab., Loiblthal Jsch.

100. Familie: *Ampelideae Kunth.* Rebengewächse.
(Tabell. Uebers. 103. Fam.)

DXLIV. Ampelopsis Michx. Zaunrebe.

(V. 1. n. 145.)

1834. 1. Ampel. hederacea Mchx. Fünfblättrige Zaunrebe, wilder Wein, Mauerkatze.

Hedera quinquefolia L. Koch p. 159; Neilr. p. 838

Ampel. quinquefolia Roemer et Schultes; Grke. p. 83.

Kletternd; Blätter drei- bis fünfzählig, kahl, mit kurzgestielten eiförmigen oder länglichen, zugespitzten, kurzstacheligen, spitzlich-gesägten Blättern; Blume grünlich; Beeren schwarz.

Stammt aus Nordamerika und ist häufig angepflanzt an Mauern, in Gärten. † August bis September.

DXLV. Vitis L. Weinrebe.

(V. 1. n. 144.)

1835. 1. Vit. vinifera L. Edle Weinrebe.

Wulf. p. 296; Koch p. 159; Neilr. p. 837; Grke. p. 83.

Blätter herzförmig, meist fünflappig, grob gezähnt, kahl oder filzig; Blume gelblichgrün; Beeren roth, dunkelblau oder gelblichgrün.

Angepflanzt. † Juni bis Juli.

Lavantthal und Globasnitz im Freien, sonst wohl nur in Gärten, an Häusern auf sonnigen Plätzen. Am Sonnberg bei Tiffen an einer sehr sonnigen Felslehne fast ohne alle Cultur, im Möllthale noch bei Obervellach D. P.

101. Familie: *Rhamnaceae R. Brown.* Kreuzdorn-Gewächse.

(Tabell. Übers. 87. Fam.)

DXLVI. Rhamnus Tournef. Kreuz- oder Wegdorn.

(V. 1. n. 147.)

1. Rotte: *Cervispina Dill.* Aeste gegenständig, ein Dorn an den diesjährigen Aesten endständig, später gabelständig; Blätter gegenständig, an den Seiten der Aeste büschelig, zu beiden Seiten der Mittelrippe mit drei meist zusammenneigenden Hauptadern; Blüten fast büschelig an den Seitenästchen, grün oder gelblich.

1836. 1. Rhamn. cathartica L. Gemeiner Kreuzdorn.

Wulf. p. 289; Koch p. 172; Neilr. p. 839; Grke. p. 90.

Blätter rundlich-oval, kleingesägt, am Grunde herzförmig; Blattstiel zwei- bis dreimal so lang als die Nebenblättchen; Krone grün oder gelblich; Beere schwarz; Steinfrucht auf dem bleibenden ziemlich convexen Grunde des Kelches sitzend; Ritze der Samen geschlossen.

Gebüsche an trockenen Rainen. † Mai bis Juni.

Satnitz Kkl., Ulrichsberg Wulf., Lattenberg bei Wolfsberg Hfnr., Glödnitz, Tiffen, Teichen D. P., Kanning Khlmr., Obervellach selten D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Bleiberg Mar., Villach D. P., Karawanken Jab.

1837. 2. Rhamn. saxatilis L. Stein-Kreuzdorn.

Wulf. p. 290; Koch p. 173; Neilr. p. 840.

Blätter elliptisch oder lanzettlich; Blattstiel von der Länge der Nebenblättchen; Steinfrüchte auf dem bleibenden flachen Grunde des Kelches sitzend; Ritze der Samen klaffend.

Felsige, sonnige Plätze in Gebirgen und auf Voralpen.
 † Mai bis Juni.

St. Georgen am Längsee Mus. Herb., Wischberg
 Mrchs., Gebüsch unter Gailitz bei Arnoldstein Jab., Karawanken Jab., zwischen Kirschentheur und Ferlach am Fusse des Loibl Wulf., am kleinen Loibl Kkl., Jsch., Loibl sehr häufig Trflnr., Hsr.

2. Rotte: **Rhamnus**. Aeste wechselständig, wehrlos; Blätter mit geraden, schief laufenden Adern; Blüten am Grunde der Aestchen in den Winkeln von deckblattförmigen hinfalligen Blättchen und in den Winkeln der unteren Blätter der Aestchen.

1838. 3. **Rhamn. carniolica A. Kerner**. Krainischer Kreuzdorn.
 A. Kerner Ferdinandeum III. Folge, 15. Heft, p. 282; Rhamn. alpina L. Wulf. p. 290; Koch p. 173, soweit die Standorte Kärnten und Krain angeführt sind.

Wuchs aufrecht; Blätter im Umriss länglich-lanzettlich, vorn allmählich verschmälert, spitz, am Grunde plötzlich zusammengezogen, gestutzt oder etwas herzförmig, am Rande von kleinen, geschweiften, einwärts gebogenen, mit einer schwarzen drüsenartigen Verdickung endigenden Kerbzähnen dicht gekerbt-gesägt, die an der Unterseite hervortretenden Seitennerven parallel, bis zum Rande geradlinig; Blüten auf flaumigen Stielchen gebüschelt, männliche grösser als die weiblichen; Kronblättchen sehr klein, nur 1 mm. lang, lineal.

Berg- und Voralpenwälder auf Kalk. † Mai bis Juni.

Wischberg Schnk. als Rh. alpina, Karawanken Jab., Bärenthal bei Suetschach Kkl., Kotschna Mus. Herb., Ortatscha Hsr., heilige Wand Zwgr., Loibl Hppe. 1802, Baba Kkl., Koschuta Drchnr., Wildensteiner Graben gegen die Obir Zwgr., Kankerthal Wulf.

Anmerkung. Nach A. Kerner ist unser ehemaliger Rhamn. alp. nun carniolica. Rh. alp. gehe von der Schweiz nicht weiter östlich, sei besonders im Jura einheimisch und unterscheide sich auf den ersten Blick durch im Umriss stets ovale, vorn plötzlich in eine kurze dreieckige Spitze zusammengezogene oder auch ganz stumpfe, mithin nie länglich-lanzettliche Blätter.

1839. 4. **Rhamn. pumila L.** Niedriger Kreuzdorn.

Wulf. p. 291; Koch p. 173.

Strauch an Felsen angedrückt, niederliegend; Blätter elliptisch oder rundlich, kleingesägt, am Mittelnerv beiderseits sechs schiefe, etwas bogige Adern.

Sonnige Felsen auf Kalkalpen. † Mai bis Juli.

Weissbriach, Reisskofel Khlmr., Schoberkopf bei Pirkach und Lamprechtskofel in der Plöcken Jab., Gartnerkofel D. P., Vogel- und Weissenbach-Graben im Kanalthale, Garnitzenschlucht bei Hermagor Preissm., Bleiberg Mar., Sonnseite des Erzberges sehr häufig Zwgr., Karawanken Jab., Seleniza Hsr., Felswände bei der Teufelsbrücke Kkl., Loiblthal Js ch.

DXLVII. *Frangula Tournef.* Faulbaum.

(V. 1. n. 148.)

1840. 1. *Frang. Alnus Miller.* Glatter Faulbaum, Pulverholz, Hundsbeer.

Rhamnus *Frangula* L. Wulf. p. 291; Koch p. 174; Neilr. p. 840; Grke. p. 90.

Zweige wechselständig, dornenlos; Blätter elliptisch, zugespitzt, ganzrandig; Krone grünlichweiss; Frucht zuerst roth, dann schwarz.

Gebüsche, feuchte Haine, Vorwälder. † Mai bis Juli.

Klagenfurt Wulf., Satnitz Kkl., Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Glödnitz, Tiffen D. P., Maltathal Khlmr., Obervellach, Sagritz nur mehr an einem vor dem Winde sehr geschützten sonnigen Abhange D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Karawanken Jab., Liescha Zwgr.

102. Familie: *Empetreae Nutt.* Rauschbeer-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 102. Fam.)

DXLVIII. *Empetrum Tournef.* Rauschbeere.

(XXII. 3. n. 589.)

1841. 1. *Empetr. nigrum L.* Schwarze Rauschbeere, Krähenbeere, Stainhadach.

Wulf. p. 787; Koch p. 742; Rchb. ic. fig. 4810; Neilr. p. 841; Grke. p. 346.

Niederliegend; Blättchen länglich-lineal, am Rande zurückgerollt; Blume rosenroth; Staubgefässe purpurn; Beeren schwarz.

Felsige Plätze auf Alpen und Voralpen. † Juni bis Juli.

Winterthal und Flatnitz gegen das Griffenthal D. P., Kleinellend im Maltathale Rchrdt., Malnitz am Schwandkopf, Lerchriegel Hkl., Tauern Js., Kapponiger-Alm, Kleinzirknitz, kleine Fleiss, Eggerwiesen bei Putschal D. P., Pasterze und

Glockner Wulf., Koralm ober Siflitz Jab., Spitaler - Alm unter der bösen Nase Wulf., Rattendorfer-Alm im Gailthale D. P., Ortatscha, Seleniza Js ch., Jab.

103. Familie : *Euphorbiaceae* Kl. & Grke.
 Wolfsmilchgewächse.
 (Tabell. Uebers. 41. Fam.)

DXLIX. Tithymalus Scop. Wolfsmilch.

(XXI. 1. n. 557.)

1. Rotte: *Helioscopia* Röper. Drüsen der Blütenhülle quereval, theilweise halbmondförmige eingemischt.

a. Wurzel einjährig, spindelrig.

- 1842. 1. Tithym. helioscopius Scop.** Sonnenwend-Wolfsmilch.
Euphorbia helioscopia L. Wulf. p. 496; Koch p. 745; Rchb. ic. fig. 4754; Neilr. p. 844; Grke. p. 347.

Blätter verkehrt-eiförmig, vorn gesägt; Dolde fünfspaltig; Aeste dreigabelig, mit gabelspaltigen Aestchen; Drüsen ungetheilt, gelb; Kapsel glatt; Samen wabig-netzig.

Aecker, Gärten, Schutt in Dörfern, an Wegen, Strassenrändern meist häufig. ☉ Juni bis Herbst.

Klagenfurt Js ch., Zwgr., Lavantthal Grf., Hfnr., Gurkthal, Tiffen D. P., Maltathal Khlmr., Malnitz Berr., durch's ganze Möllthal D. P., Oberdrau- und Gitssothal Khlmr., Predil riesig bis $\frac{1}{3}$ m. hoch Jab., Villach D. P.

- 1843. 2. Tithym. platyphyllus Scop.** Flachblättrige Wolfsmilch.
Euph. platyphyllos L. Wulf. p. 497; Koch p. 745; Rchb. ic. fig. 4758; Neilr. p. 844 α vulgaris; Grke. p. 347.

Blätter spitz, in der Mitte ungleich kleingesägt, mit herzförmigem Grunde sitzend, unterste verkehrt-eiförmig; Trugdolde drei- bis fünfspaltig; Hüllchen fast dreieckig, eiförmig, stachelspitzig; Aestchen gabelspaltig; Drüsen gelblich, ganz; Kapsel warzig, Warzen fast halbkugelig; Samen glatt, rundlich.

Aecker, Gräben, Wegränder, in Dörfern. ☉ Juli bis Herbst.

Klagenfurt Kkl., Mantschemühle, Stein, Vietring, Schmelzhütte Wulf., Krumpendorf Kkl., Ebenthaler Strasse, Lavantthal Grf.

Anmerkung. In Kokeil's Herbar befindet sich auch ein nicht ganz explicates Stück von *Tithym. strictus*

Kl. et Grke. ob aus Kärnten, ist nicht ganz sicher. Unterscheidet sich von voriger durch um die Hälfte kleinere Früchte und durch die walzlichen Warzen. Wäre die Provenienz dieser Pflanze in Kärnten zu erforschen.

b. Wurzelstock ausdauernd, wagrecht.

1844. 3. *Tithym. dulcis* Scop. Süsse Wolfsmilch.

Euph. dulcis Jacq. Wulf. p. 498; Koch p. 745; Rchb. ic. fig. 4759 *Euph. solisequa* Rchb.; Neilr. p. 844; Grke. p. 347.

Stengel stielrund, trocken fein gerieft; Blätter lanzettlich, länglich stumpf, nach dem Grunde verschmälert, ganzrandig oder vorn kleingesägt, sehr kurz gestielt; Trugdolde einmal zweispaltig; Hüllen lanzettlich, Hüllchen am Grunde abgeschnitten; Drüsen anfangs grünlich, später schwarzpurpurn; Kapsel warzig, Warzen zerstreut.

Wälder, Vorhölder, Schluchten. 7. Mai bis Juni.

Klagenfurt Wulf., Satnitz Grf., beim Ebenthaler Schlosse Jsch., Rabensteiner Berg und Abhänge der Unterhausschlucht im Lavantthale Grf., Wald zwischen Mödern-
dorf und der Urbanicapelle im Gailthale B. R., Plöcken, Tröpolach, Kühweger-Alm, Bombasch-Graben D. P., Kanalthal Kkl., Heiligengeist vor Bleiberg, Villach Hsr., Kirschen-
theuer Jsch.

1845. 4. *Tithym. angulatus* Kl. et Grke. Kantige Wolfsmilch.

Euphorb. angulata Jacq. Koch p. 746; Rchb. ic. fig. 4762; Neilr. p. 845; Grke. p. 348.

Stengel geschärft-kantig, gerieft; Blätter länglich, oval, fast sitzend, vorn kleingesägt; Hüllen eiförmig, sitzend; Hüllchen fast dreieckig, so breit als lang, kleingesägt; Trugdolde aufrecht, einmal zweispaltig; Drüsen ganz, erst hell, dann sattgelb, zuletzt rostbraun; Kapsel warzig, Warzen zerstreut, stumpf, fast halbkugelig; Same glatt.

Gebirgige, waldige Orte, Abstürze, Schluchten. 7. Mai bis Juni.

Gebüsche unter St. Primus gegen Falkenberg sehr selten J a b., Satnitz Hppe. und S n s. 1802 als *Euph. pilosa*, Grf., Kkl., Zwgr., Rabensteinerberg, Unterhausschlucht im Lavantthale Grf., Weissbriach Khlmr.

1846. 5. *Tithym. pilosus* Scop. Haarigè Wolfsmilch.

Euphorbia carniolica Jacq. Wulf. p. 498; Koch p. 746; Rchb. ic. fig. 4760.

Blätter lanzettlich, länglich stumpf, ganzrandig, nach dem Grunde verschmälert, kurz gestielt; Hüllchen elliptisch,

am Grunde abgerundet, ganzrandig und nebst den Hüllen kurzgestielt; Dolde überhängend; Drüsen gelb; s. w. v.

Sonnige Berglehnen. 4 Mai bis Juni.

Wischberg Schnk., Buchenwälder am Predil Jab.
14. Mai 1880.

c. Wurzelstock ausdauernd, senkrecht.

1847. 6. *Tithym. epithymoides* Jacq. Gelbhüllige Wolfsmilch.

Euph. epithym. L. Wulf. p. 500; Koch p. 547; Rchb. ic. fig. 4764; Neilr. p. 845.

Blätter länglich, sitzend; Hüllchen elliptisch, stumpf, ausgerandet, am Grunde verschmälert oder abgerundet, kurz gestielt, nebst der Hülle ganzrandig; Drüsen gelb; Kapsel warzig, Warzen verlängert fadenförmig.

Rauhe, waldige Hügel. 4 Mai bis Juni.

Satnitz Gntr., Villach Hsr.

1848. 7. *Tithym. verrucosus* Scop. Warzige Wolfsmilch.

Euphorb. verrucosa Lam.; Wulf. p. 499; Koch p. 746; Rchb. ic. fig. 4763 Euph. dulcis L.; Neilr. p. 845; Grke. p. 348.

Blätter länglich-eiförmig, fast sitzend, kleingesägt; Hüllblättchen elliptisch-stumpf, am Grunde verschmälert, kurz gestielt; Drüsen gelblich; Warzen kurz, walzlich.

Trockene Weiden, an Wegen, unter Gesträuch auf Kalkboden. 4 Mai bis Juni.

Raibl Ndrst., Predil Preissm., Tarvis und Arnoldstein Jab., Bleiberg Mar., Föderaun, Faakersee, Rosenthal Kkl., Ortatscha Hsr., Obir Trflnr.

1849. 8. *Tithym. paluster* Kl. et Grk. Sumpf-Wolfsmilch.

Euph. palustris L.; Koch p. 747; Rchb. ic. fig. 4771; Neilr. p. 846; Grke. p. 548.

Blätter lanzettlich, sitzend, ganzrandig oder etwas gezähnt; Hüllchen elliptisch, stumpf, am Grunde verschmälert, sitzend; Aeste der vielspaltigen Dolde dreispaltig und weiter zweispaltig; Drüsen rothgelb, ganz; Kapsel warzig, Warzen länglich, kurz walzig.

Sümpfe, Auen, Ufergebüsche niedriger Gegenden.
4 Mai bis Juni.

Satnitz Welw., am Wörthersee und bei Ebenthal Kkl.

1850. 9. *Tithym. villosus* W. et Kit. Zottige Wolfsmilch.

Euph. villosa A. Kerner Schedae Nr. 866. Euph. procera M. Bieberst.; Wulf. p. 501 Euph. palustris L.; Koch p. 747 Euph. procera M. Bieb.; Rchb. ic. fig. 4770; Neilr. p. 846 Euph. pilosa L. α biocarpa; Grke. p. 348.

Blätter sitzend, länglich-lanzettlich, kleingesägt, gegen den Grund ganzrandig, ober- und unterseits zottig, später kahl werdend; Hüllchen oval, stumpf, hinten abgerundet oder etwas verschmälert; Aeste fünfspaltig, Dolde dreispaltig und noch einmal zweispaltig; Drüsen ganz gelb; Kapsel glatt oder mit kleinen Knötchen bestreut, lang behaart oder kahl.

Waldige, feuchte Plätze, Gebüsche. 7 Juni bis Juli.

Satnitz Jab., Zwgr., Siebenhügel Zwgr., Wörthersee, Ebenthal Kkl., unter Grafenstein Jab., Lavantthal bei St. Ulrich, im Arling-, Pressing- und Weissenbach-Graben Hfnr.

Anmerkung. In Hauser's Herbar lag auch mit dem Standorte Villach *Tithym. Gerardianus* = *Euph. Gerardiana* Jacq. Die Blätter dieser Pflanze sind bläulich-grün, lanzettlich-lineal oder lineal, zugespitzt, stachelspitzig, ganzrandig, kahl; Hüllchen dreieckig-eiförmig, quer breiter, begrannt, stachelspitzig, ganzrandig, kahl, am Grunde abgeschnitten oder herzförmig.

2. Rotte: **Esula Röp.** Drüsen der Blütenhülle halbmondformig oder zweihörnig.

a. Wurzel ausdauernd; Blätter um die Mitte der blühenden Stengel rosettig gehäuft; Samen glatt.

1851. 10. **Tithym. amygdaloides Kl. et Grke.** Mandelblättrige Wolfsmilch.

Euphorb. amygd. L. Wulf. p. 502 *Euph. sylvatica* L.; Koch p. 748; Rchb. ic. fig. 4799; Neilr. p. 848; Grke. p. 348.

Blätter flaumig, verkehrt-eiförmig, länglich, in den Blattstiel verschmälert; Hüllchen in ein flaches Scheibchen zusammengewachsen; Kapsel kahl, fein punktirt, rauh; Drüsen gelblich oder purpurn.

Auen, Vorhölzer, Wälder bis in die Voralpen. 7 April bis Juni.

Satnitz Kkl., Zwgr., Hsr. als *Euph. montana*; Gurnitz D. P., um St. Paul im Lavantthale Grf., Eberstein Js., Ebenberg im Oberdrauthale, Weissbriach Khlmr., Raibler Wälder Zwgr., Bleiberger Strasse, Villacher Bad D. P., in den Karawanken gemein Jab.

1852. 11. **Tithym. Kernerii Huter.** Kerner's Wolfsmilch.

A. Kerner Schedae in Flor. exsicc. austro-hung. Nr. 503.

Sämmtliche Blätter ganzrandig, sitzend, länglich, im obern Drittel etwas breiter, sehr stumpf, einnervig, mit winzigen aufgesetzten Knötchen an der Spitze; Hüllblättchen

rhombisch, rundlich, die der Hüllchen nierenförmig oder quereiförmig, stumpf oder stumpflich; Dolde fünfspaltig aufrecht und nochmals zweispaltig; Drüsen purpurbraun; Kapsel eiförmig, kaum gekörnt.

Wälder auf sandigem Kalkboden und zwischen Felsen.
4. Mai bis Juli.

Raibl hinter dem See auf Kalkschutt J a b. 10. Mai 1880, als *Euphorb. saxatilis* Jacq., ebendort Zwgr., zwischen dem Raiblersee und der Friauler Grenze Preissm., am Fusse des Schinouz bei Leopoldskirchen J a b. Mai 1882, Kathrein-Graben bei Malborgeth D. P. 17. Juli 1883.

b. Wurzel ausdauernd; Blätter am Stengel rosettig gehäuft; Samen glatt.

1853. 12. Tithym. Cyparissias Scop. Zypressen-Wolfsmilch, Krottenkraut, Krottengras.

Euph. Cypariss. L. Wulf. p. 504; Koch p. 749; Rchb. ic. fig. 4793; Neilr. p. 849; Grke. p. 349.

Blätter schmal lineal, ganzrandig, kahl; Hüllblättchen rautenförmig, ganzrandig; Kapsel fein punktiert, rau; Drüsen wachsgelb.

Sehr gemein durch ganz Kärnten auf Weiden, Rainen, Wegrändern. 4. April bis Herbst.

Klagenfurt Wulf., Satnitz Drchnr., Kreuzbergl, Zollfeld, Gurnitz, Mieger Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Gurkthal, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Malnitz Berr., durch's ganze Möllthal D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Gailthal D. P., Kanalthal Rssmn., Raibl Zwgr., Bleiberg Mar., Villach D. P.

1854. 13. Tithym. Esula Scop. Gemeine Wolfsmilch.

Euph. Esula L. Wulf. p. 505; Koch p. 749; Rchb. ic. fig. 4791; Neilr. p. 850; Grke. p. 349.

Blätter lanzettlich-lineal, nach dem Grunde verschmälert; am Rande nach der Spitze zu etwas rau; s. w. v.

Zwischen Getreide, an Wegen, Weiden, Dämmen, bei Gebüsch, jedoch nur stellenweise auftretend. 4. Juni bis Juli.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., auf einem Felde bei Ausserfragaut im Möllthale sehr sparsam D. P.

c. Wurzel einjährig; Blätter am Stengel nicht rosettig gehäuft; Samen verschiedenartig ausgestochen.

1855. 14. Tithym. Peplus Gaertn. Garten-Wolfsmilch.

Euph. Peplus L. Wulf. p. 509; Koch p. 752; Rchb. ic. fig. 4773; Neilr. p. 851; Grke. p. 350.

Blätter gestielt, verkehrt-eiförmig, sehr stumpf; Hüllblättchen eiförmig; Kapsel am Rücken mit zwei schwach geflügelten Kielen; Aeste der dreispaltigen Trugdolde wiederholt zweispaltig; Drüsen gelblich.

Auf bebautem Boden, in Gärten, bei Zäunen, Mauern.
 ☉ Juli bis Herbst.

Klagenfurt J s c h., K k l., Wolfsberg oft häufig H f n r.

1856. 15. Tithym. falcatus Kl. et Garke. Sichelförmige Wolfsmilch.

Euph. falcata L. Koch p. 752; Wulf. p. 509; Rchb. ic. fig. 4776; Neilr. p. 852; Grke. p. 850.

Blätter lanzettlich, am Grunde verschmälert, spitz oder zugespitzt, untere spatelförmig; Hüllblättchen eiförmig oder elliptisch, stachelspitzig; Kapseln glatt; Drüsen gelb.

Unter Getreide und auf Stoppelfeldern. ☉ Juli bis Herbst.

Velden Br n b c h r., Malnitz B e r r., wohl nur mit Getreide eingeschleppt und wieder verschwunden D. P., Wischberg? M r c h s.

1857. 16. Tithym. exiguus Mnch. Kleine Wolfsmilch.

Euph. exigua L. Wulf. p. 510; Koch p. 752; Rchb. ic. fig. 4777; Neilr. p. 852; Grke. p. 350.

Blätter linealisch; Hüllblättchen aus herzförmigem Grunde lineal spitz; s. w. v.

Auf Stoppelfeldern, Brachen. ☉ Juli bis Herbst.

Bei Velden mit voriger vermischt Br n b c h r.

104. Familie: ***Acalyphaceae Kl. et Grke.*** Brennkräutgewächse.

(Tabell. Uebers. 40. Fam.)

DL. Mercurialis L. Binglekraut.

(XXII. 7. n. 597.)

1858. 1. Merc. perennis L. Ausdauerndes Binglekraut.

Koch p. 753; Rchb. ic. fig. 4804; Neilr. p. 853; Grke. p. 350.

Stengel ganz einfach; Blätter eiförmig, länglich; weibliche Blüten lang gestielt.

Wälder, Vorhölzer, feuchte Haine, Gebüsche in Wiesen.
 4 April bis Juni.

Satnitz J s c h., Ebenthal H s r., Gurnitz D. P., Umgebung von St. Paul G r f., Lattenberg bei Wolfsberg H f n r., Pfaffen-

berg bei Obervellach bei 1200 m., Flattach D. P., Gasloch und Amlacher-Alm im Oberdrauthale, Weissbriach Khlmr., Schattseite bei Watschig im Gailthale D. P., Raibl Zwgr., Bleiberg Mar.

1859. 2. Merc. ovata Strm. et Hoppe. Eiblättriges Binglekraut.
Koch p. 753; Rchb. ic. fig. 4803; Neilr. p. 853.

Blätter eiförmig, sehr kurz gestielt, fast sitzend; s. w. v. Buschige Stellen in lichten Wäldern der Bergregion.

4. Mai.

Kärnten Koch, Satnitz Hsr.

1860. 3. Merc. annua L. Jähriges Binglekraut.
Koch p. 753; Rchb. ic. fig. 4801; Neilr. p. 853; Grke. p. 350.

Stengel ästig; Blätter gestielt, eilanzettlich oder eiförmig; weibliche Blüten fast sitzend.

An wüsten Plätzen, Wegen, Rainen. ☉ Juni bis Herbst.

Klagenfurt Kkl., Js ch., Glangasse Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Villach Hsr.

105. Familie: *Buxaceae Kl. et Grke.* Buchs-
Gewächse.

(Tabell. Uebers. 39. Fam.)

DLI. *Buxus Tournef.* Buchsbaum.

(XXI. 4. n. 571.)

1861. 1. Bux. sempervirens L. Gemeiner Buchsbaum.
Koch p. 743; Neilr. p. 854; Grke. p. 353; Rchb. ic. fig. 4808.

Blätter lederartig, eiförmig; Blattstiele gewimpert; Staubbeutel pfeilförmig; Blume gelblich weiss.

In Gartenanlagen als Gebüschgruppen oder als Einfassung.

4. Mai.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., im Propsteigarten in Friesach als 3 m. hoher Baum D. P., Villach Hsr.

106. Familie: *Juglandae D. C.* Wallnussgewächse.
(Tabell. Uebers. 24. Fam.)

DLII. *Juglans L.* Wallnuss.

(XXI. 5. n. 579.)

1862. 1. Jugl. regia L. Gemeine Wallnuss, Nussbaum.
Koch p. 757; Neilr. p. 854; Grke. p. 353.

Blätter unpaarig gefiedert mit sieben bis neun ovalen, etwas gesägten Blättern; Blüten einhäusig, grün; Früchte kugelig.

Stammt aus Asien. Angepflanzt und verwildert an trockenen Berglehnen. † Mai.

Klagenfurt J s c h., Wolfsberg H f n r., Gurkthal noch am Zammelsberg, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal K h l m r., Möllthal bis Sagritz 1200 m. D. P., Berg und Weissbriach K h l m r., Lesachthal um 100 m. höher hinauf wachsend als der Mais J a b., häufig im Untergailthale D. P.

107. Familie: *Terebinthaceae* D. C. Terebinthen-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 93. Fam.)

DLIII. *Rhus* Tournef. Sumach.

(V. 3. n. 205a.)

1863. 1. Rh. *Cotinus* L. Perücken-Sumach, Perückenbaum.
Wulf. p. 400; Koch p. 174; Neilr. p. 855; Grke. p. 90.

Blätter einfach, verkehrt-eiförmig bis kreisrund; Blüten in vielästiger Rispe, zweigeschlechtig; Blume weissgrünlich.

Hie und da in Gärten. † Mai.

Klagenfurt G r f., St. Georgen am Längsee R s s m n.

1864. 2. Rh. *Toxicodendron* L. Wurzelnder Sumach, Giftbaum.
Koch p. 174; Grke. p. 90.

Blätter dreifach zusammengesetzt, sehr lang gestielt, Blättchen ei- oder herzförmig, ganzrandig oder mit wenigen grossen Zähnen am äussern Rande, untere Fläche sparsam behaart, die traubige Rispe blattwinkelständig; Blüte zweigeschlechtig; Blume klein, grün.

Stammt aus Nordamerika und ist hie und da in Gärten angepflanzt. † Juni.

Klagenfurt G r f.

1865. 3. Rh. *typhinum* L. Hirschkolben-Sumach, Essigbaum.
Neilr. p. 855; Grke. p. 90.

Blätter acht- bis zehnpaarig gefiedert, Fiederblätter lanzettlich zugespitzt, gesägt, unterseits fein behaart, Zweige wollig; Blume grünlich-gelb; Frucht roth.

Stammt aus Nordamerika und ist unter den Sumacharten am häufigsten angepflanzt. † Juni bis Juli.

Klagenfurt K k l., Feldkirchen D. P.

108. Familie: *Zanthoxyleae Kunth.* Zahnwehholz-
Gewächse.

(Tabell. Uebers. 106 b. Fam.)

DLIV. Ailanthus Desf. Götterbaum.

(V. 3. n. 205 b.)

- 1866. 1. Ail. glandulosa Desf.** Drüsentragender Götterbaum.
Dietrich, Synops. plant. Tom. II., p. 1001; Deutschlands Wälder und Haine von Franz Schulz p. 37;
Neilr. p. 855.

Blätter unpaarig gefiedert (12—30 Paare), Fiederblätter eirund oder lanzettlich, am Grunde mit einem Zahne; Blüten in endständiger Rispe, grüngelb, zwei- oder eingeschlechtlich; Frucht wallnussähnlich.

Als Alleebaum hie und da angepflanzt. Stammt aus China. † Juni bis Juli.

Klagenfurt.

109. Familie: *Rutaceae Juss.* Rautengewächse.

Fünf, acht bis zehn Staubgefäße, der unterliegenden nicht an den Kelch angewachsenen Scheibe eingefügt; Kronblätter fünf oder vier; Blätter nebenblattlos.

DLXV. Ruta Tournef. Raute.

(VIII. 1.)

Kelch vier- bis fünftheilig, bleibend; Kronblättchen vier, bei der endständigen Blüte fünf, benagelt; Staubgefäße acht, bei der Endblüte zehn; Kapsel vier- bis fünffächerig, vielsamig.

- 1867. 1. Rut. graveolens L.** Gemeine Raute.
Koch p. 168; Rchb. ic. fig. 4814; Neilr. p. 856;
Grke. p. 88.

Blätter doppelt oder fast dreifach gefiedert, im Umriss dreieckig mit verkehrt-eiförmigen Blättchen; Kronblättchen ganzrandig oder wenig gezähnt, plötzlich in den Nagel zusammengezogen, gelb.

In Gärten hie und da, auch halb verwildert. † Juli bis August.

Wolfsberg verwildert im Scherl'schen Weingarten Scherl, Berg im Oberdrauthale Khlmr.

110. Familie: *Geraniaceae* D. C. Kranichschnabel-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 97. Fam.)

DLVI. *Geranium* L. Storchschnabel.

(XVI. 2. n. 432.)

1. Rotte: *Batrachia* Koch. Wurzelstock knotig, dick, schief oder wagrecht, lang- und starkfaserig, zuletzt mehrköpfig; Kelchblättchen während der Blüte abstehend; Kronblättchen gross, Saum viel länger als der Nagel.

1868. 1. *Geran. macrorrhizum* L. Grosswurzlicher Storchschnabel.

Wulf. p. 634; Koch p. 160; Rchb. ic. fig. 4886; Grke. p. 83 Bot. Reisen tab. IX.

Blätter handförmig, siebenspaltig; Kronblättchen langbenagelt, spatelig, blutroth; Staubfäden abwärts gebogen; Klappen kahl, querrunzlig.

Felsige Plätze in Gebirgen auf Kalk. 7. Juli bis August.

Kärnten *Dodonaeus*; auf Kohlenkalk in der Plöcken B. R., Str., Zwgr., Preissm. fand allda auch weissblühende Stöcke, Wischberg bei Raibl Mrchs., Schnk., Tarviser Strasse gegen Saifnitz Schnk.?

1869. 2. *Geran. phaeum* L. Braunblühender Storchschnabel.

Koch p. 160; Rchb. ic. fig. 4891; Neilr. p. 858; Grke. p. 84.

Kronblättchen flach, rundlich-verkehrt-eiförmig, kurz benagelt, rothbraun oder schwarzviolett, etwas länger als der stachelspitzige Kelch; Klappen behaart, vorn querfaltig; s. w. v.

β. lividum. Blüten schmutzig-lila, oft mit einem schmutziggelb-violetten Flecken am Grunde der Platte.

Wiesen, Vorwälder bei Gebüsch bis in die Voralpen. 7. Mai bis Juli.

Pörschach am See Jab., Satnitz Drchnr., Zwgr., Lavanththal um St. Paul Grf., Wolfsberg Hfnr., Lölling, Osterwitz, Tiffen D. P., Kanning Khlmr., Obervellach selten D. P., bei Bruggen im Oberdrauthale Khlmr., im Walde ob Mauthen Vlp., Malborgeth Rssmn., Raibl Ndrst., Tarvis Schnk., Arnoldstein B. R., Bleiberg Mar., ob Heiligengeist vor Bleiberg Hsr., Hollenburg Kkl., Karawanken Jab., Loibl Kkl., Hsr., Weidisch Zwgr.

β. Plöcken Preissm.

1870. 3. *Geran. pratense* L. Wiesen-Storchschnabel.

Koch p. 161; Rchb. ic. fig. 4883; Neilr. p. 858;
Grke. p. 84.

Stengel oben drüsig behaart; Blütenstielchen zweiblütig, drüsig-zottig, nach dem Verblühen herabgeschlagen, zur Fruchtreife oft wieder aufrecht; Kronblättchen breit, verkehrt-eiförmig, über dem Nagel kahl und nur am Rande bärtig-gewimpert, blau; Staubfäden am Grunde kreisförmig erweitert; Klappen und Schnäbel mit wagrecht abstehenden Drüsenhaaren besetzt; Samen sehr fein punktirt.

Wiesen, Grasplätze, feuchte Gebüsch. 4 Juni bis August.

Klagenfurt bei der Zigguln Js ch., Wolfsberg Hfnr., Friesach, Feldkirchen und Bodensdorf beim Ossiachersee D. P., Kanning, Katschthal Jab., Maltathal Khlmr., Obervellach D. P., Pasterze B. R., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Lesachthal Jab., Kanalthal Rssmn., oberer Malborgether-Graben Jab., Föderaun D. P.

1871. 4. *Geran. sylvaticum* L. Wald - Storchschnabel, Blutwurz.

Koch p. 161; Rchb. ic. fig. 4882; Neilr. p. 859;
Grke. p. 84.

Blütenstielchen nach dem Verblühen aufrecht; Kronblättchen verkehrt-eiförmig, über dem Nagel und am Rande bärtig, violett in's röthliche spielend; Staubfäden lanzettlich; s. w. v.

Bergwiesen, Wälder, im Gerölle auf Alpen. 4 Juni bis August.

Satnitz Zwgr., Umgebung von St. Paul Grf., Kor- und Saualm Hfnr., Flatnitz D. P., Grillendorfer Alpe im Gaisekthale sehr üppig Fürstenw., Haidnerhöhe Krnbrgr., Kanning und Maltathal Khlmr., Malnitz Hkl., durch's Möllthal nicht selten D. P., Feistritz bei Berg, Weissbriach Khlmr., Mussen D. P., Lesachthal Jab., Tröpolach, Eggforst im Gailthale D. P., Kühweger-Alm B. R., Kanalthal Rssmn., Saifnitz, Tarvis Schnk., Raibl Ndrst., Bleiberg Mar., Dobratsch Hsr., Stougruppe Jab., Ortatscha, Seleniza, Loibl Kkl., Hsr.

1872. 5. *Geran. palustre* L. Sumpf-Storchschnabel.

Wulf. p. 634; Koch p. 161; Rchb. ic. fig. 4892; Neilr. p. 859; Grke. p. 84.

Stengel ausgebreitet, oberwärts nebst den nach dem Verblühen niedergebogenen Blütenstielchen mit rückwärts gekehrten, drüsenlosen Haaren besetzt; Kronblättchen purpurroth; Klappen mit abstehenden drüsenlosen Haaren; Schnabel fast kahl; Samen fein längsstreifig.

Sumpfige Wiesen, feuchte, schattige Weiden, Vorwälder.
 4 Juni bis August.

Klagenfurt an der Glan Kkl., Satnitz Grf., Drechnr.,
 um St. Paul im Lavantthale, Unterhaus, Gleinitz Grf.,
 Wolfsberg Hfnr., St. Georgen am Längsee Wulf., Tiffen,
 Obervellach D. P., Oberberg Khlmr., Saifnitz, Tarvis
 S c h n k.

1873. 6. *Geran. sanguineum* L. Blutrother Storchschnabel.

Koch p. 162; Rchb. ic. fig. 4894; Neilr. p. 859;
 Grke. p. 85.

Stengel ausgebreitet, nebst den nach dem Verblühen
 etwas abwärts geneigten, einblütigen Blütenstielchen mit
 langen, wagrecht abstehenden Haaren besetzt; Blätter tief
 siebentheilig, mit dreispaltigen Zipfeln und linealischen
 Zipfelchen; Kronblättchen blutroth, verkehrt-eiförmig, aus-
 gerandet; Klappen zerstreut drüsig behaart; Samen sehr fein
 punktirt.

Sonnige, rauhe Lehnen, auf Bergen. 4 Mai bis Herbst.

Satnitz Kkl., Grf., Zwgr., Südseite der Rabensteiner
 Felsen bei St. Paul Grf., Wolfsberg Hfnr., bei Ober-
 vellach D. P., Ameisbüchl im Oberdrauthale Khlmr.,
 Raibl Mrchs., Rosenthal, bei Unterbergen J a b.

2. Rotte: ***Columbina Fries.*** Wurzel spindelig, senk-
 recht, einfach; Kelchblättchen während der
 Blütezeit abstehend; Kronblättchen klein, Saum
 viel länger als der Nagel.

α. Kronblättchen tief ausgerandet oder kurz
 zweispaltig; Samen glatt; Blätter (untere) hand-
 förmig gelappt oder gespalten, mit wenig aus-
 einanderfahrenden, stumpfen, vorn grob ge-
 zähnten Zipfeln.

1874. 7. *Geran. pyrenaicum* L. Pyrenäischer Storchschnabel.

Koch p. 162; Rchb. ic. fig. 4881; Neilr. p. 860;
 Grke. p. 84.

Stengel aufrecht, weichhaarig, zottig; Blütenstielchen
 feindrüsig, weichhaarig, nach dem Verblühen abwärts geneigt;
 Kronblättchen verkehrt-eiförmig, zweispaltig, oberhalb des
 Nagels beiderseits dichtbärtig, purpurviolett; Klappen an-
 gedrückt weichhaarig, drüsenlos.

In schattigen Gebüsch auf Waldwiesen. 4 Juni bis
 Herbst.

Wolfsberg Hfnr., Plöcken? und Petzen? H b r. 1864.

1875. 8. Geran. molle L. Weicher Storchnabel.

Koch p. 164; Rchb. ic. fig. 4879; Neilr. p. 860;
Grke. p. 86.

Stengel ausgebreitet, von kurzen Haaren weich und von längeren zugleich zottig; Kronblättchen verkehrt-herzförmig, am Grunde fein gewimpert, purpurroth; Klappen querrunzlig, kahl; Samen glatt.

An Weg- und Ackerrändern, in Gärten. ☉ Juli bis Herbst.

Gemein bei Wolfsberg Hfnr.

1876. 9. Geran. pusillum L. Kleiner Storchnabel, Bruchkraut.

Koch p. 163; Rchb. ic. fig. 4877; Neilr. p. 860;
Grke. p. 85.

Stengel ausgebreitet, mit kurzen Drüsenhaaren; Blütenstielchen nach dem Verblühen abwärts geneigt; Kronblättchen länglich, verkehrt-herzförmig, blaviolett oder bläulichroth; Klappen angedrückt, weichhaarig.

Gemein auf Schutthaufen, an Wegen, Zäunen, in Aeckern, Gärten. ☉ Juli bis Herbst.

Klagenfurt Hsr., Grf., Wolfsberg Hfnr., Görtschitzthal, Tiffen, Obervellach D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Tröpolach, Villach D. P.

β. Kronblättchen abgerundet oder abgestutzt; nicht ausgerandet; Samen bienenzellig punktirt,
s. w. v.

1877. 10. Geran. rotundifolium L. Rundblättriger Storchnabel.

Koch p. 163; Rchb. ic. fig. 4878; Neilr. p. 861;
Grke. p. 86.

Stengel ausgebreitet, weichhaarig; Kronblättchen länglich keilförmig, ungetheilt, über dem Nagel kahl, fleischroth; Klappen abgehend weichhaarig.

Aecker, Gärten, Schutthaufen. ☉ Juni bis Herbst.

Klagenfurt Js ch., Bleiberg Mar.

γ. Blätter fast bis an den Grund handförmig getheilt mit auseinander fahrenden, in schmale lineale Zipfel getheilten Abschnitten; Kronblättchen tief ausgerandet; Samen w. b. v.

1878. 11. Geran. dissectum L. Geschlitzblättriger Storchnabel.

Koch p. 163; Rchb. ic. fig. 4876; Neilr. p. 861;
Grke. p. 85.

Stengel ausgebreitet, kurz behaart; Kronblättchen verkehrt-herzförmig, über dem Nagel bärtig, purpurroth; Klappen und Schnabel abstechend drüsenhaarig.

Gärten, Aecker und Saaten, Raine. ☉ Mai bis Juli.

Klagenfurt Kkl., Zwgr., Schmelzhütte Grf., Maltathal und Weissbriach Khlmr.

1879. 12. Geran. columbinum L. Feintheiliger Storchschnabel.

Koch p. 163; Rchb. ic. fig. 4875; Neilr. p. 861;

Grke. p. 86.

Stengel ausgebreitet, nebst den Blütenstielchen mit kurzen, abwärts angedrückten Haaren sparsam besetzt; Kronblättchen verkehrt-herzförmig, am Grunde bärtig, rosenroth; Klappen kahl, Schnabel mit sehr kurzen vorwärts gerichteten, drüsenlosen Haaren.

Steinige Plätze, Hügel, bei Gebüsch. ☉ Juli bis September.

Klagenfurt Kkl., Tiffen, Obervellach D. P., Berg Khlmr.

3. Rotte: **Robertsia Gren. et Godr.** Wurzel spindelig, senkrecht, einfach; Kelchblättchen schon während der Blüte aufrecht zusammenschliessend; Kronblättchen klein, Saum höchstens so lang als der Nagel.

1880. 13. Geran. Robertianum L. Stinkender Storchschnabel, Krepelkraut, Warzenkraut, Rothlaufkraut.

Koch p. 164; Rchb. ic. fig. 4871; Neilr. p. 862;

Grke. p. 86.

Stengel blutroth, aufrecht, abstechend behaart; Kronblättchen verkehrt-eiförmig, ungetheilt, länger als der Kelch, rosenroth mit drei weisslichen Streifen; Klappen netzrunzlig; Samen glatt.

Feuchte Gebüsch, Mauern, Felsen. ☉ Juni bis Herbst.

Klagenfurt Hsr., Satnitz Kkl., Gurnitzgrotte Drchnr., Mieger Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Görttschitzthal, Gurkthal D. P., Kребenzen B. R., Tiffen, Gmünd D. P., Maltathal Khlmr., durch's ganze Möllthal D. P., Gries bei Greifenburg, Weissbriach Khlmr., Gailthal D. P., Raibl Zwgr., Bleiberg Mar., Karawankenthäler Jab.

DLVII. *Erodium L' Herit.* Reiherschnabel.

(XVI. 2. n. 431.)

1881. 1. Erod. cicutarium L' Herit. Schierlingsblättriger Reiherschnabel.

Wulf. p. 635 *Geranium cicutarium L.*; Koch p. 165;

Rchb. ic. fig. 4864; Neilr. p. 862; Grke. p. 87.

Stengel niederliegend, rauhaarig; Blätter gefiedert; Blättchen sitzend, tief eingeschnitten fiederspaltig; Blütenstiele vielblütig; Krone purpurroth; die drei fruchtbaren Staubfäden am Grunde verbreitert, ohne Zähnen.

Aecker, Raine, Sandfelder. ☉ März bis Herbst.

Klagenfurt Wulf., Kkl., Lavantthal am Langen- und Josefsberge Grf., Wolfsberg Hfnr., Gurkthal, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Möllthal D. P., Oberdrauthal, Gitschthal Khlmr., Gailthal D. P., Raibl Mrchs., Villach D. P.

1882. 2. Erod. moschatum L' Herit. Bisamduftender Reiher-schnabel.

Koch p. 165; Rchb. ic. fig. 4867; Grke. p. 87.

Stengel aufsteigend; Blättchen kurz gestielt, ungleich doppelt-gesägt; Blume purpurroth; fruchtbare Staubfäden zwei-zählig; s. w. w.

Aecker, Wege. ☉ Juni bis Juli.

Bei Villach an der Bleiberger Strasse Kkl.

1883. 3. Erod. malacoides Willd. Herzblättriger Reiher-schnabel.

Wulf. p. 636 Geran. malacoides L.; Koch p. 165;

Rchb. ic. fig. 4868.

Blätter herzförmig, stumpf gezähnt; Blatt- und Blütenstiele drüsig-flaumig; Kronblättchen dreinervig, lila; Staubgefäße sämmtlich lanzettlich.

In Gärten. ☉ Juli.

Villach Grf.

111. Familie: *Lineae De C.* Leingewächse.

(Tabell. Uebers. 99. Fam.)

DLVIII. *Linum L.* Lein.

(V. 5. n. 209.)

1. Rotte: *Cathartolinum* Rchb. Blätter gegenständig, am Grunde drüsenlos; Blume weiss.

1884. 1. Lin. catharticum L. Purgir-Lein.

Wulf. p. 412; Koch p. 149; Rchb. ic. fig. 5153; Neilr. p. 863; Grke. p. 77.

Stengel fadenförmig, oberwärts gabelästig; Kelchblättchen elliptisch, zugespitzt, schwach drüsig gewimpert.

Wiesen, Grasplätze bis in die Alpen, stellenweise sehr häufig. ☉ Juni bis August.

Klagenfurt Kkl., Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Tiffen, Katschthal D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Malnitz Berr.,

Möllthal sehr häufig bis in die Alpen D. P., Berg und Ebenberg im Oberdrauthale, Weissbriach Khlmr., Gailthal sowohl im Thale als auf Alpen, z. B. Mussen, Tröpolacher-Alm, Hochwipfel D. P., Kanalthal Rssmn., Luschariberg Kempf, Raibl Zwgr., Predil Preissmn., Bleiberg Mar.

2. Rotte: **Eulinum Griseb.** Blätter wechselständig, am Grunde drüsenlos; Blumen blau, lila oder rosafärbig.

1885. 2. Lin. tenuifolium L. Dünablättriger Lein.

Wulf. p. 410; Koch p. 147; Rchb. ic. fig. 5165; Neilr. p. 864; Grke. p. 76.

Blätter schmal-lineal, am Rande wimperig rauh; Kelchblättchen elliptisch, pfriemlich, drüsig gewimpert, wenig länger als die Kapsel; Blume hellröthlich.

Trockene, steinige Hügel, Berge auf Kalk. ☿ Juni bis Juli.

Südseite des Kasbauersteines und Langenberges im Lavantthale Grf., St. Georgen am Längsee Herb. carinth., Pontebana-Graben Preissmn., Kanalthal Rssmn., Jab., Eberndorf Grf., Kappel und Rechberg Wulf.

1886. 3. Lin. usitatissimum L. Gemeiner Lein, Flachs, Haar.

Wulf. p. 411; Koch p. 148; Rchb. ic. fig. 5155; Neilr. p. 864; Grke. p. 77.

Blätter schmal-lineal, unbewimpert; Stengel einzeln; Kelchblättchen eiförmig-zugespitzt, fein gewimpert, fast so lang als die Kapsel; Blume blau.

Angebaut bis zur höchsten Culturgrenze. ☉ Juni bis August.

Klagenfurt Wulf., Kkl., Wolfsberg Hfnr., Gurkthal bis Lorenzen in der Reichenau D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Katschthal, Malnitz, Möllthal ob Sagritz noch bei 1600 m., Heiligenblut D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Lesachthal Jab., Gailthal D. P., Bleiberg Mar., im Grossen angebaut im Unterdrauthale und bei Feldkirchen D. P.

Anmerkung. Zu Wulfen's Zeiten wurde laut dessen Angabe im Himmelberger Grund und in der Gnesau cultivirt *Linum perenne L.*, ausdauernder Lein. Seine Stengel sind zahlreich; Kelchblättchen unbewimpert und zweimal kürzer als die eiförmige Kapsel; Blume hellblau. Liebt sonnige Hügel und trockene Bergwiesen.

1887. 4. Lin. austriacum L. Oesterreichischer Lein.

Wulf. p. 412; Koch p. 149; Rchb. ic. fig. 5156 *Adenolinum austriacum*; Neilr. p. 865 *L. austr. α pratense*; Grke. p. 77.

Stengel zahlreich; Kelchblättchen kahl, kürzer als die Kapsel; innere sehr stumpf; abgeblühte Blütenstielchen bogig herabhängend; Blume azurblau.

Sonnige Hügel, Haiden. 4 Mai bis Juni.

Im Aufstiege auf die Alpe Trögel (Trog) bei Pontafel Wulf., Wischberg bei Raibl Schnk., am Fusse der Obir und zwischen Rechberg und Kappel Wulf.

1888. 5. Lin. alpinum Jacq. Alpen-Lein.

Wulf. p. 411; Koch p. 148 α genuinum; Rchb. ic. fig. 5160 Adenolinum alp.; Neir. p. 865 L. austr. β . alpinum; L. laeve Scop.

Mehrstengelig, Blätter lineal-lanzettlich, kahl; Kelchblättchen am Rande drüsenlos, kahl, innere sehr stumpf; Kronblättchen dunkelblau, von der Mitte an auseinander-tretend, Nagel länglich-dreieckig; Kapsel oval, um ein Drittel länger als der Kelch; Blüten- und Fruchtstielchen aufrecht.

Trockene Felsstellen auf Kalkalpen. 4 Juli bis August.

Reisskofel Khlmr., Reppspitz bei Tröpolach D. P., Watschiger- und Kühweger-Alm Wulf., B. R., Hppe. 1802, Mittagskofel bei Malborgeth Rssmn., Raibl auf der Fischbach-Alm Ndrst., Dobratsch ob Heiligengeist, Mittagskofel (Kum) bei Rosegg Hsr., Kotschna Herb. carinth., Ortatscha Kkl., Seleniza Hsr., Bahauzwiesen Grf., Obir bei den Bleigruben auf der höchsten Höhe Wulf., Presteralische, Vellacher Kotschna Grf., unter dem Gipfel der Petzen Weld., Oistriza und Rinka Weiss.

Anmerkung. *Linum montanum* Schleicher ist wohl eine üppigere Form des *L. alpinum*, wie solche die Predilwiesen Jab. bieten. Koch sagt von dieser Pflanze: Stengel schuhhoch oder noch höher, aufstrebend oder aufrecht und von *L. alpinum*: Stengel fingerlang bis halbfusshoch, oft niederliegend.

1889. 6. Lin. hirsutum L. Rauhhaariger Lein.

Wulf. p. 409; Koch p. 147; Rchb. ic. fig. 5166; Neir. p. 865.

Stengel filzig-zottig; Blätter eilanzettförmig oder lanzettlich, fünfnervig und nebst dem Kelch zottig, letzterer nebst den Deckblättchen drüsig-gewimpert, Kelchblättchen lanzettlich, zugespitzt, länger als die Kapsel; Blume lila, am Grunde weisslich.

Trockene Wiesen, Raine, Hügel. 4 Juni bis August.

Südseite des Langenberges im Lavantthale Grf., Raibl Ndrst., Finkenstein Js ch., Karawanken Jab., Loiblwiesen und Obir Kkl., bei Maria Rain Kkl., Jaunthal Js ch., Eberndorf Grf.

1890. 7. Lin. viscosum L. Klebriger Lein.

Wulf. p. 410; Koch p. 147; Rchb. ic. fig. 5167; Neilr. p. 866.

Stengel von weitabstehenden Haaren zottig; Blätter lanzettlich, drei- bis fünfnervig, zottig, die oberen, die Deckblättchen und der Kelch drüsig gewimpert, fast kahl; Blume hellrosenroth mit violetten Adern; s. w. v.

Auf trockenen Wiesen, Rainen, Hügeln. 4 Juni bis Juli.

Satnitz gegen Maria Rain Kkl., Grf., Ostabhang des Stiftkogels Zwgr., Ebenthaler Wasserfall und Predigtstuhl Welw., Thalenstein Wulf., St. Georgen am Längsee Herb. carinth., Weissbriach Khlmr., Plöcken Preissmn., Oels bei Hermagor und Förolach D. P., Str., Kanalthal Rssmn., Bichl bei Tarvis Schnk., Bleiberg Sonnseite Mar., Zwgr., Jab., Villach Wulf., Karawanken Jab., bei Unterbergen die Wiesen ganz roth Zwgr., Loibl Kkl., Waidisch und Zell Drchnr., Petzen na luscha Krstf.

3. Rotte: **Xantholinum Rchb.** Blätter wechselständig, am Grunde an der Anheftungsstelle nach Art der Nebenblätter beiderseits mit einer kleinen Drüse besetzt; Blumen gelb.

1891. 8. Lin. flavum L. Gelber Lein.

Wulf. p. 409; Koch p. 147; Rchb. ic. fig. 5175
Xantholinum flav.; Neilr. p. 866; Grke. p. 76.

Stengel oberwärts scharfkantig; Blätter kahl; Kelchblättchen lanzettlich, zugespitzt, länger als die Kapsel, am Rande drüsig gewimpert.

Bergwiesen, trockene Hügel. 4 Mai bis August.

Satnitz Wulf., Hppe., Schmelzhütte, Predigtstuhl Jsch., Zwanzgerberg Drchnr., St. Jakob unter Klagenfurt Zwgr., Rabensteinerberg, Unterhausschlucht Grf., Reissberg im Lavantthale Klotz, Hollenburg Hsr., Maria Rain Kkl., Unterbergen Jab.

Anmerkung. *Linum gallicum L.* kömmt auf der Tröpolacher-Alm nicht vor, Wulfen täuschte sich wirklich.

112. Familie: ***Oxalideae De C.*** Sauerkleegewächse.
(Tabell. Uebers. 98. Fam.)

DLIX. Oxalis L. Sauerklee.

(X. 5. n. 292.)

1892. 1. Ox. Acetosella L. Gemeiner Sauerklee, Hasenklee, Guggubrod.

Koch p. 167; Rchb. ic. fig. 4898; Neilr. p. 867; Grke. p. 87.

Wurzelstock kriechend, gezähnt; Stengel fehlt; Blätter dreizählig mit verkehrt-herzförmigen Blättchen; Blütenstiele einblütig, länger als die Blätter, über der Mitte mit zwei Deckblättchen; Blume weiss oder röthlich-weiss mit purpurrothen Adern und einem gelben Flecken am Grunde.

Sehr gemein in feuchten Wäldern, an bemoosten Felsen, bis in die Alpen. ☿ April bis Juni.

Kreuzbergl Zwgr., Satnitz Kkl., bei der Annabrücke fol. aureo-reticulatis Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Tiffen, Gurkthal D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Leoben, Katschthal, Möllthal D. P., Malnitz Berr., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Gailthal D. P., Bleiberg Mar., Loiblthal Zwgr.

1893. 2. Ox. stricta L. Steifer Sauerklee.

Koch p. 167; Rchb. ic. fig. 4895; Neilr. p. 867; Grke. p. 88.

Wurzelstock Ausläufer treibend; Stengel einzeln, aufrecht; Blätter dreizählig, Blättchen verkehrt-herzförmig; Blattstielchen ohne Nebenblättchen; Blütenstielchen zwei- bis fünfblütig; Blume gelb.

Auf bebautem Boden, in Gärten als Unkraut, auf Schutt. ☉, Ausläufer ☉ Juni bis Herbst.

Klagenfurt Kreuzbergl-Anlagen sehr häufig Zwgr., Priesterhaus-Garten, Friesach D. P., Eberstein Js., Bleiberg Mar.

1894. 3. Ox. corniculata L. Gehörnter Sauerklee.

Koch p. 167; Rchb. ic. fig. 4896; Neilr. p. 867; Grke. p. 88.

β mit dunkelrothen Blättern. Ox. tropaeoloides Hort.

Wurzel faserig ohne Ausläufer; Stengel mehrere, ausgebreitet wurzelnd; Blattstiele am Grunde mit zwei kleinen angewachsenen Nebenblättchen besetzt, s. w. v. Pflanze manchmal dunkelpurpurn.

In Gärten als Unkraut, auf Schutt. ☉ Juli bis Herbst.

Klagenfurt Zwgr., Obervellach im Pfarrhofgarten D. P.

β. Als Teppichpflanze verwendet und nicht mehr auszurotten.

113. Familie: *Balsamineae* **A. Rich.** Balsaminen-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 89. Fam.)

DLX. Impatiens L. Springkraut.

(V. 1. n. 142.)

1895. 1. Imp. nolitangere L. Empfindliches Springkraut, Rührmichnichtan.

Koch p. 166; Rchb. ic. fig. 4483; Neilr. p. 868; Grke. p. 87.

Stengel an den Gelenken angeschwollen; Blätter eiförmig, grob gezähnt; Blütenstielchen drei- bis vierblütig, kürzer als das Blatt; Blüten hängend, citrongelb, inwendig roth punktirt; Sporn an der Spitze zurückgebogen.

In Gebirgsgräben bis in die Voralpen. ☉ Juli bis September.

Satnitz Kkl., Lavantufer um St. Paul Grf., Twimberger Graben Hfnr., Lölling sehr häufig, Glödnitz bis in den Jauernigwinkel unter der Flatnitz, Tiffen, Leoben D. P., Umgebung Kanning, Maltathal Khlmr., Malnitz Js., durch's ganze Möllthal bis Sagritz D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Kanalthal Rssmn., Bartolo-Graben zwischen Saifnitz und Feistritz Schnk., Föderaun D. P., Bleiberg Mar.

1. Anmerkung. *Impatiens Balsamina* L. Balsamine, schöne Fräulein, Spazierfräulein, schöne Menscher, ist eine aus Ostindien stammende, in Gärten sehr häufig cultivirte Pflanze.

2. Anmerkung. Auch das nahe verwandte *Tropaeolum majus* L. Kapuzinerkresse, ist eine häufig vorkommende Zierpflanze.

114. Familie: *Philadelphaceae* Don. Pfeifenstrauchgewächse.
(Tabell. Uebers. 84. Fam.)

DLXI. Philadelphus L. Pfeifenstrauch.
(XII. 1. n. 302.)

1896. 1. *Philad. coronarius* L. Gemeiner Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.

Koch p. 292; Neilr. p. 868; Grke. p. 150.

Blätter elliptisch, zugespitzt, gesägt-gezähnt; Blüten traubig, weiss; Griffel tief vierspaltig, kürzer als die Staubfäden.

Aus Südeuropa und in Gärten als Heckenpflanze angepflanzt, wird durch seine Ausbreitung lästig. 4 Mai bis Juni.

Maria Saal Welw., Wolfsberg Hfnr., Lesachthal Jab., Obervellach D. P.

115. Familie: *Oenotheraceae* Endl. Nachtkerzen-Gewächse.
(Tabell. Uebers. 79. Fam.)

1. Gruppe: *Onagreae* De C. Kelchröhre kürzer als der Fruchtknoten, der freie Theil mit dem Saume abfällig.

DLXII. Oenothera L. Nachtkerze.

(VIII. 1. n. 251.)

1897. 1. Oenoth. biennis L. Zweijährige Nachtkerze.

Koch p. 284; Neilr. p. 869; Grke. p. 145.

Stengel kurz weichhaarig und mit längeren, auf Knötchen sitzenden Haaren besetzt; Blätter gezähnt, etwas geschweift, die untersten des ersten Jahres elliptisch oder länglich-verkehrteiförmig, stumpf mit einer Spitze; Blume gelb.

Stammt aus Virginien und findet sich jetzt an Ufern, in Gebüsch, auf Sandfeldern. ☉ Juni bis August.

Stadtcanalausfluss und Ränder der Bewässerungscanäle unter Klagenfurt Kkl., Zwgr., Ufer der Lavant und Nebenbäche Grf., Hfnr., St. Johann am Brückl Js., Tiebelufer bei Buchscheiden D. P., Unterdrauthal Js., Lind ob Sachsenburg und Weissbriach Khlmr., Gailthal bei Mondorf und an der Gail bei Tröpolach D. P., Bleiberg Mar. nur ein Exemplar.

DLXIII. Epilobium L. Weidenröschen.

(VIII. 1. n. 250.)

1. Rotte: **Chamaenerion Tausch.** Blätter sämtlich wechselständig; Kronblättchen flach ausgebreitet; Staubgefäße und Griffel abwärts gebogen.

1898. 1. Epil. angustifolium L. Schmalblättriges Weidenröschen, Federblüh.

Wulf. p. 796; Koch p. 280; Neilr. p. 870; Grke. p. 141.

Blätter lanzettlich, ganzrandig oder drüsig schwach gezähnt, aderig; Kronblättchen benagelt, verkehrt-eiförmig, purpurroth.

Wälder, Holzschläge, zwischen Gesteinen im Gebirge und auf Alpen. ☿ Juli bis August.

Sehr verbreitet, Satnitz Kkl., Zwgr., Kreuzberg Zwgr., Rabenstein, Nordabhang der Koralm in der Nähe der Quellen Grf., Gräben bei Wolfsberg Hfnr., Eberstein Js., Ulrichsberg Drchnr., Glödnitz gegen Flatnitz, Reichenauer Garten, Tiffen und an der Himmelberger Strasse bei Pichlern, Teichen, Leobengraben häufig, Katschthal D. P., Kanning, Maltathal bis in's Elend Khlmr., durch's ganze Möllthal D. P., Oberberg und Weissbriach Khlmr., Lesach-

thal Jab., Frohn- und Luggauer Alpen B. R., Tröpolach D. P., Möderndorf bis auf die Kühweger-Alm Hsr., Bartolo-Graben Schnk., Wischberg Mrchs., Bleiberg Mar., Heiligengeist vor dem Bleiberg Hsr., Ritschberg nächst der Petzen Weld.

1899. 2. Epil. Dodonaei Vill. Rosmarinblättriges Weidenröschen. Epil. rosmarinifolium Haenke; Ep. angustissimum Aut.; Koch p. 281; Neilr. p. 371; Grke. p. 142.

Blätter lineal, adernlos; Kronblättchen elliptisch-länglich, am Grunde schmaler, purpurroth; s. w. v.

Kiesige Stellen, Gerölle in Gebirgsgräben bis in die Alpen. 4 Juli bis August.

Gössling am Kreuzbergl Kkl., Js ch., südliche Stadtmauer in Klagenfurt Js ch., an der Bahn bei Kühnsdorf häufig Jab., Gnoppnitzbachschütt bei Greifenburg Khlmr., Bachgries bei Rattendorf D. P., Urbanicapelle bei Möderndorf bis in die Kühweger-Alm Hsr. als Epil. rosmarinifol., Kanalthal Rssmn., Pontafel Preissmn., Maria Elend Herb. car.

2. Rotte: Lysimachion Tausch. Untere Blätter gegenständig quirlig, obere abwechselnd; Kronblättchen trichterförmig abstehend; Staubgefäße und Griffel aufrecht.

a. Blume ansehnlich, die vier Narbenzipfel frei abstehend; Stengel stielrund, von den Blatträndern keine erhabenen Linien herablaufend, gewöhnlich schon während der Blüte unterirdische verlängerte Ausläufer treibend.

1900. 3. Epil. hirsutum L. Zottiges Weidenröschen.

Wulf. p. 452; Koch p. 281; Neilr. p. 571; Grke. p. 142.

Stengel stielrund, von einfachen längeren und kürzeren drüsentragenden Haaren zottig; Blätter stengelumfassend, mit blattartigem Grunde wenig herablaufend, lanzettlich, länglich; Narben abstehend; Blume purpurroth.

Gräben, Ufer, feuchte Gebüsch. 4 Juni bis September.

Maria Loretto Wulf., Glan und Glanfurt, Maria Saal Kkl., Velden Grf., Ebenthal Drchnr., Ufer der Lavant und Nebenbäche Grf., Eberstein Js., Tiebelufer bei Buchscheiden und Tiffen, Ossiacher-See D. P., Weissbriach Khlmr., Bleiberg Mar., Karawanken Jab.

b. Blumen klein, Stengel gewöhnlich erst nach der Blüte am Grunde seitliche Blattrosetten oder durch Entwicklung der Zwischenknoten verkürzte, beblätterte Ausläufer treibend; s. w. v.

1901. 4. *Epil. parviflorum* Retz. Kleinblütiges Weidenröschen.
Wulf. p. 796; Koch p. 281; Neilr. p. 872; Grke. p. 142.

Stengel stielrund, ohne erhabene Linien, von einfachen Haaren zottig oder weichhaarig; Blätter sitzend, nicht stengelumfassend, nicht herablaufend, lanzettlich, gezähnt; Samen eiförmig; Blume hellviolett.

β. *subglabrum* Koch, Ep. rivulare Wahlenb. Haare spärlich, kurz, angeedrückt und so auseinander gestellt, dass die Pflanze kahl zu sein scheint.

Sumpfige Wiesen, Gräben, Weidengebüsche. 4 Juni bis September.

St. Georgen am Sandhof, Gössling Kkl., mittlerer Teich ob der Zigguln, Satnitz Wulf., Canalufer und Glanfurt Kkl., Tiffen am Moose und gegen Himmelberg, Tiebel bei Liebetegg, Pernegg D. P., Pontafel Preissm n., Malborgeth Rssm n., Bleiberg Mar.

β. Klagenfurt an der Papiermühle Kkl., Glanfurt Gr f., Teichufer bei Flatschach und bei Tiffen D. P.

1902. 5. *Epil. montanum* L. Berg-Weidenröschen.
Wulf. p. 452; Koch p. 282; Neilr. p. 872; Grke. p. 142.

Stengel stielrund ohne erhabene Linien, kurz angeedrückt behaart; Blätter eiförmig-lanzettlich, ungleich gezähnt-gesägt, untere gestielt; Blume rosenroth, selten weiss. Von dem naheverwandten *parviflorum* durch den feinen angeedrückten, oft kaum bemerkbaren Flaum und breitere kürzere Blätter verschieden.

Ausser der gewöhnlichen Form kommen vor:

β. *subalpinum* Neilr. Stengel nicht viel über 15 cm. hoch, einfach, wenigblütig, welche anfangs stark überhängen; Blätter eilanzettlich, obere lanzettlich, wechselständig.

γ. *alternifolium* Neilr. Blätter sehr tief gezähnt; Internodien sehr kurz, blos wenige unterste gegenständig, von der Mitte hinauf wechselständig, wenigblütig. Ob *Epil. collinum* Gm. Koch?

Sehr verbreitet bei Gebüsch, in Gräben, auf Mauern, Felsen bis in die Alpen. 4 Juni bis September.

Kreuzbergl Kkl., Satnitz Wulf., Zwgr., Lavanththal, bei St. Paul Gr f., Wolfsberg Hfnr., Lölling, Flatnitz Wulf.

Haidnerhöhe Krn brgr., Poitschacher Graben, Tiffen, Teichen, Leobengraben, Katschthal, durch's Möllthal bis Heiligenblut D. P.

β. Koralm Grf., Hofalm im Leobengraben, Rabisch in Malnitz, Heiligenblut D. P. Hieher wohl auch die Standorte aus dem südlichen Alpenzuge, wie aus Exemplaren in Hauser's Herbar zu schliessen, nämlich Plöcken B. R., Bleiberg Mar., Ortatscha, Seleniza, Loibl Kkl., Karawanken Jab., Kotla, Seleniza Grf.

γ. Malnitzerthal und am niedern Tauern D. P.

Anmerkung. Exemplare von der Glanfurt Kkl. und Krumpendorf scheinen Bastarde von montanum und palustre Schmidtianum zu sein. Da jedoch durch Abmähen oder Abfressen des Hauptstengels die Entwicklung nicht normal ist, so kann eine Bestimmung nicht mit Sicherheit erfolgen.

1903. 6. Epil. hypericifolium Tausch. Johanniskrautblättriges Weidenröschen.

Koch p. 282; Grke. p. 143.

Stengel weichhaarig; Blätter eiförmig-zugespitzt, ganzrandig, auf den Adern und am Rande weichhaarig, untere gegenständig, gestielt; s. w. v.; Blume zuerst weiss, dann rosenroth.

Trockene Weideplätze, Raine. 4 Juli.

Bei Maria Saal Welw.

c. Blumen klein; die vier Narbenzipfel keilförmig zusammenschliessend; Stengel von zwei bis vier erhabenen, von den Blatträndern herablaufenden und öfter paarweise zusammenfliessenden Linien vier- bis zweireihig; s. w. v.

1904. 7. Epil. trigonum Schrank. Dreikantiges Weidenröschen.

Koch p. 283; Neilr. p. 873; Grke. p. 143.

Stengel meist einfach, mit zwei bis vier erhabenen Linien; Blätter zu drei bis vier quirlständig, sitzend, fast stengelumfassend, länglich-eiförmig zugespitzt, ungleich gezähnt-gesägt; Blume rosenroth.

Feuchte Weiden auf Alpen und Voralpen. 4 Juli bis August.

Koralm im Seethal und Himmelreich Hfnr., Haidnerhöhe Krn brgr., Umgebung Kanning Khlmr., Malnitz am niedern Tauern und in der Wolliger-Alm Hkl., hier und in der Kapponiger-Alm und Wunzen bei Obervellach nur mit

zwei gegenständigen Blättern, Pasterze D. P., Eggeralm im Oberdrauthale und Weissbriach Khlmr., Gailthal D. P., Luschariberg Kkl., Wischberg Mrchs., Uschowa Weiss.

1905. 8. Epil. tetragonum L. Vierkantiges Weidenröschen.

Koch p. 283; Neilr. p. 873; Grke. p. 143.

Stengel steifaufrecht, ästig, fast kahl, geflügelt vierkantig; Blätter lanzettlich, gezähnt-gesägt, mittlere mit jedem ihrer beiden Ränder bis zum nächsten Paare gesondert herablaufend, untere sehr kurz gestielt; Blume rosenroth.

In Sumpfräben, bei Quellen. 4 Juli bis August.

Ausfluss des Stadtcanals bei Klagenfurt Kkl., Sauracherger Mösl und Görlitzen ob Tiffen D. P., Umgebung Kanning Khlmr.

1906. 9. Epil. roseum Retz. Rosenrothes Weidenröschen.

Koch p. 383; Neilr. p. 874; Grke. p. 143.

Stengel sehr ästig, reichblütig; Blätter ziemlich langgestielt, länglich, zu beiden Seiten spitz, dicht ungleich gezähnt-gesägt; Blume klein, blassrosenroth.

Gräben, Bachufer. 4 Juli bis August.

Satnitz Kkl., Lavantthal Grf., Eberstein Jsch., Berg und Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Raibl Ndrst., Heiligengeist und Bleiberg Mar., Loibl Kkl.

d. Stengel von mehr oder minder deutlichen, von den Blättern herablaufenden und meistens paarweise zusammenfliessenden Linien zweiseitig, seltener vierseitig oder ohne herablaufende Linien stielrund; gewöhnlich schon während der Blüte aus den untern Gelenken verlängerte schuppige oder beblätterte Ausläufer treibend;

s. w. v.

1907. 10. Epil. alsinifolium Vill. Mierenblättriges Weidenröschen.

Epil. organifolium Lam. Koch p. 284; Neilr. p. 874; Grke. p. 144.

Stengel einfach, armlütig; Blätter etwas gestielt, eiförmig, lanzettlich zugespitzt, geschweift und entfernt schwach gezähnt, kahl; Blume rosenroth.

An Bächen, Quellen auf Alpen und Voralpen. 4 Juni bis August.

Koraln Grf., Saualm Kkl., Flatnitz D. P., Grf., in Kaltwasser (Flatnitzgruppe) mit *Draba flatnizensis* Trflnr.,

Krucken, Reichenauer Garten D. P., Faschaun und gegen das kleine Elend Khlmr., Malnitz am niedern Tauern und Thorwandkopf Hkl., Wolaja D. P., Plöckenpass, Garnitzenberg Preissm n., Buchacher-Alm und Grossrudnig D. P., Kühweger-Alm Kkl., Luschariberg am Wege gegen Kaltwasser Kkl., Grf., Wischberg Mrchs., Karawanken unter der heiligen Wand Kkl., Obir Preissm n., Rinka Weiss.

1908. 11. Epil. anagallidifolium Lam. Alpen-Weidenröschen.

Epil. alpinum Aut. Wulf. p. 453; Koch p. 284; Neilr. p. 875; Grke. p. 144; Seboth Alp. Pfl. III. T. 17.

Stengel einfach, armbütig; Blättchen kurz gestielt, länglich oder länglich-lanzettlich, stumpf, ganzrandig, am Grunde verschmälert; Blume blossroth.

Schlammige, feuchte Plätze und bei Quellen auf Alpen. 4 Juli bis August.

Nordabhang der Koralm Grf., Saualm Jab., Hfnr., Winterthal, Reichenauer Garten D. P., Alpen um Kanning, Trippalm in der Göss, Maltathal Khlmr., Malnitzer Tauern Bs chf., Berr., Grossfragant Gussbr., Lonza, Schober, Sagritzer Alpen, Pasterze, Gamsgrube D. P., Heiligenbluter Tauern Hppe., Kreuzeck bei Greifenburg Preissm n., Lesachthaler Alpen Jab., Dobratsch Mar., Karawanken Jab.

1909. 12. Epil. palustre L. Sumpf-Weidenröschen.

Koch p. 282; Neilr. p. 875; Grke. p. 144.

Stengel kurz behaart; Blätter lanzettlich oder linealisch, ganzrandig oder gezähnt, mit keilförmigem Grunde sitzend; Blume fleischroth.

β. lineare Krauss. Blätter lineal; Stengel nickend, einfach.

γ. Schmidtianum Rostkovius. Blätter breit, deutlich gezähnt.

Torfige Wiesen, Weiden, Gräben. 4 Juli bis September.

Gössling bei Klagenfurt Kkl., Satnitz Zwgr., hinter der Zigguln und Ebenthal Js ch., unteres Lavantthal, Koralm Grf., Wolfsberg Hfnr., Himmelberg, Steindorf D. P., Kanning Khlmr., Malnitz im Seethale Beer., Obervellach, Heiligenblut D. P., Oberberg Khlmr., Bartolograben bei Feistritz im Gailthale Schnk.

β. Reichenauer Garten, Pasterze D. P.

γ. Malnitz D. P.

2. Gruppe: **Jussieuace De C.** Kelchröhre den Fruchtknoten nicht überragend mit vier- bis sechsspaltigem bleibenden Saume.

DLXIV. *Isnardia* L. **Isnardie.**

(IV. 1. n. 75.)

1910. 1. ***Isn. palustris* L.** Sumpf-Isnardie.

Wulf. p. 213; Koch p. 285; Grke. p. 145.

Stengel am Grunde wurzelnd; Blätter gegenständig, eiförmig, spitz; Blüten blattwinkelständig, einzeln, sitzend; Blume grün.

Sumpfgräben, Seen, Teiche, langsam fließende weiche Wasser. 4 Juli bis August.

Sümpfe bei Klagenfurt J a b., Wörthersee, Siebenhügel Kk l., Loretto, Kreuzberg l, Zigguln Wulf., Ebenthal Grf.

3. Gruppe: ***Circaeace De C.*** Saum zwei- bis vierspaltig, abfallend; s. w. v.

DLXV. *Circaea* Tournef. **Hexenkraut.**

(II. 1. n. 5.)

1911. 1. ***Circ. lutetiana* L.** Gemeines Hexenkraut.

Wulf. p. 7; Koch p. 285; Neilr. p. 876; Grke. p. 145.

Stengel aufrecht, weichhaarig; Blätter eiförmig, am Grunde herzförmig, geschweift-gezähnt; Deckblättchen fehlen; Kronblättchen so lang als der Kelch, anfangs rötlich, dann weiss; Fruchtknoten zweifächerig; Frucht verkehrt-eiförmig mit widerhackigen Stachelchen besetzt.

Schattige, feuchte Haine, buschige Ufer. 4 Juli bis August.

Victring beim Pfarrerbründl, Strassengraben bei Krumpendorf Grf., Satnitz Gntr., Ebenthal Herb. car., Gurnitz Kk l., Wolfsberg Hfnr., Pörschach am See J a b., Tiffen, Möllthal nur zwischen Semslach und Söbriach, Tröpolacher Moos D. P.

1912. 2. ***Circ. intermedia* Ehrh.** Mittleres Hexenkraut.

Koch p. 285; Neilr. p. 877 *Circ. alpino-lutetiana* Rehb.; Grke. p. 146 *Circ. alpino-lutetiana* Meyer.

Stengel kahl; Blätter meist herzförmig, geschweift gezähnt, obere eiförmig, Deckblättchen borstlich; Früchte fast kugelig eiförmig, sehr selten fruchtbar; s. w. v.

Feuchte, schattige Haine, Gebirgsbäche, Ufer. 4 Juli bis August.

Krumpendorf häufig Kkl., Vietringer Wald gegen die Götterquelle Jsch., Langische Schlucht an der Satnitz, Umgebung St. Paul im Lavantthale Grf.

1913. 3. *Circ. alpina* L. Alpen-Hexenkraut.

Koch p. 286; Wulf. p. 8; Neilr. p. 876; Grke. p. 146.

Stengel aufsteigend, kahl; Blätter herzförmig, geschweifgezähnt; Kronblättchen kürzer als der Kelch, anfangs röthlich, dann weiss; Fruchtknoten einfächerig; Frucht länglich keulenförmig.

Schattige Laubwälder, an faulenden Baumstämmen bis in die Alpen. 4 Juni bis Juli.

Satnitzschluchten Kkl., Ebenthaler Wasserfall Welw., Vietring Wulf., Kor- und Saualm Hfnr., Gurkthal bei Sirnitz D. P., Flatnitz Wulf., Reichenauer Garten Hsr., Unterberg im Ossiacher Seethal D. P., Umgebung Kanning, Maltagraben Khlmr., Malnitz Hkl., Fraganter Alpen Gussbr., Sagritz und Heiligenblut D. P., Iselsberg bei Winklern Preissm., Grafenweger Höhe im Oberdrauthale gegen Gössering, Weissbriach Khlmr., Frohn-, Luggauer-, Plöckner- und Tröpolacher Alpen B. R., Lesachthal Jab., Gailthal D. P., Fuss der Villacher-Alm Wulf., Karawanken Jab., Bodenthal Grf., Mozhniggraben in Weidisch B. R.

4. Gruppe: **Trapeae E. Meyer.** Kelchröhre angewachsen, mit bleibendem Saume; Frucht nussartig, knöchern.

DLXVI. *Trapa* L. Wassernuss.

(IV. 1. n. 92.)

1914. 1. *Tr. natans* L. Schwimmende Wassernuss, Seenuss.

Wulf. p. 213; Koch p. 286; Neilr. p. 879; Grke. p. 146.

Untergetauchte Blätter haarförmig gefiedert, schwimmende rautenförmig, gezähnt, gestielt, Blattstiele in der Mitte aufgeblasen; Blume weiss.

In stehenden oder sehr langsam fliessenden Wässern. 4 Juni bis Juli.

Nach Wulf. bei Loretto, Wörthersee Hppe. 1802, im grossen Fischeiche bei Hallegg häufig Jab., Krastowitz Teich, Sumpf bei Lind unterm Ulrichsberg, Teiche bei Ehrenthal und

Krumpendorf Kkl., Teich in Victring Zwgr., Teich nächst der Strasse bei Keutschach Js ch., Pfitzen nächst der Draubrücke bei Völkermarkt Rs ch., Kolnitz im Lavantthale Hfnr., Ossiachersee bei Steindorf D. P. und im unteren Theile desselben Jab.

116. Familie: *Haloragae R. Brown.* Meerbeeren-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 80. Fam.)

DLXVII. Myriophyllum Vaill. Tausendblatt.

(XXI. 5. n. 584.)

1915. 1. Myrioph. verticillatum L. Quirlblättriges Tausendblatt.
Koch p. 286; Neilr. p. 878; Grke. p. 146.

Blätter quirlig, tief fiederspaltig, Zipfel borstenförmig; Blüten in blattwinkelständigen, ährenförmigen Quirlen; Deckblättchen sämmtlich kammförmig fiederspaltig.

Gräben, stehende Wässer. ♀ August bis September.

Wörthersee und Glanfurt Kkl., Waidmannsdorf und Ebenthal Js ch., Schwabenhofer Lacken bei Wolfsberg Hfnr., Wasserleitgräben am Tiffner Moose und Ossiachersee bei Steindorf, Stranig und Rattendorf im Gailthale, Villacher Bad D. P.

1916. 2. Myrioph. spicatum L. Aehrenförmiges Tausendblatt.

Koch p. 287; Neilr. p. 879; Grke. p. 146.

Blüten in ährenförmigen Quirlen, junge Aehren aufrecht; untere Deckblättchen eingeschnitten, obere ganzrandig; s. w. v.

Stehende Gewässer, Gräben. ♀ Juli bis September.

Wörthersee, Glanfurt, Satnitz Kkl., Js ch., Wasserleitgräben im Tiffner Moos, Ossiachersee bei Steindorf, Rattendorf im Gailthale D. P., Weissbriach Khlmr., Klopeiner- und Sittersdorfer-See bei Eberndorf Grf.

117. Familie: *Hippurideae Lnk.* Tannenwedel-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 44. Fam.)

DLXVIII. Hippuris L. Tannenwedel.

(I. 1. n. 1.)

1917. 1. Hipp. vulgaris L. Gemeiner Tannenwedel.

Wulf. p. 2; Koch p. 287; Neilr. p. 877; Grke. p. 147.

Stengel aufrecht, blüthentragender Theil ober dem Wasser; Blätter linealisch, zu acht bis zwölf in Wirteln; Blüten blattwinkelständig, klein grün, sitzend.

Gräben, stehende und langsam fließende Wässer. 4 Juni bis August.

Glanfurt, Satnitz Kkl., Zwgr., Ebenthal Js ch., Tümpel am Maria Saaler Moose Jab.

118. Familie : *Lythrarieae* *Juss.* Weiderich-Gewächse.

(Tabell. Uebers. 88. Fam.)

DLXIX. Lythrum L. Weiderich.

(XI. 1. n. 297.)

1918. 1. Lythr. Salicaria L. Gemeiner Weiderich.

Koch p. 290; Neilr. p. 880; Grke. p. 149.

Blätter herzlancettförmig, untere gegenständig oder quirlig; Kelch am Grunde ohne Deckblättchen, Kelchzähne abwechselnd länger; Blume purpurroth.

Sumpfwiesen, Gräben, feuchte Gebüsch. 4 Juli bis September.

Klagenfurt Kkl., Satnitz, Siebenhügel Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Glödnitz, Tiffen D. P., Maltathal Khlmr., Möllthal bis Winklern D. P., Oberdrauthal, Hauzendorfer Moos, Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Bleiberg Mar.

DLXX. Peplis L. Afterquendel.

(VI. 1. n. 232.)

1919. 1. Pepl. Portula L. Gemeiner Afterquendel.

Wulf. p. 447; Koch p. 291; Neilr. p. 881; Grke. p. 149.

Stengel niederliegend, vielästig, Aeste wurzelnd; Blätter gegenüberstehend, verkehrt-eiförmig, kurz gestielt; Blüten einzeln in den Blattwinkeln, sehr klein, röthlichweiss.

Ufer, Waldstümpfe, auf im Winter überschwemmt gewesenen Plätzen. ☉ Juli bis September.

Wörthersee Hppe., Kkl., Waidmannsdorf und Siebenhügel Js ch., Kalvarienberg Wulf., Pörschach Jab., unteres Lavantthal am Langenberg Grf., bei Tschriet ob Tiffen, Ossiacher Seeufer bei Steindorf, Möllthal in der Schattseite bei Gratschach D. P., Iselsberg nahe an der Kärntner Grenze Preissmn.

119. Familie: *Pomaceae* **Juss.** Apfelgewächse.
(Tabell. Uebers. 83. Fam.)

1. Gruppe: **Mespilae** **Neilr.** Frucht ein Steinapfel mit knöchern verhärteten Fächern.

DLXXI. Crataegus L. Weissdorn.

(XII. 2. n. 306.)

1920. 1. **Crataeg. Oxyacantha L.** Gemeiner Weissdorn, Mehl-
dorn.

Koch p. 275; Neilr. p. 282 α lobata; Grke. p. 138
Mespilus oxyacantha Gaertner.

Strauch; Blätter verkehrt-eiförmig, drei- bis fünfflappig, eigeschnitten und gesägt, am Grunde keilförmig, unterseits bleicher, nebst Aestchen und Blütenstielen kahl; Griffel ein bis drei; Früchte eiförmig, ein- bis dreisteinig; Blume weiss.

Hecken, Zäune, Waldränder bis in die Gebirgsthäler.
‡ Mai bis Juni.

Satnitz Kkl., Wolfsberg Hfnr., Görtschitzthal, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Obervellach selten, Sagritz nur in sehr geschützten Lagen einzeln D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Lesachthal Jab., Bleiberg Zwgr., Villach, Tröpolach D. P., Karawanken Jab.

1921. 2. **Crataeg. monogyna Jacq.** Eingrifflicher Weissdorn, Mehl-
dorn.

Koch p. 275; Neilr. p. 882 *Crat. oxyac. β . laciniata*;
Grke. p. 139 *Mespil. monogyna* Willd.

Baum; Aestchen kahl; Blütenstielchen zottig; Blätter unterseits weisslich-grün; Griffel meist einer; Früchte fast kugelig, meist einsteinig; Blume weiss.

Waldränder, Auen, Hecken. ‡ 14 Tage später als *Cr. Oxyacantha*.

Zwanzgerberg Drchnr., Eberstein Js., Maltathal, Weissbriach Khlmr., St. Daniel im Obergailthale, Auen bei Tröpolach hübsche Bäume D. P., Hollenburg Hsr., Karawanken Jab.

DLXXII. Cotoneaster Medicus. Zwergmispel.

(XII. 2. n. 308.)

1922. 1. **Coton. integerrima Med.** Gemeine Zwergmispel.

Coton. vulgaris Lindl. Koch p. 275; Neilr. p. 883;
Grke. p. 139.

Blätter rundlich-eiförmig, ganzrandig, unterseits filzig; Kelch und überhängende Früchte kahl; Blume klein, blassroth; Frucht purpurroth, selten schwarz.

Felsige Plätze in Gebirgen bis in die Alpen. † Mai bis Juni.

Südseite der Rabensteiner Felsen im Lavantthale Grf., Koralm J s c h., Flatnitz, Winterthal, Tiffen, Rabischhügel im Malnitzthale, Sagritz D. P., Fuss des Bokhorner Gebirges bei Heiligenblut, Pasterze B. R., Rosenstein bei Amlach und Ameisbichl im Oberdrauthale K h l m r., Radegund-Graben im Lesachthale K., Achernach in der Plöcken B. R., Predil Zw g r., Loibl K k l.

1923. 2. *Coton. tomentosa* Lindl. Filzige Zwergmispel.

Koch p. 275; Neilr. p. 883.

Blätter oval, abgerundet stumpf; Kelch nebst Blütenstielen filzig, Früchte hochroth, kreiselförmig, aufrecht; s. w. v.

Felsige Plätze auf Voralpen. † Mai bis Juni.

Satnitz K k l., Flatnitz bei den Kalköfen D. P., Heiligenblut J s c h., Weissbriach K h l m r., Predil P r e i s s m n., Villach H s r., Karawanken J a b., Bärenthal, Teufelsbrücke am kleinen Loibl K k l.

DLXXIII. *Mespilus* L. Mispel.

(XII. 2. n. 307.)

1924. 1. *Mesp. germanica* L. Gemeine Mispel.

Koch p. 276; Neilr. p. 884; Grke. p. 138.

Blätter länglich-lanzettlich, ganzrandig, unterseits filzig; Blüten endständig, einzeln, weiss.

In Obstgärten hie und da angepflanzt. † Mai.

Klagenfurt K k l., Wolfsberg H f n r., Tigring, Obervellach D. P., Villach H s r.

2. Gruppe: **Pyraea Neilr.** Frucht mit papierartig knorpeligen oder dünnhäutigen Fächern, mithin ein Kernapfel oder eine Beere.

DLXXIV. *Pyrus* L. Birne.

(XII. 2. n. 309.)

1925. 1. *Pyr. communis* L. Gemeine Birne.

Koch p. 276; Neilr. p. 884; Grke. p. 139.

Blätter eiförmig, etwa so lang als der Blattstiel, kleingesägt; Blume weiss; Griffel frei, Frucht gegen den Blatt-

stiel hin verlängert, Pyr. Achras Wallr. oder am Grunde abgerundet, Pyr. Pyrastrer Wallr.

α. *glabra* Koch. Ueberzug auf den Blättern dünn, bald verschwindend, Holzbirne.

β. *tomentosa* Koch. Ueberzug auf den Blättern dicht, fast bis in den Herbst bleibend.

Waldränder, Raine, auf trockener, steiniger Unterlage. † April bis Juni.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., Gurkthal, Tiffen, Teichen, Leoben D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Möllthal bis in die Umgebung von Sagritz D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Lesachthal Jab., Gailthal D. P.

1926. 2. Pyr. nivalis Jacq. Schneebirne.

Neilr. p. 884; Koch p. 277.

Blätter verkehrt-eiförmig oder elliptisch, ganzrandig, nur vorn undeutlich gezähnt, sehr kurz gestielt, in der Jugend beiderseits, später nur unterseits weissfilzig; s. w. v.

In Gebirgen an sonnigen Ackerrainen. † Mai bis Juni. Obervellach D. P.

1927. 3. Pyr. Malus L. Apfelbaum.

Koch p. 277; Neilr. p. 885; Grke. p. 140.

Blätter eiförmig, kurz zugespitzt; Blattstiele meist halb so lang als das Blatt; Blüte röthlich, später weiss; Griffel bis zur Mitte verwachsen.

α. *Malus* De C. als Art. Blätter unterseits und Fruchtknoten wollig.

β. *acerba* De C. als Art. Blätter und Fruchtknoten kahl.

Raine, Vorwälder und steigt als β noch höher als die Birne in's Gebirge hinauf. † April bis Juni.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., Glödnitz gegen Flatnitz β., Tiffen, Leoben D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Möllthal α und β bis Bokhorn und Fleiss D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Lesachthal Jab., Gailthal D. P.

DLXXV. *Cydonia* Tournef. Quittö.

(XII. 2. n. 311.)

1928. 1. Cyd. vulgaris Pers. Gemeine Quitte.

Koch p. 276; Neilr. p. 885; Grke. p. 139.

Blätter eiförmig, ganzrandig, unterseits nebst den Kelchen filzig; Blüten einzeln, endständig, röthlichweiss.

In Obstgärten angepflanzt. † Mai.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., Glanhofen D. P.,
Maltathal Khlmr., Obervellach D. P.

DLXXVI. *Aronia Pers.* Felsenbirne.

(XII. 2. n. 312.)

1929. 1. *Aron. rotundifolia Pers.* Rundblättrige Felsenbirne.

Koch p. 277; Neilr. p. 886; Grke. p. 139 *Amelanchier vulgaris* Moench.

Blätter eiförmig, stumpf, unterseits filzig, im Alter kahl; Kronblättchen lanzettlich-keilig, weiss.

Bergabhänge, Felsenspalten. † Mai bis Juni.

Satnitz Kkl., Zwgr., Gurnitz gegen Mieger Zwgr., Südseite der Rabensteiner Felsen im Lavantthale Grf., Maltathal Khlmr., Pfaffenberg bei Obervellach, Sagritz beim Sprinzfelsen, Schattseite Heiligenblut D. P., Ochsen Schlucht und Gasloch im Oberdrauthale, Weissbriach Khlmr., Lesachthal Jab., Raibl, Predil Ndrst., Karlsteig bei Tarvis Schnk., Deutsch-Bleiberg Zwgr., Mar., Karawanken, Stougrube Jab., Bärenthal, Schlucht am Harlouz Js ch., Loibl Hsr., Maria Rain gegen die Drau Js ch.

DLXXVII. *Sorbus L.* Eberesche.

(XII. 2. n. 310.)

1. Rotte: *Aucuparia* Neilr. Blätter unpaarig gefiedert, in der Jugend zottig.

1930. 1. *Sorb. Aucuparia L.* Gemeine Eberesche, Moschbeer, Vogelbeer.

Koch p. 278; Neilr. p. 886; Grke. p. 140 *Pyrus Aucuparia* Gaertner.

Knospen filzig, trocken; Griffel meist drei; Früchte kugelig; Same klein, lichtbraun, verkehrt eiförmig, am Rande abgerundet; Blume weiss; Frucht roth.

In Wäldern, zwischen Felsen, an sonnigen Abhängen, in Wiesen, Ackerrainen bis in die Voralpen. † Mai bis Juni.

Satnitz Kkl., Predigtstuhl Hsr., Grazerkogel am Kreuzbergl Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Lölling, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Malnitz Berr., Teichl im Möllthale sehr häufig, Sagritz D. P., Emberg im Oberdrauthale Khlmr., Lesachthal Jab., Gitschthal und Gailthal D. P., Karawanken Jab., Ritschberg bei der Petzen Weld.

2. Rotte: **Aria Neilr.** Blätter nicht gefiedert.**1931. 2. Sorb. torminalis Crntz.** Rohrbünnen-Eberesche.

Koch p. 279; Neilr. p. 887; Grke. p. 141 Pyr. torminalis Ehrh.

Blätter breit-eiförmig, gelappt, im Alter kahl; Lappen ungleich gesägt, zugespitzt, untere grösser, abstehend; Blume weiss; Frucht lederbraun.

Angepflanzt. † Mai.

Freudenberg Zwgr., Schlosspark in Wolfsberg Hfnr.

1932. 3. Sorb. Aria Crntz. Weissfilzige Eberesche, Mehlbeerbaum.

Koch p. 279; Neilr. p. 887; Grke. p. 141 Pyr. Aria Ehrh.

Blätter länglich-eiförmig, doppelt gesägt oder am Rande klein gelappt, unterseits filzig; Sägezähne oder Läppchen von der Mitte des Blattes zum Grunde hin abnehmend; Blume weiss; Frucht roth oder gelblich.

Gebirgswälder bis in die Alpenthäler. † Mai bis Juni.

Satnitz Kkl., Zwgr., Gurnitz D. P., Umgebung Kanning, Maltathal Khlmr., Sagritz, Putschal unter dem Mittag wandl, Heiligenblut D. P., Emberg im Oberdrauthale, Weissbriach Khlmr., Lesachthal Jab., Raibl Zwgr., Heiligengeist vor Bleiberg Zwgr., Mar., Karawanken Jab., am kleinen Loibl Js ch.

1933. 4. Sorb. Chamaespilus Crntz. Zwerg-Eberesche, Zwergmispel.

Wulf. p. 516 Mespilus Chamaesp. L.; Koch p. 279; Neilr. p. 887; Grke. p. 141 Pyr. Chamaesp. D. C.

Blätter elliptisch oder lanzetlich, doppelt-gesägt, kahl oder unterseits filzig; Kronblättchen schmal, aufrecht, rosenroth.

Zwischen Steingerölle auf höheren Gebirgen und Alpen. † Juni bis Juli.

Flatnitz bei den Kalköfen D. P., Gaslochschlucht bei Berg im Oberdrauthale, Latschur, Weissbriach Khlmr., Reisskofel Preissmn., Mussen D. P., Lesachthal Jab., in der Dober bei Rattendorf D. P., Kühweger- und Tröpolacher-Alm B. R., Wischberg Mrchs., Karawanken Jab., Kum oder Mittagkogel Vst., Bärenthal, Ortatscha Kkl., Seleniza Js ch., Zwgr., Obir Kkl., Vellacher Kotschna und kleiner Grintouz Grf., Petzen Weld., am Gipfel Krstf., Uschowa und Rinka Weiss.

120. Familie: **Rosaceae Juss.** Rosengewächse.
(Tabell. Uebers. 118. Fam.)

1. Gruppe: **Sanguisorbeae Torrey und Gray.** Schalfrüchte nussartig, zu ein bis vier in der erhärteten, aber sonst wenig veränderten Kelchröhre eingeschlossen.

DLXXVIII. Agrimonia L. Odermennig.

(XI. 2. n. 298.)

1934. 1. Agrim. Eupatoria L. Gemeiner Odermennig.

Koch p. 260; Neilr. p. 888; Grke. p. 134.

Stengel aufrecht, rauhaarig; Blätter unterbrochen gefiedert, Fiederblättchen länglich-lanzettlich, gesägt, unterseits kurz grauhaarig, das unpaarige gestielt, übrige sitzend; Kronblättchen eiförmig, goldgelb; Fruchtkelch verkehrt-kegelförmig, der ganzen Länge nach gefurcht, am Grunde mit weit abstehenden weichen Stacheln.

Buschige Hügel, trockene Raine, Wegränder. 4 Juni bis September.

Klagenfurt Kkl., Keutschacherthal Zwgr., häufig am Südfusse des Ulrichsberges zwischen Karnburg und Stegendorf Zwgr., Lavantthal bei St. Michael Hfnr., Tiffen sehr gemein, Obervellach selten, Flattach häufig D. P., Maltathal und Oberdrauthal Khlmr., Tröpolach D. P., Wischberg Mrchs., obere Vellach bei Villach Hsr.

DLXXIX. Aremonia Necker. Aremonie.

(XI. 2. n. 299.)

1935. 1. Arem. agrimonoides Necker. Odermennigartige Aremonie.

Wulf. p. 493 *Agrimonia agrimon. L.*; Koch p. 360.

Zottig; Wurzelblätter unterbrochen gefiedert, Fiederblättchen rundlich, kerbzählig, Stengelblatt dreizählig; Blütenstengelchen aufsteigend; Kelch vielspaltig, Zipfel lineal-lanzettlich; Blume gelb.

Rauhe, steinige Laubwälder. 4 Mai bis Juni.

Maria Saal und am Wege auf den Predigtstuhl Welw., Osselitzenauen bei Tröpolach D. P., Raibl Js ch., Predil Jab., Römerthal und -Pass bei Tarvis Sch nk., Schlitzaschlucht im Walde Jab., Bleiberg am Wege nach Heiligengeist sehr häufig Zwgr., Oberhüttendorf und Kadutschen in Bleiberg Mar., Hollenburger Park Kkl., Singerberg bei Ebenau häufig

Wulf, Karawanken Jab., Bodenthal, Loibl, Ortatscha Kkl., Weidisch-Graben Grf., Bleiburg am Fusse der Petzen Weld.

DLXXX. Alchemilla Tournef. Löwenfuss.

(IV. 1. n. 78.)

a. Blüten in ebenständigem Endstrauss.

1936. 1. Alchem. vulgaris L. Gemeiner Löwenfuss, Frauenmantel, Wundwurz.

Wulf. p. 215; Koch p. 272; Neilr. p. 889; Grke. p. 133.

Untere Blätter langgestielt, nierenförmig, sieben- bis neunlappig, Lappen fast halbkreisförmig, ringsum gesägt, ein Drittel der ganzen Blattlänge einnehmend; Blume klein, gelblichgrün.

In Grösse und Bekleidung sehr veränderlich:

α. Pflanze ganz kahl.

β. Unterhalb haarig, besonders die Rückseite der Blätter.

γ. Ganz seidenhaarig. Alch. subsericea Koch, A. montana Willd.

Wiesen, Weiden bis in die Alpen. 4 Mai bis August.

Klagenfurt Kkl., Victring Wulf., Wolfsberg Hfnr., Saualm Wulf., Glödnitz, Flatnitz β und γ, Tiffen β, Teichen β D. P., Kanning, Maltathal bis zum kleinen Elend Khlmr., Malnitz Berr., Pasterze γ Hppe., γ Bschf. als A. montana, durch's ganze Möllthal α, β und γ, Alpen bei Sagritz auf der Albitzen (Holzgrenze α) D. P., Oberdrauthal α, Weissbriach Khlmr., Mussen γ D. P., Lesachthal Jab., Plöcken B. R., Tröpolach α und β, Bombasch-Graben γ D. P., Raibl, Predilwiesen Jab., Dobratsch Wulf., Hsr., Karawanken Jab., Loiblhöhe Kkl., Obir Preissmn., Gipfel der Petzen Weld., Einsattlung veški legar Krstf.

1937. 2. Alchem. pubescens M. B. Flaumiger Löwenfuss.

Koch p. 272; Seboth Alp. Pfl. I., tab. 32.

Lappen der Wurzelblätter verkehrt-eiförmig, vorn etwas abgeschnitten, spitz-gesägt, am Grunde zu einem Drittel ganzrandig, seidenhaarig bekleidet; s. w. v.

Auf trockenen Gebirgs- und Alpenweiden. 4 Mai bis Juli.

Micheleben und Winterthal, Leitersteig, Reichenauer Garten, Moschelitzen, Wöllanernock, Alpen im Leoben-Graben, Stern im Katschthale D. P., Malnitz auf der Feldwand, Lonza, Sickerköpfel Hkl., Rabischriegel, Rosskopf-Alb, Launsparg,

Astnerfelder gegen Waschgang, Grosszirknitz, am hohen Sattel D. P., Pasterze Hppe., D. P., Pirkacher Bergwiesen bei Oberdrauburg Jab., Latschur Khlmr., Rattendorfer-Alm, Rosskofel D. P., Kanalthal Rssmn., Wischberg Mrchs., Dobratsch Mar.

1938. 3. Alchem. fissa Schummel. Gespaltener Löwenfuss.

Koch p. 273; Grke. p. 133.

Kahl; Blattlappen tief eingeschnitten, bis zur Hälfte des Blattes, am Grunde ganzrandig, so dass die Lappen keilig erscheinen; s. w. n. 1.

Grasplätze auf Alpen. 7 Juli bis August.

Kor- und Saualm Hfnr., Faschaun in der Maltein Khlmr., Malnitzer Tauern, Lonza, Astenalm gegen Schober D. P., Alpen um Heiligenblut Rprcht., Pasterze Hppe., Harg., Latschur und Abhänge des Reisskofels Khlmr., Wolaja im Lesachthale D. P., Wischberg Mrchs., Karawanken, Kotschna Jab.

1939. 4. Alchem. alpina L. Alpen-Löwenfuss.

Wulf. p. 215; Koch p. 273; Neilr. p. 889; Grke. p. 134; Seboth Alp. Pfl. I., tab. 33.

Untere Blätter fingerig, fünf- bis siebentheilig, Zipfel lanzettlich, keilig, stumpf, an der Spitze angedrückt gesägt, unterseits seidenhaarig.

Kiesige, felsige Plätze auf Alpen. 7 Juli bis August.

Glockner? Blmfld. und Schwb., Sieb. als var. podophylla Tausch mit handförmig siebentheiligen Blättern, Flora 1841, Beibl. Nr. 7, Koralm Kkl., Jsch., Lesachthal Jab., zwischen Wolfsbach und Raibl Mrchs., Luschariberg D. P., Raibl Ndrst., Strasse gegen Predil Kkl.

b. Blüten blattwinkelständig, geknäult.

1940. 5. Alchem. arvensis Scop. Acker-Löwenfuss.

Wulf. p. 216 Alchem. Aphanes Leers; Koch p. 273; Neilr. p. 890; Grke. p. 134.

Stengel fadenförmig; Blätter handförmig dreispaltig, am Grunde keilförmig, Zipfel vorn eingeschnitten, drei- bis fünfzählig; Blume meist einmännig.

Auf Aeckern und sonnigen, mageren Rainen. ☉ Mai bis Herbst.

Klagenfurt Wulf., St. Ruprecht nächst der Eisenbahn Kkl., Tiffen und Umgebung, jedoch meist vereinzelt und nicht jedes Jahr an allen Standorten D. P.

DLXXXI. Sanguisorba L. Wiesenknopf.

(IV. 1. n. 79.)

1941. 1. Sanguis. officinalis L. Gemeiner Wiesenknopf.

Wulf. p. 211; Koch p. 273; Neilr. p. 890; Grke. p. 134.

Blätter unpaarig gefiedert; Blättchen herzförmig, länglich; Blüten in eiförmig-länglichen dunkelbraunen Köpfchen. Feuchte Wiesen. 4 Juni bis August.

Stadtcanal Klagenfurt Kkl., Satnitz Trflnr., Mantschemühle und Ehrenhausen Wulf., St. Paul im Lavantthale Grf., Wolfsberg Hfnr., Glanhofen, zwischen Tiffen und Himmelberg, Fuchsgrube ob Steierberg, nach der Entsumpfung der Mooswiesen bei Stallhofen (Möllthal) auf der ausgeworfenen Erde D. P.

DLXXXII. Poterium L. Becherblume.

(XII. 2. n. 305.)

1942. 1. Pot. Sanguisorba L. Wiesenknopffartige Becherblume.

Koch p. 274; Neilr. p. 890; Grke. p. 134 Sanguisorba minor Scop.

Stengel kantig, fruchttragender Kelch knöchig-verhärtet, netzig-runzlig, vierkantig; Knoten stumpf; Blume meist vielchig, grünlich.

Trockene Hügel, Bergwiesen. 4 Juni bis Juli.

Wolfsberg Hfnr., Launsdorf, Pfaffenberg bei Obervellach D. P., Bahnkörper bei Berg, Weissbriach Khlmr., Kanalthal Rssmn., Raibl, Predil Ndrst., Kaltwasser, Bleiberg Zwgr., Föderaun D. P., Villach Hsr.

1943. 2. Pot. polygamum W. et Kit. Vielehige Becherblume.

Koch p. 274.

Die fruchttragenden Kelche knöchern-verhärtet, grubig-runzlig; Knoten geflügelt; s. w. v.

Trockene Raine, Weiden in Gebirgsgegenden. 4 Juli bis August.

Satnitz, Südseite der Rabensteiner Felsen bei St. Paul Grf., Sagritz D. P., Pfarmeben im Oberdrauthale Khlmr., Tröpolach und Bombasch-Graben auf Kalkfelsen D. P., Bleiberg Mar., Maria Rain Kkl.

2. Gruppe: **Roseae De C.** Schalf Früchte nussartig, zahlreich, in der zu einer knorpeligen oder markigen Scheinfrucht erweiterten Kelchröhre eingeschlossen.

DLXXXIII. Rosa Tournef. Rose.*)

(XII. 3. n. 315.)

1. Rotte: **Systylae De C. Keller** l. c. p. 200; **Borbás: A Magyar Birodalom Vadon Termo Rozsai** p. 333. Aeste und Blütenzweige niedergestreckt, liegend oder aufrecht, drüsenlos; Stacheln gleichförmig, derb, gekrümmt; Blättchen fünf bis sieben, kahl oder an der Unterseite schwach behaart; Kelchzipfel abfällig, fiederlappig oder ungetheilt; Krone mittelgross bis klein, weiss, sehr selten rosa; Griffel so lang als die Staubgefässe.

a. **Arvenses Crép. Keller** p. 200; **Borb.** p. 333. Zweige kriechend, wurzelnd; Blätter abfällig, selten glänzend, schwach behaart, auf den Flächen drüsenlos; Zahnung einfach; Blütenstiele lang, kahl oder stieldrüsiger; Kelchzipfel kurz zugespitzt, meist einfach, abfällig; Kronblättchen weiss; Griffel in eine Säule verwachsen, Diskus breit; Scheinfrucht knorpelig, mennigroth, dann lederig, braun.

1944. 1. Rosa arvensis Huds. Acker-Rose.

Keller l. c. p. 200; **Borb.** l. c. p. 343; **Christ Rosen der Schweiz** p. 195; **Koch** p. 270; **Wulf** p. 520; **Neilr.** p. 899; **Grke.** p. 138.

Stacheln derb, an den Aesten gekrümmt, an den Zweigen zarter, gekrümmt oder fast gerade, pfriemlich; Blättchen dünn, eirund oder elliptisch, stumpf bis zugespitzt, oberseits dunkelgrün, unterseits blass, einfach gesägt; Blütenstiele stets lang, mit kleinen lanzettlichen Deckblättchen, entweder kahl oder, wie die Receptakeln, stieldrüsiger; Kelchzipfel kürzer als die Kronblättchen, oval mit kurzen Spitzchen, ungetheilt oder wenig fiederlappig; Scheinfrucht kugelig oder ellipsoidisch, klein, reif zuerst scharlachroth, später braun bis schwarz.

Hecken, Vorwälder. † Juli.

Südseite der Rabensteiner Felsen bei St. Paul, Abhänge der Goding im Lavantthale, so wie auf der Grutschen Grf.

*) Anmerkung. Bei der Bestimmung der Rosen nach neueren Forschungsergebnissen gingen dem Verfasser vor Allem **J. B. Keller** in Wien, dessen Nachträge zur Flora Niederösterreichs 1882: Die niederösterreichischen Rosen, mit Erlaubniss des Verfassers zur Basis genommen wurden, dann Professor **Vincenz v. Borbás** in Pest, sowie **Johann Wiesbauer**, **S. J.**, derzeit zu **Maria Schein** in Böhmen, an die Hand, welchen Herren hiemit den verbindlichsten Dank auszusprechen der Verfasser sich dringend verpflichtet fühlt.

Nach Exemplaren aus dem Herbare Ferdinand Hauser's, leider ohne Standortangabe, dürfte die Kärntner *R. arvensis* Huds. die Form:

R. baldensis A. Kerner. Keller p. 202 repräsentiren, denn die Blättchen sind klein, unterseits an den Nerven beflaumt, Mittelnerv mit kleinen Borstchen besetzt; Blüten- und Blattstiele drüsig, letztere zugleich dichtflaumig.

2. Rotte: **Gallicanae De C.** Keller p. 204; Borb. p. 334. Kleine bis weniger erhobene, aus unterirdischen, oftmals kriechenden Stämmen aufrechte Sträucher, von 0·3 bis 1·3 m. Höhe; Bestachelung meist zweifach, gekrümmte Stacheln und kurze oft drüsentragende Borsten; Blättchengross, sitzend, lederig, starr, spät abfallend, oft zusammengefaltet und zurückgeschlagen; Blüten einzeln, lang gestielt, ohne Deckblättchen oder zu zwei bis mehreren vereinigt, kurz gestielt und im letzteren Falle mit Deckblättchen gestützt; Blütenstiele fast immer drüsig, wie die Rückseite der Kelchzipfel, letztere zurückgeschlagen, äussere fiederlappig, abfällig; Blüten die grössten der Gattung, meist lebhaft gefärbt, wohlriechend; Griffel frei, seltener in eine Säule vereinigt; Scheinfrüchte theils lederig, saftlos, orange, theils knorpelig, tiefroth oder nur halb sich entwickelnd, steril bleibend bei den Hybriden.

a. **Gallicanae verae** Aut. Borb. p. 367; Keller p. 206. Griffel nicht verlängert, ein weisswolliges, behaartes oder kahles dichtes Köpfcchen bildend; Blüten sehr gross, purpurn-bleichrosa, sammtig, einzeln (selten zu zwei), langgestielt, deckblattlos oder mit kleinen blattlosen Bracteengestützt; Blätter zu fünf, die obern häufig zusammengefaltet und zurückgeschlagen, unterseits nicht oder sehr selten drüsig; Nebenblättchen schmal, alle gleichgestaltet; Stacheln zweierlei, derbe und borstenförmige, letztere vorherrschend.

1945. 2. **Rosa austriaca** Crantz. Oesterreichische Rose.

Keller p. 206; Borb. p. 367 *R. gallicae* β ; Christ. p. 199 *R. gallica* typ.; Koch p. 271; Josch, Flora von Kärnten p. 38; Neilr. p. 899 *R. gall.*

Stacheln ungleich, die grössern pfriemlich gerade oder gekrümmt, die kleinern borstig, kurz nadelig; Blütenzweige

mit Drüsenborsten dicht bewehrt; Blattstiele drüsig-flaumig, bestachelt; Blättchen rundlich elliptisch bis eirund, am Grunde schwach herzförmig oder verkehrt-eirund, spitz oder stumpf, seitliche sitzend, einfach oder doppelt gesägt; Nebenblättchen lineal, drüsig gewimpert, alle ziemlich gleichgestaltet; Blütenstiele einzeln, selten zu zwei, dichtdrüsig, mit eingemischtem Stacheln; Kelchzipfel fiederlappig; Griffel dicht behaart; Scheinfrüchte kugelig bis birnförmig, lang aufrecht bleibend; Blume lichtroth, wohlriechend.

Haine, Waldränder. † Juni bis Juli.

Klagenfurt Grf. als *R. gallica* L., Satnitz Js ch., Zwgr., unter der Wungerlhube, bei Mageregg Js ch., Grutschen Grf., Lesachthal? Jab., Eberndorf Grf.

In den Formenkreis gehören:

α. *f. haplodonta* Borb. p. 367; Keller p. 207. Griffel stark behaart bis wollig-filzig; Zweige stets aufrecht; Blättchen einfach gesägt, Sägezähne drüsenlos oder nur mit ein bis zwei Drüsen besetzt; Scheinfrüchte kugelig.

Satnitz Zwgr.

β. *f. subglandulosa* Borb. p. 372; Keller ip. 208. Griffel fast kahl; Blattstiele drüsig behaart; Blättchen elliptisch, nicht selten spitz, auf den Seitennerven so wie auf dem Rücken der Nebenblättchen rothdrüsig; Kelchzipfel so lang oder länger als die purpurnen Kronblätter.

Beide Formen bei Kollegg und St. Martin im Lavantthale Wsbr.

b. **Glandulosae Crép.** Keller p. 208; Borb. p. 374; *Trachyphyllae* Christ. p. 42. Griffelköpfchen stets gross, meist gestutzt kegelförmig, wolligzottig; Blüten gross; meist lebhaft rosa, einzeln oder in Corymben vereinigt, Früchte gross, knorpelig, weich, tiefroth oder scharlachroth bei der Reife, auf drüsenborstigen (nur bei *R. decora*), glatten etwas kürzeren Stielen; Kelchzipfel breit, reich fiederspaltig, abfällig, am Rücken und zumeist auch am Rande dicht und lang stieldrüsig; Deckblätter und Nebenblätter (in der Regel) grösser und breiter, sammt den Blättern unterseits mit hervorstehenden stieldrüsigem Adernetz, Serratur stets zusammengesetzt, vierfach bis doppelt, mit scharfen, feindrüsigem, vorgestreckten oder etwas auseinanderfahrenden Sägezähnen.

1946. 3. **Rosa decora? Kerner.** Zierliche Rose.

Keller p. 209; Borbás p. 374?

Strauch hoch; Blütenzweige weinroth oder grünlich, stachellos, junge Triebe theils mit gebogenen, theils mit geraden, am Grunde verbreiterten, graugelben Stacheln bewehrt, theils stachellos; Blattstiele mit sehr feinen Drüsen bestreut, sonst haar- und stachellos oder schwach bestachelt; Blättchen kahl, oberseits lichtgrün, schwach bläulich angeflogen, Mittel- und Seitennerven weisslich, meist hervortretend, erstere mit feinen Drüsen reichlich besetzt, letztere fast drüsenlos, oval-lanzettlich, lang zugespitzt oder die der untern Zweige eilänglich, spitz oder beiderseits abgerundet; Endblättchen nicht grösser als die seitlichen, letztere kurz gestielt; Serratur unregelmässig doppelt bis dreifach, Sägezähne gross, offen, in ein schmales vorgestrecktes oder zusammenneigendes längliches Spitzchen endigend, an der innern Seite ganzrandig oder an den untern Blättern mit ein bis zwei, an der äussern Seite mit zwei bis drei oder an den untern Blättern mit drei bis sieben in Stieldrüsen endigenden Sägezähnen besetzt; Nebenblätter länglich-lineal, ziemlich gleichförmig verbreitert, haarlos, unterseits hie und da mit einigen Drüsen bestreut, nach oben in kurze, spitze, vorgestreckte Ohrchen endigend, an den Rändern mit kurzen Drüsen dicht besäemt, am Grunde und längs des Blattstieles purpurn; Deckblätter haarlos, länglich, schmal und langzugespitzt oder häufig an der Spitze ein bis drei entwickelte, lanzettliche, gesägte Blättchen tragend, am Rande kleindrüsig-dichtbewimpert, länger als die Blütenstiele; Letztere einzeln oder zu zwei bis drei, ganz kahl und wie die schmal ellipsoidischen bis verlängert eiförmigen, ebenfalls kahlen Receptakeln weinroth, an der verschmälerten Spitze die grossen, am Grunde breit eiförmigen, oben spitzen Knospen tragend; Kelchzipfel ganz kahl, kürzer als die Kronblätter, abfällig, von der Mitte an verschmälert, und mit linealen fast fädlichen Anhängseln, die äussern fiederspaltig mit schmalen linealen, zuweilen mit ein bis zwei secundären Fiederchen versehenen Fiederlappen; Griffel wollig; Diskus flach; Frucht breit-elliptisch; Blüte rosenroth, gross.

β. f. *anomala* Keller p. 210. Zweige grün, Blättchen nicht zugespitzt oder lanzettlich; Sägezähne liegend; Blattstiele stachelig; Kelchzipfel nicht in fädliche, sondern an der Spitze spatelig verbreiterte Anhängsel auslaufend, stets kürzer als die um Vieles grösseren Blumenblätter.

Diese Form der *R. decora* wurde aus dem Lavantthale von Herrn Höfner dem Verfasser zugesendet. Leider sind die Exemplare nicht instructiv genug, daher diese Rose nur mit? aufgenommen werden konnte.

1947. 4. Rosa Jundzilliana Besser forma reticulata? A. Kerner.

Netzadrig Rose.

H. Braun Abhandl. d. zool.-bot. Gesellschaft Wien
1885, p. 77; Fl. v. Regensb. 1819, p. 465 *R. humilis*
Tausch; Keller p. 212?; Borb. p. 377?

Aestchen fast wehrlos; Stacheln gerade oder kaum gebogen; Stachelborsten selten, Blättchen zu fünf, eiförmig-elliptisch, abgerundet, nur die obersten spitz, oberseits glanzlos hellgrün, unterseits licht graugrün, mit hervortretendem Adernetz, beiderseits haarlos, unterseits nur an den Nerven drüsig, welche Drüsen auf den höhern Blättern fast verschwinden; Blütenstielchen stachelborstig und drüsig, Receptakeln und Kelchzipfel drüsigborstig, äussere Kelchzipfel reichlich fiederspaltig, Rand dichtdrüsig, innere schwachdrüsig, am Rande wolligzottig; Blume gesättigt rosa; Frucht nach dem Receptakel zu urtheilen kugelig.

Hecken auf Bergen und Hügeln. † Juni bis Juli.

Ober Terndorf am Maria Saaler Berge bei Klagenfurt in noch nicht vollkommen ausgebildetem Zustande am 20. Juni 1885 gesammelt von Zwanziger, ferner Föhrenwäldchen südlich von Tesendorf Zwgr. 1886.

3. Rotte: *Pimpinellifoliae* De C. Keller p. 213; Borb. p. 338. Meist kleinere Sträucher mit lockerer oder gedrungener dichter Verzweigung; Bestachelung zweifach, pfriemliche mit drüsenborstiger vermengt, mehr oder minder dicht, oder an den Blütenzweigen fehlend; Blättchen zahlreich (sieben bis neun oder sieben bis eilf), einfach bis mehrfach gesägt; Blüten einzeln, selten zu zweien, deckblattlos oder mit Deckblättchen; Kelchzipfel ungetheilt, selten mit ein bis zwei Fiederchen; die mittelständigen Fruchtknoten in der Kelchröhre fast sitzend.

a. *Pimpinellifoliae* Crép. Keller p. 213; Borb. p. 537; Christ. p. 62. Bewehrung meist dichtnadelig; Blättchen klein, zahlreich, vorherrschend einfach und stumpf gesägt; Krone weiss bis hellrosa; Kelchzipfel schmal, fast fädlich endigend, kürzer als die Krone.

1948. 5. Rosa spinosissima L. Sehr dornige Rose.

Keller p. 213; Borb. p. 538; Christ. p. 62.

Wurzel kriechend; Stämmchen aufrecht, sammt Aesten und Zweigen bestachelt; Stacheln pfriemlich und borsten-

förmig; Zweige gedrunken; Blättchen sieben bis eilf, rundlich-oval oder länglich, stumpf, einfach gesägt oder theilweise mit gespaltenen Sägezähnen, Zähnen rechtwinkelig, kurz; Nebenblättchen lineal oder lineal-keilig, erst an den Blütenzweigen etwas verbreitert; Blattstiel fast unbehaart und drüsenlos, mehr, minder bestachelt; Blütenstiele einzeln, meist deckblattlos, stets gerade aufgerichtet, kahl bis drüsig weichstachelig; Receptakeln rundlich oder kugelig, kahl, selten drüsig weichstachelig; Kelchzipfel ganzrandig, schmallanzettlich und zugespitzt, kürzer als die geöffnete Krone, am Rücken kahl, bis über die Fruchtreife bleibend, nach dem Verblühen aufrecht; Griffel wollig; Diskus verschwindend klein; Scheinfrüchte kugelig, aufrecht, schwarz.

Unter den von J. B. Keller aufgezählten Formen fand Verfasser nur *R. pimpinellifolia* L. Aeste und Schösslinge reichstachelig; Blütenstiele kahl oder drüsenborstig; Blüte ziemlich gross, rosenroth, meist gefüllt, wohlriechend.

In Gärten, woselbst sich sehr vermehrend. † Mai bis Juni.

St. Urban ob Glanegg Krabath, Buchscheiden, Obervellach D. P.

Anmerkung. *Rosa reversa* W. K. von der Kühweger Alpe Kkl. in Josch Flora von Kärnten, S. 38, ist nicht zu ermitteln.

b. Alpinae Crép. Keller p. 215; Borb. p. 525; Christ. p. 58. Bewehrung meist schwach oder fehlend; Blättchen zwei- bis dreifach gesägt; Krone meist tiefroth; Kelchzipfel an der Spitze verbreitert; Verzweigung locker.

1. Strauch zwergig; Blättchen klein, meist rund oder fast rund, denen der *Rosa spinosissima* sehr ähnlich, aber Zähnen doppelt gesägt; Kelchzipfel kürzer oder mit den Kronblättchen gleichlang.

1949. 6. Rosa gentilis? Sternberg. Verwandte Rose.

Fl. v. Regensb. 1826, Beil. p. 79; Borb. p. 526?; Koch p. 262.

Blättchen zu neun bis eilf, genähert, am Grunde am breitesten, unterseits an den Nerven drüsenlos, stumpf; Nebenblättchen lineal-keilig, Ohrchen lanzettlich, zugespitzt, auf den Blütenästchen eiförmig; Blüten klein, gesättigt roth; Frucht ovoid oder länglich ovoid, beiderseits etwas verschmälert, nickend.

In der Krummholz-Region. † Juli.

Gumitsch auf der Saualm l. Höfer 1885.

1. Anmerkung. Von Bleiberg-Nötsch liegt ein auf einer sonnigen Schutthalde von dem leider zu früh verstorbenen Doctor Maruschitz gesammeltes mankes, d. h. kleines Blütenexemplar einer Rose vor, die ihrem Habitus nach zur *R. gentilis* Sternb. f. *subsimplax* Borb. p. 533 zu ziehen sein dürfte. Die Blättchen sind länglich oval, die Zähnnchen erster Ordnung endigen in ein längeres theilweise gerades, öfters geneigtes Spitzchen; Blattstiele stachellos, drüsig, Drüsen ungleich gestielt; Mittelrippe der Blättchen behaart und schwach drüsig; Kelchzipfel am Rande schwach drüsig, rothgefärbt wie das Receptakel, innere Zipfel am Rande filzig, sämtliche ohne Seitenläppchen so lang als die Kronblättchen, diese gesättigt-rosa.

2. Anmerkung. Strauch bis 1 m. hoch; Blättchen länglich, meist mehr entfernt stehend; Kelchzipfel so lang oder länger als die Kronblättchen; s. w. 1.

1950. 7. *Rosa alpina* (L.) Aut. Alpen-Rose.

Keller p. 215; Borbás p. 527; Christ. p. 58; Koch p. 263; Wulf. p. 517; Neilr. p. 893; Grke. p. 135.

Stämmchen und Aeste meist wehrlos, seltener, besonders die Schösslinge bestachelt oder borstig; Blättchen zahlreich, sieben, neun bis eilf, länglich elliptisch oder eilänglich, spitz oder stumpf, oberseits dunkelgrün, unterseits blasser mit etwas drüsigem Mittelnerv, kahl bis schwach behaart; Nebenblättchen drüsig gewimpert, lineal-keilig, vom Grunde an in eiförmig-dreieckige grössere Ohrchen auseinander fahrend; Blattstiel drüsig, mehr minder stachelig; Blütenstiele einzeln, mehrmals länger als das Receptakel, stieldrüsig, selten kahl, deckblattlos (bei einer im Malnitzthale wachsenden Form mit sehr breit-eiförmigem Deckblatte), Receptakel drüsig oder kahl, eiförmig bis länglich flaschenförmig; Kelchzipfel ungetheilt, so lang oder länger als die Kronblättchen, diese tief ausgerandet; Griffel wollig; Scheinfrüchte eiförmig oder flaschenförmig, von den aufgerichteten oder zusammenschliessenden Kelchzipfeln gekrönt, entweder aufgerichtet (*R. alpina* L.) oder überhängend (*R. pendulina* L.)

Felsige Gebüsche auf Bergen und in den Alpen bis zur obersten Holzgrenze. † Juni bis Juli.

Satnitz Wulf., Kkl., Zwgr., Abhänge der Goding und Koralm Grf., Saualm Js ch., Kanning und Maltathal Khl m r., Fraganter Alpen Gussbr., Thal bei Heiligenblut Hp pe., bei Feistritz nächst Berg und auf schattseitigen Wiesen am Weissensee Khl m r., Lesachthal J a b., Sattel am Tuffbade K., Wolaja D. P., Plöcken, Tröpolacher-Alm B. R., Raibl N dr st., Kolm bei Eberndorf Grf.

Bisher sind folgende Formen aus Kärnten bekannt geworden:

* Stengelchen und Aeste bewehrt.

α. f. adjecta Déségl. Blattstiele fast kahl oder schwach drüsig und fläumlich, Blättchen eiförmig, stumpf oder elliptisch, Mittelnerv drüsig, Bezahnung doppelt, drüsig; Nebenblättchen unterseits, besonders gegen die Oehrchen zu drüsig; Blütenstiele, Receptakel und Kelchzipfel stieldrüsig; Scheinfrucht gross, nickend, ovoid oder birnförmig.

In Frucht gefunden am 8. August 1885 auf der Kappniger-Alm bei Obervellach an der Holzgrenze D. P.

β. f. intercalaris? Déségl.? Stacheln am Stamme und an den Aesten reichlich, Blattstiele reichdrüsig und stachelborstig; Blättchen nur am Hauptnerv behaart, sonst kahl; Blüten kaum mittelgross, gesättigt rosa.

Im Malnitzthale am Rabischhügel D. P.

** Stengel und Aeste unbewehrt.

γ. f. atrichophylla Borb. p. 527; Keller p. 217. Blättchen ganz oder bis auf die Mittelrippe unbehaart; Blattstiele bestachelt; Blütenstiele drüsig; Scheinfrüchte fast kugelig oder länglich.

Lavantthal Christoph, Sirnitz beim Schlosse Neualbeck, Laschgwand am Malnitzer Tauern D. P., Dobratsch Mar., Obir Preissmn., Malborgeth D. P., Rssmn.

subf. *atrich. denticulata* H. Braun. Keller p. 217. Blätter mit zugespitzten Sägezähnen.

Kühweger-Alm Herb. Kkl.

δ. f. lagenaria Vill. Blattstiele fast kahl oder fläumlich und drüsig, borstlich stachelig; Blütenstielchen meist drüsig borstig, selten ganz kahl; Scheinfrucht flaschenartig verlängert, hängend, kahl.

Kreuzbergl Zwgr., in der Schattseite bei Malborgeth Rssmn.

ε. f. pubescens Koch p. 263; Borb. p. 527; Blattunterseite schwach, Mittelnerv stark behaart; Blattstiele fast kahl und schwach drüsig; Receptakel eiförmig, so wie die Kelchzipfel kahl.

Lavantthal, Saualm Hfnr.

ζ. f. adenosepala Borb. p. 527. Blättchen unterseits behaart, an den Nerven schwach drüsig, Zahnung ziemlich tief; Receptakel und Kelchzipfel drüsig borstig.

Satnitz? Zwgr., Lading im Lavantthale Wsbr.

η. f. norica. Keller p. 217. Blättchen unterseits behaart, drüsenlos wie die länglichen Receptakeln und die langen unterseits rothen schmalen Kelchzipfel; Serratur tief; Griffel weisswollig; Blüten purpurn.

Lavantthal Christoph.

δ. f. pyrenaica Christ p. 59. Blattstiel, Blütenstiele, Kelchröhre und Rücken der Kelchzipfel stieldrüsiger; Scheinfrucht zerstreut weichstachelig.

Malborgeth R s s m n.

4. Rotte: Cinnamomeae De C. Keller p. 218; Borb. p. 522 seq. Aufrechte Sträucher von mittlerer Grösse und schlankem Wuchse, mit meist zimmfärbiger Rinde; Bestachelung zweifach, die der nicht blühenden Zweige krumm, paarweise gegenständig unter den Nebenblättern, die der blühenden Zweige borstenförmig, gerade; Laubtheile drüsenlos, angedrückt, fast seidig behaart, Seratur einfach, kurz; Nebenblättchen der nicht blühenden Zweige lineal-länglich, oft röhrig zusammenschliessend; Deckblätter entwickelt, breit, bläulichgrau; Kelchzipfel aufrecht, ungetheilt und meist ungesägt, bleibend; Blüten purpurn bis weiss; Griffel wollig, frei; Scheinfrüchte früh reif und mehlig, aufrecht.

1951. 8. Rosa cinnamomea L. Zimmtrose.

Keller p. 218; Borbás p. 524; Christ. p. 57; Koch p. 264; Neilr. p. 894; Grke. p. 136.

Aeste lang, rothbraun; Stacheln am Grunde borstlich, abfallend und bei unserer Form foecundissima Koch meistens fehlend; Nebenblättchen ungleich, an den blühenden Zweigen keilig-verbreitert, flach; Blattstiel behaart, manchmal bestachelt, Blättchen zu fünf bis sieben, elliptisch oder eilänglich, etwas keilig, stumpf oder spitz, grasgrün, oberseits kahl (junge schwach flaumig), unterseits flaumhaarig; Zähnen zusammenneigend; Blütenstiele eins bis drei, kurz, von Deckblättchen eingehüllt; Spitzen der Kelchzipfel lanzettlich verbreitert, so lang oder länger als die Krone, aussen so wie die Receptakeln kahl, die kurze, verkehrt-eiförmige oder kugelige Scheinfrucht bleibend krönend; Blume rosenroth in's purpurne, schwach riechend.

In Kärnten nur die halb- oder ganzgefüllte Form, die

R. cinnam. foecundissima Koch. Kelchröhre becherförmig erweitert, unfruchtbar.

In Gärten und in der Nähe derselben verwildert, aber die Winter überdauernd. † Mai bis Juni.

St. Georgen am Sandhof, St. Martin bei Launsdorf Zwgr., Klagenfurt, Tiffen, Obervellach, Tröpolach D. P.

1952. 9. Rosa turbinata Ait. Kreiselförmige Rose.

Keller p. 220; Koch p. 264; Neilr. p. 894; Grke. p. 136.

Stacheln an den Wurzeltrieben gedrungen, zweifach, derbe, gerade oder herabgekrümmte und drüsenborstige, im mittleren Theile des Strauches vorherrschend derbe, zerstreut stehende, Aestchen meist stachellos; Blätter zu fünf bis sieben, gross, flach, oval, stumpf oder spitz, grobgesägt, oberseits grün, unterseits von Flaumhaaren grau; Blattstiele behaart, stachellos; Nebenblättchen länglich oder keilig, an den blütentragenden Zweigen breiter, flach; Deckblättchen oval, kurzgespitzt, flaumhaarig, am Rande drüsenlos, um die Hälfte kürzer als die Blütenstiele, diese, sowie die Kelchröhre meist feinstachelig, drüsenborstig, selten kahl; Kelchzipfel ungetheilt, selten mit einzelnen Fiederläppchen; Spitze theils schmal, theils breitlanzettlich, stieldrüsiger oder drüsenlos, am Rande und auf der Innenseite filzig, kürzer als die Krone; Griffelköpfe gross, weisswollig; Scheinfrüchte ellipsoidisch, birnförmig oder kugelig, von den zuletzt aufgerichteten Kelchzipfeln gekrönt, scharlachroth; Blume purpurroth mit bläulichem Schimmer, wohlriechend.

In Kärnten bis jetzt nur die Form plena bekannt, jedoch in sehr vielen Gärten und Hecken beliebt, gegen Witterungseinflüsse zäher, widerstandsfähiger als *Rosa centifolia* L., bringt reife Früchte.

In Gärten halbverwildert. † Juni bis Juli.

Feldkirchen, Obervellach, Tröpolach D. P.

5. Rotte: **Montanae Crép.** Keller p. 222; Borb. p. 335. Grosse, aufrechte, kräftige Sträucher von dichtbuschigem Wuchse mit graulich bereiften Blättern und Zweigen. Stacheln derb, krumm, zumeist leicht gebogen oder gerade; Blätter zumeist etwas verbreitert, von einander entfernt, mit deutlich vortretenden Nerven; Neben- und Deckblätter stets breit, letztere die kurzen Blütenstiele fast verdeckend; Blütenstand gedrängt; Kelchzipfel einfach oder häufiger fiederspaltig, nach der Blüte stets aufgerichtet und die halbreife Scheinfrucht krönend oder wenigstens bis zur Färbung derselben bleibend; Blume lebhaft rosa gefärbt, selten weiss; Griffel über dem fast immer breiten Diskus zu kurzen, weisswolligen, seltener kurzsteifhaarigen oder kahlen Köpfchen geformt.

a. Blätter kahl.

1953. 10. **Rosa glaucescens Wulf.** Bläulichgrüne Rose.

Wulf. fl. norica p. 518; Roemers Archiv III, p. 376 non Desvaux sec. A. Kerner Schedae ad Fl. exsicc. austr.-hung. N. 460.

Stacheln aus breitem Grunde plötzlich in eine gekrümmte pfriemliche Spitze zusammengezogen, ziemlich kurz und schwach, Rinde dunkelroth oder an den Zweigen violett überlaufen; Blättchen zu sieben bis neun, steiflich, länglich eiförmig, am Grunde ganzrandig, keilig oder eiförmig abgerundet, unterste manchmal fast dreieckig, Zahn an der Spitze dann kürzer als die zwei nächststehenden, sowie die Aeste ganz kahl; Bezaehlung einfach, ziemlich breit, Spaltzähnen sehr selten, Spitze drüsenlos aber hornig; Blattstielchen wenig stachelig bis unbewehrt, Blättchen unterseits weisslich oder bereift, oberseits röthlichviolett bereift, sowie die viel breiteren Deckblättchen am Rande drüsenlos; Blütenstielchen, Basis der Receptakel und Kelchzipfel am Rücken und den Rändern stieldrüsig; Blüten in Doldentrauben; Kelchzipfel viel länger als die Kronblättchen, ungetheilt oder sehr selten mit einem schmalen Seitenläppchen, Spitze lanzettlich verbreitert; Scheinfrucht rundlich; Blüten mittelgross, lebhaft rosa.

Hecken, sonnige Raine im Malnitzthale, classischer Standort Wulfen's.

Anmerkung. Der Strauch im Malnitzthale selbst entspricht der Diagnose am meisten. Die in sonnigen, gegen Mittag geneigten Lagen wachsenden Sträucher bilden sich viel kräftiger aus, die Blätter werden oblong, stehen entfernter, Aeste und Blattstiele werden stacheliger und die Doldentrauben sehr reichblütig, bis zu 28, wo dann die einen Früchte länglich-eiförmig werden, während die an den äussersten Seitenstielchen klein und kugelig sind. In der ersten Entwicklung sind die Deckblättchen und die Blättchen selbst dunkelblutroth, während die später sich entwickelnden Blättchen mehr oder minder oft unterseits blass, auf der einen Hälfte purpurn überlaufen erscheinen. Bei im Schatten stehenden Sträuchern verliert sich die Drüsigkeit auf Blütenstielen und Kelchzipfeln fast oder gar ganz und möchte man die Form für die *R. rubrifolia* Vill. nehmen, wenn der übrige Habitus mit ächten Schweizer Exemplaren dieser Art stimmen würde.

var. *Gutensteinensis* Keller in litt. *Rosa Gutensteinensis* Jacq., A. Kerner Fl. exsicc. austr.-hung. N. 461; *R. rubrifolia* Aut. non Vill. Josch Fl. v. Kntn. p. 38. Unterscheidet sich nach Kerner l. c. durch die um die Hälfte grösseren Blüten und Früchte, durch die blasseren Kronblätter und durch die Serratur der Blätter; diese sind weiter gegen die Basis herab gesägt, als dies bei *R. glaucescens* Wulf. der Fall ist, die Sägezähne sind zahlreicher, lang und schmal und der endständige Zahn ist lang vorgezogen.

Diese Form findet man bei Malborgeth im Kanalthale Rasmn., aber die Blätterfarbe ist freudiger grün, oberseits sogar glänzend. Exemplare von Deutsch-Bleiberg Maruschitz, stehen bezüglich der Bezahnung und Berandung der Blätter in der Mitte zwischen den Malnitzer und Malborgether Pflanzen. Von Bleiberg gibt diese Rose bereits Graf Sternberg als *R. rubrifolia* Vill. an.

Am Loibl kommt diese Pflanze mit breit eiförmig lanzettlichen Blättern, drüsenlosen Blütenstielen und Receptakeln, drüsigen Kelchzipfeln Kkl. und im Bärenthale mit dunkler purpurnen Rinde, schmäleren, unterseits roth überlaufenen Blättchen und drüsig gezähnten Neben- und Deckblättchen vor, Kkl. als *Rosa rubrifolia* Vill., ebenso in Josch's Flora von Kärnten S. 38, in der nur neun Rosenarten aus Kärnten aufgeführt werden, von denen eine, *R. reversa* W. K. von der Kühweger Alpe Kkl. sehr zweifelhaft ist. S. Nr. 1948 Anmerkung.

1954. 11. Rosa Pacheri Keller. Pacher's Rose.

Keller deutsche botanische Monatschrift 1884 N. V., p. 72.

Hoher Strauch, Aeste und Blütenästchen wehrlos, schwarz purpurn; Blattstiele wehrlos, schwach kraushaarig, schwach drüsig; Neben- und Deckblättchen verbreitert, purpurn überlaufen, dichtdrüsig gewimpert; Blättchen fünf bis sieben, mittelgross, breit eiförmig rundlich, unterseits bleich blaulichgrün, oberseits dunkelgrün, kahl, doppelt- oder ungleich dreifachgezähnt, Zähne zusammenneigend, lang zugespitzt, drüsig; Blütenstielchen einzeln, selten zu zwei bis drei, glatt, so lang oder kürzer als die oft blatttragenden Deckblättchen; Receptakel länglich eiförmig, an der Spitze leicht eingeschnürt; Kelchzipfel verlängert, am Rücken geröthet und glatt, am Rande weissfilzig, sämmtliche ungetheilt oder die zwei äusseren mit sehr schmalen hinfalligen Fiederchen; an der Spitze in einen bald schmäleren bald breiteren, ganzrandigen oder gezähnten Lappen erweitert; Kronblättchen gross, freudig purpurn, gegen den Nagel zu fast weiss; Griffel weisswollig, am Diskus sitzend; Frucht eiförmig länglich, gross, viermal so lang als der Fruchtsiel, dunkelpurpurroth, vom bleibenden Kelche gekrönt.

Auf Chloritschiefer im Malnitzthale 1100 m. s. m. †. Bl. anfangs Juli nach der *R. alpina* Aut., die erste Fruchtreife im October.

Bisher nur am Rabischhügel im Malnitzthale D. P.

1955. 12. Rosa cuneata Christ forma **Bleibergensis Keller.**

Keiligblättrige Rose.

Keller in litt. 1885.

Pflanze bläulichgrün, Aestchen dunkelroth überlaufen; Stacheln fein, dünn, gerade; Blättchen oboval, kahl, am Grunde deutlich keilig verschmälert, kurz gestielt oder fast sitzend, Serratur zusammengesetzt, sonst seicht und zusammenneigend; Blattstielchen sehr schwach drüsig und borstig stachelig, mehr kurz; Blütenstielchen ziemlich lang; Receptakel länglich, drüsigborstig oder kahl; Diskus sehr schmal; Kelchzipfel lang, länglich lanzettlich, am Grunde schmal, ärmlich fiedertheilig, wie das Blattstielchen centimatös drüsig (Drüsen bläulich auf mehr weniger langen gelblichen Borsten); Blüten klein, Scheinfrüchte einzeln, oval bis länglich-verkehrt-eiförmig, an der Spitze verengt, von den aufrechten Kelchzipfeln gekrönt, welche erst nach der Fruchtreife abfallen, scharlachroth.

Hecken auf Kalkunterlage. † Juli bis September.

Deutsch-Bleiberg Mar.

Anmerkung. Eine der *Rosa montana* Chaux forma *grandifrons* Christ. p. 178, sehr nahe verwandte Rosenform hat Verfasser ebenfalls von Dr. Maruschitz aus Deutsch-Bleiberg erhalten. Der Strauch dürfte hoch wachsen, was aus vorliegendem Theile eines Schösslings ersichtlich ist; die Blütenästchen sind schwach bläulich bereift; Blättchen breit, rundlich, am Grunde nicht ausgesprochen keilig, manche abgerundet, Zahnung kaum doppelt, am sehr stacheligen Schössling länglich, oval, kurz gespitzt, einfach gezähnt; Blüten und Frucht kurz gestielt, in der Regel wahrscheinlich, wie aus beiliegender reifer Frucht ersichtlich, jedoch hat ein zweites Blütenexemplar, das sonst dem einen im Habitus gleicht, langgestielte Blüten; die Blumenkrone ist gross, ziemlich dunkelrosa; Frucht gross, scharlachroth.

1956. 13. *Rosa glauca* Vill. Graugrüne Rose.

Keller p. 225; Borbás p. 442; R. Reuteri Godet bei Christ p. 165.

Strauch kräftig; Zweige etwas bereift; Stacheln zahlreich, hackig gebogen oder fast gerade und dünn; Blattstiel kahl oder drüsig, an der Rückseite bestachelt; Blättchen zu fünf bis sieben, kurz gespitzt oder zugespitzt, das endständige sehr lang gestielt, kahl, oberseits dunkler, unterseits blass- oder bläulichgrün, meist schwach bereift, daher nicht selten glanzlos seegrün mit deutlich vortretenden, mehr oder minder purpurnen Mittel- und Seitennerven. Blattrand vom Grunde an gesägt, Sägezähne einfach, tief zusammenneigend; Nebenblättchen manchmal purpurn verwaschen, am Rande drüsig, länglich, gegen die Inflorescenz hin bedeutend breiter; Deckblättchen gross, eilanzettlich oder lanzettlich, am Rande

drüsig, bläulichgrün, seltener schwach purpurn oder grün; Blüten gebüschelt zu drei bis sieben in Corymben vereinigt, selten einzeln; Blütenstiele kahl, sehr kurz, sammt den breit elliptischen oder eikugeligen Receptakeln mehr, minder bereift, in den grossen, sie überragenden Deckblättern versteckt; Kelchzipfel während der Blütezeit herabgeschlagen, später aufgerichtet und die halbreife Scheinfrucht krönend, vor der Fruchtreife abfallend, so lang als die Kronblätter, am Rücken kahl, die äusseren stets reichlich fiederspaltig; Krone mittelgross, lebhaft rosa; Diskus flach, breit; Griffel in wolligen kurzen Köpfchen; Scheinfrucht früh reif, die äusseren kugelig, die mittleren oder, wenn einzeln, birnförmig oder länglich verkehrt-eiförmig, gross, orange oder trüb-scharlachroth.

In den Gebirgstälern, wahrscheinlich überall in Kärnten sehr verbreitet, wenn auch nicht überall die gleichen Formen auftreten. † Juni bis Juli.

Um Obervellach häufig, Sagritz, Oberdrauthal, Malborgeth D. P., Bleiberg Mar.

Zur *R. glauca* gehörende Formen sind bis jetzt in Kärnten gefunden worden:

a. Blätter einfach- oder unregelmässig doppelt gesägt.

α. f. Braunii Gndgr. T. 1022. Unterfoliäre Stacheln wirtelig, grössere gekrümmte mit kleineren geraden; Blättchen eiförmig, kurz bespitzt, auch die seitenständigen gestielt, Bezeichnung fein, etwas ungleich; Scheinfrucht birnförmig, sehr kurz gestielt; Kelchzipfel mit schwach drüsig gezähnten Fiederchen; Griffelköpfchen kurz gestielt, sonst die typische Form.

In der Krassau bei Obervellach D. P.

β. f. refracta Gndgr. T. 992. Sehr üppiger Strauch; Blattstiele etwas behaart, mit Anfängen von Drüsigkeit; Bezeichnung ungleich; Kelchzipfel an der Frucht ausgebreitet, nicht aufrecht; Blütenstielchen meist länger als die Frucht; Griffel gross, wollig.

Feld ober dem Schlosse Trabuschgen, Feldzäune im Gstran und bei Räuflach D. P.

γ. f. longepedunculata Keller in litt. Stacheln fast wirtelig, dünn; Blättchen rundlich, mittelgross, Blattstiele wehrlos, etwas fläumlich, Nebenblättchen breit; Kelchzipfel schmal, bleibend, ausgebreitet bis aufgerichtet; Scheinfrucht kugelig; Blüte sattrosa mit weisslichem Nagel.

Bei Flattach und Fragant D. P.

♂. f. *subcanina* Christ. Kelchzipfel theils herabgeschlagen, theils abstehend; Blütenstiele auffallend verlängert; Scheinfrüchte gross; Blattstiele etwas befläumt; Blättchen entfernt stehend (Behaarung der Blattnerven wurde bei Kärntner Pflanzen nicht bemerkt).

An einer Feldmauer bei Semslach im Möllthale D. P., Malborgeth Rssmn.

♂. f. *istriaca* Gndgr. T. 9051. Blättchen um die Hälfte kleiner als bei vorigen Formen, verkehrt-eiförmig oder eilänglich, Bezahlung einfach, Blattstiele drüsen- und haarlos; Receptakeln klein, fast kugelig; Blüten klein.

Deutsch-Bleiberg Mar.

♂. f. *pilosae* Gndgr. *proxima*. Blattstiele fläumlich, dann verkahlend, oberseits röthlich, Neben- und Deckblättchen verwaschen bis trübrot; Blütenstielchen sehr kurz, 4 mm.; Scheinfrüchte sehr gross, an beiden Enden verschmälert, von den aufgerichteten Kelchzipfeln gekrönt, einige Blättchen mit Doppelzähnen als Uebergang zu den folgenden Formen.

Deutsch-Bleiberg Mar.

b. Blätter doppelt oder mehrfach drüsig gezähnt.

γ. f. *complicata* Gren. Blattstiele und Kelchzipfel drüsig; Blütenstiele kahl; Scheinfrüchte kugelig; Blüten schön rosenroth; Mittelnerv der Blattunterseite mit wenigen Drüsen, Serratur unregelmässig doppelt.

Satnitz Zwgr., Berglehnen am Pfaffenberg und Launsberg bei Obervellach, Lassach am Rabischhügel, Sagritz, Teichl D. P., Bleiberg Mar.

♂. f. *inter discretam* Rip. et *Caballicensem* Puget. Keller in litt. Stacheln kräftig, zusammengedrückt, sichelförmig gekrümmt, auf den Blütenästen paarig, ungleich, einige gerade, fast borstig, wirtelig; Blattstiele dichtdrüsig mit sichelförmig gekrümmten Stachelchen besetzt; Nebenblättchen breit, am Rande dichtdrüsig, einige unterseits schwach drüsig; Blütenstielchen lang, spärlich drüsig, fast glatt; Receptakel ellipsoidisch, glatt; Kelchzipfel schmal, am Grunde mit zwei bis drei linealen kleinen Fiederchen, am Rücken drüsig, Drüsen fast sitzend, am Rande drüsig gewimpert, nach der Blüte ausgebreitet oder aufrecht; reife Scheinfrüchte gross, häufig bis in's nächste Frühjahr bleibend und zurückgeneigt, die centrale umgekehrt ei- oder birnförmig, seitliche rundlich oder elliptisch; Griffel dichtwollig-filzig, in einem verlängerten Köpfchen; Diskus fast eben, klein; Kronblätter bleichrosa, etwas länger als der Kelch.

Auf Chloritschiefergestein am Rabischhügel im Malnithale in der Nähe der R. Pacheri Keller, doch häufiger D. P.

ι. f. imponens? Rip. Borb. p. 445. Blättchen eiförmig, Serratur meist doppelt gesägt, Nebenzähnen drüsig, am Grunde nicht lang, aber ausgesprochen keilig, oberseits dunkelgrün, mittlere Blütenstielchen kürzer, seitliche länger als die fast kugeligen oder elliptisch eirunden Früchte; Kelchzipfel sammt den sehr schmalen Fiederchen drüsig gewimpert; Griffel dichtwollig.

Lassach bei einem Feldzaune an der Malnitzer Strasse D. P.

κ. f. venosa? Sw. Déségl. Borb. p. 445. Blättchen eiförmig, durchgehends doppelzählig, Blattnerve hervortretend; Receptakel ovoid; Griffel dichtwollig; Frucht gross, fast kugelig, von den bleibenden Kelchzipfeln gekrönt.

Am Semslacher Bachl an der Mündung des Grabens erst im Fruchtstande gefunden im September 1885 D. P.

Anmerkung. Nach Bräucker: Deutschland wilde Rosen, Berlin 1882 sind *Rosa Reuteri* Godet und *R. glauca* nicht synonym, sondern unterscheidet sich erstere durch längere Blütenstiele, kleine, schmale Bracteen und ebenso drüsenlos und ganz kahl wie die *R. glauca* Vill. Nach Keller hat *R. glauca* Vill. rundliche, *R. Reuteri* God. längliche Früchte.

1957. 14. *Rosa globularis* Franchet varietas Keller. Kugelfrüchtige Rose.

Keller p. 327; Borb. p. 444? non Christ.

Kelchzipfel lang andauernd, aufrecht abstehend; Blüten mittelmässig gross, sehr blassrosa; Serratur der kleineren, elliptischen Blätter schwach transitorisch (nebst Zähnchen 1. Ordnung noch drüsig 2. Ordnung), die Blätter nächst den Blüten scharf und lang zugespitzt; Blattstiele befaumt, drüsig, stachelig oder auch öfters kahl, Hauptrippe haarlos; Blütenstielchen lang, zu fünf bis sieben, kahl, glatt, wie die kugeligen Receptakeln; Kelchzipfel schmal linealisch, Fiederchen drüsenlos in oval lanzettlich drüsig besäumte Deckblättchen eingehüllt.

Eine Rose, welche die Mitte hält zwischen *R. globularis* Franchet, *R. aciphylla* Rau, *R. mueronulata* Déségl. und *R. insubrica* Christ., von welchen Arten aber keine hier wächst, mithin eine Bastardirung nicht stattfinden kann. Unterscheidet sich von *R. globularis* Franchet in der ärmeren Serratur, in den kleineren Blättchen, den stark

gekrümmten, kurzen Stacheln, die ganz kahle Unterseite der Blätter; von *R. mucronulata* Déségl., *R. insubrica* Christ. und *R. aciphylla* Rau in den langdauernden, die unreifen, kugeligen Scheinfrüchte krönenden, einfachen, sehr schmal gefiederten, zierlichen, in schmal lineale Anhängsel endigenden Kelchzipfeln der *Montanae*. So Keller.

An der Malnitzer Strasse ob Obervellach an einer Feldmauer † Juli D. P.

b. Blättchen wenigstens am Mittelnerv sowie die Blattstiele filzig behaart; Blättchen zumeist grösser, lederig, die unpaarigen am Grunde abgerundet, fast herzförmig.

1958. 15. *Rosa coriifolia* Fries. Lederblättrige Rose.

Keller p. 228; Borbás p. 440; Christ. p. 189.

Strauch gross bis sehr gross, mit hin und her gebogenen abstehenden Zweigen von matter grauer Farbe; Stacheln derb und krumm, etwas ungleich, am Grunde stets breit, jene der Blütenzweige nur leicht gebogen, häufig auch kürzer, manchmal gerade; Blattstiele filzig, mit wenigen kurzen Stacheln, drüsenlos (in der Regel), wie alle Laubtheile; Blättchen zu fünf bis sieben, fast lederig, genähert, elliptisch oder eilänglich, gegen den Grund verschmälert und daselbst ungesägt, die seitenständigen oben mehr minder abgestumpft, die endständigen oben scharf bespitzt, am Grunde herzförmig gerundet, oberseits angedrückt behaart, zuletzt verkahlend, unterseits dicht graugrün, filzig und häufig runzlig, einfach gesägt; Sägezähne bald von einander abstehend, bald (an jüngeren Blättern) schwach zusammenneigend (kleiner und schmaler als bei *R. dumetorum* Thuill.), stets drüsenlos; Nebenblättchen länglich keilig, die der blütenständigen Blätter stets grösser, breiter, elliptisch mit vorgestreckten, spitz eilänglichen Ohrchen; Blütenstiele einzeln oder zu drei gebüschelt in Doldentrauben, stets sehr verkürzt und in grosse, eilanzettliche, zuweilen blatttragende, nebst den Nebenblättern grau behaarte, am Rande drüsige und kleingesägte Deckblätter ganz eingehüllt, unbewehrt und kahl wie die vollkommen kugeligen Receptakeln; Kelchzipfel reich fiederspaltig mit ganzrandigen Lappen, grau behaart, drüsenlos, nach der Blüte ausgebreitet oder aufgerichtet, bleibend, erst bei der Färbung der Scheinfrucht oder der Reife derselben abfallend; Blumenkrone lebhaft rosenroth; Griffelköpfchen gross, weisswollig; Scheinfrucht lebhaft roth oder orange in's scharlachrothe, kugelig, fast nussgross, beinahe sitzend oder birn- bis eiförmig,

länger als ihr Stiel, früh reif; Diskus breit; Karpellen kurz gestielt.

Durch die lebhaft rosenrothen Blüten, die eigenthümlich bläulich graugrünen Blätter und bleibenden ausgebreiteten oder aufgerichteten Kelchzipfel von der sonst ähnlichen *R. dumetorum* Thuill. und deren Formen unterscheidbar.

In Gebirgstälern bis hinauf fast bis zur Getreideculturgrenze stellenweise häufig. † Juni bis Juli.

Keutschacherthal Zwgr., Thalebene und sonnige Gehänge bei Obervellach, Lobersberg im oberen Möllthale, Sagritz, Berg D. P., Bleiberg Mar.

Ist eine formenreiche Art, und wurden in Kärnten bisher gefunden:

Modif. coriifol. sclerostephana Gndgr. T. 2451; *f. periacantha* Borb. in litt. 1885. Stacheln sehr ungleich fein, wirtelig, gebogene und gerade untereinander an den Blütenästen, unterste Blättchen fast dreieckig keilig, oberseits fast kahl; Griffel wollig.

Wolliggen bei Obervellach bei 1000 m., Malnitzthal am Rabischhügel D. P.

α. f. pseudo-incana Keller in litt. Pflanze graulich, Zweige dünn, Stachelchen sehr klein, zart, gerade oder gebogen, aber häufig, Blättchen am Grunde verengert, verkehrt-eiförmig, stumpf, deutlich gestielt, einfach gezähnt, selten mit einem Nebenzahne, Kelchzipfel mit wenigen Fiederchen, fast ohne dieselben; Frucht sphaerisch oder kugelig.

Bleiberg Mar., leider nur in einem unvollkommenen Exemplare.

β. f. pseudovenosa H. Br. *modif. lancifolia* Keller p. 229. Stacheln an den Blütenzweigen auffallend kurz; Blättchen eilanzettlich, scharf bespitzt, einfach gesägt, beiderseits dicht anliegend behaart; Blütenstiele ziemlich lang; Griffelköpfchen schwach wollig, Blüten klein, gebüschelt; Scheinfrüchte eiförmig an beiden Enden verschmälert.

Sonnige, trockene Berglehnen bei Obervellach sehr selten D. P.

γ. f. subcollina Christ. Keller p. 229; Borb. p. 439. Blätter mehr minder doppelt gesägt, nicht lederig, matt, unterseits nur an den Nerven behaart, eilanzettlich; Nebenblättchen kurz, schmal, Kelchzipfel oft zurückgeschlagen; Blütenstielchen manchmal doppelt so lang als die eiförmige Scheinfrucht; Griffel verlängert, schwach, behaart, fast kahl.

Zwischen Feldern an Ackerrainen bei Obervellach
D. P.

♂. f. *Vagiana* Crép. Borb. p. 439. Blättchen ziemlich gross, fast lederig, oberseits glänzend, unterseits an den Nerven schwach pubescirend, halb doppeltzählig, die der Blütenästchen gestielt, breit eiförmig, am Grunde herzförmig; Nebenblättchen mit dreieckigen, lang zugespitzten, auseinanderfahrenden Ohrchen; Deckblätter mit dem fruchttragenden Receptakel gleich lang; Blüten in Corymben, Blütenstielchen kürzer als die Scheinfrucht, Kelchzipfel aufrecht, die Scheinfrucht krönend.

Gebüsche an sonnigen Berglehnen bei Obervellach
D. P.

♂. f. *Teichlensis* Keller in litt.

Aeste dünn; Stacheln sichelförmig, wirtelig; Blattstiele filzig, häufig bestachelt, mit sitzenden und gestielten Drüsen sparsam besetzt; Nebenblättchen breit, Ohrchen am Rande drüsig, unterseits fläumlich; Blättchen lederig, ziemlich gross, zu sieben, die seitenständigen kreisrund, das endständige eirund, an der Spitze kurz bespitzt, am Grunde breit abgerundet, halb herzförmig, oberseits kahl, unterseits an der ganzen Fläche pubescirend, gestielt; Blüten in Corymben, Blütenstielchen dem Receptakel gleich oder doppelt länger, kahl; Früchte eikugelig; Kelchzipfel kurz, doppelt fiederig, Fiederchen schmal, grün, am Rande schwach drüsig, zurückgeschlagen; Griffel behaart, manchmal fast kahl; Diskus etwas erhaben; Blüte schwach rosa. Steht in der Mitte zwischen f. *Vagiana* und f. *frutetorum*, während die Griffelbehaarung sie der f. *trichostylis* zugesellt.

Wiesengebüsche am Wege in die Teichl im Möllthale
D. P.

♂. f. *frutetorum* Besser. Blätter von zarter Consistenz, mittelgross, unterseits bleich, verkehrt-eiförmig-elliptisch, oberseits kahl, unterseits an den hervortretenden Nerven fläumlich, Sägezähnen gespalten oder doppelt sägezählig (biserrat); Nebenblättchen länglich fast kahl, Ohrchen abgehend eiförmig dreieckig; Deckblättchen sehr verbreitert, die gebüschelten kurzen Blütenstielchen überragend; Blattstiele dichtflaumig und drüsig; Stacheln zahlreich, dicht gestellt, ziemlich gerade; Kelchzipfel fiederspaltig, häufig mit rothen, kurzen Stieldrüsen besetzt; Krone schön rosenroth, an den Nägeln bleicher; Scheinfrüchte fast kugelig, gross, roth gefärbt.

Auf einer Feldmauer in der Nähe von Semslach im Möllthale D. P.

6. Rotte: **Rubiginosa De C.** Keller p. 230; Borb. p. 336; Christ. p. 104. Meist grosse Sträucher; Bestachelung bei einigen Unterrotten gleichförmig, einfach, bei anderen doppelt, d. i. aus krummen, sehr selten pfriemlichen, derben, breiten und besonders an den Blütenzweigen eingemischten, drüsentragenden, nadel- oder borstenförmigen Stacheln bestehend; Blättchen von mittlerer Grösse oder klein, zu fünf bis sieben, auf der Unterfläche entweder ganz und gleichförmig dicht, oder zerstreut und nur mehr auf den Seitennerven drüsig; Blättchen im ersteren Falle stark riechend und dreifach gesägt, im letzteren geruchlos und nur doppelt gesägt; Behaarung der Blättchen entweder fehlend oder schwach flaumig und nur selten der Blattstiel, die halb entwickelten Gipfeltriebe (Tomentellae) und die Unterseite der Blätter filzig; Serratur zwei- bis dreifach, theils tief und schmal, theils kurz, offen mit sehr kleinen, armdrüsigen Sägezähnen; Kelchzipfel stets fiederspaltig und hinfällig (bei den echten Rubiginosae nach der Blüte aufgerichtet); Blütenstiele oftmals drüsig; Diskus mittelbreit bis breit; Griffel frei oder zu einer Säule vereinigt aber nicht verwachsen, behaart oder im letzteren Falle kahl; Blüten lebhaft rosa bis weiss, meist klein; Scheinfrucht roth, nicht gross, knorpelig, erst spät breiig werdend.

A. Spuriae Keller p. 230. Stacheln einfach gebogen; Blättchen dicklich; Drüsen der Blattunterfläche sehr zerstreut, meist nur an den Seitennerven oder am Rande einwärts bemerkbar; Serratur doppelt, kurz, Sägezähne offen, Sägezähnen sehr klein und kleindrüsig; Kelchzipfel hinfällig; Diskus breit.

In dieser Gruppe wurden die Tomentellae Crép. und Scabratae Crép. vereinigt.

1959. 16. Rosa tomentella Lem. Schwachfilzige Rose.

Keller p. 231; Borbás p. 472; Christ. p. 127.

Grosser, hoher Strauch mit lockerer abstehender Verästelung und kleiner Belaubung; Zweige kurz, die jüngeren etwas rothbraun überlaufen, mit braungrünen, oft röthlichen, manchmal fast filzigen, jungen Gipfeltrieben. Stacheln sehr

breit, dreieckig hackig, lang herabgezogen, zusammengedrückt, gelbbraun; Blattstiele filzig und mit kurzen rothen Stieldrüsen und krummen strohgelben Stachelchen besetzt; Blättchen zu fünf bis sieben, dicklich, klein, rundlich in's obovale mit abgerundetem, fast herzförmigem Grunde und kurzer aber deutlicher Zuspitzung, oberseits dunkelgrün und kahl oder mit zerstreuten anliegenden Härchen bekleidet, unterseits blassgrün und dicht behaart und auf den Mittel- und Secundär-Nerven und an einzelnen Stellen des Blattparenchyms in der Nähe des Blattrandes mit zerstreuten, sehr kleinen, kurzen, röthlichen, leicht abfallenden Stieldrüsen besetzt, welche an den obersten Blättern zumeist fehlen, den doppelt gesägten Rand aber vom Grunde an besäumen. Serratur offen, fast rechtwinklig, mit den Sägezähnen nur etwas zusammenneigend, kurz, mit sehr kleinen, wenigen, oft nur durch deren kleine Stieldrüsen kenntlichen Sägezähnen; Nebenblätter schmal, unterseits schwach behaart oder kahl, am Rande drüsig; Deckblätter etwas verbreitert, eilanzettlich, am Rande drüsig, meist unbehaart; Blütenstiele in Corymben zu drei bis vier oder einzeln, kahl, ungefähr $1\frac{1}{2}$ mal so lang als das gleichfalls kahle, eiförmige Receptakel und die Scheinfrucht; Kelchzipfel reich fiedertheilig, breit, nach der Blüte zurückgeschlagen, vor der Fruchtreife abfällig, am Rücken kahl, mit grünen, breitlancettlichen, filzig berandeten, drüsig gesägten Lappen; Blumenkrone ziemlich klein, Kronblätter weiss, rosig besäumt; Griffel wollig, etwas verlängert; Scheinfrucht klein, kurz und breit ellipsoidisch bis kugelig mit etwas erhabenem breiten Diskus, scharlachroth in's orange-farbene ziehend, spätreif.

Gebüsche und Hecken auf Kalkunterlage. † Juni bis Juli.

Unter dem Dorfe Gluk bei Malborgeth D. P. 1883. 17. Juli bereits in Früchten.

1960. 17. Rosa scabrata? Crép. Rauhe Rose.

Borbás p. 465; Christ. p. 130, jedoch nicht typisch.

Blattstiele haarlos, drüsig und stachelig; Blättchen klein eirund oder eielliptisch, oberseits mehr dunkel-, unterseits graugrün, am Hauptnerv drüsig stachelig, Seitennerven und Parenchym fast drüsenlos, Bezahnung ziemlich kurz, Zähne mehrfach drüsig gezähnt; Blütenstielchen drüsenlos, so lang als das halbrunde Receptakel und kürzer als die unterseits drüsigen, oberseits glatten, drüsig gewimperten und nebst den oberen Nebenblättchen rothangelaufenen Deckblättchen; Kelchzipfel innerhalb wolligfilzig, aussenseits glatt, sammt den Fiederchen drüsig-gewimpert, von der Länge der licht-

fleischrothen Krone oder etwas länger, Diskus etwas erhaben, Griffel dicht behaart; Frucht?

Unsere Kärntnerform dürfte mit *R. scabrata* f. *subrotunda* Borbás p. 467, wenn nicht identisch, so doch sehr nahe verwandt sein.

Siebenhügel bei Klagenfurt, Föhrenwäldchen bei Tesendorf Zwgr.

B. Sepiaceae Crép. Keller p. 233; Borb. p. 476; Christ. p. 115. Blättchen auf der ganzen Unterseite mit zahlreichen Drüsen ungleichförmig dicht besetzt, im Umriss schmal verkehrt-eiförmig, keilig bis lanzettlich, deren Ränder tief und schmal gesägt, Sägezähne langgestreckt, zwei- bis dreifach zusammengesetzt, meist (aber nicht immer) scharf und etwas zusammenneigend; Blütenstiele meist kahl, seltener mit Drüsenborsten versehen; Receptakel kahl; Kelchzipfel auf dem Rücken kahl, seltener mit Drüsen bestreut, lang und meist in schmale lineale Anhängsel auslaufend, herabgeschlagen, seltener aufgerichtet, stets abfällig; Krone meist klein; weisslich; Diskus breit; Scheinfrucht scharlachroth.

1961. 18. Rosa sepium Thuill. Hecken-Rose.

Keller p. 233; Borbás p. 476; Christ. p. 115.

Aufrechter Strauch mit dünnen, reich bestachelten Aesten und Zweigen; Stacheln sehr stark, breit, hackig; Blattstiele unbehaart oder mit wenigen Härchen, mit zahlreichen mehr minder dichtgestellten Drüsen bekleidet, an der Rückseite mit einigen schwach gekrümmten Stachelchen besetzt; Blättchen zu fünf bis sieben entfernt am Blattstiel sitzend, auffallend schmal, länglich verkehrt-eiförmig, keilig in die Basis verlaufend, spitz bis zugespitzt, die der jüngeren Triebe lanzettlich, beiderseits unbehaart, unterseits mit Sitzdrüsen ungleichförmig dicht besetzt, oberseits oft glänzend grün; Nebenblätter länglich, fast gleichbreit, spitz, unbehaart, unterseits und am Rande drüsig, so wie die lanzettlichen kurzen Deckblätter; Blütenstiele unbehaart und drüsenlos, wie die Receptakeln und die Unterseite der Kelchzipfel, ziemlich lang, ungefähr zweimal länger wie das länglich eiförmige oder länglich ellipsoidische Receptakel, einzeln oder zu drei, höchst selten zu mehreren; Kelchzipfel nach dem Verblühen zurückgeschlagen, meist schon vor Färbung der Scheinfrucht abfallend, die äusseren fiederspaltig mit schmallinealen, sehr verlängerten Lappen und Anhängseln, etwas länger als die Kronblätter, nur am Rande mehr minder drüsig gewimpert; Krone klein,

weisslich, manchmal in's fleischröthliche ziehend, seltener rosenroth; Griffel verlängert, kahl oder fast kahl; Diskus flach; Scheinfrüchte meist eilänglich oder ellipsoidisch bis eiförmig, seltener rundlich, von orange in's scharlachrothe ziehend, spätreif.

Hecken, Gebüsch. † Juni bis Juli.

Die typische *R. sepium* Thuill. wird wohl im wärmeren Kärnten vorkommen. Bis jetzt sind folgende Formen bekannt geworden:

* Blütenstiele kahl.

α. f. robusta Christ.? p. 117. Blättchen breit verkehrt-oval, aber nicht genähert, Corymben mehrblütig, Griffel schwach behaart, Blattstielchen flaumig.

Maria Saaler Berg ober Terndorf am 20. Juni 1884
Z w g r.

β. vinodora Kerner; Keller p. 234. Griffel kahl, verlängert in einem kurzen Säulchen zusammenstehend; Blattstiele filzig, Blättchen unterseits behaart, oberseits schwach behaart oder kahl, im Umrisse elliptisch, von der Mitte nach beiden Seiten spitz verlaufend, Sägezähne nach vorn gerichtet und etwas kleiner als beim Typus; Kelchzipfel unterseits drüsig; Krone weiss; Diskus gestutzt kegelig.

Weide ob dem Ranacherbauer auf der Wolliggen bei Obervellaeh D. P., Pontafel Preissm.

γ. f. subglobosa Gndgr. T. 3114. Mittelrippe zottig behaart, Seitennerven kaum behaart, Parenchym kahl; Frucht fast kugelig; Blütenästchen stachelig; Blättchen oberseits kahl, glänzend, gegen den Grund keilig verlaufend.

Malnitzthal ob Lassach D. P.

modific. sphaerocephala Gndgr. T. 3184. Frucht kugelig, Griffel wenig behaart, Blätter unterseits an den Nerven behaart.

Ebendort wo obige D. P.

δ. f. inodora Fries. Griffel kurz, kopfig, dicht behaart; Blättchen unbehaart oder nur unterseits die Mittelrippe befäumt, dunkelgrün, dünn, unterseits dicht kleindrüsig; Kelchzipfel schmal, wagrecht abstehend mit auffallend langen fädlichen Anhängseln.

Um Tiffen D. P.

** Blütenstiele stieldrüsig.

ε. f. Gizellae Borbás p. 479. Blättchen längs des Mittel- und der Seitennerven dicht behaart, scharf dreifach

gesägt; Blattstiel dicht behaart und stieldrüsiger; Kelchzipfel lang mit tiefgesägten, blattartigen Lappen; Blütenstiele den Deckblättchen gleich lang; Receptakel eiförmig, kahl oder am Grunde drüsiger; Blüte weiss, Diskus kegelig; Griffel kurz.

Im Walde am Wege in die Teichl bei 900 m. D. P. 1885.

1962. 19. *Rosa graveolens* Gren. Starkkriechende Rose.

Keller p. 235; Borb. p. 477; Christ. p. 117.

Von *R. sepium* verschieden durch gedrungenen Wuchs, kürzere dichter stehende Zweige; obere Theile roth überlaufen; Bestachelung etwas ungleich, zwischen sehr starken mässig gekrümmten einzelne kleinere übrigens gleich gestaltete Stacheln; Blattstiele drüsiger und filzig behaart; Unterfläche und Rand der Blättchen dicht drüsiger, fläumlich, Oberseite kahl oder sehr spärlich behaart; Drüsen gestielt und dadurch hervortretender als bei *R. sepium* Thuill., Fläche und Umriss des Blattes dadurch rauher; Blättchen kürzer als bei *R. sepium*, breit oboval, vorn sehr oft rundlich abgestumpft (in der Regel), keiliger und plötzlich spitzwinklig am Grunde verschmälert, Zähne erst in der Mitte des Blattes stark hervortretend, Zahnung weniger steil, Zähne breiter, sonst ähnlich; Blüten beim Typus zu drei bis vier in Corymben, oft auch einzeln; Blütenstiele kahl, wesentlich kürzer als bei *R. sepium*, in der Blüte nicht länger als die ebenfalls kahle Kelchröhre und in den Bracteen versteckt, auch im Fruchtstande nur oder kaum so lang als die Frucht; Kelchzipfel nach der Blüte wagrecht, später aufgerichtet, auf der reifen Frucht scheinbar bleibend, auf dem Rücken kahl und von Gestalt der *R. sepium*, doch weniger fiederspaltig, in der Regel noch schmaler und fadenförmig verlängert; Griffel kurz, als dichtes Köpfchen den Diskus überragend, weisswollig; Krone etwas grösser als bei *R. sepium*, hell fleischroth oder weiss; Scheinfrucht rundlich-oval, seltener oval, scharlachroth; Geruch stark balsamischer und dies von der ersten Entwicklung im Frühjahr an bis in den Herbst.

Trockene Weiden, im Möllthale gemein in ausgezeichneten Formen. Keller schreibt von den hiesigen *Graveolentes*: Alle sind ausgezeichnet durch ihren gracilenten Wuchs, dünne, grüne, oft bläulich angelaufene, stets, und zwar wirtelig bestachelte Blütenzweige, scharfe reichdrüsiger, etwas divergirende Serratur der oberseits meist etwas glänzenden, zuweilen schwach drüsiger (am Kapponig), kahlen, unterseits meist nur längs der Nerven behaarten, aber ganz dicht braun drüsiger Foliolen, purpurnen, von feinem kurzen Filze ganz bedeckten, oberseits rinniger und

reichlich roth drüsigen, unterseits von kleinen Aciculen und dünnen Stachelchen bewehrten Petiolen; kurzen, corymbosen, kahlen Pedunkeln, ovalen bis länglichen, nicht kleinen, kahlen Receptakeln und äusserst reichdrüsig gesägten, sehr feinen, in fädliche lange Anhängsel endigenden, am Rücken von der Spitze gegen die Mitte herab drüsigen (oder kahlen) aufrechten Sepalen, oft etwas schwächer wolligen und erhabenen Griffelköpfchen und weissen, nur an den Rändern etwas fleischröthlichen Petalen.

Nach Herrn Keller's Mittheilung und auf dessen ausdrücklichen Wunsch werden die hiesigen *Graveolentes* in zwei Gruppen geschieden und zwar:

* **Genuinae Keller und Pacher** mit mehr, weniger behaarten oder kahlen und am Grunde mit mehr weniger keiligen Blättern.

α. f. Cheriensis Déséglis. Borb. p. 477. Kelchzipfel nach der Blüte aufgerichtet; Receptakel obovoid; Frucht gross, ellipsoidisch, von den bleibenden Kelchzipfeln gekrönt; Blattstiele drüsig, dicht, aber sehr kurz flaumhaarig; Blüten weiss in's fleischfarbige.

Südlicher Fuss des Ulrichsberges, Ehrenthaler-Büchel Zwgr. Im Möllthale am ausgebreitetsten. Sonnige Berglehnen bei Obervellach, Lassach, Flattach, Fragant, Sagritz D. P.

1. In der Teichl wächst eine *modificatio* der *Cheriensis*, zu *Lugdunensis* hinneigend. Unterscheidet sich von ersterer durch schwachfilzige Blattstiele, die unteren Blättchen sind oberseits drüsig, unterseits nur auf dem Mittelnerven wollig filzig; Blütenstielchen kurz; Blütenstand doldig; Receptakel eiförmig; Früchte mittelgross, eirund oder eiförmig bis verkehrt-eiförmig; Kelchzipfel zart, am Rande sammt den fädlichen Lappchen dichtdrüsig; Blättchen entfernt stehend, jüngere oberseits behaart; Stacheln gepaart, subfoliar gestelit; Aestchen zart, grün, bogig; Diskus flach; Griffel dicht wollhaarig; Kronblättchen sanft rosa, gegen den Nagel weiss Keller in litt.

Auf der Buchholzer Tratten in Teichl, einem sonnigen Bergabhang D. P.

2. In der Lassach wächst eine *Modification* der *Cheriensis*, hinneigend zur *Rosa stephanophora* Gndgr. T. 1327; Keller in litt. Blätter unterseits ausser den Nerven hin und wieder behaart, zuletzt kahl, oboval, seltener oboval-länglich oder elliptisch, Endblättchen an beiden Enden zugespitzt, Zahnung schmal, scharf, sehr drüsig; blühende Aeste stachelig; Kelchzipfel bleibend, aussenseits schwach drüsig, nach dem

Verblühen aufgerichtet; Receptakel eilänglich; Frucht gross, länglich verkehrt-eiförmig, ziemlich lang gestielt; Blume weiss, mit einem Tone in's Röthliche.

An der Malnitzer Strasse beim Lassacher Kreuz D. P.

3. Eine weitere Modification der *Cheriensis* steht nach Keller in litt. zwischen der *R. aspera* Schleicher und *R. stargardiensis* Gndgr. Sie hat eiförmig gerundete Früchte; Kelchzipfel an der noch unreifen Frucht abstehend; Blättchen am Grunde weniger zugespitzt, mehr eiförmig, unterseits schwach haarig, bleichgrün, Zahnung tiefer, breiter, weniger scharf; Stacheln weisslich, kräftig, sichelig gekrümmt, am Grunde breit, gleichförmig; Griffel mehr hervortretend, zottig behaart.

Auf trockenen, sonnigen Berglehnen, dünnen Weiden um Obervellach, Fragant im Möllthale D. P.

β. f. *Vallis Möllae* Keller et Pacher. Stacheln wirtelig, ungleich, zart, sehr spitzig, gerade oder schwach geneigt, am Grunde wenig erweitert, Wuchs gracil; Blättchen zu fünf, oboval (nicht länglich oboval), spitz, oberseits glänzend, auf den tieferen Blättchen schwach drüsig, unterseits auf der ganzen Fläche schwach behaart und sehr dicht rostfärbig-drüsig, später blos an den Nerven hin und wieder zottig behaart; Blütenstielchen (zwei bis drei) kürzer oder mit den Receptakeln gleichlang; Scheinfrucht länglich (oder ovoid-länglich, 8 mm. breit, 13 mm. lang), am Grunde abgerundet; Blattstiele rostfarbig-zottig, Drüsen purpurn, gestielt, der ganzen Länge nach mit zarten Acikeln häufig besetzt und mit zarten, fast geraden Stachelchen bewehrt; Nebenblättchen kurz zugespitzt, unterseits dicht rostfärbig behaart; Kelchzipfel zugespitzt, verlängert, Anhängsel am Rücken mit purpurnen Drüsen besetzt, am Rande drüsig gezähnt, nach der Blüte aufrecht oder ausgebreitet, bis zur Fruchtreife bleibend; Griffel frei, bald auf dem flachen Diskus sitzend (fast kopfig), dann zottig, bald mehr minder gestielt, dann weniger dicht zottig; Blüten weiss mit einem Tone in's röthliche.

Auf sandigen Waldweiden an der Möll bei Obervellach D. P.

γ. f. *Lugdunensis* Déségl.; Borb. p. 478. Griffel dicht wolligzottig, Blättchen, Receptakel, Blüten die kleinsten der Art, letztere rosa, die sphärische Scheinfrucht vom bleibenden Kelche gekrönt.

Trockene, sandige Plätze. † Juli.

Kapponig bei Obervellach bei 1000 m. Höhe, Stall, Heiligenblut D. P.

δ. f. Vaillantiana Boreau; Borb. p. 478. Blättchen mittelgross, verkehrt, eiförmig, oberseits kahl werdend, unterseits drüsig, flaumhaarig, manchmal auch auf der Oberseite drüsig; Blütenstielchen kurz, von den eiförmigen zugespitzten mit den Nebenblättchen unterseits drüsigen Bracteen überragt; Receptakel ovoid oder fast kugelig; Kelchzipfel die kugelige grosse Scheinfrucht vor der Fruchtreife krönend; Blüte weiss.

Auf trockenen Weiden ziemlich häufig. † Juli.

Schattseite und Kapponigberg bei Obervellach, Fragant D. P.

Anmerkung. Nicht typische Formen von *R. graveolens* Gren. liegen noch vor aus dem Keutschacherthale, vom Südfusse des Ulrichsberges und von Ehrental Zwgr.

**** Latifoliae Keller und Pacher.** Blättchen am Grunde am breitesten.

1963. 20. Rosa Kokeilii Keller et Pacher. Kokeil's Rose.

Keller in litt.

Nicht blos das End-, sondern auch wenigstens die beiden obersten Seitenblättchen am Grunde oder wenigstens im unteren Drittel am breitesten, unterseits graugrün, mit vorragenden, blassen, filzigen Seitennerven, oft auch des ganzen Adernetzes Fläche meist dicht anliegend behaart, armdrüsig; Serratur offen, an *R. rubiginosa* L. erinnernd, auch am Grunde kleindrüsig gesägt; Nebenblättchen filzig berandet; Corymbus drei- bis fünfblütig, bis einblütig; Blütenstiele kahl; Receptakeln eiförmig oder länglich-eiförmig; Kelchzipfel am Rücken und an den Rändern dichtdrüsig, aufgerichtet, bleibend; Griffel wollig-zottig.

An einer sehr sonnigen Berglehne ob Fragant am 7. August 1885 schon verblüht gefunden D. P.

Anmerkung. Keller bemerkt hiezu: Nach der Braun-Kernerischen Manier müssten die *Graveolentes* nach Behaarung oder Kahlheit der Blattflächen aufgefasst und sämtliche behaarte zur *R. elliptica* Tausch gestellt werden, welcher Vorgang aber unrichtig sei, weil man dann in grosser Verlegenheit wäre mit der Unterbringung der unterseits mehr weniger behaartblättrigen, dabei aber keilig- oder doch nach dem Grunde verschmälert-blättrigen *Graveolentes*.

C. Rubiginosae verae Déségl. Keller p. 238; Borb. p. 489; Christ p. 104. Blättchen breit, im Umriss eirund bis rundlich, unterseits stets gleich-

förmig dichtdrüsig, von merkbarem Geruche; Serratur kurz, offen; Sägezähne nicht nach vorne gestreckt; Rücken der Kelchzipfel und die Blütenstiele dicht stieldrüsiger (mit Ausnahme der *Heteropodae*), letztere oftmals stacheldrüsiger; Blüten dunkler oder lichter rosenroth (selten weiss), zumeist klein und zahlreich; Scheinfrüchte roth, oftmals frühreif und dann scheinbar schwarz.

1. **Micranthae Crép.**; Keller p. 238. Aeste und Zweige fast immer einfach bestachelt; Stacheln hackig, meist ohne eingemischte Stachelborsten; Jahrestriebe zickzackförmig hin- und hergebogen; Blättchen zum Grunde verschmälert; Serratur ziemlich tief, an die der *Sepiaceae* erinnernd; Blütenstiele so lang oder länger als die Scheinfrucht, ohne oder fast ohne Stachelchen; Krone blassrosa; Griffel kahl; Scheinfrucht scharlachroth.

1964. 21. **Rosa micrantha Smith.** Kleinblumige Rose.

Keller p. 240; Borbás p. 492; Christ p. 110.

Lockerer, hoher Strauch mit bogig überhängenden Jahrestrieben und Aesten; Stacheln alle gleichförmig, stark, aus breitem Grunde hackig gebogen, theils zerstreut stehend, theils am Grunde der Nebenblättchen zu zwei; Blütenzweige oft wehrlos; junge Triebe roth; Blattstiel mehr minder behaart, oft filzig, dicht drüsig und bestachelt; Nebenblätter lineal, am Rande drüsig gesägt, alle oder die unteren auf der Unterseite dicht röthlich drüsig, oft auch behaart mit auseinanderfahrenden spitzen Oehrchen; Blättchen zu fünf bis sieben, breit oval mit etwas verschmälertem Grunde, oberseits zerstreut behaart, unterseits nebst den Nerven dicht flaumhaarig und von röthlichen (oft schwachen) Drüsen dicht besetzt; Serratur doppelt bis mehrfach, Sägezähne ziemlich tief und schmal; Deckblätter lanzettlich zugespitzt, am Rande drüsig, meist kürzer als die Blütenstiele, häufig durch entwickelte Laubblätter ersetzt; Blüten gebüschelt, von ein bis acht; Blütenstiele stets länger als die Scheinfrüchte mit gleichförmigen, weichen Stieldrüsen besetzt, seltener einzelne Drüsenstiele grösser, aber nicht stachelig; Receptakel ellipsoidisch, kahl oder nur am Grunde schwach stieldrüsiger; Kelchzipfel auf dem Rücken schwach drüsig, die äusseren fiederspaltig mit lanzettlichen Fiederlappen, am Rande drüsig, nach der Blüte stets zurückgeschlagen und vor Färbung der Scheinfrucht abfällig; Krone klein oder ziemlich klein, blass-

fleischfarben angehaucht; Griffel kahl, ziemlich lang; scheinbar eine Säule bildend, doch aber von den Staubfäden eingeschlossen, mit kleinen flachen Narbenköpfchen; Scheinfrüchte nicht gross, eiförmig, häufig ellipsoidisch oder schwach flaschenförmig mit breitem flachen Diskus, scharlachroth, säuerlich.

Hecken, Waldblössen, auf Weiden. † Juni bis Juli.

Thalsole bei Räuflach und Semslach und auf der Wolliggen D. P.

Von den verschiedenen Formen sind bisher in Kärnten gefunden worden:

a. Blütenzweige unbewehrt oder sehr selten bewehrt.

α. f. operta Puget; Keller p. 241; Borbás p. 492. Blattstiele flaumig, drüsig bestachelt, verlängert; Receptakel länglich, am Grunde öfters stieldrüsig; Blättchen ziemlich gross, an den Hauptnerven unterseits fläumlich, auf den Secundärnerven schwach pubescirend; Blütenstiele zu drei oder einzeln; Krone rosenroth.

Sonnige Berglehnen bei Stallhofen, Semslach, Laas ob Fragant D. P.

β. f. Pommaretii Pug. var. *attenuatissima* Gndgr. T. 3474; Keller in litt. Aeste verlängert, entfernt stachelig (*Pommaretii* ist nach Borb. p. 490 unbewehrt); Blättchen mittelgross, sämmtlich am Grunde verengt, untere an der Spitze abgestutzt oder stumpf, obere zugespitzt, verkehrt-eiförmig-rundlich oder eiförmig-elliptisch, auf den unfruchtbaren Aesten elliptisch-lanzettlich, oberseits kahl, unterseits an den Seitennerven, manchmal auch an der Blattfläche drüsig, Mittelrippe zottig behaart; Blattstiele zottig, kahl werdend, dicht drüsig, mit zarten Stachelchen bewehrt; Blütenstielchen doppelt länger als das Receptakel, drüsig; Blütenstand corymbos; Receptakel länglich, kahl; unreife Scheinfrüchte an der Spitze verengt; Kelchzipfel schmal, fiedertheilig, am Rücken drüsenlos abstehend; Diskus sehr schmal, eben; Griffel kahl; Blüte schwach rosa, reife Scheinfrucht ebenfalls *attenuat*.

Sonnige, trockene Waldblössen um Obervellach D. P.

b. Blütenzweige bestachelt.

Am nächsten der *R. micrantha* Sm. stehen von den hier wachsenden *Micranthen*:

γ. f. cacosoma Gndgr. T. 3367; Keller in litt. mit drüsigen Receptakeln und *f. pallescens* Gndgr. T. 3389;

Kell. in litt. mit kahlen Receptakeln, beide sind *homacanth* (gleich gestaltig bestachelt); deren Scheinfrüchte sind länglich; Blattstiele und Blättchen unterseits behaart, abgerundet oder eiförmig-abgerundet; die hispide Form ist jedoch dunkler und hat rundliche Blättchen. Die Repräsentanten, wachsen auf einer Berglehne ob Fragant D. P., weisen auf demselben Aestchen kahle und drüsige Receptakeln auf.

♂. f. *Lemanii* Boreau; Keller p. 241; Borb. p. 492; Christ. p. 113 als *R. Hystrix* Backer. Blüentragende Zweige zahlreich, kurz; Blättchen klein, elliptisch; Stacheln lang, gebogen, meist rötlich gefärbt; Blütenstiele einzeln oder gebüschelt; Receptakel oblong, kahl oder mehr oder minder drüsenborstig, kürzer als die Blütenstiele, diese gleichförmig und sehr zart stieldrüsige; Krone lebhaft rosenroth, die schmalen Kelchzipfel am Rücken drüsig, nach der Blüte zurückgeschlagen, früh abfallend; Diskus flach.

Schattseitige, dürre Weide bei Obervellach D. P.

1. Hierher die Modification *R. Lemanii cyanescens* Gndgr. Decas Fasc. II, p. 23, 1876. Verschieden durch stachellose Blüenzweige; kleine, unterseits bläuliche, eiförmige, an der Mittelrippe (*costa*) schwachzottige Blättchen; Blattstielchen kurzhaarig bis kahl, dicht drüsig, mehr minder bestachelt; Blütenstielchen zwei bis vier, sehr drüsig, 6—12 mm. lang; Receptakel oblong oder oblong-ovoid (bei 12—13 mm. lang, 6—7 mm. breit), ganz, aber zerstreut bestachelt borstig; Scheinfrucht länglich; Krone gesättigt rosa.

Zwischen Raufen und Semslach in der Thalsohle D. P.

2. f. *Lemanii pseudoremotior* Gndgr. T. 3469 = *R. subhebegynia* Borbás in litt. Blättchen doppelt kleiner als bei *R. micrantha* Smith. Zweige bewehrt oder unbewehrt, Früchte oberhalb halsförmig verengert und oblong-ellipsoidisch oder oblong; nur durch mindere Drüsigkeit von der Gandoger'schen *pseudoremotior* abweichend, welche bereits 1882 in drei verschiedenen Schriften von Gandoger publicirt wurde. Keller in litt.

♂. f. *permixta* Déségl.; Keller p. 241; Borb. p. 492; Christ. p. 111. Receptakel eiförmig; Stacheln derb, hackig gebogen, breit, Bewehrung manchmal *heteracanth* (verschieden gestaltet), jedoch immer nur schwach angedeutet; Blättchen oval, an Grösse die der *R. Lemanii* fast doppelt übertreffend, daher zu den *Macrophyllis* Crép. gehörig, während *R. Lemanii* mit ihren nächsten Modificationen zu den *Microphyllis* Crép. zu zählen ist.

Die am häufigsten vorkommende Form der *R. micrantha* Smith sowohl in der Thalsohle als auf der sonnseitigen

Gebirgsabdachung bei Obervellach, noch bei 1000 m. h. m. am Pfaffenberg, Wolliggen D. P.

ζ. f. *parallela* Gndgr. T. 3510; Keller in litt. Eine bezüglich der Griffelbildung ausgezeichnete Mittelform zwischen *R. micrantha* Sm. f. *Lemanii* Bor. und *R. rubiginosa* L. Receptakel glatt, Griffel in der Stärke der *rubiginosae*, am Grunde in ein kurzes Säulchen zusammengestellt, also ein breites säulenartiges Bündel bildend, jedoch kahl; Blüten klein, purpurn, am Grunde bleich, in's weissgelbe übergehend. Sind jedoch die Receptakeln stieldrüsiger, so ist es die Form *R. exquisita* Gndgr. T. 3546; Keller in litt. Beide Formen haben eiförmig-ellipsoidische Receptakeln und kahle oder sehr schwach behaarte Griffelköpfchen. Bei einem Blütenästchen zeigte die eine Blüte das charakteristische dicke, die andere das charakteristische dünne hohe Griffelsäulchen. Mithin scheint die *R. parallela* Gndgr. ein Bastard zu sein.

Dürre, steinige Berglehnen am Pfaffenberg bei Obervellach und in Lassach D. P.

2. **Suavifoliae Crép.** Keller p. 242; Borb. p. 490. Bestachelung einfach oder doppelt, im letzteren Falle die derben Stacheln hackig und nur die Blütenzweige theilweise stieldrüsiger, unfruchtbare Triebe gerade; Kelche nach dem Verblühen zumeist aufgerichtet, und das Receptakel, beziehungsweise die grüne (unreife) Scheinfrucht durch mehr minder lange Zeit krönend; Griffel kurz behaart oder wollig.

1965. 22. **Rosa rubiginosa L.** Rostfarbigblättrige Rose, Weinrose, schottische Zaunrose.

Keller p. 242; Borbás f. *isacantha* p. 493; Christ p. 104.

Aufrechter, starker, hoher Strauch von gedrungenem Wuchse mit dichten Zweigen; diese mit zahlreichen, kräftigen, breiten, aber zusammengedrückten hackigen, grauen oder weisslichen Stacheln besetzt, die an den Blütenzweigen in gerade, zumeist borstliche, gelbe Stachelchen theilweise übergehen; Blattstiele behaart und drüsiger, unterseits stacheliger; Blättchen zu fünf bis sieben, mittelgross, rundlich oval bis breit elliptisch, unterseits mit angedrückten Haaren bestreut und dichtdrüsiger klebriger, dadurch schmutziger- oder bräunlichgrüner, doppelt drüsiger-gesäger; Serratur offen, fast rechtwinklig, kurz und breit, mit unregelmässiger doppelten bis mehrfach zusammengesetzten drüsigeren Sägezähnen; Nebenblätter lineal-länglich oder keiliger, schmal, unbehaart, unterseits und am

Rande drüsig, mit spitzen, auseinanderfahrenden kurzen Oehrchen; Deckblätter spitzoval, beiderseits kahl oder nur unterseits und am Rande drüsig, länger als die Blütenstiele, diese einzeln, seltener gebüschelt; Receptakel klein, eiförmig, gegen die Spitze eingeschnürt, kahl oder drüsenborstig; Kelchzipfel auf dem Rücken dichtdrüsig, gegen die Spitze verbreitert, zwei ungetheilt, die drei äusseren fiederspaltig mit kurzen, lanzettlichen, grünen, am Rande drüsigen Fiederlappen, nach der Blüte herabgeschlagen, später ausgebreitet oder aufgerichtet, meistens aber vor der Färbung der Scheinfrucht hinfallig; Griffel dicht, kurz, steifhaarig oder fast kahl, in einem deutlichen Köpfchen auf dem Diskus sitzend; Blüten rosa, oft klein; Scheinfrüchte oval, an beiden Enden breit gerundet oder fast kugelig, blutroth, knorpelig, zuletzt fleischig.

Meist auf dünnen, sandigen Weiden oder steilen sonnigen Berglehnen in mehreren Formen:

α. f. *isacantha* Borbás p. 493; Keller p. 244. Bestachelung einfach; Blüten rosenroth; Griffel kurzhaarig; Blättchen eiförmig, mittelgross, untere Nebenblättchen auf der Aussenseite drüsig; Receptakel eiförmig; Kelchzipfel nach der Blüte abstehend, am Rücken schwach drüsig, äusserste dichtdrüsig, mit breiten, oft blattartigen Lappen und Anhängseln, Blütenstiele meist nur so lang als die Scheinfrucht, diese eiförmig-kugelig.

St. Peter am Bichl, Südfuss des Ulrichsberges, Siebenhügel Zwgr., Schattseite bei Obervellach, Lassach, Sagritz D. P.

β. var. *benearmata* Gndgr. T. 3670; Keller in litt. Sämmtliche Blattstiele zottig behaart; Blättchen eiförmig, am Grunde abgerundet, oberseits hin und wieder drüsig; Blütenäste bestachelt; Receptakel oblong, verkehrteiförmig-länglich, am Grunde borstig; Frucht abgerundet, an der Spitze eingeschnürt. Nach Keller die Var. *Pailoti* Gndgr. der *R. isacantha*.

Wunzenbachgries nahe der Möll bei Obervellach D. P.

γ. f. *pulchra* Gndgr. T. 1659 teste Keller. Blütenzweige nicht drüsig borstig; Blattstiele und Blättchen behaart; Blütenstand corymbos, zwei- bis dreiblütig, Blütenstiele gleichförmig stieldrüsig; Kelchzipfel auf dem Rücken drüsig, bleibend; Griffelköpfchen gross, kurz steifhaarig, später verkahlend; Scheinfrucht kugelig, am Grunde drüsig borstig; Blume klein, tief rosa.

Auf einer dünnen, schotterigen Weide in der Schattseite bei Obervellach D. P.

δ. f. *dimorphacantha* Martinis; Borb. p. 493, *R. consanguinea*? Gren.; Kell. p. 243. Auf den Blütenästen kleine borstenförmige Stachelchen; Griffel fast kahl; Blättchen unterseits nur drüsig; Receptakel drüsenborstig; Früchte klein.

Bei Groppenstein und an einer Feldmauer unter Söbriach D. P.

ε. f. *setocarpa* Borb. et Holuby. p. 494. Griffel behaart; Blättchen mittelgross, elliptisch oder eiförmig elliptisch, an der Mittelrippe schwach behaart; Receptakel ovoid; Blüten in einem dichten Trugdöldchen bis einzeln; Frucht borstig stachelig.

Bei Söbriach und Laas ob Fragant D. P.

ζ. f. *comosa* Rip.; Keller p. 245; Borbás p. 494; Christ. p. 106. Behaarung der Blättchen unterseits deutlich; Serratur scharf, tief, fein; Drüsen des Blattrandes und Rückens des Kelchzipfel weisslich schimmernd; Kelchzipfel und deren Lappen auffallend lang, schmal zertheilt, am Rücken oft fast drüsenlos, bis zur völligen Reife die Scheinfrüchte krönend; letztere länglich-oval oder oval-rundlich, nach beiden Seiten, insbesondere aber gegen den Grund, der meist unbestachelt erscheint, verschmälert; Drüsenborsten der Blütenstiele sehr dünn und lang; Bestachelung nicht selten einfach, die derben gebogenen Stacheln sehr lang, ziemlich schmal.

Um Obervellach die am meisten verbreitete Form der *Rubiginosae* D. P.

1. f. *comosa* var. *alsogenes* Gndgr. T. 3743 sec. Keller. Stacheln beständig gleichgestaltig, mit breiter Basis, stark, sichelförmig gekrümmt, Fruchtstand corymbos, drei bis neun; mittelständige Früchte oblong, sehr kurz gestielt, seitliche länger gestielt, kegelförmig oder ovoid-oblong; Blättchen am Grunde gerundet, Frucht glatt, und

2. *comosa* var. *anisocarpa* Gndgr. T. 3744. Blättchen am Grunde keilig; Früchte borstig, sonst w. v.

Beide auf schattseitigen Weiden bei Obervellach D. P.

η. f. *densa* Timb.; Borb. p. 493. Blättchen sehr klein, oberseits kahl, unterseits an den Nerven fläumlich; Blüten einzeln mit den ovoiden oder elliptischen Receptakeln, sehr klein, diese am Grunde borstig; Griffel behaart; Stacheln kräftig, gekrümmt.

Erlenau bei Ehrenhausen Zwgr., auf trockenen Weiden um Obervellach, Lassach, Groppenstein, Heiligenblut noch bei 1600 m. D. P.

Anmerkung. Eine bisher nicht einzureihende Form liegt vor aus der Erlenau bei Ehrenhausen Zwgr.

Nun kommen zwei Formen, welche gleich in der Mitte zwischen den *Graveolentes* als Übergangsformen zu den echten *Rubiginosae* stehen und welche von Gandoger mit Anverwandten als eigene Abtheilung: **Heteropodae** zusammengefasst wurden, und deren gemeinschaftlichen Charakter also definirt: Blütenstielchen entweder kahl oder behaart oder glatt oder drüsig am selben Aestchen; Griffel dicht behaart; Blätter eiförmig oder verkehrt-eiförmig, oberseits kahl, an den Nerven meist behaart; Früchte verkehrt-eiförmig oder länglich. — Bei den Obervellacher Heteropoden sind die Blütenstielchen nur kahl oder stieldrüsig, nicht behaart; die Scheinfrüchte eiförmig oder ovoid-eiförmig; die Stacheln zahlreich, einige gebogen, andere gerade oder geneigt, daher der Form *R. heteropes Willkommiana* Gndgr. T. 3354 nahe gerückt.

1966. 23. *Rosa heteropes* Gndgr. f. *Flattachensis* Keller et Pacher.

Keller in litt.; *R. micrantha* forma *sublaevipes* Borb. in litt.

Aeste sehr stachelig; Stacheln wirtelig, kräftig, ungleich, grössere fast sichelig gekrümmt, erdfärbig, kleinere etwas geneigt, gelblich (nach Christ im bot. Centralblatt 1884 an spanische, wenigstens südländische Rosen erinnernd), drüsentragende Stachelchen kaum vorhanden; Blattstiele fläumlich oder fast filzig, mit gestielten oder sitzenden, bräunlichen oder weisslichen Drüsen dicht besetzt, mit gelblichen Stachelchen bewehrt; Blättchen fünf bis sieben, mittelgross (untere klein), bleichgrün, obere eiförmig oder eiförmig-elliptisch, untere verkehrt-eiförmig oder etwas in's längliche, am Grunde gerundet, an der Spitze stumpflich oder spitzig, oberseits kahl, selten mit einzelnen zerstreuten Drüsen besetzt, unterseits bei den unteren die Nerven fläumlich, drüsig, an der Fläche sparsam behaart, aber dicht drüsig, obere Blättchen der fruchtragenden Aeste an Nerven und Rippen drüsig, Mittelrippe schwach flaumig, Fläche kahl, bis zum Grunde gezähnt, Bezahnung offen, mehr den *Micranthen* als *Rubiginosen* ähnlich, doppelt drüsig, Zähne erster Ordnung breit-lanzettlich, zweiter Ordnung in eine kleine Drüse endend; Nebenblättchen schmal, kurz, am Rande dichtdrüsig, unterseits drüsig und fläumlich, an den Fruchttästen verkahlend; Blütenstielchen verkürzt (4—6 mm. lang), doppelt kürzer als die Frucht, einige (auf demselben Aestchen) glatt, andere zerstreut stieldrüsig, am Grunde mit zwei Deckblättchen, diese schmal-

lanzettlich, am Rücken und Rande behaart und drüsig, so lang als die Blattstielchen oder länger; Receptakeln zur Blütezeit purpurn, glatt, eiförmig-elliptisch, unreife Frucht breit-eiförmig oder eiförmig-länglich, seitenständige eirundlich (13 mm. lang, 12 mm. breit), an dem kurzen Aestchen zu drei bis fünf in einem Corymbus; Kelchzipfel spät abfallend, aufrecht, länger als die Kronblättchen, schmal fiederig, Fiederchen am Rande dicht drüsig-gezähnt, am Rücken mit gestielten und sitzenden Drüsen besetzt; Diskus flach; Griffel kopfig, dicht zottig-behaart; Kronblättchen mittelgross, dunkelrosa, Nagel bleicher.

Palan zwischen Söbriach und Flattach, Laas D. P.

Anmerkung. Von dieser Rose schreibt Keller: Diese prächtige Rosenform ist in der österreichisch-ungarischen Rosenflora bislang mit keiner bisher beschriebenen Rose in wirkliche, nächste Verwandtschaft zu stellen; sie gehört zu jenen Rosenformen die den Uebergang jener von Christ l. c. vortrefflich gekennzeichneten mediterranen Rosenarten in unsere gemeineren mitteleuropäischen Rosenarten darstellen. Sie kann eine *Micrantha* nicht sein, denn sie besitzt einen auffallend breiten, den Diskus ganz verdeckenden und dabei dicht behaarten (wollig-zottigen) Griffelknopf, aufgerichtete (nur den *Graveolentes* und *Suavifoliis* eigene) Kelchzipfel und sehr lebhaft rosenrothe, fast purpurescirende Kronblättchen. Auch ist der Name *sublaevipes* Borbás in litt. mit *heteropes* Gndgr. gleichbedeutend und letzterer hat die Priorität für sich.

1967. 24. *Rosa heteropes f. montigena* Gndgr. T. 3348.

Keller in litt.

Bestachelung einfach, etwas ungleich; Blätter eiförmig, abgerundet, untere fast kreisrund, gegen den Grund zu fast keilig; Bezahnung kurz, fast rechtwinklig, Rand dichtdrüsig; Blütenstielchen bald glatt, bald mehr minder stieldrüsig, kahl; Receptakel am Grunde stieldrüsig; Kelchzipfel länger als die Kronblättchen, später aufrecht, die meist kahle, grosse längliche Scheinfrucht krönend, am Rücken mehr weniger stieldrüsig; Diskus klein; Griffel dicht behaart; Blume gesättigt rosa.

In sehr sonniger, warmer, von Winden geschützter Lage am Wege nach Groppenstein auf Kalkglimmerschiefer (Cipollin) bei 700 m. s. m. Juli D. P.

Anmerkung. Während *R. heteropes* Flattachensis, schreibt Keller, ein Kettenglied zwischen *R. graveolens* Gren. und *R. rubiginosa* L. ist, stellt diese *R. montigena*

eine Verbindungsform der *R. graveolens* Gren. mit *R. micrantha* Crép. vor.

7. Rotte: **Tomentosae Crép.** Keller p. 248; Borb. p. 336; Christ. p. 90. Grosse Sträucher mit weitverzweigten, lockeren Aesten und grossen, bogig verlängerten, sterilen Trieben; Bestachelung einfach, Stacheln derb, schmal, am Grunde nicht oder nur wenig flach gedrückt, an der Spitze meist leicht gebogen, seltener gerade oder mit Stachelborsten gemengt; Blätter gross bis mittelgross, beiderseits matt, weichhaarig, ausnahmsweise verkahlend, seltener auf der Unterseite drüsig, einfach oder doppelt grob-gesägt; Blattstiele und Seitennerven filzig; Blütenstiele meist lang, von ziemlich grossen, mehr oder minder behaarten Deckblättern gestützt; Blumenkrone blassrosa; Kelchzipfel mehr oder minder lang dauernd, aber die völlig reife Scheinfrucht nicht mehr krönend; Diskus deutlich entwickelt.

a. Griffel zahlreich, frei, keine kurze Säule bildend; Blättchen beiderseits dicht behaart; Stacheln dünn, lang.

1968. 25. Rosa tomentosa Smith. Filzige Rose.

Keller p. 248; Borbás p. 509; Christ. p. 93; Koch p. 268; Neilr. p. 897; Grke. p. 137.

Strauch aufrecht, hoch; Stacheln derb, gross, aus ovalem, kleinen, nur wenig verbreiterten Grunde pfriemlich oder leicht abwärts gekrümmt, daher schlank, meist zerstreut, an den Aesten einzeln oder paarweise; Blattstiel dicht grau-filzig, drüsig und bestachelt; Blättchen zu fünf- bis sieben, fast sitzend oder kurz gestielt, entfernt, in der Regel gross, Endblättchen breit elliptisch, spitz oder zugespitzt, Seitenblättchen oval, spitz oder stumpf, scharf und grob gesägt, hellgraugrün, in der Jugend beiderseits, später oberseits nur schwach, unterseits auf der Fläche dicht weichhaarig, zottig, drüsenlos und nur an den Nerven angedrückt-filzig, ein- bis zweimal doppelt gezähnt, Sägezähne etwas zusammenneigend, Sägezähnen armdrüsig; Nebenblättchen länglich oder keilig, ziemlich flach, Oehrchen eiförmig, spitz bis kurz zugespitzt, vorgestreckt, beiderseits behaart, drüsig gewimpert, die der blütenständigen Blätter grösser; Deckblätter gross und breit, elliptisch, dicht angedrückt behaart, grau, drüsig gewimpert; Blütenstiele etwas länger als die Deckblätter, meist zu drei

bis fünf, selten einzeln, drüsig oder drüsig-borstig, stets gerade; Receptakel ellipsoidisch oder eiförmig, drüsenborstig oder etwas kurz weichstachelig; Kelchzipfel mit blattartigen gesägten Anhängseln, die drei äusseren stets reichlich fiederspaltig, auf dem Rücken dichtdrüsig, nach dem Verblühen abstehend oder einige aufgerichtet, aber vor der Fruchtreife vertrocknend und abfallend; Blumenblätter ungewimpert und ungekerbt, etwas kürzer als die Kelchzipfel, blassrosa oder an den Nägeln weiss, verkehrt-herzförmig; Griffel in kurzen, fast kahlen oder kurz steifhaarigen Köpfchen auf dem deutlich entwickelten, aber nicht breiten Diskus sitzend; Scheinfrucht eiförmig bis länglich, auf langen Fruchtstielen stets aufrecht, scharlachroth, knorpelig.

Von den vielen Formen, unter denen die *R. tomentosa* Sm. auftritt, fanden sich bisher in Kärnten:

α. f. lavantina Wiesbr. Blattstiele sehr schwach drüsig und stachelig; Blütenstiele kürzer als die Deckblättchen; Kelchzipfel steif aufrecht, Seitenläppchen drei, Anhängsel blattartig, zur Zeit der Fruchtreife die längliche Frucht krönend, sonst wie folgende.

Bei St. Andrä im Lavantthale Wsbr.

β. f. subglobosa Smith.; Keller p. 250. Blätter eiförmig, spitz, unterseits drüsenlos; doppelt gesägt; Receptakel fast kugelig; Kelchzipfel auffallend stark entwickelt mit vier bis fünf Paar Lämpchen und blattartigen Anhängseln; Blumen bleichrosa.

Keutschacherthal Zwgr., ein Strauch beim Gruber in Stranach im oberen Möllthale D. P.

γ. f. permutata? Rip.; Borb. p. 509. Blätter elliptisch-abgerundet; Früchte kugelig; Kelchzipfel bleibend, Deckblättchen länger als die Blütenstiele; Blüte sanft rosa.

Kadutschen bei Deutsch-Bleiberg Mar.

δ. f. dacica Borb. p. 509. Blättchen ziemlich drüsenlos, eiförmig-elliptisch, fast sitzend, untere durchaus, obere weniger doppelzählig drüsig; Blütenstiele einzeln, kurz; Neben- und Deckblättchen lanzettlich, unterseits flaumhaarig; Receptakel ovoid, stieldrüsig; Blüte mittelgross.

Malborgeth Rssmn.

ε. f. pseudo-cuspidata Cré p.; Keller p. 251. Blätter unterseits drüsig; Serratur durchaus doppelt; Blütenzweige unbehaart; Blütenstand arm, (eins bis drei); Scheinfrüchte klein, lang gestielt, rundlich eiförmig bis kugelig; Kelchzipfel hinfällig; Griffel kurzhaarig; Blume fast weiss.

Schattseite Obervellach und Teichl D. P.

b. Griffel wenig zahlreich, meist ziemlich lang, eine kurze Säule bildend, kahl oder mit einzelnen Haaren bedeckt, so wie die Oberseite der Blättchen; Stacheln kurz, derb, mehr gekrümmt, Drüsigkeit schwach.

1969. 26. *Rosa abietina* Gren. Tannen-Rose.

Keller p. 253; Borb. p. 507; Christ. p. 132.

Gedrungener Strauch; Stacheln alle derb, aus massivem Grunde in eine starke, bogig nach abwärts gekrümmte Spitze vorgezogen, die der blühenden Zweige gleich gestaltet, nur kleiner und leicht gebogen, seltener einzelne ganz gerade und kurz; Blattstiele sehr dicht filzig, kurz, stieldrüsiger und bestachelt; Blättchen zu fünf bis sieben, gestielt, sehr entfernt, alle von gleicher Grösse, an den sterilen Trieben meist grösser, spitzoval oder oboval und stumpf, die seitlichen schwach keilig, oben fast kahl und dunkelgrün, unten bläulichgrün, auf der Fläche oder nur an den Nerven behaart mit nur wenigen, in der Behaarung zerstreuten Drüsen, ungleich doppelt gesägt (an den sterilen Trieben oft einfach), Sägezähne kurz, offen, drüsenlos, hingegen die sehr kleinen Sägezähnen drüsiger; Nebenblätter und Deckblätter kahl oder schwach behaart, unterseits und am Rande oft drüsiger, letztere gewöhnlich klein und kürzer, als die Blütenstiele; Blüten zu drei bis acht oder einzeln auf drüsiger borstigen bis drüsiger stacheligen, ziemlich kurzen Blütenstielen; Receptakeln eiförmig, drüsenborstig; Kelchzipfel am Rücken dicht drüsiger, doppelt fiederspaltig mit lanzettlichen, schmalen und gesägten Fiedern und sehr scharf zugespitzten Lappen, nach der Blüte abstehend, spät hinfällig; Griffel ganz kahl oder dünn behaart und später verkahlend; Diskus breit; Krone blassrosa; Scheinfrucht eiförmig oder eikugelig, drüsigerborstig, spät reifend, dunkelroth.

Mitterbichling im Lavantthale Wsbr., mit Annäherung an die Form:

a. f. capnoides Kerner. Blättchen ungleich gross; Endblättchen am grössten, Sägezähne drüsiger; Blütenstielchen lang, drüsiger-stacheliger, einblütiger, Receptakel nur am Grunde drüsiger-stacheliger; Kelchzipfel länger als die Krone, drüsigergefiedert; Lappchen schmal.

β. f. pseudo-commutata Keller in litt. Zweige schwach flexuos, mit wenigen kurzen, dünnen, schwachen Stacheln bewehrt; Blätter oben blassgrün oder graugrün, matt, in's gelbliche, kahl oder mit einzelnen angedrückten Härchen und seltenen Stieldrüsen, unterseits bläulichgrau, gleichfalls zumeist kahl und auf der ganzen Fläche mit zer-

streuten, aber deutlich gestielten braunen Drüsen besetzt, seltener sind der Mittelnerv und die Seitennerven mit sehr wenigen, angedrückten, mit der Loupe deutlich erkennbaren, weissen Härchen bestreut, mittlerer Grösse, zu fünf; Serratur reich zusammengesetzt, wengleich schmal und seicht an den obern, an den untern quer abgestumpften obovalen, kleinen, breitkeiligen Blättchen aber tief und gross; Sägezähne sichelförmig zusammenneigend mit äusserst zahlreichen kleinen scharfen Secundarzähnen, wie *R. pomifera* Herm.; Blattstiele schwach filzig, meist ungleichförmig, das ist unterseits kahl werdend, dabei reichlich mit Drüsen und auch einigen Aciculen ausgestattet; Nebenblättchen kurz, mit breiten ovalen, oft lang zugespitzten Ohrchen, die unterseits meist ganz drüsig sind; Blütenstielchen einzeln, kurz (bei 7 mm.), mit weisslichen, rothe Drüsen tragenden, schwachen, kurzen Borsten sparsam besetzt; Receptakel nach der Blüte klein, ovalkugelig, ganz kahl; Kelchzipfel abstehend, mittelgross, innen weissfilzig, aussen blassgrün mit steifen, kurzen, gelblichen Stieldrüsen dicht bedeckt, die äusseren immer aber nur am Grunde mit je ein Paar schwachen, kurzen Fiederlappen versehen; Diskus flach; Griffel ein weisswolliges Köpfchen. Blüte und Frucht bisher unbekannt. Der Finder dieser interessanten Rose ist nun leider todt.

Deutsch-Bleiberg Mar.

8. Rotte: **Villosae Crép.** Kerner p. 254; Borb. p. 337; Christ. p. 78. Gedrungene starke Sträucher mit steifen, geraden, an den Gipfeln nicht umgebogenen, sterilen Trieben; Bestachelung einfach, gerade, dünn, pfriemlich; Blättchen fünf bis sieben, mittelgross oder gross, beiderseits weich behaart, unterseits oft reichlich mit Drüsen besetzt; Serratur zwei- bis dreifach; Sägezähne am ganzen Rande dicht-drüsig; Blütenstiele in der Regel ziemlich kurz, durchaus stacheldrüsig, wie das Receptakel und die Scheinfrucht; Kelchzipfel nach der Blüte aufgerichtet, über die Fruchtreife bleibend, drüsig-borstig; Krone lebhaft rosenroth oder hellpurpurn; Diskus wenig entwickelt; Scheinfrüchte stacheldrüsig oder weichborstig, dunkelroth in's violette, meist geneigt oder mehr minder an den Zweigen nickend, markig.

1970. 27. **Rosa pomifera Hermann.** Apfel-Rose.

Christ. p. 81; Koch p. 269; Keller p. 255; Neilr. p. 898; Grke. p. 138.

Strauch stark, gedrungen; Stacheln einige stark, andere, besonders gegen die Infloreszenz hin, schwach, fast borstlich; Blättchen gross, elliptisch verlängert mit fast parallelen Rändern, oben stumpf oder lanzettlich zugespitzt, unten abgerundet oder etwas herzförmig, die seitlichen sitzend, oben leicht behaart, unten dichtfilzig, beiderseits hellgraugrün in's bläuliche, Geruch ölig-harzig; Zahnung doppelt, Zähne rechtwinklig, ziemlich gross, etwas vorgestreckt, Zähnchen zahlreich, fein, drüsentragend; Nebenblättchen dichtdrüsig, wimperig, mehr oder minder behaart; Blütenstiele kurz, drüsig weichstachelig, in der Regel von den Bracteen bedeckt, in Corymben von drei oder auch einzeln; Blüten lebhaftrosa, ziemlich klein; Kronblättchen am Aussenrande fein gezähnt; Griffel ein weisswolliges Köpfchen bildend; Kelchzipfel stark drüsig, länger als die Krone, äussere fiederspaltig, Anhängsel schmal bis blattartig und gezähnt; Kelchröhre (Receptakel) dicht, weichstachelig, Stacheln durch's Trocknen gelb, an der reifen Frucht bleibend, steif; Frucht kugelig, eine der grössten der Gattung, die centrale birnförmig, gekrönt von den aufrechten, bleibenden Kelchzipfeln, scharlachroth in's violette, breiig, säuerlich; Diskus schmal.

In Kärnten wurde bis jetzt die abändernde Form:

β. f. *recondita* Puget; Christ. p. 83; Borbás p. 515 gefunden. Von der Hauptart verschieden durch oberseits behaarte, unterseits aber auch drüsige Blätter; Blüte grösser, lebhaft rosa, mittlere Blüte und Frucht fast stiellos, tief in die Bracteen eingesenkt; seitenständige Früchte kugelig. Die Stammart soll beiderseits drüsenlose, die forma *Gaudini* Puget beiderseits drüsige Blattflächen besitzen.

Obervellach auf der Wolliggen, Sagritz, wo sie schon Wulfen sammelte D. P.

Anmerkung. Aus Deutsch-Bleiberg liegt ein leider mangelhaftes Exemplar einer *Rosa*, gesammelt von Dr. Maruschitz im Leininger am Dobratsch, vor, welches eine Mittelform zwischen *R. recondita* Puget und *R. resinosa* Strnbg. zu sein scheint. Das Blatt ist grün, die Blütenstiele nicht kurz, die Kelchzipfel ungetheilt, Receptakel kugelig, flachkugelig, die Stacheln kurz. Mit Schweizer Exemplaren der *R. resinosa* Strnbg. verglichen, wäre dieser Repräsentant zur *R. resinosa* Strnbg. zu ziehen.

9. Rotte: *Caninae* De C. Keller p. 256; Borb. p. 335. Meist hohe starke Sträucher mit aufrechten, niemals kriechenden Stämmen und langen, zahlreichen, bogig auswärts geneigten Aesten und Zweigen; derber, gleichförmiger, in der Regel

einfacher Bestachelung (nur bei einzelnen Arten der Unterrotten: **Collinae** und **Hispidae** erscheinen ausser derben Stacheln auch borstenförmige, eingemischt); Blattstiele nicht sammtig filzig; Blättchen zu fünf bis sieben, meist oval, mittelgross, kahl bis behaart, aber auf der Fläche niemals, höchstens am Mittelnerv drüsig oder filzig; Nebenblätter und Deckblätter in der Regel gleichförmig, d. i. die letzteren nur selten blattartig; Blütenstiele kahl oder drüsig, im letzteren Falle (**Collinae** und **Hispidae**) die Stieldrüsen nicht weichstachelig; Kelchzipfel reich fiedertheilig, auf dem Rücken drüsenlos (oder bei den Unterrotten **Collinae** und **Hispidae** manchmal einzelne wenige Drüsen tragend), nach der Blüte herabgeschlagen, später sich nicht aufrichtend, bald abfällig; Blumenkrone mittelgross, rosa bis weiss; Diskus breit, flach, seltener schwach kegelig; Griffel frei, kürzer als die Staubfäden, kahl oder behaart; Scheinfrucht knorpelig, dann breiig, gerade, niemals nickend.

1. Unterrotte: **Collinae Crép.** Keller p. 256; Borbás p. 335. Blattstiel rundum kurz- oder flaumhaarig; Blättchen beiderseits mehr-minder oder nur an den Nerven behaart, einfach- oder doppelt-gesägt; Serratur tief; Blütenstiele stieldrüsig; seltener auch die Rückseite der Kelchzipfel; den derben Stacheln manchmal an den Blütenzweigen borstenförmige beigemischt.

1971. 28. **Rosa alba L.** Weisse Rose.

Keller p. 258; Borb. p. 385; Christ. p. 207.

Strauch reichästig, gedungen; Bestachelung einfach, an den Zweigen dünner oder fehlend, alle Stacheln gebogen; Blattstiele dicht behaart, mit Stieldrüsen und kleinen Stachelchen besetzt, so wie die Mittelrippe der Blättchen; diese zu fünf bis sieben, mittelgross bis gross, rundlich, fast so breit als lang, unterseits behaart, später kahl, Mittelnerv mit Drüsen; Nebenblättchen drüsig-gesägt, unterseits graufaumig; Deckblätter eilanzettlich zugespitzt, meist ein länglich-lanzettliches Theilblättchen tragend, so lang oder wenig kürzer als die verlängerten Blütenstielchen, diese drüsig-borstig; Receptakeln eiförmig, drüsig-borstig; Kelchzipfel am Rücken drüsig-borstig, kürzer als die Kronblättchen, äussere fiederspaltig mit lanzettlichen Lappen, auf der Innenseite filzig; Blüte gross, rein

weiss, manchmal in's gelbliche; Kronblättchen schwach ausgerandet; Griffel ein grosses behaartes Köpfchen bildend; Scheinfrucht eiförmig, scharlachroth, von den früh abfallenden abstehenden Kelchzipfeln bekrönt.

Halbverwildert in Friedhöfen, Gartenhecken. † Juli.

Gewöhnlicher findet man aber die halbgefüllte Form, welche sich von obiger durch Drüsenborsten an den Blütenzweigen, drüsenlose Blattstiele, kahlen Mittelnerv der unterseits spärlich behaarten Blättchen, kahle Nebenblättchen, sehr lange Blütenstiele und halb oder ganz gefüllte Blumen unterscheidet.

Feldkirchen, Tiffen, Obervellach, Tröpolach D. P.

2. Unterrotte: **Pubescentes Crép.**; Keller p. 273; Borb. p. 335. Bestachelung stets einfach; Blattstiele rundum behaart; Blättchen beiderseits oder doch unterseits an den Nerven behaart, an den Seitennerven nicht drüsig; Serratur einfach oder doppelt, in der Regel drüsenlos oder mehrfach und drüsig; Blütenstiele und Receptakeln drüsenlos, oft beflaumt; Kelchzipfel nach der Blüte herabgeschlagen, abfällig, drüsenlos, seltener bei den doppelt gesägten Formen am Rande einzelne Stieldrüsen tragend.

1972. 29. Rosa dumetorum Thuill. Gesträuch-Rose.

Keller p. 273; Borbás p. 424; Christ. p. 181.

Grosser, starker Strauch mit aufrechten Stämmen und schlanken Zweigen; Stacheln an den Aesten breit hackig, an den ältesten so wie an den Gipfeltrieben und Blütenzweigen fast fehlend; Blattstiele dicht flaumhaarig, in der Jugend oft graufilzig, meist drüsen- und stachellos; Blättchen mittelgross zu fünf bis sieben, rundlich-oval oder breitelliptisch abgerundet, stumpf, nur die blütenständigen spitz oder kurz zugespitzt, oben angedrückt und dünn behaart, unterseits auf der ganzen Fläche flaumig-weichhaarig, am Rande dicht gewimpert; Serratur einfach, Sägezähne breit bis sehr breit, bogig zusammenneigend, drüsenlos; Nebenblätter länglich, oft schmal und lang bis lineal mit kurzen Oehrchen, meist gleich gestaltet oder gegen den Blütenstand hin nur wenig verbreitert, aussen stets behaart, wie die ovalen und eilanzettlichen Deckblätter, am Rande mit entfernten Drüsen besetzt; Blütenstiele zu eins bis drei, zweimal so lang als die Scheinfrucht, drüsenlos, kahl oder schwach beflaumt; Receptakel eiförmig, kahl, grün; Kelchzipfel beiderseits behaart, am Rande gewimpert, die drei äusseren fiederspaltig mit lanzettlichen, fast ganzrandigen

Fiederlappen, etwas kürzer als die Krone, nach der Blüte zurückgeschlagen, vor Färbung der Scheinfrucht abfällig; Krone blassrosa, etwas in's weissliche ziehend; Griffel nach der Blüte etwas vortretend, leicht behaart bis fast kahl; Diskus nicht verbreitert, flach; Scheinfrucht fast kugelig, knorpelig, scharlachroth, meist glänzend, Karpelle gestielt.

Gebüsche, Waldränder. † Juni bis Juli.

Keutschacherthal, St. Georgen am Sandhof, Hochosterwitz Zwgr., Obervellach, Laaserweg ob Fragant D. P., Bleiberg Mar.

Als Formen gehören hierher:

β. *f. solstitialis* Besser; Keller p. 275; Borb. p. 424. Bestachelung reichlich; Blattstiele filzig, so wie die Nerven der Blattunterfläche, diese dicht weichhaarig; Blättchen eirund oder elliptisch, spitz oder zugespitzt, am Grunde schmal gerundet; Serratur oftmals gespalten; Nebenblätter gesägt und mit rothen Drüsen dichter besäimt; Deckblätter breit, oftmals blatttragend; Blüten einzeln, seltener zu zwei bis drei; Blütenstiele sehr kurz (nicht über 13 mm.), oft bläulich bereift wie die eiförmigen, von den Deckblättern verdeckten Receptakeln; Kelchzipfel kurz, filzig berandet; Scheinfrucht eiförmig bis eikugelig; Griffel fast kahl.

Pfaffenberg bei Obervellach D. P.

γ. *f. leptotricha* Borb.; Keller p. 275; Borb. p. 425. Blättchen oval oder elliptisch, kurz zugespitzt, dünn, etwas schwach gesägt, mittelgross, oberseits sehr dünn oder zerstreut haarig, unterseits gleichförmig flaumhaarig; Nebenblätter der blütenständigen Blätter auffallend verbreitert, in Deckblättchen übergehend; Blütenstiele verlängert, der mittlere, manchmal auch die seitlichen verkürzt; Receptakel ellipsoidisch oder eiförmig und etwas verlängert; Griffel dicht weisswollig; Blume rosa.

Keutschacherthal, Siebenhügel Zwgr., Wolfsberg? Hfnr., Obervellach an sonnigen Berglehnen, Fragant D. P.

δ. *obtusifolia* Desvau x; Keller p. 276; Borb. p. 425. Stacheln wenig zahlreich, mittelgross, sichelig gebogen, zusammengedrückt, am Grunde schwach verbreitert; Blattstiele dicht behaart, fast filzig, meist etwas schimmernd, wie die dichtfilzigen Nerven der unteren Blattfläche, stachelig; Blättchen zu fünf bis sieben, mittelgross, oft ziemlich klein, dicklich, unterseits mit vorragenden Nerven, oval oder oval-elliptisch, stumpf, an der Spitze verschmälert, insbesondere an den sterilen Trieben scharf gespitzt, am Grunde schmal zugerundet, grün, oberseits schwach behaart, endlich verkahlend, unterseits sehr dicht behaart, Behaarung in der Jugend

schimmernd; junge Triebe röthlich; Nebenblätter länglich, am Rande drüsig und dicht gewimpert, mit auseinander fahrenden Ohrchen, die der blütenständigen Blätter verbreitert; Blütenstiele ziemlich kurz, ungefähr so lang als die Receptakeln oder etwas länger, letztere eiförmig oder länglich, kahl, meist von den ovalen behaarten Deckblättern theilweise verdeckt; Kelchzipfel fiederspaltig, auf der Innenseite sehr filzig, abfällig; Blüte weiss (selten gegen den Rand rosenröthlich); Griffel in der Regel schwach wollig, bisweilen kahl werdend, bald kurz, bald ein wenig verlängert, frei oder zusammengedrängt; Scheinfrucht elliptisch krugförmig bis kugelig.

Malborgeth R s s m n., Bleiberg Mar.

ε. subforma: capitata Christ.; Keller p. 274. Blättchen ziemlich klein, oboval, abgerundet, mit vorragenden Seitennerven, oft runzlig und dunkelgrün; Blütenstiele kurz, roth überlaufen, zu zweien bis dreien von Deckblättern eingehüllt; Receptakel schmal-elliptisch, roth überlaufen; Blüten ziemlich lebhaft rosa.

Föhrenwäldchen bei Tesendorf Zwgr.

ζ. f. subatrachostylis? Borbás p. 427 und 436. Aeste sehr stachelig, Stacheln gerade oder sanft gebogen, fast wirtelig gestellt; Blattstiele mehr weniger filzig, drüsig, stachelig; Blättchen mittelgross bis gross, oberseits kahl, unterseits an den Nerven mehr weniger behaart (bei der fruchttragenden Pflanze), vollkommen doppelt-drüsig gesägt, eiförmig, spitz oder zugespitzt; Griffel sehr schwach behaart oder kahl; Frucht ellipsoidisch, ziemlich kurz gestielt; Diskus flach; Kelchzipfel drüsig berandet (wovon bei Borbás keine Erwähnung).

Bei St. Jacob an der Strasse Zwgr.

1973. 30. *Rosa urbica* Gren.

Keller p. 277; Gren. fl. jur. p. 246.

Bestachelung stark, auch die oberen Zweige reichlich bestachelt; Blattstiel scheinbar filzig, meist ungleich dicht behaart; Blättchen etwas ungleich gesägt, in der Jugend beiderseits seidig behaart, im Alter nur mehr an den Nerven der Unterseite oder bloss auf den Mittelnerven behaart, sonst kahl; Receptakel eiförmig oder länglich, kahl wie die Blütenstiele; Kelchzipfel auf der Unterseite kahl, Fiederchen ganzrandig, drüsenlos; Krone blassrosa, höchst selten rein weiss; Griffelköpfchen wollig zottig, nach der Blüte nicht vorragend, auf dem flachen Diskus sitzend; Scheinfrucht eiförmig oder länglich; s. w. R. dumetorum Thuill.

Sagritz D. P., Malborgeth R s s m n.

a. Serratur einfach.

α. f. *globata* Déségl. als Art in Crép. Prim. I, p. 58; Keller p. 278. Blattstiel und Mittelnerv der Blättchen von zerstreuten Härchen schwach befläumt; Serratur einfach; Deckblätter in der Jugend auf der Unterseite und am Rande befläumt; Blüte rosa; Griffel wollig-zottig; Scheinfrucht gross, kugelig.

Bleiberg Mar.

β. f. *semiglabra* Keller p. 278; Borb. p. 426; Rip. als Art. Blattstiel und Mittelnerv wie bei voriger, höchstens vereinzelte Haare an den Seitennerven, sonst haarlos; Blättchen oftmals stumpflich; Blütenstiele kürzer als die verbreiterten kahlen Deckblätter; Receptakel und Scheinfrucht eiförmig.

Bleiberg Mar.

γ. f. *violascens* Puget; Syn. R. *violascens* Puget = R. *coriifolia* × *spuria* Keller in litt. olim, einstweilen hier eingeschaltet und wird über die systematische Einschaltung dieser Rose später sich auszusprechen Gelegenheit werden. Aeste grauviolett, bestachelt, Blätter einfach gesägt, eiförmig-elliptisch, entfernt stehend; Blütenstiele schwach behaart oder kahl, 5—10 mm. lang; Griffel dicht zottig-behaart; Scheinfrüchte verkehrt-eiförmig-länglich oder oblong. Erinnert an die Section der *Montanae* Keller.

Bleiberg Mar.

δ. f. *platyphylloides* Déségl.; Keller p. 279; Borb. p. 425. Strauch grün; Stacheln der Blütenzweige klein, bald hackig, bald gerade, meist fehlend; Blattstiele dicht kurz-zottig behaart, mit zerstreuten oft sparsamen Drüsen, stachellos oder mit wenigen Stachelchen; Blättchen dünn, die unpaarigen spitzoval, die seitenständigen oval-elliptisch oder kreisrund, oberseits grün und ganz kahl, unterseits bläulich, an den Seitennerven mit Härchen bestreut, die später abfallen, zuletzt nur mehr der Mittelnerv dicht behaart; Sägezähne fein gespitzt; Deckblätter die Blütenstiele theilweise überhöhend, ganz kahl, oval zugespitzt, gewimpert; Receptakel eiförmig, kahl; Kelchzipfel um vieles kürzer als die Krone; Griffel schwach behaart, fast kahl; Diskus ziemlich flach; Blüte blassrosa; Scheinfrucht eiförmig.

Sagritz D. P.

b. Serratur mehr weniger gedoppelt oder gespalten.

ε. f. *Pacheriana* Keller in litt. Aeste ausgebreitet, roth überlaufen, bestachelt; Stacheln klein, geneigt oder gerade, genähert, am Grunde wenig erweitert; Blattstiele zottig-behaart, wenig drüsig, bestachelt; Blättchen oberseits

bleichgrün, unterseits bläulichgrau; Nerven zottig, sonst schwach behaart, ziemlich starr, eiförmig elliptisch, seitenständige am Grunde schwach zugespitzt, das endständige abgerundet; Serratur gespalten oder drüsig doppelt gezähnt; Blütenstiele kahl, corymbos; Receptakel den Früchten gleichlang, eilänglich, am Grunde und an der Spitze verengt; Kelchzipfel gefiedert, Fiederchen und Deckblättchen gezähnt, am Rande drüsig; Diskus purpurn, kegelig; Griffel purpurn, schwach behaart oder kahl; Blüte fast weiss.

Pfaffenberg bei Obervellach D. P.

ζ. f. *fragantina* Keller in litt. Blättchen unterseits dicht behaart, aus breit ovalem Grunde lang zugespitzt, Serratur drüsig; Blattstiele schwach-drüsig; Griffel kurz, kahl.

Sonnige Berglehne ob Fragant D. P.

η. f. *affinita* Puget; Keller in litt.; Braun Verhandl. d. z. b. G. Wien 1885, p. 96. Aeste schwach bestachelt; Blätter seegrün, deutlich doppeltzählig, unterseits sowohl auf dem Mittel- als Seitennerven, selten aber auf der Fläche behaart, oberseits auch in der Jugend kahl, Blattstiele dicht flaumig und reichdrüsig; Kelchzipfel auffallend reich- und langdrüsig gewimpert; Griffel deutlich aber schwach behaart; Scheinfrucht eiförmig, gegen die Spitze verengt.

Gebüsche in den Teichler Feldern D. P.

θ. f. *subglabra* Borb. p. 426; Keller p. 280. Blattstiel und Mittelnerv der Blättchen schwach befläumt, Serratur doppelt; Deckblätter lang, kahl; die kugeligen Scheinfrüchte so lang als ihre Stiele; Griffel kahl oder schwach behaart; s. w. f. *globata* Déségl.

Sonnige Berglehnen bei Obervellach D. P.

ι. f. *juncta* Pug. var. *fructu globoso* Keller in litt. Aeste bestachelt; Blütenzweige sehr stachelig; Stacheln schwach, fast gerade oder schwach gebogen, häufig paarweise; Blattstiele flaumig, bestachelt, obere mit wenigen Drüsen besetzt, untere meist drüsenlos; Blättchen oberseits kahl, unterseits an den Primärnerven in der Regel flaumig, sonst kahl, obere eirund, spitz, am Grunde breit abgerundet oder halb-herzförmig, untere oval oder oboval, unterseits bleichgrün mit vorstehenden gelblichen Nerven, mittelgross, untere biserrat oder spaltzählig, obere ungleich doppelt gezähnt drüsig; Fruchtstiele 2 bis 2½ mal länger als die Frucht, gewöhnlich zu zwei, kahl; Scheinfrüchte kugelig oder eikugelig, kurz; Kelchzipfel abstehend oder zurückgebogen, doppeltfiederig, Fiederchen schmal, am Rande schwach drüsig; Diskus flach; Griffel schwach behaart; von der eigentlichen *R. juncta* Puget durch den Griffel und die kugelige Frucht verschieden.

Sonnige Berglehnen bei Obervellach D. P.

α. f. *hemitricha* Rip.; Keller p. 281; Borb. p. 427. Blattstiele dicht behaart und drüsig; Blätter gleichförmig doppelt gesägt; Blüte gesättigt rosenroth; s. w. *urbica*.

Malnitzer Strasse ob Obervellach und Laaserweg ob Fragant D. P.

λ. f. *amblyphylla*? Rip.; Borb. p. 427. Blattstiele filzig, drüsig, mehr minder bestachelt, Blättchen eirund, auf den sterilen Zweigen eilanzettlich, unterseits bläulichgrün, Hauptnerv sehr schwach behaart oder kahl und hierin von der Form abweichend, aber oft drüsig stachelig; Bezahlung vollkommen biserrat, Zähne oft gespalten, sämmtlich drüsig berandet, Blütenstiele glatt, kurz; Kelchzipfel drüsenlos, zurückgeschlagen (wahrscheinlich), kaum so lang als die Krone, fiederlappig, Griffel sehr schwach behaart; Diskus erhaben; Frucht eiförmig; Blume?

Weidischgraben Zwgr.

1974. 31. **Rosa uncinelloides Puget**; Keller in litt.

Braun Verhandl. d. z. b. Gesellschaft Wien 1885, p. 95, 96.

Blättchen auf den Haupt- und Seitennerven dicht, auf der Fläche zerstreut behaart, kurz elliptisch oder elliptisch-abgerundet; Frucht kurz-eiförmig oder eiförmig-gerundet; Griffel dicht-behaart oder wollig.

Sonnige Gebüsch an Bergabhängen bei Obervellach D. P.

1975. 32. **Rosa Annoniana Puget**.

Keller in litt *R. spuria* × *dumetorum*; Braun Abhdl. d. z. b. G. Wien 1885, p. 95.

Blätter breit elliptisch-lanzettlich, unterseits auf den Nerven behaart; Aeste unbewehrt oder schwach bewehrt, sammt Nebenblättchen röthlich; Griffel schwach behaart oder kahl; Blütenstielchen an Länge der Scheinfrucht gleich oder länger.

Sonnige Berglehnen um Obervellach D. P.

3. Unterordnung: **Biserratae Crép.**; Keller p. 283; Borb. p. 335. Blattstiel unbehaart oder nur die Oberseite desselben dauernd schwach befläumt; Blättchen kahl, höchstens der Mittelnerv mit Drüsen bestreut; Serratur an allen Blättchen vollkommen doppelt bis zusammengesetzt, mit drüsentragenden Sägezähnen (nur in Ausnahmefällen ungleichmässig doppelt und dann der Blattstiel drüsentragend), Blütenstiele und Receptakel kahl; Kelchzipfel herabgeschlagen (selten abstehend oder aufgerichtet), stets abfällig.

1. Griffel kahl oder fast kahl, büschelig auseinander tretend oder verlängert und in eine Säule zusammengedrängt (abernicht verwachsen).

1976. 33. *Rosa medioxima* Déségl. Weinsäuerliche Rose.

Keller p. 284; Borbás p. 416.

Stacheln am Stamme derb, am Grunde verbreitert, ein wenig gebogen, an den Aesten und unteren Zweigen dicht, an den Blütenzweigen zerstreut, kleiner und gekrümmt; Blattstiele oberseits der ganzen Länge nach reichlich befüumt oder am Grunde leicht behaart und mit feinen Stieldrüsen bestreut, unterseits bestachelt; Blättchen zu fünf bis sieben, alle gestielt, kreisrund, unterseits blasser, bläulichgrün, kahl, mit wenig vorragenden Mittel- und Seitennerven, nur der Mittelnerv an einigen unteren Blättchen einzelne zerstreute Drüsen tragend, am Rande gleichförmig doppelt gesägt mit drüsentragenden Sägezähnen und ziemlich scharfen Sägezähnen; Nebenblättchen länglich, kahl, am Rande mit kleinen Stieldrüsen besetzt und mit scharf gespitzten, divergirenden Ohrchen; Blütenstiele kurz, kahl, wenig gebüschelt, von oval lanzettlichen, kahlen, nur am Rande drüsigen, um vieles längeren Deckblättern eingehüllt, die äusseren Blütenstielchen überdies am Grunde von kleinen, kurzen Deckblättchen gestützt; Receptakel kahl, eiförmig oder etwas länglich, manchmal kurz ellipsoidisch; Kelchzipfel kahl, zwei ungetheilt und am Rande filzig, drei gefedert mit lanzettlichen Anhängseln, die Blüte in der Knospenlage überragend, um vieles kürzer als die geöffnete Blüte, nach der Blüte herabgeschlagen und abfällig; Griffel frei, kurz, fast kahl; Diskus kegelförmig; Blüte ziemlich gross, schön rosa gefärbt; Scheinfrucht eiförmig, am Grunde abgerundet, gegen die Spitze ein wenig verschmälert.

Satnitz Zwgr., sonnseitige Berglehnen bei Obervellach, zwischen Söbriach und Flattach, ob Fragant D. P.

β. f.? villosiuscula Rip.

Keutschacherthal, Ehrenhausen bei Klagenfurt Zwgr.

1977. 34. *Rosa cladoleia* Rip. Schösslingreiche Rose.

Keller p. 285; Borbás p. 416.

Blütenzweige stets stachellos; Aeste schwach, sehr verlängert, fast unbewehrt oder mit wenigen hackigen Stacheln, über die Nachbargesträuche klimmend; Blattstiele kahl oder mit einzelnen zerstreuten Haaren, im Alter verkahlend, stachellos; Blättchen oval oder oval-elliptisch, unterste Paare abgestumpft, oberseits dunkelgrün, am Rande gleichförmig

doppelt gesägt; Nebenblättchen gegen die Spitze gesägt; die Deckblättchen meistens in ein dreiblättriges Anhängsel endigend, viel länger als die Blütenstiele; Kelchzipfel an der Spitze spatelig verbreitert, nach der Blüte zurückgeschlagen, abfällig; Griffel kahl oder während der Blüte äusserst schwach behaart; Krone lichtrosa; Scheinfrucht eiförmig, roth; s. w. R. *medioxima* Déségl.

Südfuss des Maria Saaler Berges oberhalb Krastowitz Zwgr.

1978. 35. *Rosa oblonga* Déségl. et Rip. Länglichfrüchtige Rose. Keller p. 286; Borb. p. 416.

Hellgrüner, flatternder Strauch; Stacheln gebogen, am Grunde verbreitert, an den jungen Trieben fast gerade; Blattstiele mit wenigen Drüsen bestreut, unterseits so wie der Mittelnerv wenigstens der Endblättchen mit feinen, dünnen, wenig gebogenen oder geraden nadelförmigen, kurzen Stachelchen besetzt; Blättchen zu fünf bis sieben, das endständige spitz-oval, die seitenständigen oval-elliptisch, oberseits glänzend hellgrün, unterseits ein wenig blasser, von derber Consistenz; Sägezähne gleichförmig, einmal doppelt mit drüsentragenden Sägezähnen; Nebenblätter schmal, kahl, mit drüsigbesäumten Rändern und meist gerade vorgestreckten Ohrchen; Blütenstiele meist einzeln, selten zu dreien, bei $1\frac{1}{2}$ mal länger als das Receptakel, dieses verkehrt- oder verlängert-eiförmig, kahl; Kelchzipfel an der Spitze spatelig erweitert, kahl, zwei ganzrandig, die drei äusseren fiedertheilig mit schmalen Fiederlappen, um vieles kürzer als die geöffnete Krone; Griffel schwach behaart, später verkahlend, mit einzelnen Härchen an den Narben, kurz; Diskus konisch; Blüte ziemlich gross, rosa; Scheinfrucht ellipsoidisch, roth.

Bergabhänge bei Obervellach, auf der Wolliggen noch bei 1000 m. s. m. D. P.

1979. 36. *Rosa Carioti* Chabert. Cariots Rose.

Stacheln der Aeste zahlreich, die der Zweige sichelförmig, röthlich; Blattstiele rinnig, mit Drüsen bestreut, an der Ansatzstelle mit Härchen befläumt, unterseits und längs des Mittelnerves mit kleinen, nadelförmigen Stachelchen bewehrt; Ohrchen der Nebenblättchen in eine feine borstenförmige Weichspitze endigend; Blättchen oval, theils zugrundet, theils stumpf, regelmässig doppelt gesägt; Sägezähnen offen, oval lang zugespitzt, mit mehr- minder abstehenden Weichspitzen; Blütenstiele kurz mit ovalen zugespitzten Deckblättern, die um vieles länger sind als die Stielchen; Receptakel eiförmig; Fiederlappen der drei

äusseren Kelchzipfel oft kämmig gesägt; Griffel kurz, ganz kahl; Diskus schmal kegelig; Blume weiss mit verkehrt-herzförmigen Blättern; Scheinfrüchte eiförmig, früh reif; s. w. v.

Auf der Wolliggen D. P.

β. f. *polyodon* mit röthlicher Blüte. An der Strasse bei Stallhofen D. P.

2. Griffel ein dichtweisswolliges, kurzes scheinbares Säulchen bildend.

1980. 37. *Rosa eriostyla* Rip. et Déségl. Wolliggrifflige Rose. Keller p. 290; Borbás p. 417.

Mittelhoher Strauch; Stacheln mehr minder zahlreich, nach abwärts geneigt oder gerade; Blattstiele fast unbewehrt, mit Drüsen und einzelnen Härchen bestreut; Blättchen oval bis ovaelliptisch, die unteren Paare bei der Mehrzahl fast abgestumpft; Sägezähne mit drüsentragenden Sägezähnchen; Blütenstiele einzeln oder in Sträussen zu zwei bis vier, am Grunde mit ovalen, zugespitzten, um vieles längeren Deckblättchen gestützt; Receptakel eiförmig; Kelchzipfel so lang als die Krone; Griffel frei, sehr wollig; Diskus schwach kegelig; Blüte hellrosa; Scheinfrüchte kugelig, mittlere oftmals verkehrt-eiförmig.

Keutschacherthal nicht typisch Zwgr., um Obervellach sehr verbreitet vom Thale bis gegen 800 m. s. m. D. P.

β. f. *perglobosa* Gndgr. T. 1836; Keller in litt. Blattstiele stacheliger als beim Typus, obere Blättchen lanzettlich, untere wenig doppeltzählig; Blütenstielchen etwas länger als die Scheinfrucht.

Schottrige trockene Weiden in der Thalsole bei Obervellach D. P.

3. Griffel kurz, ein mehr oder minder behaartes oder dichtzottiges Köpfchen bildend.

* Scheinfrucht eiförmig bis länglich-eiförmig oder verkehrt-eiförmig bis länglich verkehrt-eiförmig, stets länger als breit; Blättchen klein, Stacheln derb, gerade oder fast gerade, meist lang und dicht; Sträucher gedrungen bis zwergig.

1981. 38. *Rosa squarrosa* Rau. Sparrigästige Rose. Keller p. 291; Borbás p. 417.

Zweige kurz, meist schlängelig, sparrig, Rinde purpurröthlich; Stämme stets, Zweige meist dicht bestachelt, Stacheln der Stämmchen weissgrau, derb, aus verbreitertem Grunde gerade oder wenig gebogen, die der Zweige graulichweiss, seltener röthlich, oft etwas kürzer und zerstreuter, aber alle gleichgestaltet; Blattstiele purpurn, mit einzelnen zerstreuten Haaren, der ganzen Länge nach sammt dem Mittelnerv mit steifen Stieldrüsen und Stachelchen bewehrt; Blättchen klein oder ausnahmsweise an einzelnen Zweigen mittelgross, beiderseits kahl, die unpaaren spitzoval, die seitlichen oval, mehr minder abgerundet oder elliptisch doppelt-gesägt; Sägezähne spitz, gegen die Mitte des Blättchens offen, auf der äusseren Seite mit ein bis zwei oder auch drei bis fünf stets rothe Drüsen tragenden Sägezähnen; Nebenblättchen länglich, schmal oder weniger flach, beiderseits kahl, in lanzettliche spitze Ohrchen auslaufend; Blütenstiele meist einzeln, seltener zwei bis fünf, im letzteren Falle kürzer als die purpurröthlichen, eilänglichen Receptakeln; Deckblätter oval spitz oder zugespitzt, bei den einzelnblütigen kürzer oder fehlend, bei den mehrblütigen so lang als die mittleren Blütenstiele; Kelchzipfel unterseits kahl, oberseits und an den Rändern feinfilzig mit langen, schmalen, meist linearen Anhängseln, um vieles kürzer als die Blumenblätter, nach der Blütezeit herabgeschlagen, abfällig; Krone mittelgross, rosa; Diskus konisch; Griffel ein kurzes, zottiges oder behaartes Köpfchen; Scheinfrucht mittelgross, eiförmig oder bei gebüscheltem Blütenstande die mittlere verkehrt-eiförmig, roth.

Maria Saaler Berg ober Terndorf, Satnitz, eine nahe-stehende Form am Hollenburger Riegel und eine weitere bei Karnburg Zwgr.

1982. 39. Rosa insignis Gren. Ausgezeichnete Rose.

Keller p. 292; Borb. p. 418.

Hoher Strauch mit zickzackförmigen, zurückgebogenen Zweigen; Stacheln kräftig, am Grunde verbreitert, gebogen oder sichelförmig gekrümmt, zahlreich, die der Zweige um vieles kürzer, bisweilen von weinrother Farbe; Blattstiel kahl, oberseits rinnig, mit sehr feinen, sparsamen Drüsen besetzt, unterseits bestachelt oder stachellos; Blättchen zu fünf bis sieben, alle gestielt, unpaares spitz, seitenständige stumpf-oval, mehr minder gross, kahl, oberseits grün, unterseits schwach bläulichgrün mit wenig vorragenden Nerven; Serratur doppelt, Sägezähne gleichförmig spitz mit drüsentragenden Sägezähnen; Nebenblättchen kahl, länglich, mit scharf-besetzten vorgestreckten oder abstehenden Ohrchen, am Rande dicht mit Drüsen besetzt, Blütenstiele ziemlich kurz,

aber länger als 4 mm., kahl, einzeln oder in dichten Sträussen, am Grunde von breiten, um vieles längeren, oval zugespitzten, kahlen, am Rande drüsigen Deckblättern gestützt und weit überhöht; Receptakel eiförmig, kahl; Kelchzipfel unterseits kahl, die zwei inneren ganzrandig, die drei äusseren fiedertheilig, mit verschmälerten, drüsenlosen Anhängseln, die Blumenkrone nur in der Knospe überhöhend, so lang als die geöffneten Blumenblätter, in und nach der Blüte herabgeschlagen, später abfällig; Krone hellrosa; Diskus erhaben bis gestutzt keilig; Scheinfrüchte gross, länglich verkehrt-eiförmig oder ellipsoidisch, frühreif.

In sonnigen, geschützten Lagen. Bei Obervellach nur die verwandte

β. f. brachypoda Déségl. et Rip.; Borb. in litt.; Keller p. 293. Ganze Pflanze roth überlaufen; Blättchen oval oder oval-elliptisch; Blütenstiele nur 3—4 mm. lang; Kelchzipfel nach der Blüte aufgerichtet; Receptakel eilänglich; Scheinfrucht kurz verkehrt-eiförmig bis birnförmig, oft etwas in den Stiel verlaufend.

Anmerkung. Eine zwischen *R. insignis* Gren. und *R. dumalis* Aut. stehende Form liegt vor vom Hollenburger Riegel Zwgr.

1983. 40. *Rosa dumalis* Aut. non Bechst. Gebüsch-Rose.

Keller p. 293; Borb. p. 418; Billotia 1866 vol. I p. 121—122 *Rosa stipularis* Desv. teste Keller.

Rinde des Stammes rothbraun, an der Schattenseite mehr grün, an jungen Zweigen glänzend; Stacheln breithackig, ziemlich entfernt, einzeln oder zu zwei schief gegenüberstehend; Blattstiel oberseits spärlich drüsig, im unteren Drittel nackt, hier höchst selten mit ein bis zwei Stachelchen bewehrt; Blättchen oval, spitz, das unterste Paar klein, die weiteren Paare an Grösse zunehmend, das oberste Paar und das Endblättchen am grössten, letztes rundlich oval, stets scharf bespitzt oder kurz zugespitzt; Sägezähne lanzettlich, fein, ein- bis zweimal gedoppelt, mit kleinen in eine rothe stiellose Drüse endigenden gespaltenen Sägezähnen, oben dunkelgrün, unten blasser grün oder etwas bläulich bereift; Nebenblättchen auffallend breit, mit scharf zugespitzten, auseinanderfahrenden Ohrchen, am Rande dicht rothdrüsig, kahl; Deckblätter ovallanzettlich, etwas kürzer als die Blütenstiele; Kelchzipfel am Rande dicht drüsig-gewimpert, meist ein wenig kürzer als die Kronblättchen; Diskus flach, breit, Griffel dicht behaart bis zottig, nach der Blüte als ein kurz gestieltes Köpfchen sich schwach über den Diskus erhebend;

Scheinfrucht kurz eiförmig, bauchig, unten abgerundet, oben wenig verschmälert, sehr gross, bei der Reife braunroth, etwas bläulich angeflogen und meist noch einige abgelöste Kelchzipfel tragend; Blüte mittelgross lebhaft, bei einigen Formen hochrosa in's purpurne, sehr wohlriechend.

Sonnige Gebüsche auf Berglehnen verbreitet. † Juni bis Juli.

Pizelstetten Zwgr., Obervellach am Pfaffenberge, Lassach, Wolliggen D. D.

β. f. *stipularis glaucophylla* Du Mort.; Keller in litt. Blättchen eilänglich, schwach biserrät, unterseits besonders blaugrün und der *R. glauca* Vill. in der Färbung am nächsten; Blüten klein.

Malborgeth Rssmn.

γ. f. *medioxima* × *dumalis*? Blattstiele oberseits fläumllich, sonst wie *dumalis*.

Südseite des Maria Saaler Berges oberhalb Terndorf bei Klagenfurt Zwgr.

δ. f. *rubelliflora* Rip.; Keller p. 295; Borb. p. 418. Aeste zickzackförmig hin und her gebogen, mit rothbrauner oder dunkelpurpurner Farbe und hackigen, kurzen, derben Stacheln bewehrt, reichlich mit kurzen oder wenig verlängerten Blütenzweigen bedeckt, letztere weniger bestachelt, dünn, oft etwas röthlich, junge Triebe grün; Blattstiele kahl mit einzelnen rothen Stieldrüsen und wenigen Stacheln oder glatt; Blättchen mittelgross bis klein, die seitenständigen elliptisch, das endständige oval, etwas genähert, fast sitzend oder sehr kurz gestielt, oberseits grün, matt, unterseits graugrün, regelmässig doppelt-gesägt; Sägezähne oft röthlich besäumt, offen; Blütenstiele zur Zeit des Aufblühens kurz, eins bis drei, kahl wie das eilängliche oder ellipsoidische Receptakel; Blume lebhaft rosenroth; Diskus erhaben; Griffel dicht behaart; Scheinfrucht eiförmig bis eilänglich oder ellipsoidisch.

Ziemlich häufig um Obervellach an sonnigen, dünnen Berglehnen, viel verbreiteter als die *dumalis* Aut. Juni bis Juli.

Peretschitzen, Krassau, Gstran, Wolliggen D. P.

ε. f. *laeviramea* Borbás in litt. Aeste glatt und fast stachellos, Blütenzweige unbewehrt, purpurroth; Blättchen beiderseits glänzend, oberseits lichtgrün mit einem Strich in's gelbliche, Serratur ungleich, gespalten, Drüsenzähnen nicht häufig; Blattstiele, Ränder der Neben- und Deckblättchen, so wie der Kelchzipfel sehr schwach drüsig, fast glatt, Fiederchen der Kelchzipfel schmal bis sehr schmal, fadenförmig, Endzipfel verbreitert, der äusseren Kelchblättchen

drüsig gezähnt; Griffel sehr wollig, auf einem breiten kegeligen Diskus; Frucht gross, eiförmig, am Grunde fast kugelig; Blume von der Grösse der *R. rubelliflora*, jedoch sanfter rosa.

Gebüsche an einer Feldmauer im Walde ob Semslach D. P.

ζ. f. *dicranoides* Gndgr. T. 1732; Keller in litt. Blättchen ziemlich klein, sich fast berührend (die der typischen *R. dumalis* stehen entfernt); Stacheln derb; Blattstiele drüsenlos; Receptakel kurz; Griffel schlank; Blüte ziemlich klein, sanft rosa.

Gebüsche auf sonnigen Berglehnen bei Obervellach D. P.

η. f. *rhodella* Gndgr. T. 1755; Keller in litt. Blättchen lanzettlich, am Grunde keilig oder eiförmig (die obersten der Blüte nahestehenden); Stacheln gracil, mehr weniger gekrümmt, meistens zu zweien unter den Nebenblättchen; Blütenstielchen kurz, Deckblättchen die Frucht noch überragend; Blüte gross, schwach rosa, später fast weiss.

Sonnige, trockene Bergwiesen. Gebüsche ob Stallhofen D. P.

θ. f. *Carinthiae* Keller in litt. Aestchen dunkel purpurn, bestachelt, Blattstiele drüsig, stachelig; Blättchen beiderseits glänzend, zart, eiförmig lanzettlich, in eine scharfe Spitze vorgezogen, Serratur fein, scharf; Kelchzipfel dreifachfiederig, Fiederchen verlängert, lineal-lanzettlich, am Rande drüsig gezähnt, so lang oder länger als die ziemlich grossen, schwach rosafarbenen Kronblätter; Diskus kegelig; Griffel wollig, am Grunde verbunden, eine den Staubfäden am Länge fast gleiche Säule bildend.

Sonnige Gebüsche bei Obervellach sehr selten D. P., Malborgeth Rssmn.

Anmerkung. Herr Keller schrieb hiezu: Eine merkwürdige schöne Rose, deren Blütenzweige in der tiefen Serratur der Kelchzipfel einer *R. trachyphylla*, in der Griffelformation der *Rosa syntrichostyla* und *eristostyla*, in dem rothen Leibe aber der der *Rosa spuria* und *R. vinacea* Déségl. Keller (non Backer) entsprechen. Man könnte sie für eine Combination der *R. syntrichostyla* (der sie in zwei Haupteigenschaften: Blütenfarbe und Griffelform), mit der *spuria* (der sie im rothen Leibe), oder vielmehr der *R. vinacea* Keller erklären, allein die seltene Eigenschaft der dreifachgefiederten Kelchzipfel, die dicht drüsig und kämmig eingeschnitten sind, erinnert an eine *trachyphylla*; daher wohl eine ganz besonders schöne Form der *R. dumalis*.

1. f. *rubescens* Rip.; Keller p. 295; Borb. p. 418. Starker aufrechter Strauch; Stacheln derb, wenig gebogen, an den Aesten gerade, aus verbreitertem Grunde plötzlich verschmälert, roth, an den Zweigen kürzer, oft zerstreut; Blättchen etwas grösser, oberseits glänzend grün, oval, alle spitz, die unpaaren scharf gespitzt oder kurz zugespitzt, mit abgerundetem Grunde; Nebenblätter breit, gross, mit langen, schmalen, fein zugespitzten Ohrchen, am Rücken verwischt oder blasspurpurn; Blütenstiele zu eins bis drei, schon in der Blütezeit etwas gestreckt, aber von längeren blassgrünen, am Rücken hellpurpurn - gestreiften, länglich - elliptischen, blatttragenden oder einfachen, spitzovalen, nur am Rande drüsig-besäumten Deckblättern gestützt; Receptakel kurz, meist breit-eiförmig oder eikugelig bis kugelig; Kelchzipfel schmal, kürzer als die Kronblätter; letztere ziemlich gross, sattrosa mit dunkelröthlicher Nuance, in der Knospenlage roth; Scheinfrüchte eikugelig, nicht bauchig, purpurn.

Malborgeth Rss m n.

Wohl wahrscheinlich ein Bastard zwischen *R. eriostyla* und *dumalis* ist

*. f. *amphiotycarpa* Borbás in litt. vom Typus abweichend durch kleinere eilanzettliche oder lanzettliche, einfacher biserrate Blättchen, fast weisse, kleine Blüten und an beiden Enden zugespitzte Früchte, während die Griffelbildung sie der *R. eriostyla* anreicht; wenig fruchtbar.

An einer schattseitigen Berglehne bei Obervellach D. P.

2. f. *biserrata*? Merat. Aeste und Zweige sehr stachelig, Bestachelung ungleich, grössere Stacheln hackig-gebogen, kleinere fast gerade, an den Blütenzweigen fast wirtelig; Blattstiele lang, drüsig, bestachelt; Blättchen eirund, gestielt, oberstes am Grunde keilig, bespitzt; Nebenblättchen breit, kahl, drüsig gewimpert, am Rücken verwaschen röthlich, Griffel behaart; Diskus erhaben; Früchte eirund, mittlere birnförmig. Von *biserrata*, welche Keller zur *sphaeroidea* zieht, durch die dicht bewehrten Aeste abweichend.

St. Jakob an der Strasse Zwgr.

** Alle Scheinfrüchte kugelig oder an beiden Enden gleichförmig breit abgerundet, oder alle sehr breit eikugelig, Länge und Breite derselben fast gleich oder gleich.

1984. 41. *Rosa sphaeroidea* Rip. Sphärischfrüchtige Rose.
Keller p. 296; Borbás p. 419.

Hoher Strauch; Rinde grün oder nur einseitig geröthet; Stacheln der Stämme und Aeste kräftig, aus erweitertem Grunde zusammengedrückt, krumm oder an der Spitze nach abwärts gebogen, an den Blütenzweigen oftmals fehlend; Blattstiele kahl, oberseits rinnig und mit feinen Drüsen bestreut, unterseits bestachelt, grün; Blättchen fünf bis sieben, spitzoval oder an den untersten Blättern die seitenständigen breitelliptisch, oberseits glänzendgrün, unterseits blassgrün oder etwas bläulich, längs des Mittelnervs bei den meisten Blättchen mit kleinen, schwach gebogenen, nadelförmigen Stachelchen besetzt, biserrat, Sägezähne nach der Spitze des Blattes oft breiter, ziemlich gross, weniger offen, mit zwei bis drei in Stieldrüsen endigenden Sägezähnchen; Nebenblätter breit, kahl, an den Rändern drüsig, mit breiten, spitzen, theils vorgestreckten, theils abstehenden Ohrchen; Blütenstiele kahl, in der Regel gebüschelt, von breiten, oval zugespitzten, kahlen, grünen (oder ausnahmsweise an einzelnen Zweigen unterseits etwas röthlichen), nur an den Rändern drüsigen Deckblättern ganz umhüllt; Receptakel eiförmig, kahl; Kelchzipfel mit verbreiterten, gesägten, oft blattigen Anhängseln, manchmal ungleich stark entwickelt, unterseits kahl, grün, oberseits schwach filzig, wie die Ränder der zwei inneren ungetheilten, die drei äusseren fiedertheilig, mit an den Rändern drüsigen Anhängseln, länger als die Knospe, um vieles kürzer als die geöffnete Krone, herabgeschlagen und abfällig; Griffel dicht behaart bis zottig; Diskus fast flach; Blüte hellrosa; Scheinfrüchte ziemlich gross, plattkugelig eiförmig, bauchig oder breitgerundet, nicht länger als breit.

Ziemlich häufig in Hecken und auf trockenen Weiden.
 † Juni bis Juli.

Launsdorf Zwgr., ober Stallhofen und Obervellach auf Berglehnen, Sagritz D. P., Hollenburger Riegel Zwgr.

Mehr oder weniger verwandte Formen sind:

α. f. *Lejeunii* Crép. *proxima* Keller in litt. Blättchen fast eiförmig oder eiförmig-länglich, am Grunde etwas zusammengezogen oder abgerundet; Blütenzweige bestachelt, Kelchzipfel schwach drüsig-gezähnt; Blüte sehr schwach rosa, dann weiss; Scheinfrucht sehr glänzend.

In der Schattseite bei Obervellach bei einer Feldmauer D. P.

β. f. *Luxemburgianae proxima* Keller in litt. Blattstiel wehrlos oder nur mit einzelnen Stacheln besetzt, so wie der Hauptnerv fast oder ganz drüsenlos; Blättchen breit eirund oder elliptisch, das unpaare, manchmal auch das nächste Paar am Grunde herzförmig; Kelchzipfel fast so lang

als die Krone. Von der eigentlichen *Luxemburgiana* abweichend in den nicht gesättigt weinrothen Aesten, Blattstielen, Neben- und Deckblättchen und den Nerven der Blättchen.

Bei einem Feldzaune am Berge ob Stallhofen D. P.

γ. f. *sclerophylla* Gndgr. T. 1731 als Uebergangsform in *R. rubescens* Keller in litt. Zweige mehr grün; Stacheln krumm; Blättchen oft spitzig, oberseits glänzend; Receptakel in der Blüte eiförmig bis eilänglich; Blüte selbst lebhaft rosa.

Gebüsche an einem sonnigen Bergwege bei Obervellach D. P.

δ. f. *subvillosa* mihi. Blattstiele schwach behaart, aber drüsig; Sägezähne an den unteren, fast runden Blättern sehr stumpf, breit, an den oberen eiförmigen oder elliptischen, ein bis drei drüsige Sägezähnen zeigenden etwas zusammenneigend; Receptakel oval; Kelchzipfel breit, äussere gefiedert, Fiederchen schmal, schwach drüsig-gezähnt, an der ausgewachsenen, schwach glänzenden Scheinfrucht zurückgebogen, ausgesperrt oder aufrecht; Kronblättchen gross, schwach rosa; Pflanze sehr stachelig, Stacheln hie und da wirtelig, an den Blütenästchen kleiner, weinroth; s. w. *R. sphaerica*.

Auf einer sehr schotterigen, sonnigen Berglehne bei Obervellach bis jetzt nur ein mittelmässig hoher Strauch, der im Jahre 1885 gar nicht blühte, 1886 abgefressen war D. P.

ε. f. inter *R. venosam* Gndgr. et *R. vinaceam* Keller in litt. Griffel angedrückt behaart; Diskus schwach konisch; Receptakel eikugelig; Blätter entfernt stehend, fast klein, lederig, beiderseits glänzend, eirund oder fast kreisrund, doppelt gesägt; Sägezähnen sehr klein, drüsig; Rippen bleichgrün, drüsig; Blattstiele und Blütenäste mit kleinen Stacheln oder wehrlos; Deckblättchen und Kelchzipfel unterseits dunkelroth; Blüten gesättigt roth; Antheren purpurn.

Auf einer trockenen Bergwiese ob Stallhofen D. P.

ζ. *sylvularum*? Rip. Keller p. 298; Borb. p. 418. Kleiner Halbstrauch, in allen Theilen grün oder die Rinde hie und da weinroth; Zweige dünn, klein; Stacheln meist gerade, kurz; Blattstiele fein drüsig und kleinstachelig oder glatt; Blättchen alle klein, oval oder stumpfoval, doppelt gesägt, kahl; Nebenblättchen klein mit gerade vorgestreckten Ohrchen; Blütenstiele einzeln oder zu zwei bis drei, sehr kurz, von viel längeren, ovalen, zugespitzten Deckblättern gestützt; Receptakel eiförmig, kahl; Kelchzipfel fiedertheilig mit verschmälerten Anhängseln, um vieles kürzer als die Kronblättchen, abfällig; Griffel schwach behaart; Diskus konisch; Scheinfrüchte klein, roth, kugelig.

Malborgeth R s s m n., Berg? K h l m r.

7. f. *Malmundariensis* Lejeune; Keller p. 299; Borbás p. 418. Sehr hoher, verzweigter Strauch mit intensiv rothen, bläulich bereiften, jungen Trieben; Stacheln zahlreich, kräftig, sehr verbreitert, herabgekrümmt; Blattstiele oberseits ein wenig befläumt, mit Stieldrüsen reichlich bestreut, mit kleinen Stachelchen bewehrt; Nebenblätter länglich, gleichförmig verbreitert, beiderseits kahl, grün, oft am Rücken etwas roth gestreift mit abstehenden spitzen Ohrchen, ziemlich lang, fast alle bis zu dem untersten Blattpaare reichend; Blättchen längs des Mittelnerves drüsentragend, oval, spitz oder abgerundet, oberseits dunkelgrün, unterseits alle bläulich bereift mit blasspurpurröthlichen Mittel- und Seitennerven, doppelt gesägt, alle gestielt; Sägezähne alle ziemlich gross, mit der Spitze nach vorne gerichtet, jedoch nicht convergirend, auf der inneren Seite ohne, auf der äusseren mit zwei bis drei kurzen drüsentragenden Sägezähnen; Blütenstiele zu zwei bis drei, roth und kahl, so wie die Receptakel, in der Blütezeit von spitzovalen bis ovalen und zugespitzten, rothüberlaufenen, am Rande drüsigen, dieselben überragenden Deckblättern unhüllt, bei der Frucht reife der mittlere kürzer, die äusseren länger als die Scheinfrucht; Receptakel eiförmig, röthlich; Kelchzipfel unterseits kahl, oberseits und an den Rändern filzig, schmal, mit langen oder nur etwas verlängerten, kämmig eingeschnittenen, drüsig gesägten Anhängseln, nach der Blüte herabgeschlagen, später abfällig; Blüte mittelgross, rosa; Diskus schwach kegelig; Griffelköpfechen dichtzottig; Scheinfrucht ziemlich gross, breit, verkehrt-eiförmig oder kurz ellipsoidisch, sehr breit abgerundet, fast kugelig, dunkelpurpurn, glänzend.

An Feldzäunen. 5 Juli.

Siebenhügel, Victring, Pizelstetten, St. Peter am Bichl, Südfuss des Ulrichsberges, Krastowitz Zwgr., Pfaffenberg und Lassach im Möllthale D. P.

4. Unterordnung: *Caninae nudae* Déségl.; Keller p. 301; Borb. p. 335. Blattstiele kahl, höchstens längs der oberen Seite hie und da schwach befläumt, meist stacheltragend und nur einzelne Spuren von Drüsen zeigend; Blättchen völlig kahl (mit Ausnahme der *f. canina orthochlamys*), auf den Seitennerven niemals drüsig, einfach gesägt oder bei einigen Arten an einzelnen Blättchen mit durchaus gespaltenen oder unregelmässiggedoppelten, oft nur theilweise oder garnicht drüsentragenden Sägezähnen; Blütenstiele und Scheinfrüchte nie drüsig.

a. Serratur an allen Blättchen halb gedoppelt; Sägezähne gespalten Sägezähnchen in der Gestalt und Grösse ungleich, oftmals fehlend oder drüsenlos.

* Scheinfrüchte kugelig oder kurz eikugelig; Kelchzipfel entweder nach der Blüte aufgerichtet oder länger als die Blumenblätter.

1985. 42. Rosa montivaga Déségl. Bergliebende Rose.

Keller p. 302; Borbás p. 410.

Hoher Strauch; Zweige purpurn bis schwarzpurpurn; Stacheln meist zahlreich und ungleich, theils aus breitem Grunde in eine hackig gekrümmte, theils nur leicht gebogene Spitze ausgehend, theils fast gerade, letztere vorherrschend; Blattstiel oberseits am Grunde schwach befäumt, hie und da einzelne zerstreute Drüsen tragend, unbewehrt oder mit einzelnen zerstreuten Stacheln; Blättchen alle gestielt, Endblättchen oval, kurz bespitzt, am Grunde abgerundet, Seitenblättchen alle stumpf, die untersten Paare rundlich, die oberen breitoval, oberseits dunkelgrün, unterseits mit purpurnen Rippen, einfach gesägt, Sägezähne spitz, etwas zusammenneigend, die der unteren Blättchenpaare hie und da gedoppelt; Nebenblätter ziemlich gross, mehr weniger roth überlaufen, kahl, mit feinen Drüsen besäumt, in spitze Ohrchen auseinander tretend; Blütenstiele einzeln oder zu zwei bis vier, ganz kurz, in den gleich langen oder wenig längeren, drüsig besäumten, rothüberlaufenen oder dunkelpurpurnen, oval zugespitzten Deckblättern verborgen; Receptakel kahl, eiförmig, purpurbraun oder roth wie die Kelchzipfel, diese in lanzettliche lang zugespitzte Anhängsel auslaufend, die zwei inneren ungetheilt, am Rande filzig, die drei äusseren reichlich fieder spaltig mit verschmälerten bis linealen, mit einzelnen Drüsen schwach bewimperten Fiederlappen, nach der Blüte zurückgeschlagen, später abstehend oder etwas aufgerichtet und vor der Reife abfällig; Krone mittelgross, rosa; Griffel dicht kurzhaarig-zottig, ein wenig über den flachen Diskus hervorragend; Scheinfrucht kurz ellipsoidisch bis kugelig, roth.

Gebüsche auf Lehnen höherer Berge. † Juli.

Keutschacherthal Zwgr., Pfaffenberg bei Obervellach D. P., Malborgeth? Rssmn.

β. f. Magnieri Gndgr.; Keller in litt. Von obiger durch ganz einfache Serratur, längere Blütenstiele, sehr schwach behaarte, fast kahle Griffel und fast weisse Blüte verschieden.

Im Malnitzthale an einem sonnigen Abhange D. P.

1986. 43. *Rosa aciphylla* Rau. Spitzzähnlblättrige Rose.

Keller p. 303; Borb. 410.

Niedriges, schlankes Sträuchlein mit an den Stämmen und Aesten mehr zerstreuten, dünnen, fast pfriemlichen Stacheln, Zweige an den Aesten zahlreich, kurz und dicht gedrängt, schwach hin- und hergebogen, mit brauner Rinde und sparsamen krummen Stacheln; Blattstiele fast stachellos oder wenig bestachelt, fast kahl oder unterseits kahl, oberseits mit Härchen bestreut oder behaart; Nebenblättchen verschmälert, lineal, kahl, am Rande drüsig; Blättchen stets klein und ganz kahl, die unteren Paare eilanzettlich oder lanzettlich, die oberen schmal oder länglich-lanzettlich, alle scharf gespitzt, nach oben in eine feine lange Spitze vorgezogen, ungleichförmig scharfgesägt, Sägezähne in eine feine Weichspitze auslaufend, theils einfach, theils hie und da mit eingemischten, einzelnen, in eine kleine Drüse endigenden Sägezähnen; Blütenstiele kahl, kurz, einzeln oder zu drei bis vier von grossen Deckblättern ganz verhüllt; Receptakel kugelig; Kelchzipfel in lanzettliche, zugespitzte Anhängsel auslaufend, länger als die geöffneten Blumen; Krone sehr klein, fast weiss, schwach rosa angehaucht; Griffelköpfchen kurz, weisswollig; Scheinfrüchte kahl, klein, kugelig, roth.

Deutsch-Bleiberg Mar.

** Scheinfrüchte eikugelig bis eilänglich; Kelchzipfel herabgeschlagen, so lang oder um vieles kürzer als die Kronblätter.

1987. 44. *Rosa spuria* Puget. Unechte Rose.

Keller p. 304; Borbás p. 411.

Hoher, kräftiger Strauch mit purpurnen, etwas hechtblau bereiften, daher mehr minder auffallend rothvioletten Zweigen; Stacheln derb, aus verbreitertem Grunde lang und schlank oder nur wenig gekrümmt, oft ganz gerade, obere etwas kleiner, manchmal purpurn; Blattstiele purpurn, unterseits bestachelt und kahl, oberseits ein wenig beflaumt, Härchen von längerer Dauer, dichter, oft noch zur Zeit der Frucht reife wahrnehmbar, alle oder nur die der unteren Blätter mit Stieldrüsen sparsam bestreut; Blättchen zugespitzt oder spitz-oval, das unpaare am Grunde verschmälert, mittelgross, einfach gesägt, nur die unteren in der Regel mit gedoppelter oder schwach zusammengesetzter Serratur; Nebenblätter purpurn, kahl, die der sterilen Zweige schmal, jene der Blütenzweige unter der Inflorescenz breiter, am Rande mit feinen Drüsen besäimt, mit spitzen vorgestreckten Oehrchen; Blütenstiele einzeln, kahl, am Grunde von purpurnen, ovalen,

zugespitzten, um vieles kürzeren Deckblättern gestützt; Receptakel eiförmig, kahl; Kelchzipfel purpurn, die zwei inneren ungetheilt, die drei äusseren schwach fiedertheilig mit wenigen, schmal lanzettlichen kurzen Fiederlappen, um vieles kürzer als die Kronblättchen, nach der Blüte herabgeschlagen, abfällig; Griffel schwach behaart; Krone gross, hellrosa; Diskus flach; Scheinfrüchte ziemlich gross, eiförmig oder ellipsoidisch, purpurn. Mit ihren vielen Abänderungen und nahen Anverwandten sehr verbreitet.

Keutschacherthal, Siebenhügel, Ulrichsberg, St. Peter am Bichl, Hochosterwitz Zwgr., Möllthal sowohl an sonn- als schattseitigen Berglehnen D. P., Bleiberg Mar., Weidischgraben Zwgr.

β. R. sp. *oenophorae* Gndgr. proxima T. 1437; Keller p. 305 R. *spuria* versus *euoxyphyllam* Borb. Blättchen lanzettlicher als beim Typus; Aeste bestachelter, Stacheln sichelig gekrümmt; Blattstiele fast drüsenlos; Frucht eiförmig oder eikugelig; Griffel wolligfilzig, lang.

Obervellach, Teichl, Fragant D. P., Malborgeth Rssmn., Bleiberg Mar.

γ. var. versus *Wimmerianam* Gndgr. T. 1446. Ganz grün oder schwach purpurröthlich; Blattstiele kahl, wehrlos oder fast wehrlos, die wenigsten etwas behaart; Aeste bestachelt, Blütenstielchen bei 10 mm. lang; Blättchen verkehrt-eiförmig, am Grunde verengt; Frucht eiförmig. Keller in litt.

Sonnige Berglehne bei Obervellach D. P.

δ. var. versus *umbilicatum* Gndgr. T. 1382; Keller in litt. Eine kleine an R. *ramulosa* erinnernde Form; Griffel kaum behaart; Diskus erhaben oder flach; Krone rosa; Blütenstielchen bei 13—15 mm. lang; Blütenäste bestachelt; Blättchen klein, am Grunde zusammengezogen bis abgerundet, verkehrt-eiförmig; Serratur einfach, selten mit Nebenzähnen, Mittelrippe drüsenlos; Frucht verkehrt-eiförmig, länglich.

Ein Strauch auf einer Weide ob der Malnitzer Strasse ob Obervellach D. P.

ε. f. *fissidens* Borbás; Keller p. 305. Hoher Strauch; Zweige und Blätter grün; Blattstiel befäumt oder kahl. Serratur an allen Blättchen oder vorherrschend gespalten; Blüten rosa oder fast purpurn.

Ziemlich häufig in der Umgebung von Obervellach D. P.

ζ. f. *Vellacensis* mihi. Glänzende wie lackirt rothe Zweige und Blättchen; Stacheln klein, zahlreich, krumm;

Blättchen eiförmig, spitz, theilweise doppelt gezähnt; Krone sanft rosa, dann fast weiss; Griffel dicht behaart bis zottig; Scheinfrucht lang gestielt, eirund oder kugelig; wie bei *R. sphaeroidea* Rip.

Auf einem Feldgesteinhaufen auf der Gemeindeweide von Obervellach D. P.

η. f. *firmula* Christ; Keller p. 306. Mittelhoher Strauch mit dünnen, stark verzweigten, grauen Aesten, die theils wehrlos theils bestachelt sind; Stacheln dünn, gerade oder fast gerade, kurz; Blattstiele drüsig, so wie die Nebenblätter roth überlaufen; Blättchen oboval oder elliptisch, häufig breit abgestumpft oder spitz mit keiligem Grunde und spiegelnder Oberfläche; Serratur tief, einfach bis ungleich doppelt; Blüten einzeln, klein, rosa; Kelchzipfel mit linealen, drüsenlosen Anhängseln; Griffel schwach behaart; Fruchtstiele lang.

Maria Saaler Berg ober Terndorf Zwgr., Bleiberg Mar.

b. Serratur an allen Blättern einfach, ungespalten; Sägezähne gleichgeformt, Doppelzähne sehr selten.

1988. 45. *Rosa canina* L. Hunds-Rose, Hötschepötsch, Hatschepatsch, Hagebutten.

Keller p. 308; Borbás p. 411; Christ p. parte p. 153; Koch p. parte p. 266.

Grosser starker Strauch; Aeste meist bogig überhängend, Zweige gestreckt, dünn, Stacheln breit, hackig, derb, an den Blütenzweigen kleiner, aber gleichgestaltet; Blattstiele bestachelt, haar- und drüsenlos oder nur einzelne Spuren von Drüsen zeigend; Blättchen oval-elliptisch, beiderseits, auch an den Nerven haar- und drüsenlos, einfach gesägt, Serratur meist schmal und scharf, oft drüsenlos oder mit theilweise drüsigen Sägezähnen, letztere gegen die Spitze des Blättchens etwas convergirend; Nebenblättchen länglich, die der sterilen Triebe schmal, jene der Blütenzweige unter den Blütenstielen breiter, aber selten blattartig, ganz kahl, mit spitzovalen, vorgestreckten oder abstehenden Oehrchen, am Rande schwach drüsig gewimpert; Blüten in lockeren Büscheln zu drei bis fünf; Blütenstiele mindestens so lang oder länger als das Receptakel, ganz kahl, niemals behaart oder drüsig, letzteres eiförmig, grün; Kelchzipfel kahl oder nur sehr sparsam drüsig gewimpert, die drei äusseren reich fiederspaltig mit lanzettlichen nicht verlängerten Lappen, kürzer als die entfaltete Krone, nach der Blüte zurückgeschlagen, schon vor

Färbung der Scheinfrucht abfällig; Krone hellrosa, ganzrandig, seltener etwas ausgerandet; Griffel kurzhaarig, nach der Blüte etwas hervorragend, um vieles kürzer als die Staubfäden, den breiten Diskus krönend; Scheinfruchtstiele meist aus den Deckblättern vorragend; Scheinfrucht aufrecht, eiförmig oder eilänglich bis flaschenförmig, knorpelig, scharlachroth, erst durch die eintretenden Fröste weich, von schwachem Wohlgeruch.

In Gebüschern jedoch hier wie die *R. dumalis* Aut. f. *typica* selten. † Juni bis Juli

Gebüsch um Obervellach D. P., Malborgeth Rssmn., Tiffen D. P., Weidischgraben Zwgr.

Nächst verwandte Formen sind:

α. *nitens* Desv.; Keller p. 309; Borb. p. 411. Blattstiele nicht ganz glatt, sondern meist mit wenigen zerstreuten Drüsen; Blättchen auffallend firnissartig glänzend, nicht gross, meist spitzoval oder breitoval und zugespitzt, beiderseits fast gleichfarbig grün; Scheinfrucht eiförmig oder wenn mehrere, die seitenständigen birnförmig, wie deren Stiele ganz glatt.

Launsberg bei Obervellach, ob Semslach D. P., Malborgeth Rssmn.

1. *modificat. subnitens* Gndgr.; Keller p. 309. Blättchen sehr gross, lederig, stark glänzend, dunkelgrün, zweifarbig, Serratur ziemlich reichlich gespalten.

Sonnige Berglehne (Gstran) bei Obervellach D. P.

2. *modif. villosula* Gndgr.; Keller p. 309. Blattstiele sehr schwach behaart; Deckblätter stark entwickelt, breit.

Satnitz Hsr., Berge bei Obervellach D. P., sehr selten.

3. *modif. subobtusa*; Keller p. 309. Blättchen dunkelgrün, matter glänzend, die Seitenblättchen abgestumpft bis abgerundet breit-eirund, oval, meist zu fünf; Stacheln dünner; Kelchzipfel kurz, auf der Innenseite purpurn, wie der abgestutzte kegelförmige Diskus; Receptakel kurz und breit, verkehrt-eiförmig.

Linz ob Tiffen, Berggebüsch bei Obervellach D. P., Malborgeth Rssmn.

β. f. *glaucescens* Desvaux; Keller p. 310; Borb. p. 411. Zweige dick, Stacheln gross, wenig zahlreich, alle Theile blau bereift; Blättchen elliptisch, klein, dicklich, oft lichtgrün; Serratur liegend mit sehr zahlreichen, ganz kurzen conniventen Sägezähnen.

Wolliggenberg bei Obervellach D. P., Hollenburger Riegel Zwgr.

γ. f. oxyodonta Kerner in Sched. und Deségl. in litt. ad Kerner; Keller p. 311. Mittelhoher, gedrungener Strauch; Aeste abstehend, dick, Rinde an der Sonnenseite bräunlich, stellenweise schwach purpurn überlaufen, glänzend, auf der Schattenseite matt, grün, mit zerstreuten, kurzen hackigen Stacheln bewehrt; Zweige oft sehr verkürzt, Blätter scheinbar aus einem Punkte entspringende in verbreiterte Nebenblätter gehüllte Büschel bildend; Zweige der sterilen Triebe entwickelt, länger; Stacheln der Zweige aus länglich elliptischem, etwas verbreitertem Grunde plötzlich verschmälert, kurz, klein bis sehr klein, blass, stets sehr dünn, fein und stark gebogen; Blattstiele kahl, seltener oberseits mit einzelnen Härchen befümt, meist unbewehrt, hie und da purpurn, die der untersten Blätter in der Regel zu vier bis sechs, scheinbar aus demselben Punkte entspringend; Blättchen zu fünf bis sieben, alle abgerundet, die der Blütenzweige rundlich, die der unteren Paare kreisrund, klein, die mittleren grösser, rundlich oder verkehrt-eirund mit breiter, gestutzter Basis, theils sitzend, theils in sehr kleine Stielchen zugeschweift, sehr genähert oder sich deckend, Endblättchen, so wie sämtliche Blättchen der sterilen Triebe länglich oval, an beiden Enden schmal zugerundet, alle einfach ausgebissen-gesägt oder gezähnt; Sägezähne kurz, rundlich, mit theils abstehenden, theils nach einwärts gerichteten kurzen Weichspitzen, der endständige Sägezahn theils quer abgestutzt, theils dreispitzig, stets mit einem aufgesetzten, an den sterilen Trieben oft langen, borstenförmigen Stachelspitzchen; Nebenblätter durchaus lang und breit, grösstentheils bis zur halben Länge der Blattstiele reichend, auffallend bleich, weisslichgrün oder grauweiss, bläulich überlaufen mit eilanzettlichen, wenig abstehenden Oehrchen, die an den Rändern gesägt sind, hie und da purpurn, die Blütenzweige der ganzen Länge nach bedeckend; Blütenstiele sehr kurz, oft kürzer als das eiförmige, gegen die Spitze zu etwas verschmälerte Receptakel, beide ganz kahl, letzteres oft violett überlaufen; Kelchzipfel oval, in eine kurze fadenförmige Spitze endigend, zwei ganzrandig, drei fiedertheilig, Fiederlappchen fädlich, sehr kurz, nach der Blüte herabgeschlagen; Griffel kurz behaart; Diskus schmal, fast fehlend; Blume klein, rosa, Scheinfrucht eikugelig.

Maria Saaler Berg ober Terndorf Zwgr.

δ. f. brevipes Borbás p. 411, 412. Bezahnung mehr weniger gespalten, Diskus kegelig, die elliptische oder ovalbirnförmige Scheinfrucht länger als der Fruchtsiel.

Kreuzbergl, Ehrenthaler Bichl, St. Jakob an der Strasse Zwgr.

1989. 46. Rosa sphaerica Gren. Halbkugelfrüchtige Rose.

Keller Nachtr. z. Fl. v. Niederösterreich. 1882, p. 312;
Borbás p. 410.

Strauch kräftig, Stämme aufrecht; Stacheln auffallend verbreitert, herabgebogen, meist zusammengedrückt; Blattstiele dünn, am Grunde mehr weniger beflümt oder theilweise behaart, besonders an der Insertion der Blättchen, mit oder ohne Drüsen, unterseits mehr minder bestachelt; Blättchen zu fünf bis sieben, spitzoval, alle gestielt, oft schwach zur Basis verschmälert, einfach gesägt, oberseits hellgrün, unterseits etwas bläulich und drüsenlos, steiflich, beiderseits ganz kahl, höchstens einige Sägezähne am Grunde der Blättchen mit wenigen Drüsen besetzt und scheinbar doppelt gesägt; Nebenblätter breit mit lanzettlichen, ein wenig drüsig gesägten Ohrchen; Blütenstiele einzeln oder gebüschelt, kahl, kurz, von kahlen, spitzovalen Deckblättern umfassen, Receptakel halbkugelig, kahl; Kelchzipfel abstehend, die zwei inneren am Rande filzig, ungetheilt, die drei äusseren fiederschnittig, mit verlängerten, lanzettlichen Lappen, abfällig; Krone blassrosa, ziemlich klein; Griffel in einem sehr kurzen Bündel, dicht kurzhaarig, zottig; Diskus flach; Scheinfrucht aufrecht, kugelig, mittlere oft birnförmig, knorpelig, dunkelscharlachroth, spätreif.

Kreuzbergl westlich von der Kirche Zwgr.

10. Rotte: **Eglanteriae De C.** Keller p. 313; Borb. p. 338. Sträucher mit schlanken, rothen Zweigen und doppelter Bestachelung; Stacheln theils derb und gerade oder hackig, theils borstig; Blättchen oftmals klein, zu fünf bis neun, mit reichgedoppelter bis zusammengesetzter, nach vorne geneigter Serratur; unterseits mehr minder drüsig; Blütenstiele kahl, seltener etwas beflümt oder schwach drüsig, mit kleinen hinfalligen Deckblättchen gestützt; Kelchzipfel ganzrandig oder fiedertheilig, längere Zeit bleibend, jedoch zurückgeschlagen oder abfällig, am Rücken mehr minder drüsig; Blüten gelb (oder roth); Receptakel breit, geöffnet, mit einer die Staubfäden umfassenden, aus der Oeffnung hervorragenden Haarkrone; Antheren länglich, am Grunde pfeilförmig; Griffel wollig, frei; Diskus flach; Scheinfrucht plattkugelig, aufrecht.

1990. 47. Rosa lutea Dalech. Mill. Gelbe Rose.

Keller p. 313; Koch p. 261.

Bestachelung doppelt, gerade, die der Wurzeltriebe gedrungen, ungleich, die grösseren pfriemlich, die kleineren borstlich, an den Zweigen zerstreut, kürzer, etwas gekrümmt; Blättchen klein, rundlich oder elliptisch, meist gleichfarbig, unterseits feindrüsig; Serratur doppelt; Nebenblätter alle gleichgestaltet, flach, am Rande umgebogen, linealkeilförmig, Ohrchen lanzettlich zugespitzt, auseinanderfahrend; Blütenstiele nackt; Kelchzipfel unregelmässig fiederspaltig, aussen etwas drüsig, bleibend, aber zurückgebogen, stets kürzer als die citrongelbe, wanzenartig riechende Blumenkrone; Scheinfrucht mit bleibenden weit abstehenden oder zurückgebogenen Kelchzipfeln bekrönt, gelblich scharlachroth.

Hie und da in Gärten, jedoch meist die modif. *punicea* Koch mit scharlachrother Krone.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wild auf einer Viehweide in einem lichten Föhrenwalde oberhalb Terndorf auf der Südseite des Maria Saaler Berges und am Schleppekogel. Die Blätter stimmen vollständig mit der gefüllten Varietät der *Rosa lutea* Persian Yellow der Gärten. Die gelben Blüten waren leider vom Vieh abgebissen, wurden aber Tags vorher noch von einem Gärtner gesehen. 20. Juni 1884 Zwgr.

Anmerkung. Um Klagenfurt sind alle wilden Rosen selten geworden, weil sie von den Hetschengräbern für die Gärtner zum darauf Veredeln der gefüllten Gartenrosen nahezu ausgerottet wurden, wie auch *Rosa alpina* L. und *R. austriaca* Crantz in der Satnitz forstmässig fast gänzlich wegcultivirt wurden Zwgr.

3. Gruppe: **Dryadeae Vent.** Schalfrüchte nuss- oder steinfruchtartig, meist zahlreich, auf einem saftigen oder trockenen Fruchtboden sitzend, öfters eine falsche Beere darstellend.

DLXXXIV. Rubus L. Brombeere.

(XII. 3. n. 316.)

1. Rotte: **Petrobatus Celak.** Blütenstock einjährige Blütenstengel und Laubtriebe treibend; Nebenblätter stengelständig; Blätter dreizählig; Blütenboden flach; Früchte roth, kahl.

1991. 1. **Rubus saxatilis L.** Felsen-Brombeere.

Koch p. 248; Neilr. p. 901; Grke. p. 128; Focke Synops. Rub. Germ. p. 95.

Schösslinge niedergestreckt, ausläuferartig, stachellos, der fruchttragende Stengel aufrecht; Blättchen verkehrt-

eiförmig, eingeschnitten gesägt, beiderseits grün; Ebenstrauss endständig, drei- bis sechsblütig, Krone klein, weiss; Frucht roth; Schale der Steinfrucht glatt.

Trockene Laubwälder, besonders auf kalkiger Unterlage.

4 Juni bis August.

Satnitz Kkl., Osterwitz Zwgr., Südseite der Rabensteiner Felsen bei St. Paul Grf., Wolfsberg Hfnr., Malnitz am Rabischhügel D. P., Schwandkopf Hkl., Zlapp bei Heiligenblut D. P., Feistritz im Oberdrauthale bis auf den Reisskofel, Gössering, Weissbriach Khlmr., Lesachthal Jab., Tröpolach gegen die Kirche St. Leonhard D. P., Garnitzen-Graben bei Hermagor Preissmn., Raibl, Königsberg Zwgr., Predil Preissmn., Tarvis gegen Weissenfels Schnk., Dobratsch Mar., Karawanken Jab., Seleniza Jschn., Obir Grf., Gebirge im Jaunthale Jschn.

2. Rotte: **Idaeobatus Focke**. Wurzelstock zweijährige Schösslinge treibend, die im ersten Jahre steril bleiben und im zweiten Jahre erst Blütenzweige entwickeln; Nebenblätter blattstielständig; Blätter gefiedert, fünf- (drei bis sieben) zählig; Früchte vom kegelförmigen, trockenen Fruchtboden sich ablösend, sammtig behaart, roth.

1992. 2. **Rubus Idaeus L.** Himbeere.

Koch p. 248; Neir. p. 901; Grke. p. 127; Focke p. 97; Wulf. p. 522.

Schösslinge bereift, kahl, etwas stachelig, fast aufrecht; Blätter siebenzählig gefiedert, obere dreizählig; Blättchen unterseits weissfilzig, eiförmig, ungleich scharf gesägt; Seitenblättchen sitzend; Nebenblättchen fädlich; Rispe schlaff, wenigblütig; Krone weiss.

In Gebüsch, besonders in Holzschlägen oft sehr häufig.

4 Mai bis Juni.

Satnitz Kkl., Zwanzgerberg Wulf., Ulrichsberg Kkl., Lavantthal Wsbr., Gurkthal, Tiffen, Leoben D. P., Umgebung Kanning, Maltathal Khlmr., Möllthal D. P., Malnitz Berr., Sagritz Wulf., Oberdrauthal Khlmr., Tröpolach D. P., Wischberg Mrchs., Tarvis Schnk., Stougruppe Jab., Loibl und Bärenthal Kkl.

3. Rotte: **Eubatus Focke**. Blätter gefingert oder fussförmig, drei- bis fünfzählig; Früchte mit dem erweichenden oberen Theile des Fruchtbodens verbunden, abfallend, schwarz oder schwarzroth, kahl; s. w. v.

A. Suberecti Focke p. 103. Vegetative Vermehrung in der Regel durch Adventivknospen aus langen Ausläuferwurzeln; Schösslinge fast aufrecht oder hochbogig, kahl oder mit vereinzelt Haaren, fast niemals wurzelnd; Blätter meist zu sieben, beiderseits grün, unterste Seitenblättchen oft fast sitzend, normale Blütenstände traubig, meist wenigblütig und wenig bewehrt; Kelchzipfel aussen grün, weiss berandet; Staubgefässe nach der Blüte abstehend vertrocknend, seltener zusammenniegend.

1993. 3. Rubus suberectus Anderson. Halbaufgerichteter Brombeerstrauch.

Focke p. 104; Grke. p. 118; Nachträge z. Fl. v. Niederösterreich. 1882; p. 320.

Schösslinge am Grunde rundlich, in der Mitte stumpfkantig, kahl, meist unbereift, mit kleinen geraden, am Grunde oft braunrothen, nach oben spärlicher werdenden Stacheln besetzt; Blätter drei- bis siebenzählig, äussere sitzend oder sehr kurz gestielt; Blättchen dünn, flach, lebhaft grün, fast kahl, ungleich-scharfgesägt, das endständige herzeiförmig, lang zugespitzt; Blütenzweige schwach bewehrt, mit dreizähligen ungetheilten Blättern besetzt; Rispe wenigblütig (fünf bis zwölf), an der Spitze doldentraubig; Kelchzipfel nach dem Verblühen meist abstehend; Kronblättchen gross, verkehrt-eiförmig, weiss; Staubgefässe anfangs die Griffel überragend, später ausgebreitet; Früchte klein, braunroth, himbeerartig schmeckend.

In Holzschlägen, an Waldrändern. † Juni bis Juli.

In der Nähe des Bades St. Leonhard ob Sirnitz D. P.

1994. 4. Rubus fruticosus L. (pro parte). Strauchiger Brombeerstrauch.

Focke p. 111 R. plicatus W. et N.; Grke. p. 118; Nacht. z. Fl. v. Niederöst. p. 321.

Schösslinge am Grunde stumpf; gegen die Mitte scharfkantig, oft gefurcht, kahl, unbereift, mit mittelstarken, meist gekrümmten Stacheln besetzt; Blätter fünfzählig, äussere Blättchen fast sitzend oder kurz-gestielt, gefaltet, scharf doppelt sägezählig, beiderseits zerstreut angedrückt behaart, das endständige herzeiförmig zugespitzt; Blütenzweige mit zerstreuten, derben Stacheln und drei- bis fünfzähligen Blättern; Rispe wenigblütig, fast traubig; Kelchzipfel grün, weissfilzig berandet, nach dem Verblühen meist abstehend; Kronblättchen mittelgross, verkehrt-eiförmig, weiss oder röth-

lich, am Rande oft umgerollt; Staubgefässe kürzer oder so lang als die Griffel, ausgebreitet; Früchte schwarz, mittelgross, säuerlich, nicht aromatisch.

In Gebüsch, Wäldern. † Juni bis August.

Kreuzbergl hinter St. Martin Kkl., Tiffen D. P.

Anmerkung. *Rubus fruticosus* L. und Koch p. 248; Wulf. 522; Neilr. p. 902, ist in Kärnten sehr verbreitet, Lavantthal, Satnitz, Kanning, Maltathal, Weissbriach, Oberdrauthal, Raibl, Karawanken, leider überall ohne nähere Angabe, welcher Form angehörig.

1995. 5. *Rubus sulcatus?* Vest. Gefurchter Brombeerstrauch.
Focke p. 119; Fl. v. Niederöst. 1882, p. 322.

Schösslinge kantig, gefurcht, mit starkengeraden Stacheln; Blättchen flach, scharf gesägt, beiderseits lebhaft grün, oberseits fast kahl, unterseits auf den Nerven behaart; Blütenzweige wenig bewehrt, abstehend-behaart mit meist dreizähligen Blättern; Kelchzipfel nach dem Verblühen zurückgeschlagen; Kronblättchen gross; Staubgefässe länger als die Griffel, ausgebreitet; Früchte länglich, schwarz; s. w. v.

In Wäldern. † Juli bis August.

Um Berg im Oberdrauthale (soweit die mangelhaften Exemplare erkennen lassen) Khlmr.

B. *Rhamnifolii* Focke p. 125. Schösslinge hochbogig, sparsam behaart, selten ganz kahl, im Herbst meistens an der Spitze wurzelnd; Blättchen alle deutlich gestielt, beiderseits grün oder unterseits grau- bis weissfilzig; Blütenstand rispig oder oberwärts traubig, nach der Spitze zu verjüngt, manchmal stark bewehrt; Kelchzipfel aussen graugrün bis weissfilzig; Staubgefässe nach dem Verblühen zusammenneigend oder der Frucht angedrückt.

1996. 6. *Rubus affinis* Weihe et Nees. Anverwandter Brombeerstrauch.

Focke p. 134; Grke. p. 118.

Schösslinge kahl; Blätter manchmal siebenzählig, Endblättchen breit herzeiförmig, lang zugespitzt, fast dreimal so lang als der besondere Blattstiel; Inflorescenz gegen die Spitze verjüngt (schmäler werdend), Stielchen aufrecht-abstehend behaart, mit langen, wenig gekrümmten Stacheln dicht besetzt.

In Gebüsch, an Waldrändern. † Juni bis August.

Ober St. Martin bei Klagenfurt Jab., bei Tiffen und Leoben D. P.

β. var. Blütenstielchen, Kelchblättchen mit Drüsen mehr weniger besetzt und Kronblättchen nicht bewimpert, s. w. *affinis*.

Bei einem Feldzaune am Berge ob Semslach im Möllthale D. P.

C. Candicantes Focke p. 154. Wurzelbrut fehlend; Schösslinge hochwüchsig, bogig, kantig, gefurcht, kahl oder behaart, im Herbst manchmal mit den Spitzen wurzelnd; Blättchen oberseits wenig behaart oder kahl, unterseits filzig und mit längeren Haaren bekleidet (Vestii ausgenommen); Blütenstand verlängert, schmal, von unten bis oben fast gleichbreit; Blütenstiele wehrlos oder sparsam bewehrt; Kelchzipfel aussen graufilzig, zurückgeschlagen; Staubgefässe nach der Blüte zusammenneigend.

1997. 7. Rubus Vestii Focke. Vests Brombeerstrauch.

Focke p. 155; Nachtr. z. Fl. v. Niederöster. p. 322.

Ausgewachsene Blättchen zart, unterseits grün, Endblättchen aus herzförmigem Grunde breit-elliptisch oder fast kreisrund, ungleich gesägt; Blütenzweige abstehend-behaart, mit mässig starken zerstreuten sichelförmigen Stacheln und drei- bis fünfzähligen Blättern besetzt; Rispe lang, schmal, locker, entweder ganz oder doch oberwärts traubig; Kronblättchen gross, breit-elliptisch oder eiförmig, weiss oder blassroth; Staubgefässe länger als die Griffel, anfangs aufrecht, dann ausgebreitet, nach dem Verblühen zusammenschliessend; Fruchtknoten an der Spitze bärtig-zottig; Früchte schwarz, glänzend.

An Waldrändern. † Juni bis Juli.

Klagenfurt am Kreuzbergl Jab. Nicht typisch, jedoch nach den Beschreibungen Fockes keiner Art näher und könnte als Verbindungsglied der *R. suberecti* mit den *R. candicantes* angesehen werden.

1998. 8. Rubus thyrsoides Wimmer. Straussblütiger Brombeerstrauch.

Focke p. 161; Nachtr. z. Fl. v. Niederöster. p. 323; Grke. p. 118.

Schösslinge kahl, am Grunde und an den Kanten mit meist geraden Stacheln besetzt; Blätter fingerig fünfzählig, äussere Blättchen deutlich gestielt, ungleich grob gesägt, ober-

seits kahl, unterseits grau- oder weissfilzig, das endständige eilänglich zugespitzt; Blütenzweige abstehend behaart, mit mittelstarken, zerstreuten, sichelförmigen Stacheln und drei- bis fünfzähligen Blättern besetzt; Rispe lang, schmal, locker, meist mit dreiblütigen Aestchen; Kelchzipfel graufilzig, zurückgeschlagen; Kronblättchen mittelgross, länglich weiss oder rosa; Staubgefässe länger als die Griffel, anfangs aufrecht, dann ausgebreitet, nach dem Verblühen zusammenneigend; Fruchtknoten kahl; Früchte schwarz, glänzend.

Gebüsche an Ackerrainen, Waldrändern. † Juni bis Juli.
Ackerrand ob Semslach im Möllthale D. P.

D. Villicaules Focke p. 175. Ohne Wurzelbrut; Schösslinge bogig niedergestreckt oder klimmend, behaart (sehr selten kahl), im Herbst wurzelnd; Blättchen deutlich gestielt, unterseits oft filzig; Blütenstand zusammengesetzt, nach der Spitze zu verjüngt; Kelch aussen graufilzig; Staubgefässe nach dem Verblühen zusammenneigend oder der Frucht anliegend; Stieldrüsen fehlen.

1999. 9. Rubus bifrons Vest. Zweigestaltiger Brombeerstrauch. Focke p. 186; *R. discolor* Gren. et Godr. non Weihe et N.; Neilr. p. 903 *Rub. frut. γ. discolor*.

Schösslinge stumpfkantig, zerstreut behaart, fast immer braun gefärbt, Stacheln lanzettlich, lang, kräftig, am Hauptstamme gerade, an den Zweigen häufig gebogen; Blätter dreizählig oder fussförmig fünfzählig; Blattstiel oberseits flach, sparsam angedrückt behaart, krummstachelig, meist rothbraun; Blätter oberseits kahl, unterseits weissfilzig, Bezahnung sehr scharf, Stielchen des Endblättchens etwa halb so lang als das Blättchen, dieses rundlich-elliptisch; Blütenzweige mit dreizähligen Blättern und unterwärts mit zerstreuten kräftigen Stacheln; Blütenstand ziemlich lang, ausgebreitet rispig, Achse und Blütenstiele dicht abstehend behaart, mit starken, schlanken, geraden oder etwas abwärts geneigten Stacheln bewehrt; Rispenäste abstehend, fast sparrig; Kelche unbewehrt, graufilzig, eiförmig, bespitzt, zur Blüte- und Fruchtzeit zurückgeschlagen; Kronblättchen verkehrt-eiförmig, in den Nagel verschmälert, oft wellig kraus, weiss, Staubgefässe die Griffel überragend, diese grünlich; Frucht glänzend.

Sonnige Raine und Waldblössen. † Juli bis August.

Keutschachthal bei Klagenfurt, Ulrichsberg Zwgr., Tiffen D. P.

E. Tomentosi Focke p. 225. Schösslinge theils aufrecht, theils niederliegend, unbereift mit fast

gleichen Stacheln, manchmal auch mit Stieldrüsen, Stachelborsten oder Stachelhöckern besetzt; Blätter drei- bis fünfzählig mit gefurcetem Blattstiel; Blättchen oberseits sternfilzig oder zerstreut sternhaarig (sehr weich zum Anfühlen); Blütenstand dicht und verlängert; Stieldrüsen bald zahlreich, bald vereinzelt, bald fehlend; Fruchtsteinchen ellipsoidisch.

2000. 10. *Rubus tomentosus* Borkh. Filziger Brombeerstrauch. Focke p. 226; Nachtr. z. Fl. v. Niederöster. p. 327; Grke. p. 119; Rub. frutic. δ . toment. Neilr. p. 903.

Blätter meist dreizählig, rhombisch, vorn ungleich grob gezähnt, nach dem Grunde keilförmig, ganzrandig, oberstes Blättchen sehr kurz gestielt, unterseits weissfilzig; Blütenzweige mehr, minder behaart, mit Stieldrüsen; Kelchzipfel graufilzig, zurückgeschlagen; Kronblättchen elliptisch, weiss in's gelbliche, seltener rötlich; Staubgefässe griffelhoch, ausgebreitet; Fruchtknoten kahl; Früchte schwarz, glänzend.

Sonnige Abhänge in Gebüsch. † Juni bis Juli.

Klagenfurt Herb. Hs r., Sallach bei Tiffen D. P.

F. *Adenophori* Focke p. 78 und 247. Schösslinge bogig oder aus bogigem Grunde niederliegend, mehr oder minder behaart, selten ganz kahl, häufig drüsenführend, mitunter, namentlich oberwärts durch Drüsenborsten rauh mit fast gleichen Stacheln bewehrt; Uebergänge zwischen Stacheln und Borsten fehlen; Blättchen oberseits kahl oder behaart, in der Regel auch die äusseren deutlich gestielt; Blütenstand zusammengesetzt oder oberwärts traubig, mit bestachelten, mehr oder minder zahlreiche Drüsen führenden Aestchen; Staubgefässe nach dem Verblühen der Frucht angedrückt oder über derselben zusammenneigend; Steinchen halbkreisförmig.

2001. 11. *Rubus Reichenbachii*? Köhl. Reichenbach's Brombeerstrauch.

Focke p. 260 non Grke. p. 123.

Am Schössling einzelne Stieldrüsen und kleine Stacheln, diese mässig lang, rückwärts gebogen; Blättchen beiderseits grün, sehr schwach behaart; Blattstiele und Mittelrippe bis zur Hälfte hinauf sehr stachelig; Stacheln sichelförmig gekrümmt

(könnte mit Recht infestus heissen); Blütenstiele auffallend kurz, stachelig, wollig-filzig und drüsig; Kelchzipfel wollig-filzig, zurückgebogen.

Gebüsche bei Tiffen. † August bis September 1869 D. P., jedoch nicht genau, vielleicht neu.

G. Hystrices Focke p. 342. Schösslinge niederliegend oder kletternd, in der Regel undeutlich kantig, oberwärts gerundet-fünfeckig, mit undeutlichen zum Theil ziemlich kräftigen Stacheln und Stieldrüsen von verschiedener Länge besetzt; Blütenstand zusammengesetzt, die untersten Aestchen traubig, die mittleren, oft auch die oberen drei- bis mehrblütige Dichasien tragend, die obersten mitunter einfach; Aestchen und Blütenstiele dicht mit ungleichen Stieldrüsen besetzt, von denen die grösseren weit länger sind als der Querdurchmesser der Blütenstiele. Niedrige, oft kriechende oder niederliegende Arten.

2002. 12. Rubus apricus? Wimmer. Wärmeliebender Brombeerstrauch.

Focke p. 351; Nachtr. z. Fl. v. Niederöst. p. 335.

Stachelchen der Schösslinge ungleich, pfriemlich, rückwärts gebogen, mit Stieldrüsen und geraden Stachelborsten; Blätter drei- bis fünfzählig, Blattstiel mit grösseren gebogenen und kleineren geraden Stacheln und Stieldrüsen dicht besetzt; Blättchen oberseits fast kahl, unterseits grün, filzig; Endblättchen fast viermal länger als das Stielchen; Blütenzweige abstehend behaart, ungleich, stieldrüsig; Rispenästchen und Blütenstielchen sehr dicht mit ungleichen Nadelstachelchen besetzt; Kelch graugrün, drüsenborstig, mit eilanzettlichen langgespitzten, nach dem Verblühen aufgerichteten Zipfeln.

Sehr sonnige Stellen bei Tiffen gegen Sallach. August bis September D. P.

H. Glandulosi Focke p. 355. Schösslinge in der Regel rundlich, oft bereift, mit Stacheln, Borsten und Stieldrüsen verschiedener Gestalt und Länge besetzt, so dass mancherlei Uebergänge vorkommen; Blätter meistens beiderseits grün; die äusseren stets deutlich gestielt; Blütenstand in der Regel oberwärts traubig, die unteren Aestchen traubig, die mittleren zwei- bis dreiblütig, alle Aestchen nebst den Blütenstielchen mit ungleichen, fast immer theilweise den Haarfilz überragenden

Stieldrüsen, weit länger als der Querdurchmesser der Blütenstielchen. Niedrige, kriechende, meist rothdrüsige Arten.

2003. 13. *Rubus Metschii?* Focke. Metsch's Brombeerstrauch.
Focke p. 359.

Schösslinge niederliegend, kantig, gefurcht, bereift, spärlich behaart, aber reichlich mit Drüsen und kurzen, nach rückwärts geneigten, oft fast gleichen Stacheln versehen, grössere Stacheln am Grunde beträchtlich verbreitert; Blätter dreizählig und fussförmig, fünfzählig, Endblättchen länglich-eiförmig oder verkehrt-eiförmig, am Grunde abgerundet oder etwas herzförmig, allmählig in eine lange Spitze verschmälert; Blütenstand locker, verlängert, untere Aestchen halb aufrecht, mehr minder rispig, obere abstehend, traubig-trugdoldig; Aestchen und Blütenstiele mässig behaart, reich mit Drüsen und Stachelchen besetzt; Kelchzipfel an der Frucht abstehend oder aufgebogen; Kronblätter länglich; Fruchtknoten kahl; Früchte gross, glänzend.

Gebüsche bei Tiffen. 5 Juli D. P.

2004. 14. *Rubus pygmaeopsis?* Focke. Kleingestaltiger Brombeerstrauch.

Focke p. 364.

Schösslinge rundlich, nach oben kantig, locker kurzhaarig, stieldrüsige, stachelborstig und ungleich stachelig, grössere Stacheln kräftig, aus breitem Grunde allmählig verschmälert, rückwärts geneigt, häufiger etwas gebogen und nicht selten krumm; Blätter drei- bis fünfzählig; Blattstiele kurzhaarig, kurzdrüsige, krummstachelig, Blättchen grobgesägt, beiderseits wenig behaart, nur die jüngeren unten weichhaarig; Endblättchen drei- bis viermal länger als sein Stielchen, eiförmig oder elliptisch, gespitzt, am Grunde gerundet oder seicht herzförmig, Seitenblättchen verhältnissmässig langgestielt; Blütenzweige ziemlich lang, dicht gleichstachelig; Blütenstand unterwärts unterbrochen, durchblättert, der obere Theil sehr kurz und dicht, fast ebensträussig; Achse, Aestchen und Blütenstielchen zottigfilzig, drüsige, mit ungleichen geraden und gekrümmten Stacheln dicht besetzt; Rispenäste aufrecht-abstehend, obere gedrängt, wenigblütig; Kelch grünlich, fast immer stachelborstig, Zipfel zur Blütezeit zurückgeschlagen, später abstehend oder aufgerichtet; Kronblättchen elliptisch, weiss; Staubgefässe die Griffel kaum oder gar nicht überragend; Fruchtknoten kahl.

Das von Joas bei Eberstein gesammelte, leider mangelhafte Exemplar stimmt noch am ehesten mit obiger Beschreibung.

2005. 15. *Rubus serpens* Weihe. Kriechender Brombeerstrauch.

Focke p. 365.

Schwächere Stacheln ohne Grenze in Nadeln und Drüsenborsten übergehend; Blattstiel zwei- bis dreimal länger als das mittlere Stielchen; Blättchen ungleich gesägt, beiderseits grün und kurzhaarig; Endblättchen eiförmig oder herzeiförmig, lang zugespitzt; Blütenzweige schwach bewehrt mit dreizähligen Blättern; Rispenäste und Blütenstiele filzig, mit kurzen den Filz nicht überragenden und zerstreuten längeren Stieldrüsen und mehr minder zahlreichen sehr feinen Nadelstachelchen besetzt; Kelch grünlich, Zipfel zur Blütezeit locker zurückgeschlagen, nachher die Frucht umfassend; s. w. v.

Liesergraben bei Spittal D. P.

2006. 16. *Rubus hirtus* W. K. Rauhhaariger Brombeerstrauch.

Focke p. 371; Grke. p. 124.

Schössling rundlich, nach der Spitze undeutlich kantig, haarig, mit kürzeren und längeren Stieldrüsen und pfriemlichen, rückwärts geneigten Stachelchen besetzt, die grössten am Grunde verbreitert und leicht gebogen; Schösslingsblätter vorwiegend dreizählig; Blattstiele wie der Schössling drüsig, behaart, bewehrt, oberseits flach, jüngere mit einer schwachen Furche; Nebenblättchen ziemlich hoch am Blattstiele entspringend; Blättchen grob, nach vorn sehr ungleich gesägt, oberseits meist dunkelgrün, striegelhaarig, zuletzt kahl, unterseits blassgrün, an den Nerven abgehend weichhaarig; Endblättchen drei- bis viermal länger als sein Stielchen, in der Regel breit-elliptisch, am Grunde abgerundet, nach vorn in eine kurze, aus breiter Basis verschmälerte Spitze auslaufend, die grösste Breite des Blättchens öfters nach vorn gerückt, dann verkehrt-eiförmig und die Spitze schärfer abgesetzt (Blattform überhaupt ziemlich veränderlich); Seitenblättchen bald sehr kurz, bald deutlich gestielt, manchmal gelappt; Blütenstand durchblättert, reichblütig, Aestchen vielblütig; Achse, Aestchen, Blütenstielchen mehr minder dicht nadelstachelig, Drüsenborsten theils lang, violett, theils kurz, die ziemlich dichte Haarbekleidung verdeckend; rispenständige Blättchen ungetheilt, oberseits meist mit kurzgestielten rothen, zahlreichen Drüsen besetzt; Deckblättchen lineal-lanzettlich, ziemlich kurz; Kelch aussen drüsig-borstig, Zipfel lanzettlich, zur Blütezeit herabgeschlagen, später aufrecht, die Frucht umschliessend; Kronblättchen länglich verkehrt-eiförmig, weiss, selten röthlich; Staubgefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten behaart; Früchte kugelig, glänzend, schwarz; Rispenachse und Blütenstiele violett gefärbt.

In Bergwäldern. † Juli bis August.

Manessen ob Tiffen, Döbernitzen-Graben und Tröpolacher Pferdalm im Gailthale D. P.

2007. 17. *Rubus Güntheri*? Weihe et Nees. Günthers Brombeerstrauch.

Focke p. 376.

Schössling rundlich, unbereift, wenig behaart, Stachelchen ungleich, aus breitem Grunde pfriemlich, rückwärts geneigt; Blätter meist dreizählig, ungleich grob gesägt, beiderseits anliegend behaart, zuletzt kahl, oberseits dunkel-, unterseits blasser grün; Endblättchen elliptisch, nach dem Grunde allmählig verschmälert, zuletzt gestutzt mit ausgerandetem Grunde, nach vorn zugespitzt; Stielchen des Endblättchens etwa ein Drittel so lang als der gemeinschaftliche Stiel, Seitenblättchen ziemlich lang gestielt; Blütenzweige meist lang, unterste reichblütig; Blätter dreizählig, einzelne fussförmig, fünfzählig, die rispenständigen einfach; Rispe bald kurz und wenigblütig, bald verlängert und zusammengesetzt; Deckblätter ziemlich gross, lineal-lanzettlich; die gebogene Rispenachse, Aestchen und Blütenstiele mit graulichem Filz bekleidet, mit gedrängten langen und kurzen Stieldrüsen und wagrechten Nadelstacheln besetzt; Blüten klein; Kelche graufilzig und rothdrüsig, Zipfel zur Blütezeit herabgeschlagen, später aufrecht, die Frucht umfassend; Kronblättchen klein, weiss, meist ausgerandet; Staubgefässe die Griffel nicht überragend, meist kürzer; Fruchtknoten kahl; Früchte klein, schwarz.

In Bergwäldern. † Juli.

Waldblössen am Kreuzbergl bei Klagenfurt J a b., jedoch nicht typisch, Gailbergsattel zwischen Oberdrauburg und Köttschach Preiss m n.

2008. 18. *Rubus Bayeri* Focke. Bayer's Brombeerstrauch.

Focke p. 378; Nachtr. z. Fl. v. Niederöster. 1882, p. 337.

Schösslinge niederliegend, rundlich, wenig behaart, mit sehr zahlreichen längeren und kürzeren Stieldrüsen und ungleichen Stacheln besetzt; grössere Stacheln ziemlich gleichförmig aus breitem Grunde rasch nadelig verengt, rückwärts geneigt oder leicht gebogen; Blattstiele und Stielchen sehr dicht bewehrt; Blätter drei- bis fünfzählig, ziemlich fein- und scharfgesägt, jüngere oberseits seidig-striegelhaarig, später kahlwerdend und etwas glänzend, unterseits feinhaarig; Endblättchen breit-elliptisch, verkehrt-eiförmig oder fast rundlich, plötzlich in eine ziemlich lange, schiefe Spitze auslaufend; Normalrispen dichtblütig, unterwärts beblättert, oben blattlos, Aestchen kurz, traubig-mehrblütig, nebst Blütenstielchen und

Kelchen kurzhaarig, dicht mit langen und kurzen Stieldrüsen und Nadelstacheln bewehrt; Blüten ziemlich klein; Kelche aussen graulich, häufig dicht mit Drüsen und Nadelstacheln besetzt, Zipfel dreieckig-lanzettlich, bespitzt, an der Blüte abstehend oder zurückgeschlagen; Kronblättchen länglich oder verkehrt-eiförmig, Nagel abgesetzt, breit; Staubgefässe einreihig, kürzer als die Griffel, diese grünlich-weiss; Fruchtknoten kahl oder filzig.

Gebüsche auf Bergen. † Juli bis August.

Bei Tiffen und im Freiwald bei 1200 m. s. m. D. P.

2009. 19. *Rubus polyacanthus* Gremli. Vielstacheliger Brombeerstrauch.

Focke p. 380.

Unterscheidet sich vom vorigen durch meistens dreizählige Blätter, deren mittleres Stielchen halb so lang als der Blattstiel und ein Drittel so lang als das Endblättchen ist, die Blättchen sind ziemlich gleichförmig gesägt, beiderseits behaart, unterseits von dichten Haaren schimmernd, das Endblättchen aus gestutztem oder seicht herzförmigem Grunde elliptisch, allmählig gespitzt; Kelchzipfel nach dem Verblühen aufrecht; Kronblätter schmal, gewimpert, weiss; Fruchtknoten behaart, später kahl; s. w. v.

In sehr sonnigen, trockenen Gebüschern. † Juli.

Tiffen D. P.

2010. 20. *Rubus Bellardii* Weihe et Nees. Bellardis-Brombeerstrauch.

Focke p. 382; Grke. p. 125 *Rub. hybridus* Vill.; *Rub. glandulosus* Bellard.; *Rub. fruticosus* L. α *glandulosus* Neilr. p. 902.

Schösslinge weich, stielrund, nach der Spitze undeutlich kantig, im Schatten hellgrün, bläulich bereift, an der Sonne rothbraun angelaufen, sparsam behaart; Blätter dreizählig, äusserst selten einzelne fünfzählig, im Winter bleibend, einzelne oft noch im zweiten Sommer vorhanden; Blattstiel oberseits flach oder etwas gewölbt, wenig behaart, gleich dem Stengel bewehrt; Nebenblättchen hoch angewachsen. Blättchen sämmtlich gestielt, Stiel des Endblättchens etwa ein Drittel so lang als der gemeinsame Blattstiel; Blätter ziemlich gross, untereinander ziemlich gleich, länger als der gemeinsame Blattstiel, meist siebenervig, fein sägezählig, Endblättchen elliptisch, nach beiden Enden abgerundet, am Stielchen zuweilen etwas herzförmig, vorn mit aufgesetzter, lanzettlicher oder lineal-lanzettlicher, oft gebogener Spitze, Seitenblättchen dem Endblättchen an Grösse und Form ziemlich ähnlich; untere achselständige Blütenstiele meist dreiblütig, obere

sparrig, zweiblütig, oberste stets einfach, genähert; Deckblättchen dreispaltig, oberste lineal-lanzettlich; Kelchzipfel die Frucht umfassend; Kronblättchen schmal, spatelig, weiss; Staubgefässe so hoch wie die Griffel, nach dem Verblühen der Frucht anliegend; Frucht glänzend schwarz, von aromatischem Geschmacke.

Auf Gebirgen, in Holzschlägen, eine sehr beständige, sich gleichbleibende Art. † Juli bis August.

Benesirnitz beim Bade St. Leonhard D. P., St. Kunigund bei Türn im Lavantthale Wsbr., Teichl im Möllthale D. P.

I. Corylifolii Focke p. 387. Schösslinge gleich anfangs oder aus flachem Bogenliegend, kriechend oder kletternd, verästelt, im Herbst wurzelnd, zerstreut behaart oder kahl, mit oder ohne Stieldrüsen mit fast gleichen oder ungleichen Stacheln, fast immer bereift; Stacheln gewöhnlich pfriemlich oder gerade; Nebenblätter lineal-lanzettlich oder lanzettlich; Blättchen breit, sich oft mit den Rändern deckend, beiderseits behaart und grün oder unterseits graufilzig, die äusseren sehr kurz gestielt, Anfangs des Sommers sitzend oder fast sitzend; Blütenstand in der Regel kurz, meist mit doldentraubigen Aestchen; Kelchzipfel nach dem Verblühen meist aufgerichtet; Kronblätter breit; Staubfäden etwa so hoch wie die Griffel, selten länger; Steinfrüchtchen meist ziemlich gross. Eine sehr schwer mit bestimmten Merkmalen zu scheidende Gruppe.

I. Orthacanthi Focke p. 388. Schösslinge rundlich, drüsig und ungleich stachelig; Stacheln meist ziemlich gerade, im Blütenstande, oft auch am Schössling pfriemlich und nadelig, meist rechtwinklig abstehend; Seitenblättchen auffallend kurz gestielt oder fast sitzend; Nebenblättchen lineal-lanzettlich; Blütenstand drüsenreich, aus oft büscheligen oder doldentraubigen Blütenstielen gebildet; Kelchzipfel der Frucht ange-drückt oder abstehend. Blütezeit früh. Mittelform zwischen *R. caesius* L. und den *Glandulosus*, die breiten Blättchen, die geraden nadeligen Stacheln und die meist breiten Kronblättchen sind charakteristisch für diese Formen.

20ll. 21. Rubus Ebneri? A. Kerner. Ebner's Brombeerstrauch. Focke p. 390.

Schösslinge niedergestreckt, rund, grün, dünn, blau bereift, mit spärlichen bald verschwindenden Büschelhaaren, kurzen Stieldrüsen und kurzen fast gleichartigen Stacheln bekleidet; Blätter fussförmig, fünf- oder dreizählig; Nebenblättchen lineal; Blättchen breit, beiderseits grün und wenig behaart, Endblättchen breit, eirautenförmig oder herzförmig, kurz bespitzt; Blütenstand im Umriss eiförmig oder pyramidal, wenig über die obersten Laubblätter hinausragend, wenigblütig; Deckblättchen dreispaltig, grün; Achse und Blütenstiele kurzhaarig, kurzdrüsig, nadelstachelig; Kelchzipfel nach dem Verblühen aufrecht; Kronblättchen länglich verkehrt-eiförmig; Staubgefässe die Griffel etwas überragend; Fruchtknoten etwas behaart; Früchte zum Theil fehlschlagend, schwarz.

Bei Gebüsch im Tiffner Winkl D. P.

II. Sepincoli Focke. Schösslinge stumpfkantig oder rundlich, drüsenlos oder zerstreut-drüsig; Stacheln fast gleich, häufig am Grunde zusammengedrückt; Schösslingsblätter meist fünfzählig; Nebenblätter lineal-lanzettlich; äussere Blättchen sitzend oder fast sitzend; Kelchzipfel aufrecht oder abstehend, selten zurückgeschlagen; Früchte unbereift. Mittelformen zwischen *R. caesius* L. und den grossen, drüsenlosen oder drüsenarmen Arten.

2012. 22. *Rubus dumetorum* Weihe. (Collectivspecies). Gebüsch-Brombeerstrauch.

Focke p. 395; Nachtr. z. Fl. v. Niederöster. p. 338.

Schösslinge im Herbste meist stark verästelt, oft klimmend, deutlich bereift; wenig behaart, Stacheln kantenständig oder unregelmässig vertheilt; Blätter drei-, fünf-, ausnahmsweise auch siebenzählig oder gefiedert fünftheilig; Blattstiel oberseits meist gefurcht; Nebenblättchen manchmal breit, lineal oder lanzettlich; Blättchen breit, in der Regel sich mit den Rändern deckend, oberseits kahl oder wenig behaart, unterseits die jüngeren oft graufilzig, die älteren weichhaarig, grün; Bezeichnung grob, oft eingeschnitten, Endblättchen meist rundlich, seltener eiförmig, kurz gespitzt; Blütenzweige kurz oder mittellang; Blütenstand oben fast ebensträussig-rispig; Blütenstiele filzig oder kurzhaarig, mit geraden nadeligen Stacheln, oft drüsig; Kelch aussen graugrün, Zipfel anfangs zurückgeschlagen, später aufrecht; Kronblättchen breit, gross, weiss oder roth; Staubgefässe höher als die Griffel; Fruchtknoten kahl; Frucht meist unvollkommen ausgebildet, häufig aus wenigen grossen

Pflümchen bestehend, schwarz, glänzend oder matt, nicht deutlich bereift; Fruchtsteinchen gross, im Profil fast dreieckig. Charakteristisch ist die mangelhafte Ausbildung der Früchte.

In Hecken, Gebüsch, an Zäunen, Feldmauern. 5 Juli.

Von den zahlreichen Formen dieses Brombeerstrauches ist in Kärnten bisher f. *Wahlbergii* Arrh. gefunden worden, Stacheln ziemlich zahlreich, die grösseren am Grunde zusammengedrückt; Blättchen eingeschnitten gesägt; Kelche graufilzig; Staubfäden die grünlichen Griffel überragend.

Am Kreuzbergl und bei Kohldorf Jab., Ehrenhausen Zwgr.

III. Caesii Focke p. 406. Schösslinge rund mit kleinen, fast gleichen Stacheln besetzt; Blätter dreizählig; Nebenblättchen lanzettig, Früchte stark bereift.

2013. 23. Rubus caesius L. Bläulicher Brombeerstrauch.

Focke p. 407; Grke. p. 127; Koch p. 248; Nachtr. z. Fl. v. Niederöster. 1882, p. 338; Neilr. p. 901.

Schösslinge hingestreckt oder klimmend, meist stark verästelt; Stacheln unter sich fast gleich, mehr minder stieldrüsig; Blätter dreizählig oder sehr selten gefiedert fünfzählig; Blattstiel kurzhaarig mit zerstreuten, kleinen Stacheln, oft auch mit Stieldrüsen, auf der Oberseite seicht rinnig; Blätter meist dünn, zart, grob und ungleich eingeschnitten gesägt, oberseits hellgrün, behaart, unterseits blasser, mehr minder kurzhaarig, Endblättchen zwei- bis dreimal länger als sein Stielchen, breit eihertzförmig oder rundlich bis rautenförmig, oft dreilappig; Nebenblättchen an den Blütenzweigen schmaler als an den Schösslingen; Blütenstand fast ebensträussig, Blütenstielchen meist lang, dünn, kurzhaarig, manchmal sehr drüsig und stachelig; Kronblättchen breit-elliptisch, kurz genagelt, kahl, weiss; Staubgefässe zahlreich, etwa so hoch wie die grünlichen Griffel; Fruchtboden und Fruchtknoten kahl; Früchtchen ziemlich gross, schwarz, säuerlich.

Wohl die am meisten verbreitete Brombeere, vorzüglich in drei Formen:

α. f. caes. arvalis Rchb. Schösslinge meist kahl, ziemlich dicht mit gebogenen Stachelchen bewehrt; Blättchen meist klein (je nach dem Standort), unterseits dicht behaart, runzlig, jüngere manchmal graufilzig, weniger tief eingeschnitten; Blütenstiele kurz, filzig, dicht bewehrt; Kelche graufilzig; Früchte sehr vollkommen und reichlich ausgebildet. Dann

β. f. caes. aquaticus W. et N. Blättchen ziemlich gross, flach, dünn, unterseits locker behaart, kaum blasser, Schösslings-

blätter tief eingeschnitten, End- und Seitenblättchen oft gelappt; Blütenstiele lang, dünn; Kelche grün; Stacheln zerstreut; Drüsen mitunter zahlreich auf Kelchen und Blütenstielen, ganze Pflanze hellgrün, nur die Blattstiele und Achsen mattbläulich.

γ. f. caes. eglandulosus. Drüsenlos mit Ausnahme der im Filze der Kelchzipfel versteckten; Blume rosa.

Erste Blüten erscheinen bereits Ende Mai und finden sich noch im September. Fruchtreife im August. Erstere Form in Aeckern, Ackerrändern, Mauern, in trockenen Gebüschern, zweite Form vorzüglich an Ufern, im Schatten.

Kreuzbergl ob Scheriau γ. Zwgr., Satnitz, Ebenthal Kkl., Hochosterwitz Zwgr., Langenberg bei St. Paul Grf., St. Andrä bis auf die Koralm, Hohenwart, Wolfsberg Wsbr., Görtschitzthal, Poitschacher Riegel und zwischen Tiffen und Steindorf D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., durch's ganze Möllthal D. P., Berg im Oberdrauthale, Weissbriach Khlmr., Gailthal D. P., Wischberg bei Raibl Mrchs., Villach an der Strasse in's Bad D. P.

DLXXXV. *Comarum* L. Blutauge.

(XII. 3. n. 320.)

2014. 1. *Com. palustre* L. Sumpf-Blutauge, Siebenfingerkraut.

Koch p. 250; Neilr. p. 903; Grke. p. 129.

Blätter mit fünf bis sieben scharf gesägten, oberseits dunkelgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättchen; Krone dunkelpurpurroth, weit kleiner als die inwendig dunkelrothbraunen Kelchblättchen.

Torfmoore, Wassergräben, Teich- und Seeufer bis in die Voralpen. 4 Juni bis Juli.

Am Wörthersee, Waidmannsdorf, Kreuzbergl Zwgr., Falkenberger Moor Jab., Teichwiesen bei St. Andrä mit Sphagnum, Drosera, Menyanthes Wsbr., Siebendinger Moos bei Wolfsberg Hfnr., ober dem Kegelwirth im Kegelwäldchen Schn., Ossiacher Seeufer, Tiffen mit Oxycoccus, Andromeda, Calla, Carex filiformis und C. chordorrhiza, Fuchsgruben ob Steierberg, St. Lorenzen in der Reichenau D. P., Lesachthal Jab., Weissensee-Ufer Khlmr., Sittersdorfer See Grf.

DLXXXVI. *Fragaria* L. Erdbeere.

(XII. 3. n. 319.)

a. Fruchtkelche abstehend oder zurückgekrümmt.

2015. 1. *Frag. vesca* L. Gemeine Erdbeere.

Koch p. 248; Neilr. p. 904; Grke. p. 128.

Blätter dreizählig; Haare am Schafte und an den Blattstielen wagrecht abstehend, an den seitenständigen oder an allen Blütenstielen aufrecht oder angedrückt; Blüten vollkommen zweigeschlechtig; Krone weiss.

An Rainen, Hügeln, in Waldblössen. 4 April bis Herbst.

Klagenfurt Hs r., Kreuzbergl Zwgr., Satnitz Kkl., St. Andrä, Purgstall, Mühlgraben, Rojach, Hohenwarth Wsbr., Wolfsberg Hfnr., Osterwitz, Tiffen, Glödnitz, Fladnitz D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., durch's ganze Möllthal bis in die Alpen D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Mussen, Tröpolach D. P., Wischberg Mrchs., Petzen Weld.

2016. 2. Frag. moschata Duchesne. Wohlriechende Erdbeere.

Frag. elatior Ehrh.; Koch p. 249; Neilr. p. 904;

Grke. p. 128.

Haare der Blattstiele, Schäfte und sämtlicher Blütenstiele wagrecht abstehend; Blüten unvollkommen zweihäusig, weiss; s. w. v.

In Holzschlägen, Gebüsch mit fetter Erde, bei Felsen. 4 Mai bis Juni.

Klagenfurt Gntr., Kreuzbergl, Satnitz Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Osterwitz, Tiffen, Leobengraben D. P., Maltathal Khlmr., Obervellach, Sagritz, Trogalm bei Heiligenblut D. P., Berg Khlmr., Tröpolach D. P., Bleiberg und Bad bei Villach Mar.

b. Fruchtkelche angedrückt.

2017. 3. Frag. viridis Duchesne. Hügel-Erdbeere.

Frag. collina Ehrh. Koch p. 249; Neilr. p. 905;

Grke. p. 128.

Haare am Schafte und an den Blattstielen wagrecht abstehend, an den seitenständigen oder an allen Blütenstielen aufrecht oder angedrückt; Krone gelblichweiss.

An sonnigen Hügeln. 4 Mai bis Juni.

Satnitz Js ch., auf Voralpen? Kkl.

DLXXXVII. Potentilla L. Fingerkraut.

(XII. 3. n. 321.)

1. Rotte: **Laterales Döll.** Wurzel einen mittelständigen Büschel oder Rasen bleibender oder bald verwelkender Blätter und seitliche Stengel treibend.

a. Blumen weiss oder röthlich; Schalfrüchte überall oder doch am Nagel langhaarig.

2018. 1. Potent. nitida L. Glänzendes Fingerkraut.

Wulf. p. 526; Koch p. 259; Seboth Alpenpflzn. II. B., fig. 31.

Stengel meist einblütig; Blätter dreizählig; Blättchen elliptisch, beiderseits seidenhaarig-filzig, an der Spitze dreizählig, Zähne gerade vorgestreckt; Staubfäden kahl; Krone rosenroth, selten weiss.

Sonnige Felsen auf Kalkalpen. 4 Juli bis August.

Felskanten der Zunderwand bei Kanning häufig Khl m r.. Latschur, Eckwand und Staff, Kreuzkofelgruppe Jab., Zoche K., Radegundgraben D. P., Plöcken am hohen Achernach Vlp., Polinig Jsch., Trog- und Gartnerkofel D. P., Watschiger-Alm Vlp., Kühweger-Alm Jsch., Mittagskofel bei Malborgeth Rssm n., Alpen zwischen Wolfsbach und Raibl Mrchs., Seissera im Kalkgerölle, Wischberg ober der Kastreinwand, Königsberg Schnk., Raibl hinterm See Jab., Zwgr., Weissenbachkar Ndrst., Luschariberg Zwgr., Dobratsch Hsr., Kkl., Zwgr., dort auch mit weisser Blüte Mar.

2019. 2. Potent. Clusiana Jacq. Clusius'sches Fingerkraut.

Wulf. p. 526; Koch p. 259; Neilr. p. 908; Seboth Alpenpflzn. IV, tab. 63.

Stengel aufstrebend, meist dreiblütig; Wurzelblättchen fünfzählig, Blättchen länglich-lanzettlich, am Grunde keilig, an der Spitze dreizählig, Zähne gerade vorgestreckt, oberseits ziemlich kahl, unterseits zottig, am Rande seidenhaarig gewimpert; Kronblättchen breit, stumpf verkehrt-herzförmig, weiss, mit drei vom Grunde gegen das halbe Blättchen reichenden röthlichen Linien; Staubfäden oft purpurn, kahl; Nüsschen überall zottig.

Felsenspalten der Kalkalpen. 3 Juli bis August.

Kühweger-Alm Jsch., Kkl., Malborgeth, im Kaltwasserthale Wulf., Stougruppe Jab., Bärenthaler Kotschna Grf., Heilige Wand Zwgr., Ortatscha Vst. als P. lupinoides, Seleniza, Baba Strnbg., Vst., Koschuta Kkl., Storschitz Freyer, Obir Jab., Petzen ziemlich häufig Weld., Uschowa Weiss, Ursulaberg Jab.

2020. 3. Potent. caulescens L. Vielstengliges Fingerkraut.

Wulf. p. 525; Koch p. 259; Neilr. p. 908; Seboth Alpenpflzn. I, tab. 30.

Stengel reichblütig; Blättchen fast sitzend, länglich-lanzettlich, nach vorn hin spitzgesägt, etwas zottig; Kronblättchen weiss, schmal länglich-keilig; Staubfäden zottig; s. w. v.

Felsenspalten der Voralpen, in die Thäler herabsteigend. 4 Juni bis Juli.

Schlucht bei Ebenthal und Gurnitz, Satnitz Kkl., Südseite der Rabensteiner Felsen bei St. Paul Grf., Weissbriach

und Gasloch bei Berg Khlmr., Plöcken Preissmn., Wolaja, Tröpolach in Gräben beim St. Leonhard-Kirchlein, Gartnerkofel D. P., Garnitzen-Graben bei Hermagor Preissmn., Malborgeth Mrchs., Pontafel Preissmn., Raibler See Jab., Wischberg, Predilpass, Karlsteig bei Tarvis, Schlitzaufer bei Flitschl Schnk., Dobratsch am hohen Stein Wulf., Bleiberg, Kadutschen-Graben bei der Schneckenreide Mar., Villacher Bad D. P., Stougruppe Jab., Hollenburg und Loiblthal Js ch., Vorderloibl Kkl., Weidisch Drehr., Petzen Weld., Schwarzenbach Js ch.

b. Blumen gelb, Blüthen theile fünftheilig, Schalenfrüchte kahl, Stengel ausläufertreibend, kriechend.

2021. 4. Potent. anserina L. Gänse-Fingerkraut, Gänsekraut.
Koch p. 251; Neilr. p. 908; Grke. p. 129.

Stengel rankenartig; Blätter unterbrochen gefiedert, vielpaarig, Blättchen länglich, scharf gesägt, stengelständige Nebenblättchen scheidenförmig, vielspaltig; Blättchen bald ganz grün, bald unterseits oder beiderseits seidig-behaart.

An feuchten Plätzen, sandigen Ufern, Zäunen, Weideplätzen. 4 Mai bis Herbst.

Klagenfurt Kkl., Hsr., Satnitz Zwgr., Lavantthal bei Tünn, Winkling, Dachberg die Form discolor, bei St. Andrä, Zellbach, St. Paul die Form argentea Wsbr., Görtschitzthal, Tiffen auch die ganz kahle Form D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Gmünd, durch's ganze Möllthal jedoch nicht häufig D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Tröpolach häufig D. P., Raibl Preissmn., Obertarvis Schnk.

2022. 5. Potent. reptans L. Kriechendes Fingerkraut.

Koch p. 254; Neilr. p. 909; Grke. p. 131.

Stengel meist einfach; Blätter fünfzählig mit eingemischten dreizähligen, Blättchen länglich verkehrt-eiförmig, kahl oder unterseits angedrückt behaart, Blüten einzeln, Kronblättchen fünf; Früchtchen körnig-rauh.

An Ackerrändern, Gräben, Zäunen, feuchten Weiden. 4 Juli bis August.

Klagenfurt Kkl., Satnitz Zwgr., Unterlavantthal Grf., Wiesenau, Twimberg Wsbr., Wolfsberg Hfnr., Glödnitz, Tiffen, am drainirten Moose nach Auffassung der Bearbeitung sehr gemein, Leoben D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Möllthal noch bei Sagritz D. P., Oberdrauthal, Weissbriach Khlmr., Tröpolach ziemlich häufig D. P., Raibl Zwgr., Bleiberg Mar.

c. Blüthenheile in der Regel vierzählig; Schalenfrüchte kahl; Stengel nicht kriechend oder wurzelnd, oben trugdoldig-ästig; Blume gelb.

2023. 6. Potent. Tormentilla Scop. Tormentill-Fingerkraut, Ruhrwurzel.

Potent. sylvestris Necker der ältere Name, Koch p. 255; Neilr. p. 909; Grke. p. 131 Tormentilla erecta L.

Blätter dreizählig, sitzend oder kurz-gestielt, Wurzelblätter länger gestielt, drei- bis fünfzählig; Blättchen länglich lanzettlich, eingeschnitten-gesägt, gegen den Grund ganzrandig; Nebenblättchen drei- bis fünfspaltig; Blüthenheile selten fünfzählig.

Sehr verbreitet auf Wiesen, Weiden, in Wäldern. 4 Juni bis September.

Klagenfurt Kkl., Siebenhügel, Kreuzbergl, Satnitz Zwgr., Lavantthal Wsbr., Hfnr., Gurkthal, Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Katsch- und Möllthal D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Mussen, Gailthal D. P., Raibl Zwgr., Bleiberg Mar.

d. Blüthenheile fünfzählig; Stengel nicht kriechend, nur der mehrköpfige Wurzelstock öfters holzige Stämmchen treibend; Blume gelb.

2024. 7. Potent. aurea L. Goldgelbes Fingerkraut.

Koch p. 255; Neilr. p. 909; Grke. p. 131; Seboth Alpenpflzn. I, tab. 29.

Stengel aus gebogenem Grunde aufrecht, nebst den Blattstielen behaart, untere Blätter fünfzählig; Blättchen länglich, kahl, am Rande und auf den Adern unterseits silberglänzend-seidenhaarig, an der Spitze spitz gesägt, Sägezähne auf jeder Seite meist drei, der letzte kleiner.

Alpen- und Voralpenwiesen und Weiden, in die Hochgebirgsthäler herabsteigend. 4 Mai bis Juli.

Koraln Grf., Saualm bis herab zur obersten Culturgrenze Wsbr., Jab., Kребenzen Steyr., Gaiseckgraben Fürstenw., Turracher See Krnbrgr., Flatnitz, St. Lorenzen in der Reichenau, Krucken, Falkart, Krems- und Katschthaler Alpen D. P., Kanning und Malteiner Gebirgs- und Alpenwiesen Khlmr., Malnitzer Tauern Sns. 1799, Bschr., Malnitz schon bei 1100 m., am Rabischhügel D. P., gleich ob Sagritz und zwischen Mohar und Waschgang Wulf., Heiligenbluter Tauern Dbnr., Pasterze und Heiligenblut häufig Hppe., und B. R., Almwiesen ob Oberberg, Weissbriach Khlmr.,

Lesachthal J a b., Plöcken B. R., Mussen, Tröpolacher-Alm D. P., Kanalthal R s s m n., Luschariberg, Wischberg S c h n k., Dobratsch H s r., Mar., Stougruppe J a b., Baba H s r., Obir zwischen den Knappenhäusern Z w g r., Petzen gegen den Gipfel W e l d., Krstf.

2025. 8. *Potent. verna* L. Fl. suecica II, p. 177. Frühlings-Fingerkraut.

A. Kerner Schedae III, Nr. 832. *P. alpestris* Hall. fil.; Koch p. 255; Grke. p. 132 *P. salisburgensis* Haenke; Neilr. p. 910 *Potent. verna* γ . *alpina*.

Stengel aus aufstrebendem Grunde aufrecht oder hingestreckt, weichhaarig; Blättchen verkehrt-eiförmig, am Rande und auf den Adern unterseits abstehend behaart, oberseits kahl, vorn eingeschnitten gesägt, Zähne vorgestreckt, auf jeder Seite meist drei, der letzte fast gleich; Nebenblättchen sämtlich eiförmig; Blume citrongelb.

Auf trockenen, sonnigen Abhängen der Alpen. 4 Juni bis August.

Winterthal, Reichenauer Garten, Falkart, Stern und Wolfsbachthal im Katschthale D. P., Faschaun im Maltathale K h l m r., Alpen um Malnitz H k l., Kapponiger-, Astner- und Göritzer Alpenweiden, Schober, Grosszirknitz D. P., Heiligenbluter Tauern D b n r., H s r., Leiterthal, Pasterze und am hohen Sattel H p p e., Latschur K h l m r., Valentinthal Z w g r., Mussen, Sattel zwischen Wolaja und Valentin, Plöcken, Rattendorfer Alm, Troghöhe, Gartnerkofel D. P., Luschariberg, Flitschl S c h n k., Petzen W e l d.

2026. 9. *Potent. opaca* L. Glanzloses Fingerkraut, Blutwurzeln.

Potent. verna Aut. A. Kerner Schedae fl. exsicc. austr.-hung. Nr. 834.

Stämmchen niederliegend, wurzelnd; Blätter derb, nur fünf-, nicht sieben- bis neunzählig, Behaarung ziemlich schwach, aufrecht abstehend an Blatt und Stengel, an Blütenstielchen die längeren Haare fast verschwindend, Sternhaare fehlen, Blätter deutlich grün, nicht grau.

Auf kurzgrasigen Hügeln. 4 März bis Mai.

Satnitz H s r., Ulrichsberg K k l., Lavantthal W s b r., Wolfsberg H f n r., Gurkthal, Tiffen? D. P., Kanning, Maltathal K h l m r., Malnitz am Rabischhügel D. P., Oberdrauthal, Weissbriach K h l m r., Raibl N d r s t.

Anmerkung. Hierher wurden die Standorte von *Potentilla verna* Aut. d. i. Koch, Neilr. und Grke. gezogen.

2027. 10. *Potent. rubens* Crantz. Rothstengeliges Fingerkraut.

A. Kerner Schedae in Fl. exsicc. austr.-hung. Nr. 838.

Potent. opaca Jacq. Koch p. 257; Neilr. p. 910 *Potent. verna* δ . *opaca*?; Grke. p. 132.

Stengelchen nicht hingestreckt, sondern aufstrebend, mehr weniger röthlich angelaufen, nebst Blatt- und Blütenstielchen von wagrecht abstehenden, sehr langen Haaren besetzt; Blättchen fünf- bis siebenzählig, lang gestielt, Wurzelblattstielchen fast so lang als die blüthentragenden Stengelchen, Theilblättchen länglich-keilig, tiefgesägt, gestutzt, Endzähnen kürzer.

Trockene, sonnige Raine. 4 März bis Mai.

St. Martin bei Klagenfurt Kkl., Ulrichsberg, Satnitz Kkl., Hsr., Maria Saal Trflnr., Gurnitz D. P., Rabenstein, Pölling, St. Andrä, St. Gertraud im Lavantthale Wsbr., Wolfsberg Preissmn., Peretschitzen bei Obervellach D. P.

Anmerkung. Obige Standorte sind für das Vorkommen der *P. opaca* L. aufgezeichnet bei den Botanikern Kärntens.

2028. 11. Potent. arenaria Borkh. Sandliebendes Fingerkraut.

A. Kerner Schedae in Fl. exsicc. austr.-hung. Nr. 828;
Pot. cinerea Aut. germ. plur.

Erstlingsblätter fünfzählig, spätere dreizählig, Oberseite mit ziemlich zerstreuten Sternhaaren, Unterseite mit weniger dichtem Filz als bei der *P. cinerea* Chaix bekleidet und mit noch längeren Haaren überzogen; Blatt- und Blütenstielchen mit feinem Flaume und wenigen längeren abstehenden Haaren bekleidet; Pflanze graulichweiss.

Auf sonnigen, trockenen Hügeln. 4 April bis Mai.

Am Abhänge ob Lavamünd neben der Lavantthaler Strasse, Osterwitz D. P., Südseite der Rabensteinerfelsen bei St. Paul Grf. als *P. cinerea*.

2029. 12. Potent. Tirolensis Zimmeter. Tirolisches Fingerkraut.

A. Kerner Schedae Nr. 830.

Stengel hingestreckt; Blätter fünfzählig, Theilblättchen länglich-lanzettlich oder lanzettlich, gegen den Grund zu sehr verschmälert und tief herab mehr weniger spitzig gezähnt, bei den Herbstblättchen beiderseits fünf- bis siebenzählig, von einander abstehend, sich nicht berührend, oberseits dunkelgrün, zerstreut, kurzhaarig, unterseits bleicher oder graugrün mit nicht verfilzten Sternhärchen, an den Nerven mit längeren Haaren besetzt; Blattstielchen mit aufrecht abstehenden, den Durchmesser derselben übertreffenden Haaren bekleidet; äussere Kelchblättchen lineal-lanzettlich, innere eiförmig, zugespitzt, die etwas längeren Kronblättchen schwach ausgerandet.

Trockene Grasplätze und Felldränder. 4 Juni bis September.

Malnitz auf einer Feldmauer, Grosszirknitz bei Döllach
D. P.

2030. 13. Potent. glandulifera? Krasan. Drüsentragendes
Fingerkraut.

A. Kerner Schedae Nr. 836.

Blätter fünf-, selten siebenzählig, Theilblättchen länglich, gegen den Grund keilig, unterste verkehrt-eiförmig, keilig, vier- bis sechszählig, Zähnen ungleich spitzig oder abgerundet, Mittelzähnen mit den beiden Seitenzähnen gleichhoch, oberseits fast kahl, unterseits an den Nerven langhaarig, Haare an den Stengeln und Blattstielen lang, theils angedrückt, theils aufwärts abstehend, Drüsen an den Blattändern und Kelchen zwischen den längeren Haaren versteckt; äussere und innere Kelchblättchen fast gleichlang, Kronblättchen doppelt so lang als der Kelch, breitherzförmig, schwach ausgerandet.

Auf felsigen Weiden. 4 Mai bis Juli.

Tiffen bei der Kirche D. P.

2031. 14. Potent. dubia Crantz. Kleinstes Fingerkraut.

Potent. minima Haller fil. Koch p. 257; Neilr. p. 910;

A. Kerner Schedae Nr. 844.

Blättchen dreizählig, Theilblättchen verkehrt-eiförmig, abgerundet stumpf, kahl, am Rande und unterseits an den Nerven behaart, Haare etwas abstehend, vorn tief eingeschnitten-gesägt, Zähnen auf jeder Seite zwei bis vier, endständiges fast gleich; Stengelchen meist sehr kurz, ein-, selten mehrblütig; Blüten klein, kaum länger als der Kelch; ganze Pflanze freudiggrün, an den Boden angedrückt.

Alpenweiden besonders an Stellen, wo der Schnee länger lagert. 4 Juli bis August.

Stern im Katschthale und Lanisch, Wolligger-, Asten- und Göritzer-Alm, Waschgang, Grosszirknitz, Pasterze, Gamsgrube D. P., Sattelnock bei Weissbriach Khl m r., Jauken auf schwarzem Kalk Str., Wolaja, Plöcken, Troghöhe, Rosskofel D. P., Gipfel des Königsberges bei Raibl Zwgr., Wischberg Mrchs., Dobratsch im Alpenlahner Mar., Mittagskofel bei Rosegg, Karawanken Jab., Velka Pezh Trflnr., Obir Zwgr., Preissmn., Oistriza Weiss.

2032. 15. Potent. frigida Vill. Gletscher-Fingerkraut.

Koch p. 258.

Stengel aufstrebend, meist einblütig; Blätter dreizählig, Theilblättchen verkehrt-eiförmig, stumpf gezähnt, Zähne am Rande sich deckend; Nüsschen runzlig, unbehaart; ganze Pflanze zottig.

Joche der höchsten Alpen 4.

Hochthor am Heiligenbluter Tauern, Gamsgrube auf Kalkglimmerschiefer Str.

2033. 16. *Potent. nivea* L. Schneeweisses Fingerkraut.

Wulf. p. 524; Koch p. 257; Seboth Alpenpflzn. III, tab. 39.

Stengel aufrecht, armlütig; Wurzelblätter dreizählig, Theilblättchen länglich, eingeschnitten-gesägt, oberseits kahl oder rauhaarig, unterseits schneeweiss-filzig, glanzlos, am Rande flach; Nüsschen kahl.

Begraste Felsenwände auf den höchsten Alpen. 7 Juli bis August.

In der Kleinzirknitz, Felswände ober dem untern See J a b. 1872.

2034. 17. *Potent. collina* Wib. Hügel-Fingerkraut.

Koch p. 253; Neilr. p. 911; Grke. p. 130.

Stengel nach allen Seiten niedergelegt, zottig-filzig, von der Mitte an ausgebreitet-rispig, an der Spitze aufstrebend; Blätter fünfzählig, die wurzelständigen in einen mittelpunktständigen, dichten Rasen zusammengestellt, Theilblättchen verkehrteiförmig-keilig, flach, unterseits auf den Adern zottig und ausserdem daselbst graufilzig, eingeschnitten-gesägt; Blütenstielchen nach dem Verblühen zurückgebogen; Nüsschen unberandet, runzlig.

Sonnige, grasreiche Raine. 7 Mai bis Juni.

Bei Oberdrauburg J a b.

2. Rotte: **Terminales Döll.** Wurzel einen oder mehrere mittelständige Stengel und seitliche bald verwelkende oder bleibende Blätterbüschel treibend.

a. Blumen gelb.

2035. 18. *Potent. argentea* L. Silberweisses Fingerkraut, Bringwieder (Milch).

Koch p. 252; Neilr. p. 912; Grke. p. 130.

Stengel aufstrebend, filzig, an der Spitze ebensträussig; Blätter fünfzählig, Theilblättchen verkehrt-eiförmig, tief-eingeschnitten-gesägt, am Rande umgerollt, unterseits weiss-filzig; Blütenstiele gerade-aufrecht oder abstehend; Früchtchen unberandet.

β. cinerea Hausm. Fl. v. Tir. III. Heft, p. 1424.

Blätter oberseits von dichten, krausen und längeren abstehenden Haaren aschgrau.

Sonnige Raine, Feldmauern, felsige Plätze. 7 Juni bis August.

Kreuzbergl Zwgr., Granitzthal, Rabenstein, Rojach, Lading, Lamm, St. Andrä W s b r., Wolfsberg H f n r., Görtschitz-

thal, Tiffen D. P., Maltathal Khlmr., Malnitz Berr., durch's ganze Möllthal bis Sagritz D. P., Oberdrauthal, Weisbriach Khlmr., Jauken Preissm n., Tröpolach D. P., Judendorf bei Villach Mar.

β. Oberdrauburg J a b.

2036. 19. Potent. canescens Besser. Graues Fingerkraut.

Potent. inclinata Vill. Koch p. 252; Neilr. p. 912; Grke. p. 130 P. inclinata Aut.

Stengel aufrecht oder aufsteigend, weichzottig und ungleich-filzig, an der Spitze ebensträussig; Blättchen unterseits dünn graufilzig, mit abstehenden Haaren bestreut oder gewimpert, Theilblättchen länglich-lanzettlich, nach dem Grunde verschmälert, eingeschnitten gesägt; Nüsschen runzlich, mit einem fädlichen, schwachen Kiele umgeben.

Sonnige, trockene Hügel und Feldmauern. 4 Mai bis Juli.

Tiffen gegen Fressen und Sallach zu D. P., Berg Khlmr.

2037. 20. Potent. recta L. Steifaufrechtes Fingerkraut.

Koch p. 251; Neilr. p. 913; Grke. p. 130.

Stengel aufrecht, nebst den Blättern rauhaarig; Haare verlängert, auf Knötchen sitzend, mit kurzen, drüsentragenden gemischt; Blätter fünf- bis siebenzählig, Theilblättchen länglich, am Grunde keilig-verschmälert, grob-eingeschnitten-gesägt; Nüsschen erhaben runzlich, mit einem flügelartigen, bleichern Kiele umgeben; Blume schwefelgelb.

Sonnige Raine, auf trockenen Berglehnen bei Gebüsch. 4 Juli bis September.

Einst am Stadtgraben in Klagenfurt Trflnr., am Fusssteige von der Kirche Tiffen nach Steindorf vereinzelt, ebenso in den Kalvarienbergleiten bei Obervellach D. P., Malnitz? Berr., Villach beim Warmbade Mar.

2038. 21. Potent. hirta L. Haariges Fingerkraut.

Koch p. 251.

Rauhaarig, Haare verlängert, mit drüsenlosen, kürzeren gemischt; Blättchen eingeschnitten-gesägt, die der Wurzelblätter verkehrt-eiförmig-keilig, die der Stengelblätter lineal-keilig; s. w. v.

Grasreiche Plätze in sonniger Lage. 4 Juli bis August.

Vor Schwarzenbach jenseits des Wassers unweit der Brücke Weld.

b. Blumen weiss.

2039. 22. Potent. rupestris L. Felsen-Fingerkraut, Armkraut.

Koch p. 251; Neilr. p. 914; Grke. p. 129.

Stengel aufrecht, untere Blätter gefiedert, die oberen dreizählig, Blättchen eiförmig-rundlich, eingeschnitten gesägt, Nebenblätter ungeteilt.

Trockene Waldblößen, sonnige Raine. 4 April bis Juni.

Schmalzbergl H s r., Kreuzbergl K k l., auf Chloritschiefer-Felsen zwischen Klagenfurt und Velden fast allgemein Z w g r., Satnitz, auf Schiefer ober Napreth Z w g r., Predigtstuhl K k l., im mittleren Lavantthale sehr verbreitet W s b r., St. Paul G r f., Wolfsberg H f n r., Tiffen häufig, Leoben D. P., Maltathal K h l m r., Obervellach sehr selten, Sagritz D. P., Oberdrauthal K h l m r., Supersberg P r e i s s m n., Tröpolach D. P., zwischen Pontafel und Villach H e r b i c h.

DLXXXVIII. Sibbaldia L. Sibbaldie.

(V. 5. n. 210.)

2040. 1. Sibb. procumbens L. Niedergestreckte Sibbaldie.

Wulf. p. 414; Koch p. 259; Neilr. p. 914.

Blätter dreizählig, Blättchen oberseits fast kahl, unterseits behaart; Blütenstand ebensträussig, Kronblättchen lanzettlich, kaum so lang als der Kelch, gelb.

Felsige Triften der Alpen bis in's Holz herabsteigend. 4 Juni bis August.

Krebenzen Steyr., Flatnitzer Alpen T r f l l u r., Leitersteig, Zelinsee, Thorwand, Speickkogel, Wöllanernock D. P., Kreuzschlacher-Alm und Stubeneck H l l b r d., Faschaun K h l m r., Spitaler Alpen und hohe Wirlitz bei Obervellach Wulf., Malnitzer Alpen bis herab in's Krummholz H k l., Malnitzer- und Heiligenbluter Tauern, Waschgang, Kleinzirknitz beim Neuschurf in Menge Wulf., Hppe., Grossglockner Bilimek, Sagritz bis unter die Holzgrenze ob Allas 1300 m. D. P., schattseitige Pasterze B. R., Leiter bei der Salmshütte Hppe., Zoche K., Frohn- und Luggauer Alpen B. R., Rattendorfer-Alm, Grossrudnig gegen Rosskofel D. P., Seisera und Luschariberg K k l., Selenitza Hppe., Höhe der Petzen sparsam W e l d.

DLXXXIX. Geum L. Benediktenkraut.

(XII. 3. n. 318.)

1. Rotte: **Caryophyllata Tournef.** Stengel zwei- bis mehrblütig; Griffel zweigliederig, oberes Glied abfallend.

2041. 1. G. urbanum L. Gemeines Benediktenkraut, Teufelsabbiss, Nelkenwurz.

Koch p. 246; Neilr. p. 914; Grke. p. 116.

Untere Blätter unterbrochen leierförmig gefiedert, obere dreizählig; Blüten aufrecht, Kronblätter verkehrt-eiförmig, ohne Nagel; Fruchtkelch zurückgeschlagen; Fruchtköpfchen ungestielt; unteres Glied des Griffels kahl, fast viermal so lang als das am Grunde weichhaarige obere; Blume goldgelb.

In Gebüsch, bei Feldmauern. 4 Juni bis August.

Umgebung Klagenfurt Kkl., St. Andrä, Türrn, Purgstall, Dachberg Wsbr., Wolfsberg Hfnr., Launsdorf, Feldkirchen, Tiffen, Sirnitz, Leoben D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Obervellach sehr selten, Sagritz D. P., Heiligenblut Blmfld., Berg, Weissbriach Khlmr., Kanalthal Rssmn., Wischberg Mrchs., Bleiberg Mar., Karawanken Jab.

2042. 2. G. rivale L. Bach-Benediktenkraut.

Koch p. 246; Neilr. p. 915; Grke. p. 116.

Blüten nickend; Kronblätter breit-verkehrt-eiförmig, mit langem Nagel; Kelch stets aufrecht; Fruchtköpfchen lang gestielt, unteres Glied des Griffels am Grunde behaart, wenig länger als das fast bis zur Spitze behaarte obere; Blume gelb, aussen mit rothbraunem Anfluge.

Feuchte Wiesen und Gebüsche bis auf die Alpen. 4 Mai bis Juli.

Klagenfurt Kkl., Satnitz Zwgr., Maria Saal Welw., Koralm bis zu den Quellen, Unterhausschlucht bei St. Paul Grf., Auen an der Lavant Rsch., Siebending Wsbr., Wolfsberg Hfnr., Lölling, Flatnitz Krnbrgr., D. P., Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Katschthal, Möllthal D. P., Malnitz gegen den niederen Tauern Hkl., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Lesachthal Jab., Mussen, Tröpolach D. P., Kanalthal Rssmn., Raibl Ndrst., Wischberg prolificatio, *Anemone dodecaphylla* Krok. schles. Flora, Schambach 1877, Dobratsch ob Heiligengeist Hsr., Villacher Bad D. P., fl. albo Loibl Hppe. in Flora 1825, S. 512, Karawanken Jab., Černi Vrh Drchnr., Obir Preissmn., Petzen Weld.

3043. 3. G. inclinatum Schleicher. Geneigtes Benediktenkraut.

Koch p. 247; Grke. p. 117.

Blüten nickend; Kronblätter rundlich mit kurzem Nagel; Kelch aufrecht; Fruchtknoten auch bei der Fruchtreife fast sitzend, das untere Glied des Griffels doppelt so lang als das obere; Blume gelb.

Bachufer in Hochgebirgstälern. 4 Juli.

Wolligger-Alm Berr., Seisera Giessbach Schnk.

2. Rotte: **Sieversia Willd.** Stengel einblütig; Griffel nicht gegliedert.

2044. 4. G. montanum L. Berg-Benediktenkraut, Benedictwurz, Heiligengeist-Wurz, Schrietewurz.

Koch p. 247; Neilr. p. 915; Grke. p. 117; Seboth Alpenpflzn. II, tab. 30.

Blätter ungleich-gekerbt, das endständige sehr gross, fast herzförmig, stumpflappig; Früchte und Griffel zottig; Blume gelb.

Alpen- und Voralpenwiesen und -Weiden häufig. 4 Juni bis August.

Koralm Grf., Hfnr., Saualm Kkl., Jab., Kребenzen Steyr., Flatnitz, Reichenauer Alpen, Krucken, kleiner Speickogel ob St. Lorenzen, Falkart, Wöllanernock D. P., Kanninger, Millstätter, Perschitz- und Malteiner Alpen Khlmr., Katschthaler und Möllthaler Alpen häufig D. P., Malnitzer Tauern BsCHF., Malnitz in der Rhododendron-Region gemein Hkl., zwischen Mochar, Waschgang und Kleinzirknitz Wulf., Pasterze, Gamsgrube Hppe., Redschtizen Preuer, Lesachtal Jab., Frohn- und Luggauer Alpen, Plöcken B. R., Stager, Weissbriach, Latschur Khlmr., Mussen, Gailthaler Alpen D. P., Dobratsch häufig Hsr., Mar., Karawanken Jab., Obir Preissmn., Petzengipfel Weld., Krstf.

2045. 5. G. reptans L. Kriechendes Benedictenkraut, Ruhrwurz.

Wulf. p. 527; Koch p. 247; Seboth Alpenpflzn. II, tab. 29.

Ausläufer niedergestreckt; Blätter unterbrochen gegliedert, oberwärts breiter, Blättchen eingeschnitten-gesägt, Sägezähne spitz, meist dreispaltig, das endständige drei- bis fünfspaltig; Stengel einblütig; Früchtchen nebst den ununterbrochenen Grannen zottig; Blume gross, gelb.

Kiesige, felsige Plätze auf Hochalpen. 4 Juli bis August.

Zwischen Winterthal und Eisenhut Wulf., Winterthalnock, Thorwand D. P., zerschlagene Wände im Reichenauer Garten Hsr., Kante ob dem Thorer See JsCh., Klammock ob St. Oswald in Kleinkirchheim, Glockscharte, Seemannscharte und Faschaun in der Maltein Khlmr., Katschthal am Lanisch und Stern D. P., Malnitz am Morösen, Sickerköpfel, Lerchriegel Hkl., Grossfragant und Schober Gussbr., Resakopf Khlmr., Mochar, kleine Fleiss D. P., Heiligenbluter Tauern HrnschCh., Gamsgrube, Leiter bei der Salmshütte Hppe., Pasterze BsCHF., Franz Josefs-Höhe Preissmn.,

Moritzen-See Vst., Grahorn in der Drassnitz im Oberdrauthale Jab., Kreuzeckschutt Khlmr., Gehänge am Hochweissstein in der Frohn Jab., Wolaja beim See D. P., Luggauer Alpen Hohenwart.

DXC. *Dryas L. Dryade.*

(XII. 3. n. 317.)

2046. 1. *Dr. octopetala L.* Achtblättrige Dryade, Silberwurz, Frauenrose, Frauenhaar.

Koch p. 246; Neilr. p. 916; Grke. p. 116; Seboth Alpenflzn. I, tab. 28.

Blätter gekerbt-gesägt, stumpf, unterseits weissfilzig; Blume weiss.

Alpenweiden bis herab in die Thäler, auf Felsen, in Gräben. † Mai bis August.

Krebenzen Steyr., Flatnitz, Michleben, Winterthal D. P., Zunderwandplateau in Kanning, Faschaun in der Maltein Khlmr., Katschthal D. P., Malnitzer Tauern Sns. 1799, Malnitz auf Hochtriften gemein Hkl., Wurten im Fragantthale D. P., Heiligenblut bis in die Leiter B. R., Feistritz bei Berg auf Schutt vom Draufer bis zum Reisskofel, Kreuzberg und Sattelnock bei Weissbriach sehr gemein Khlmr., Mussen D. P., Frohn- und Luggauer Alpen, Plöcken B. R., Gailthal vom Thale bei Tröpolach bis zum Gartnerkofel und Rosskofel D. P., Kühweger-Alm Hsr., Luschariberg, Königsberg, Predil, Schlitzabachufer bei Tarvis Schnk., Raibl unter Krummholz Zwgr., Dobratsch Mar., Stougruppe Jab., Seleniza Drchnr., Loibl, Vorderloibl, Kotla, Harlouzschlucht Kkl., Zwgr., Felsabhänge bei Maria Rain Kkl., Obir Südwestgrat Zwgr., Petzengipfel Weld., Uschowa, Rinka, Oistriza Weiss.

DXCI. *Spiraea L. Spierstaude.*

(XII. 2. n. 313.)

2047. 1. *Spir. salicifolia L.* Weidenblättrige Spierstaude, Tamarischgen.

Wulf. p. 516; Koch p. 244; Neilr. p. 916; Grke. p. 115.

Blätter länglich-lanzettlich, ungleich-, fast doppelt-gesägt, kahl; Traube gedrungen-rispig, endständig, pyramidenförmig; Blume rosenroth, dann weiss.

Gebüsche an Wegen, Zäunen, Ufern, häufig in Gärten angepflanzt. † Juni bis Juli.

Klagenfurt südlich der zweiten Kanalbrücke Jsch., Zwgr., Türn im Lavantthale Wsbr., Wolfsberg Hfnr., bei Gurk und am Eingang in's Glödnitzthal Wulf., Jsch., Fuchsgrube ob Steierberg D. P.

2048. 2. Spir. decumbens Koch. Niederliegende Spierstaude.
Koch p. 245.

Blätter verkehrt-eiförmig oder länglich, stumpf, ungleich-doppeltgesägt, am Grunde ganzrandig, in den Blattstiel verschmälert, ganz kahl; Aestchen stielrund, glatt; Ebensträusse endständig, zusammengesetzt; Staubgefässe so lang als die weissen Kronblättchen.

Sonnige Abhänge in den Kalkgebirgstälern. † Mai bis Juni.

Ausgang des Bombasch-Grabens bei Pontafel D. P. 5. September 1860, Pontafel Rssmn., Vogelbach-Graben und Fuss des Schinouz unterhalb Leopoldskirchen, Seisera Jab.

DXCII. *Aruncus L.* Gaisbart.

(XXII. 9. n. 598.)

2049. 1. Arunc. sylvester Kosteletzky. Wald-Gaisbart.
Grke. p. 115; Spiraea *Aruncus L.* Koch p. 245; Neilr. p. 917.

Blätter mehrfach zusammengesetzt; Nebenblätter fehlen; Aehre rispig; Blüten vielehig oder zweihäusig.

In feuchten Wäldern, Gräben bis in die Voralpen. † Juni bis Juli.

Satnitz Hsr., Zwgr., Maria Saal Welw., Unterhauschlucht und Granitzthal Grf., Türn, St. Andrä, Eitweg, Winkling Wsbr., Wolfsberg Hfnr., Lölling, Osterwitz, Tiffen, Teichen, Leoben D. P., Maltathal Khlmr., Malnitz, Schwandkopf Hkl., Berr., Obervellach, Winklern D. P., Pfarrhof-Graben in Berg, Weissbriach Khlmr., Tröpolach D. P., Raibl Zwgr., Karawanken Jab.

DXCIII. *Ulmaria Tournef.* Mädesüss.

(XII. 2. n. 314.)

2050. 1. Ulm. pentapetala Gilb. Aechtes Mädesüss, Beifuss.
Grke. p. 115; Spiraea *Ulmaria L.* Koch p. 245; Neilr. p. 917.

Blätter unterbrochen-gefiedert, Blättchen eiförmig, ungetheilt, das endständige grösser, handförmig dreispaltig; Ebensträusse rispig; Kapseln kahl, zusammengewunden; Blume weiss.

α. Blätter unterseits kahl. Spir. denudata Hayne.

β. Blätter unterseits aschgrau- oder weissfilzig. Spir. glauca Schltz.

Sümpfe, Gräben, Gebüsche sehr verbreitet und beide Formen meist untereinander. ♣ Juli bis September.

Glanufer, Satnitz Zwgr., Maria Saal Welw., Ulrichsberg zwischen Karnburg und Stegendorf Zwgr., Ufer der Lavant und Seitenbäche Grf., Wolfsberg Hfnr., Türn, Aichberg Wsbr., St. Georgen am Längsee Kkl., Tiffner Moos sehr häufig D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Möllthal D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Lesachthal Jab., Gailthal D. P., Bleiberg Mar.

2051. 2. Ulm. Filipendula Al. Braun. Knollentragendes Mädestüss. Grke. p. 116; Spiraea Filipendula L. Koch p. 245; Neilr. p. 917.

Fiederblättchen länglich, fiederspaltig eingeschnitten, Lappen gesägt; Kapseln flaumig, gleichlaufend an einander angedrückt, Blume weiss, seltener röthlich; s. w. v.

Trockene Wiesen. ♣ Juni bis Juli.

Rabensteinerberg, Unterbausschlucht, Granitzthal Grf., Schattseite bei Obervellach D. P., Flattach Gussbr., Berg sehr häufig, Weissensee, Weissbriach Khlmr., Lesachthal Jab., Gailberger Bauer ob Laas und Grafendorf im Gailthale D. P., Kanalthal Rssmn., Finkenstein, Wiesen am Fusse des Singerberges bei Unterbergen Jab., Loiblthal, hinter Galizien und Bergwiesen ober dem Wildensteiner Wasserfall Jsch.

121. Familie: *Amygdalaceae* Juss. Mandel-
Gewächse.

(Tabell. Uebers. 91. Fam.)

DXCIV. Persica Tournef. Pfirsich.

(XII. 1. n. 303.)

2052. 1. Pers. vulgaris Miller. Gemeiner Pfirsich.

Grke. p. 113 Amygdalus persica L.; Koch p. 241; Neilr. p. 919.

Blätter lanzettlich, spitz, oft doppelt-gesägt, Blattstiel kurz, den halben Querdurchmesser des Blattes nicht erreichend; Blume hellrosenroth.

Nur in geschützten Lagen cultivirt. † April bis Mai.

Klagenfurt, Victring Kkl., Wolfsberg Hfnr., Feldkirchen, Villach D. P., Flattach im Möllthale D. P., Berg Khlmr.

DXCV. Prunus Tournef. Pflaume.

(XII. 1. n. 304.)

1. Rotte: **Armeniaca Tournef. Aprikosen.** Steinfrüchte sammtig, Blüten meist einzeln, vor den in der Jugend zusammengerollten Blättern hervorbrechend.

2053. 1. Prun. Armeniaca L. Gemeine Aprikose, Marille.

Koch p. 242; Neilr. p. 919; Grke. p. 113.

Blätter eiförmig, etwas herzförmig, zugespitzt, doppelt-gesägt, kahl, Blattstiel drüsig; Blütenstielchen eingeschlossen; Blüten seitenständig, einzeln, selten gezweit, kurz gestielt, weiss.

In Gärten in geschützter Lage angepflanzt und zwar häufiger als vorige. † März bis April.

Klagenfurt Kkl., Stegendorf am Ulrichsberge Zwgr., Wolfsberg Hfnr., Feldkirchen, Villach, Obervellach D. P., Berg Khlmr., Lesachthal noch in Luggau Jab.

2. Rotte: **Pruni genuini Koch.** Aechte Pflaumen. Steinfrüchte kahl, bereift; Blüten einzeln oder zu zwei bis drei, vor oder mit den in der Jugend zusammengerollten Blättern hervorbrechend.

2054. 2. Prunus spinosa L. Schlehen-Pflaume.

Koch p. 242; Neilr. p. 920; Grke. p. 113.

Blätter elliptisch oder breit-lanzettlich; Blütenstiele kahl, Aestchen flaumig; Früchte kugelig, aufrecht; Blume weiss.

Gebüsche, Feldraine, Vorwälder. † März bis Mai.

Klagenfurt sehr häufig mit Berberis, Acer campestre und selten mit einer Rosa oder einer Crataegus die meisten Hecken bildend, Kreuzbergl Zwgr., Lavantthal Wsbr., Hfnr., Gurkthal, Tiffen, Leoben D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Möllthal D. P., Oberdrau- und Gitschthal Khlmr., Gailthal, Villach D. P.

2055. 3. Prun. insititla L. Kriechen-Pflaume.

Koch p. 242; Neilr. p. 920; Grke. p. 114.

Blätter elliptisch; Aestchen sammtig, Blütenknospen meist zweiblütig; Blütenstiele sehr fein flaumig; Früchte kugelig, hängend; Blume weiss.

In Obstgärten sich selbst fortpflanzend. † April bis Mai.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., Tiffen D. P., Maltathal Khlmr., Möllthal D. P., Oberdrauthal Khlmr., Gailthal D. P., Lesachthal Jab. Hierher alle Reineclauden der Gärten.

2056. 4. *Prun. domestica* L. Gemeine Pflaume.

Koch p. 242; Neilr. p. 220; Grke. p. 114.

Blätter oval-elliptisch, gesägt, unterseits etwas lichter grün, behaart; Blüten meist einzeln; Frucht eiförmig-rundlich, mit einer Längsfurche durchzogen; Kern rundlich-stumpf oder mit einem Dörnchen, sich vom Fruchtfleische nicht oder unvollkommen lösend; Blume grünlich-weiss.

In Gärten sich selbst fortpflanzend. † April bis Mai.

Klagenfurt Kkl., Wolfsberg Hfnr., St. Salvator Zwgr., Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Möllthal D. P., Berg, Weissbriach Khlmr., Lesachthal Jab., Gailthal D. P.

2057. 5. *Prun. damascena* Tragus. Zwetschken-Pflaume.

Rchb. Fl. germ. excurs. p. 646.

Frucht oval-elliptisch; Kern zusammengedrückt-eiförmig, beiderseits spitz, sich vom Fruchtfleische vollkommen ablösend; s. w. v.

Pflanzt sich selbst in Obstgärten fort und werden die Aestchen dornig. † April bis Mai.

Ueberall wo vorige, im unteren Gailthale besonders häufig D. P.

2058. 6. *Prun. Cereola* L. Haber-Pflaume, Spilling.Rchb. Fl. germ. excurs. p. 645. *Prunus lutea* Bechstein.

Blätter oblong-eiförmig, am Grunde mit zwei Drüsen, Rand drüsig-gezähnt, beiderseits wie die jüngeren Zweige feinhaarig; Blütenstielchen meist zwei, Kelche meist behaart; Früchte länglich-eiförmig, etwas zusammengedrückt, gelb; Blume weiss, in's grünliche.

Pflanzt sich selbst fort. † März bis April.

Umgebung Klagenfurt Kkl., Lavantthal Hfnr.

2059. 7. *Prun. cerasifera* Ehrh. Kirsch-Pflaume.

Koch p. 242; Grke. p. 114.

Blätter elliptisch; Blüten meist einzeln, Aestchen und Blütenstielchen kahl; Früchte kugelig, saftig, roth; Blume weiss.

Cultivirt. † April bis Mai.

Klagenfurt Kkl., Lesachthal Jab.

3. Rotte: ***Cerasus* Koch.** Kirschen und Weichseln; Steinfrüchte kahl, unbereift, mit den in der Jugend zusammengelegten Blättern hervorbrechend.

2060. 8. *Prun. avium* L. Vogelkirsche, Süsskirsche.

Wulf. p. 515; Koch p. 243; Neilr. p. 921; Grke. p. 114.

Blätter elliptisch, zugespitzt, etwas runzlig, unterseits flaumig; Blattstiel zweidrüsiger; Dolden gehäuft, sitzend; Schuppen der Blütenknospen blattlos; Blume weiss; Wurzel keine Ausläufer treibend.

α. Frucht klein, eikugelig, schwarz oder roth, in Wäldern, bitter-süss.

β. *juliana* D. C. Herzkirsche. Frucht gross, herzförmig kugelig, weich, frühreif.

γ. *duracina* D. C. Knorpelkirsche. Frucht hart, gelblich, später reif.

Nicht bloss angepflanzt wie β. et γ., sondern auch in Wäldern, Rainen bis in die Voralpen. † April bis Juni.

Klagenfurt Kkl., Zwanzgerberg Wulf., Pustritz, Türn, Aichberg Wsbr., Wolfsberg Hfnr., Gurkthal bis gegen die Flatnitz, Tiffen, Gnesau und Teichen erst im Juni blühend D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., St. Peter im Katschthale versuchsweise angepflanzt Gussbr., Malnitz und Heiligenblut ebenso D. P., Lesachthal noch bei 1600 m. Jab., Gailthal D. P.

2061. 9. *Prun. Cerasus* L. Sauerkirsche, Weichsel.

Koch p. 243; Neilr. p. 921; Grke. p. 114.

Blätter flach, kahl, glänzend, schwach lederig, elliptisch, zugespitzt; Blattstiel drüsenlos; innere Schuppen der Blütenknospen drüsentragend; Blume weiss; Wurzel ausläufer treibend.

Meist nur angepflanzt in Obstgärten, und zwar die Abart *austera* mit langem Blütenstiel und gefärbten Saft. † Mai bis Juni.

Klagenfurt Kkl., verwildert bei Agsdorf im Lavantthale Wsbr., Wolfsberg Hfnr., Tiffen D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Möllthal bis Sagritz D. P., Berg Khlmr., Lesachthal Jab., Tröpolach D. P.

Anmerkung. Hie und da findet man *Prunus semperflorens* Ehrh., welche den ganzen Sommer über Blüten und Früchte trägt. Die Achse der Dolde ist verlängert, am Grunde mit Blättern, oberwärts mit Blüten besetzt.

4. Rotte: *Padus* Koch. Traubenkirsche. Blumen in Trauben oder gestielten Doldentrauben.

2062. 10. *Prun. Padus* L. Gemeine Traubenkirsche, Elsen.

Koch p. 244; Neilr. p. 922; Grke. p. 114.

Blätter elliptisch, fast doppelt-gesägt, etwas runzlig; Blattstiel zweidrüsiger; Traube überhängend; Blume weiss, Frucht schwarz, adstringierend, oder

β. Frucht weisslichgrün, weniger herb, in's süssliche.

Gebüsche, Raine, Vorwälder, steigt höher in's Gebirge als die Süßkirsche. † April bis Juni.

Klagenfurt Kkl., Kreuzbergl Zwgr., Zwanzgerberg Kkl., Lavantthal Grf., Rojach, Pustritz Wsbr., Wolfsberg Hfnr., Gurkthal noch gegen die Flatnitz, Tiffen, Teichen, Katschthal D. P., Kanning, Maltathal Khlmr., Göritz ob Sagritz noch bei 1550 m. D. P., Oberberg, Weissbriach Khlmr., Lesachthal Jab., Gailthal D. P.

β. Bei Tiffen, Obervellach, jedoch nur vereinzelt D. P.