

## Blatt 100 Hieflau

### Bericht 1995 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 100 Hieflau

Von FRANZ K. BAUER

Bei Abschlußbegehungen wurde noch eine Reihe von Punkten aufgesucht und Ergänzungen gemacht. Von DEKKER et al. (Jb. Geol. B.-A., 1994) wurde in Abb. 6 eine von Admont gegen NE und von Altenmarkt gegen N verlaufende Blattverschiebung gezeichnet. Diese als Weyerer Störung bezeichnete Linie ist nicht identisch mit der Weyerer Linie.

Die Weyerer Störung soll etwas westlich von Altenmarkt durchziehen. Der Bau ist hier sehr komplex, da hier die Deckengrenze Lunzer Decke zur Reiflinger Scholle verläuft und außerdem in einem schmalen bis zum Laussabach reichenden Fenster Aptychenschichten der Frankfurter Decke heraufspießen. Auf diese trifft die NW-SE verlaufende Störung des Finstertalbaches, in dem Haselgebirge vorkommt. Dieses ist an einer ganzen Reihe von Fugen heraufgepreßt worden. Im NW grenzen Oberalmer Schichten an Hauptdolomit. Östlich des südlichen Finstertalbaches bzw. Ungergraben liegen Aptychenschichten. AMPFERER unterschied in seiner Geologischen Karte 1 : 75.000 (1933) zwischen Neokommern und den den Schweigerberg aufbauenden Aptychenkalken. Zwar bauen den Schweigerberg festere gebankte Kalke auf, wie Aufschlüsse an einer neueren Forststraße zeigen, doch ist eine Abtrennung von mergeligen Aptychenschichten nicht durchführbar. Etwas westlich des Schweigerberges gibt es in den mergeligeren Aptychenschichten einen kleinen Steinbruch, in dem die Gesteine sehr stark deformiert und zerschert sind. Doch hier eine große Blattverschiebung durchziehen zu lassen, erscheint etwas willkürlich. Zieht man die Störung südwärts, der N-S verlaufenden Enns folgend, dann würde sie den kleinen westlich der Enns gelegenen Teil der Reiflinger Scholle abschneiden, was nicht sehr sinnvoll wäre. Eine linksseitige Verschiebung ist hier nicht erkennbar.

Problematisch erscheint die Blattverschiebung auch S St. Gallen zu sein, wo es beiderseits des Tales kleine Schürflinge mit Jura und Neokomgesteinen der Frankfurter Decke gibt. Hier trifft auf das Südende der Weyerer Bögen von NW her die Windischgarstener Störungszone (PLOCHINGER, Jb. Geol. B.-A., 1994). Eine Blattverschiebung hätte die Fenstergesteine östlich des Tales relativ nach N versetzen müssen.

Begehungen zur Klärung des tektonischen Baues wurden östlich St. Gallen im Gebiet Pfaffengraben – Pfliegeralmhütten gemacht. Hier liegt eine kleine Scholle, die aus Gutensteiner Kalk und Lunzer Schichten aufgebaut ist. Die Schichten stehen steil oder sind sogar überkippt, wie an einer weitergeführten Forststraße im Grenzbereich Gutensteiner – Reiflinger Kalk zu sehen ist. Der Aufbau des südlicher gelegenen Zinödlberges ist ganz ähnlich. In beiden Fällen wurde der Bau als Halbantiklinale gedeutet (TOLLMANN, 1967). Der Zinödlberg-Halbantiklinale wird die nördlichere Stiftlberg-Halbantiklinale gegenübergestellt.

Am Südrand der Weyerer Bögen liegt ein besonders komplexer Bau vor. Es lassen sich einige Teilschuppen unterscheiden. Die Labodenschuppe umfaßt das Gebiet

Ruine St. Gallen – Pfaffengraben. Sie grenzt im N an die Reiflinger Scholle. Gegen SE folgt die Kerzenmandlschuppe, die südlich der Pfliegeralmhütte mit Hauptdolomit beginnt. Den trennenden Horizont bilden Lunzer Schichten. Die Schindlgrabenschuppe schließt östlich an die Zinödlbergschuppe an, in der trennenden Fuge liegen Werfener Schichten. Südlich Kirchenlandl – Erbgraben liegt die Landlerschuppe, die infolge der Überschiebung durch die Gesäuse-Einheit in weitere Teilschollen zerlegt ist.

Zusammen mit G. BRYDA und M. MOSER wurde der Kreistengraben begangen, um hier den am Nordrand der Reiflinger Scholle vorliegenden Schuppenbau zu klären.

### Bericht 1995 über geologische Aufnahmen am Nordrand der Großreiflinger Scholle auf Blatt 100 Hieflau

GERHARD BRYDA  
(Auswärtiger Mitarbeiter)

Im Berichtsjahr wurde ein Gebietsstreifen entlang dem Grenzbereich Gamsstein-Zug – Nordrand der Reiflinger Scholle (Hochbajuvarikum) zwischen dem Umspannwerk Eßling – 2,5 km östlich Altenmarkt/Enns und dem Gamsstein-Hals (930 m SH) – Großer Sulzkogel (1185 m SH) im Westen neu aufgenommen und bereits bestehende Kartierungen (MOSER, M., 1991: Bericht über geologische Aufnahmen am Nordrand der Großreiflinger Scholle auf Blatt 100 Hieflau, Jb. Geol. B.-A., 135/3) wurden ergänzt und verbunden.

Innerhalb des Aufnahmegebietes lassen sich drei unterschiedlich aufgebaute Bereiche unterscheiden:

#### Die Sulzkogel Antiklinale

Der Große Sulzkogel bildet, im Arbeitsgebiet beginnend mit einer Schichtfolge aus Gutensteiner Kalken über Reiflinger Kalk, Lunzer Sandsteine, sowie Opponitzer Kalk und Hauptdolomit, den Kern einer Falte mit mittelsteil gegen SW fallender Achse.

Im Bereich der Stecheralm ist als Konsequenz des unterschiedlichen rheologischen Verhaltens der verfalteten Gesteine (kompetenter Hauptdolomit versus plastisch verformbarer Lunzer Schichten) der Faltenscheitel verdoppelt und die Faltenschenkel bereits innerhalb des Opponitzer Kalkes durchgerissen. Der sedimentäre Kontakt der Opponitzer Kalke zum Hauptdolomit ist offenbar besonders entlang des Südschenkels der Sulzkogelantiklinale tektonisch überprägt und gestört. Der hangende Hauptdolomit zeigt im Kontaktbereich einen hohen Zerlegungsgrad und wird von faltenschenkelparallelen Kataklasten durchzogen.

Als Besonderheit wurde innerhalb der an der Fortstraße von der Sulzbachalm auf den Mooskogel in der 1. Kehre (935 m SH) aufgeschlossenen Opponitzer Kalke eine ca. 15 m mächtige Einschaltung aus basal beigegrauen, stark bioturbaten, welligschichtigen tw. gering Hornstein führenden Kalken mit Muschelpflastern über graue bis schwarze Tonschiefer zu graubraunen, dünnbankigen Kalken (Schuttkalke ?) angetroffen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [139](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer Franz K.

Artikel/Article: [Bericht 1995 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 100 Hieflau 317](#)