2. Plankton und Strahlung

Jber. Abt. Limnol. Innsbruck 5: 59-65 (1978)

2.1. Bestand und Produktion des Phytoplanktons im Piburger See 1977/78 (E.ROTT)

Phytoplankton standing crop and production rate in Piburger See 1977/78

Abstract: In this paper data on biomass, chlorophyll content and production rate of phytoplankton for 1977 as well as chlorophyll-values for 1978 are presented. As a rough measure for light transmission, secchi-depth in 1977 and 1978 is referred. The results regard monthly sample series, taken above the deepest point of the lake in 12 and 13 depth levels, respectively.

Die folgenden Ergebnisse umfassen die noch ausstandigen Phytoplanktonbiomassen-, Chlorophyll- und Primarproduktionswerte aus dem Jahr 1977, sowie die Chlorophyllwerte aus dem Jahr 1978.

Die Auswertung der Unterwasserstrahlungsmessungen und der Globalstrahlungsregistrierungen bis Ende 1976 werden teilweise in ROTT (in Vorb.) dargelegt, wahrend mit der Auswertung der Daten von 1977 und 1978 erst begonnen wurde. Als grobes Ma fur die Transmissionsverhaltnisse werden die Sichttiefenwerte aus 1977 und 1978 besprochen. Die Ergebnisse beziehen sich, wie in fruheren Berichtjahren, auf monatlich entnommene Vertikalserien an der tiefsten Stelle aus 12 bzw. 13 Tiefenstufen.

Die qualitative Zusammensetzung des Phytoplanktons im Jahre 1977:

Wie in allen vorangegangenen Untersuchungsjahren kam es auch 1977 wieder zu einer Verschiebung in der Artenzusammensetzung des Phytoplanktons. Wie aus Abb. 2.1.-1 zu entnehmen ist, nahm der Anteil der Grunalgen (von 9% 1976 auf 14% 1977) und vor allem der der Cryptophyceen (von 9% 1976 auf 19% 1977) deutlich zu, wahrend die Anteile der Dinophyceen und Chrysophyceen, die 1976 die quantitativ wichtigsten taxonomischen Gruppen gewesen waren, wieder deutlich sanken. Die Verteilung der Blaualgen mit dem deutlichen Fruhjahrsmaximum im Mai wurde wieder ausschlielich von Oscillatoria limosa Ag. bestimmt, wahrend die kleinen Blau-

algenarten, die im Spätsommer 1976 auch quantitativ erheblich in Erscheinung getreten waren, wieder deutlich zurücktraten. Der Blaualgenanteil stieg von 19.5% auf 26.3% an. Die Dinophyceen dominierten nur im Winter mit Gymnodinium aff. uberrimum und einer anderen Gymnodinium-Art, während sie im Frühjahr und Sommer wesentlich geringer vertreten waren. Wie schon 1976 (ROTT 1977) zeigten die Cryptophyceen ihre Hauptentwicklung im Spätsommer und Herbst. Die Chrysophyceen waren zwar auch im Frühjahr 1977 mit Chrysochromulina parva deutlich vertreten, zeigten aber ihre Hauptentwicklung mit der kolonienbildenden Uroglena volvox im Herbst. Zwischen Juni und September 1977 waren die kleinen Grünalgen, vor allem Elakatothrix aff. gelatinosa und Scenedesmus denticulatus am häufigsten und trugen wesentlich zum hohen Produktionsmaximum am 5. Juli bei.

Abb.2.1.-1: Prozentanteile der wichtigsten Algengruppen an der Phytoplanktongesamtbiomasse des Piburger Sees in den Monaten Jänner bis Dezember 1977

Die Phytoplanktonbiomasse:

Im Vergleich mit den vorangegangenen Jahren war die quantitative Entwicklung des Phytoplanktons im Jahre 1977 wesentlich geringer. Der gewichtete Mittelwert war mit $728 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$ 1977 nahezu auf den Wert von 1973 ($720 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$) abgesunken, während im Vorjahr mit $1227 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$ das Maximum seit 1972 erreicht worden war. Der Jahresverlauf der Mittelwerte (Abb.2.1.-2) zeigt dabei drei allerdings unterschiedlich ausgeprägte Maxima, u.zw. das größte

Abb.2.1.-2: Phytoplanktongesamtbiomasse in mg Frischgewicht pro m^3 in den Jahren 1975 und 1976 (gewichtete Werte schraffiert)

mit $1674 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$ im Mai, ein zweites mit dem Produktionsmaximum übereinstimmendes Maximum im Juli ($1062 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$) und ein drittes gegen Ende der Herbsdurchmischung im November ($691 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$). Diese Verteilung zeigt einen ähnlichen Verlauf, wie er für das Jahr 1972 ermittelt worden war (ROTT 1975).

Die Chlorophyllwerte aus den Jahren 1977 und 1978:

Der Jahresverlauf der Chlorophyll-a-Konzentrationen im Jahre 1977 (Abb.2.1.-3) entspricht im wesentlichen dem der Phytoplanktonbiomassen; der Juliwert konnte jedoch nicht belegt werden. 1978 zeigt der Jahresgang mit 2 Maximalwerten, dem ersten im April und dem zweiten im September, einen wesentlich anderen Verlauf und läßt dementsprechend auch eine andere Biomassenverteilung erwarten. Da das Jahresmittel im Jahre 1978 auf $5.0 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$ (1977: $3.7 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$) angestiegen ist, muß erwartet werden, daß sich für 1978 wieder eine stärkere Biomassenentwicklung zeigen wird.

CHLOROPHYLL a

Abb.2.1.-3: Chlorophyllkonzentrationen in mg Chlorophyll a pro m^3 (gewichtete Werte schraffiert) und Sichttiefen in den Jahren 1977 und 1978

Die Primärproduktionswerte von 1977:

Der Gesamtverlauf der Primärproduktionswerte in Abb.2.1.-4 zeigt neben einem hohen Maximalwert im Juli drei weitere Maxima im Mai, September und November. Dabei war am 1977-07-05 mit $710 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}$ der höchste Wert seit Beginn der Untersuchungen im Jahre 1973.

zu verzeichnen. Die Maximalwerte des Jahres 1977 entsprechen, mit Ausnahme des Septemberwertes, den Biomassenmaximalwerten. Trotz deutlich geringerer Phytoplanktondichten wurde mit $211 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}$ ein höheres Jahresmittel der Primärproduktion erreicht, als 1976 mit $197 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}$ beobachtet worden war. Die Einzelwerte der Primärproduktion (Tab.2.1.-1) erreichten am 1977-07-05 und in 4.5 m Tiefe mit $126 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{d}$ ihren Maximalwert.

Sichttiefenwerte aus den Jahren 1977 und 1978:

Die Sichttiefenverteilung im Jahre 1977 (Abb.2.1.-3) zeigt zwei deutliche Minima, das erste im Juli mit 3.5 m während des starken Produktionsmaximums (kleine Grünalgen) und das zweite im Oktober mit 5.5 m. Der Maximalwert wurde im September mit 9 m erreicht.

1978 waren die Unterschiede zwischen größten und kleinsten Werten weniger deutlich ausgeprägt. Der geringste Wert wurde am 19. April mit 4.4 m, ein zweites Minimum mit 4.45 m am 11. Oktober erreicht, während der Maximalwert von 8 m am 15. März zu verzeichnen war.

PRIMÄRPRODUKTION

1977

Abb.2.1.-4: Jahresverteilung der Primärproduktionswerte in $\text{mg } C_{\text{ass}}/\text{m}^2$ u.d (ungewichtete Werte punktiert; Eisdecke schwarz)

Zitierte Literatur:

- ROTT,E. (1975): I.4.2. Phytoplankton und kurzwellige Strahlung. Jber.Abt.Limnol.Innsbruck 1: 51-58
- ROTT,E. (1977): I.3.2. Phytoplankton und kurzwellige Strahlung. Jber.Abt.Limnol.Innsbruck 3: 107-111
- ROTT,E. (in Vorb.): Primary productivity and activity coefficients of phytoplankton of a moderately eutrophic soft-water lake (Piburger See, Tirol, Austria). Int.Rev.ges.Hydrobiol.

Abb. 2.1-4: Jahresverteilung der Primärproduktionswerte in mg C/m² d. u. d. (ungewichtete) Werte punktiert; Bisdicke schwarz, die Primärproduktion.

Die Sichtungverteilung im Jahre 1977 (Abb. 2.1-2) zeigt zwei deutliche Maxima, das erste im Juli mit 2,5 m während des starken Produktionsmaximums (keine Sichtung) und das zweite im Oktober mit 2,5 m. Der Maximalwert wurde im September mit 9 m erreicht.

Tab. 2.1.1.-1: Planktische Primärproduktion im Piburger See 1977 (mg C_{ass}/m³ u.Tag)

T _M	5. I.	15. II.	16. III.	7. IV.	11. V.	8. VI.	5. VII.	1. VIII.	7. IX.	12. X.	9. XI.	20. XII.
0	12.27	3.0	9.0	9.8	7.8	40.4	52.2	66.5	21.5	5.5	51.7	30.25
1.5	2.2	7.5	13.0	25.1	24.4	44.9	118.5	57.0	48.1	16.8	41.2	24.1
3	0.7	12.7	15.9	26.9	23.1	32.1	124.6	38.5	47.1	17.5	28.1	11.4
4.5	0.2	1.5	14.7	29.2	22.3	23.9	126.2	24.8	50.4	15.1	12.5	6.1
6	0.1	6.2	11.3	25.7	20.8	19.0	81.2	21.6	40.3	9.4	5.1	1.5
7.5		2.8	8.1	15.8	30.5	13.5	40.6	17.10	30.3	3.1	1.3	0.8
9		2.5	6.9	10.8	37.5	6.9	13.4	9.1	57.0	2.7	1.8	0.4
10.5		0.6	4.2	7.7	24.0	4.3	6.7	1.7	12.2	1.0	0.2	
12			2.3	5.0	46.2	2.1	14.2	0.7	5.9	0.2		
15			1.1	4.2	5.4	1.9	3.7		1.6	0.3		
18			0.1	0.3	0.6	1.6	0.4			0.2		
21										0.1		
24												
gew. mg/m ⁻²	13.3	45.0	102.0	192.6	284.3	220.1	710.5	266.7	369.4	88.7	158.0	81.8
ungew.	13.9	53.1	127.1	244.7	402.7	263.0	853.1	306.7	464.0	105.2	174.2	89.2
												$\bar{x} \approx 211.0$

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Abteilung für Limnologie am Institut für Zoologie der Universität Innsbruck](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [1978](#)

Autor(en)/Author(s): Rott Eugen

Artikel/Article: [Bestand und Produktion Phytoplanktons im Piburger See 1977/78 59-65](#)