download unter www.zobodat.at

Die Vogelwelt von Lobenstein und seiner Umgebung.

Von

H. Schramm, Ober-Postassistent.

Ordnung: **Raubvögel.**

Familie: Eulen.

Schleiereule, Strix flammea. Brutvogel.

Steinkauz, Glaucidium noctua. Brutvogel. Ziemlich selten.

Rauhfusskauz, Nyctala Tengmalmi. Brutvogel. Ein noch nicht flügges Exemplar sah ich bei einem hiesigen Ausstopfer.

Waldkauz, Syrnium aluco. Brutvogel.

Waldohreule, Asio otus. Brutvogel.

Familie: Falken.

Edelfalken:

Turmfalke, Falco tinnunculus (L). Brutvogel.

Weihen:

Wespenbussard, Pernis apivorus (L). Brutvogel. Ein totes Dunenjunges fand ich unter dem Horstbaum.

Bussarde:

Mäusebussard, Buteo buteo (L.). Oefters beobachtet, bis jetzt noch keinen Horst gefunden.

Rauhfussbussard, Archibuteo lagopus. Ein Exemplar wurde Anfang April ds. Js. im Eisen gefangen.

Habichte:

Sperber, Accipiter nisus (L.). Brutvogel.

Hühnerhabicht, Astur palumbarius (L.). Brutvogel. Im Tiergarten zu Weidmannsheil.

download unter www.zobodat.at

Ordnung: **Singvögel.**

Raben:

Rabenkrähe, Corvus corone (L.). Brutvogel. Ziemlich häufig.

Saatkrähe, Corvus frugilegus (L.). Während des Zuges beobachtet.

Dohle, Corvus monedula (L.). Während des Zuges beobachtet.

Elster, Corvus pica (L.). Durchzügler.

Nebelkrähe, Corvus cornix. Durchzügler.

Tannenhäher, Nusshäher, Corvus caryocatactes (L.). Auf dem Durchzuge werden öfters Exemplare erlegt; ich sah zwei Stück bei einem Ausstopfer, welche der breitschnäbligen Form angehörten.

Eichelhäher, Corvus glandarius (L.). Brutvogel.

Würger:

Grosser Würger, Lanius excubitor (L.). Während des Winters wiederholt auf Strassenbäumen beobachtet.

Rotkopfwürger, Lanius rufus. Während des Zuges im Mai.

Rotrückiger Würger, Lanius collurio. Brutvogel. Sehr vereinzelt.

Fliegenfänger:

Schwarzer Fliegenfänger, Muscicapa luctuosa (Temm.). Auf dem Durchzug Anfang Mai.

Grauer Fliegenfänger, Muscicapa grisola (L.). Brutvogel.

Seidenschwänze:

Seidenschwanz, Ampelis garrulus (L.). Besucht in manchen Wintern die mit Früchten beladenen Ebereschbäume.

Pirole:

Pirol, Oriolus galbula (L.). Anfang Mai 1902 ein Weibchen auf dem Durchzug beobachtet.

Stare:

Star, Sturnus vulgaris (L.). Häufiger Brutvogel. Ueberwintert hier nicht.

Drosseln:

Misteldrossel, Turdus viscivorus (L.). Brutvogel. Einzelne Exemplare überwintern.

Singdrossel, Turdus musicus (L.). Brutvogel.

Wachholderdrossel, Turdus pilaris (L.). In den letzten Jahren

download unter www.zobodat.at

als Brutvogel sehr zugenommen; im Winter oft zu Tausenden auf den Ebereschbäumen anzutreffen.

Schwarzdrossel, Turdus merula. Brutvogel. Hier noch echter Waldvogel, welcher nur bei strenger Kälte und im zeitigen Frühjahr in die Nähe der menschlichen Wohnungen kommt.

Sänger:

Nachtigall, Sylvia luscinia. Auf dem Durchzug im Frühjahr.

Blaukehlchen, Sylvia leucocyana (Br.). Männchen auf dem Durchzug Anfang April an Bächen; Weibchen kommen Ende April bis in die Hausgärten.

Rotkehlchen, Sylvia rubecula (L.). Häufiger Brutvogel.

Gartenrotschwanz, Sylvia phoenicurus (Lath.). Brütet vereinzelt in Parkanlagen.

Hausrotschwanz, Sylvia tithys (Lath.). Brutvogel.

Dorngrasmücke, Sylvia cinerea. Brütet vereinzelt in Schwarzdorngebüschen.

Zaungrasmücke, Sylvia curruca. Brutvogel im Gallenberg.

Gartengrasmücke, Sylvia hortensis. Brutvogel.

Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla. Brutvogel.

(Sperbergrasmücke, Sylvia nisoria, kommt nicht vor.)

Waldlaubvogel, Sylvia sibilatrix (B.). Kommt regelmässig auf dem Durchzug im Mai hier vor. Brutvogel im Ebersdorfer Park.

Fitislaubvogel, Sylvia trochilus (L.). Kommt allenthalben als Brutvogel vor.

Weidenlaubvogel, Sylvia rufa. Brutvogel.

Gartenlaubvogel, Sylvia hypolais. Brutvogel in Parkanlagen und Obstgärten.

Sumpfrohrsänger, Sylvia palustris. An warmen, schönen Maitagen auf dem Zuge im Schwarzdorngebüsch in der Gallenleithe.

Schilfrohrsänger, Sylvia phragmitis. Brutvogel an Teichen im Rohr.

Goldhähnchen:

Gelbköpfiges Goldhähnchen, Regulus flavicapillus. Brutvogel.

Feuerköpfiges Goldhähnchen, Regulus ignicapillus (Naum.). Brutvogel.

download unter www.zobodat.at

Braunellen:

Heckenbraunelle, Accentor modularis. Häufiger Brutvogel.

Wasserschmätzer:

Wasserstar, Cinclus aquaticus. Brutvogel an Gebirgsbächen.

Zaunkönige:

Zaunkönig, Troglodytes parvulus. Brutvogel. Als Merkwürdigkeit sei erwähnt, dass ein Zaunkönig ein sogen. Spielnest 5 Jahre hintereinander in die Felsengrotte im Gallenberg baute.

Steinschmätzer:

Grauer Steinschmätzer, Saxicola oenanthe (L.). Brutvogel.

Braunkehliger Wiesenschmätzer, Pratincola rubetra (L.). Erst 1902 ein Paar am Nest beobachtet. Selten.

Bachstelzen:

Weisse Bachstelze, Motacilla alba (L.). Brutvogel.

Gebirgsbachstelze, Motacilla sulphurea. Brutvogel. Ueberall an Gebirgsbächen.

Gelbe Bachstelze, Motacilla flava. Auf dem Durchzug. Als Brutvogel nicht beobachtet.

Pieper:

Wiesenpieper, Anthus pratensis (Bechst.). Brutvogel. Selten.

Baumpieper, Anthus arboreus. Brutvogel.

Lerchen:

Feldlerche, Alauda arvensis. Brutvogel. Häufig.

Heidelerche, Alauda arborea. Brutvogel.

Haubenlerche, Alauda cristata (L.). Brutvogel. Selten.

Ammer:

Goldammer, Emberiza citrinella. Häufiger Brutvogel.

Finken:

Buchfink, Fringilla coelebs (L.). Brutvogel. Sehr zahlreich.

Bergfink, Fringilla montifringilla (L.). Auf dem Durchzug.

Stieglitz, Carduelis elegans. Brutvogel.

Bluthänfling, Acanthis cannabina. Brutvogel.

Berghänfling, Fringilla montium. Strichvogel.

Leinfink, Fringilla linaria (L.). Strichvogel.

Zeisig, Fringilla spinus. Brutvogel.

Girlitz, Fringilla serinus. Brutvogel. Ein Paar brütet regelmässig auf den Pappeln am Wege nach dem Schiesshaus.

download unter www.zobodat.at

Grünhänfling, Fringilla chloris. Brutvogel.
Kernbeisser, Fringilla coccothraustes. Brutvogel. Selten.
Haussperling, Fringilla domestica. Brutvogel. Häufig.
Feldsperling, Fringilla montana. Brutvogel. Seltener.

Gimpel:

Dompfaff, Pyrrhula vulgaris. Brutvogel.

Kreuzschnäbel:

Fichtenkreuzschnabel, Loxia curvirostra. Brutvogel. In manchen Jahren sehr selten.
Zweibindiger Kreuzschnabel, Loxia bifasciata. Ein Exemplar besitzt ein Ausstopfer in ausgestopftem Zustande.

Meisen:

Kohlmeise, Parus major (L.). Brutvogel. Häufig.
Tannenmeise, Parus ater (L.). Brutvogel.
Blaumeise, Parus coeruleus (L.). Brutvogel.
Sumpfmeise, Parus palustris (L.). Brutvogel.
Haubenmeise, Parus cristatus (L.). Brutvogel.
Schwanzmeise, Parus caudatus (L.). Brutvogel. Selten.

Kleiber:

Kleiber, Sitta caesia, Wolf. Brutvogel.

Baumläufer:

Baumläufer, Certhia familiaris (L.). Brutvogel.

Schwalben:

Rauchschwalbe, Hirundo rustica (L.). Brutvogel.
Hausschwalbe, Hirundo urbica (L.). Brutvogel.
Uferschwalbe, Hirundo riparia (L.). An der Saale beobachtet; jedenfalls hier auch Brutvogel.

Segler:

Mauersegler, Cypselus apus (L.). Brutvogel. Nistet öfters in Starkästen.
Ziegenmelker, Caprimulgus europæus (L.). Brutvogel im Hakengrund.

Spechte:

Schwarzspecht, Picus martius (L.). Brutvogel.
Grünspecht, Picus viridis (L.). Brutvogel.
Grosser Buntspecht, Picus major (L.). Brutvogel.
Mittlerer Buntspecht, Picus medius (L.). Strichvogel.
Kleiner Buntspecht, Picus minor (L.). Strichvogel.

download unter www.zobodat.at

Grauspecht, Picus canus (L.). Ich besitze ein ausgestopftes Männchen, welches hier erlegt wurde.

Kuckucke:

Kuckuck, Cuculus canorus (L.). Bis heute habe ich nicht feststellen können, welche Pfleger der Kuckuck hier bevorzugt.

Wendehälse:

Wendehals, Iynx torquilla (L.). Brutvogel. Benutzt Starkästen als Niststätte. Selten.

Eisvögel:

Eisvogel, Alcedo ispida. Brutvogel. Nirgends zahlreich.

Raken:

Blaurake, Coracias garrula (L.). Im Jahre 1900 beobachtete ich mehrere Tage hintereinander ein Paar, welches sich im Koselgrund aufhielt. 1902 wurde ein Männchen bei Ludwigstadt erlegt.

Wiedehopfe:

Wiedehopf, Upupa epops (L.). Ein ausgestopftes Exemplar stammt aus Seibis b. Harra.

Hühner:

Auerhuhn, Tetrao urogallus (L.). Brutvogel.
Birkhuhn, Tetrao tetrix (L.). Brutvogel.
Rebhuhn, Perdix cinerea (L.). Brutvogel.
Wachtel, Perdix coturnix (L.). Brutvogel. Selten.

Tauben:

Ringeltaube, Columba palumbus (L.). Brutvogel.
Turteltaube, Columba turtur. Brutvogel.
Hohltaube, Columba œnas (L.). Brutvogel.

Trappen:

Grosstrappe, Otis tarda (L.). Ein Männchen wurde in der Nähe von Zoppoten erlegt.

Kraniche:

Grauer Kranich, Grus cinerea (B.). Auf dem Durchzug im Herbst.

Störche:

Weisser Storch, Ciconia alba (B.). Im Frühjahr und Herbst auf dem Durchzug beobachtet.

download unter www.zobodat.at

Brachvögel:

Grosser Brachvogel, Numenius arquata (Lath.). Ein Exemplar wurde in der Nähe auf der Hühnersuche erlegt.

Regenpfeifer:

Goldregenpfeifer, Charadrius auratus. Im Herbst auf dem Zuge erlegt.

Kiebitz, Vanellus cristatus. Wird immer seltener als Brutvogel.

Flussregenpfeifer, Charadrius minor. Brutvogel.

Schnepfen:

Waldschnepfe, Scolopax rusticola (L.). Auf dem Durchzug im Frühjahr und Herbst.

Bekassine, Scolopax gallinago (Br.). Brutvogel auf den Wiesen am Kulm.

Sumpfhühner:

Wiesensumpfhuhn, Crex pratensis. Brutvogel. Erscheint hier aussergewöhnlich spät im Frühjahr, oft erst Ende Mai.

Teichhühner:

Grünfüssiges Teichhuhn, Gallinula chloropus (Lath.). Brutvogel.

Wasserhühner:

Blässhuhn, Fulica atra (L.). Brutvogel.

Gänse:

Auf dem Durchzug im Herbst bietet sich öfters Gelegenheit, wilde Gänse zu beobachten. Welcher Gattung dieselben angehören, konnte ich nicht feststellen.

Enten:

Stockente, Anas boschas (L.). Brutvogel.

Kriekente, Anas crecca (L.). Brutvogel an den Saalufern.

Meine Beobachtungen erstrecken sich auf einen Zeitraum von 4 Jahren und können deshalb noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Es ist deshalb auch nicht ausgeschlossen, dass dieser oder jener als Durchzügler bezeichnete Vogel hier brütet. Jedenfalls kommen hier auch noch mehr Sumpf- und Wasservögel auf dem Durchzug vor; ich habe mich jedoch darauf beschränkt, nur die von mir selbst beobachteten oder in ausgestopftem Zustande vorgefundenen Gattungen aufzuführen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera

Jahr/Year: 1900-1902

Band/Volume: 43-45

Autor(en)/Author(s): Schramm H.

Artikel/Article: Die Vogelwelt von Lobenstein und seiner Umgebung 58-64