

FORTSETZUNG DES VERZEICHNISSSES

der

bei Hannover und im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden
Schmetterlinge

von C. T. Glitz.

E. Pyralidina.

I. Pyralididae.

1. Cledeobia Dup.

1. (13.) **Angustalis** Schiff. Von Herrn Krösman n einigemal im Juli gefunden.

2. Aglossa Latr.

2. (24.) **Pingualis** L. Oefter in Häusern im Juni gefunden, auch einmal aus der Raupe erzogen.
3. (26.) **Cuprealis** Hb. Einige Mal in Häusern gefunden.

3. Asopia Tr.

4. (32.) **Glaucinalis** L. Im Mai und Juli einigemal gefunden.
5. (35.) **Farinalis** L. Im Mai und August in Ställen und Bäckerhäusern häufig gefunden.

4. Endotricha Z.

6. (40.) **Flammealis** Schiff. Im Juli bei Misburg in einem Birkenkampe öfter gefunden.

5. Scoparia Hw.

7. (47.) **Ambigualis** Tr. Im Juni häufig an Nadelholzstämmen im Walde.
8. (52.) **Dubitalis** Hb. Im Juni und Juli häufig auf feuchten Wiesen, auch auf dem Lindenerberge.
9. (68.) **Laetella** Z. Im Juli selten an Schlehenhecken gefangen.

10. (69.) **Truncicolella** Stt. Im Juli und August häufig an Fuhrenstämmen.
11. (70.) **Crataegella** Hb. Im Juli und August häufig an Baumstämmen, auch einige Mal aus Raupen, die von Moos lebten, erzogen.

6. *Odontia* Dup.

12. (100.) **Dentalis** Schiff. Einige Mal im August auf dem Lindenerberge gefunden.

7. *Eurrhypara* Hb.

13. (109.) **Urticata** L. Im Juni und Juli häufig auf Brennesseln, worauf die Raupe im Herbst lebt.

8. *Botys* Tr.

14. (114.) **Nigrata** Sc. (**Anguinalis** Hb.) Im Juli einige Mal auf trockenen Wiesen gefunden.
15. (121.) **Porphyralis** Schiff. Wie die Vorige.
16. (123.) **Aurata** Sc. (**Punicealis** Schiff.) Im Mai und Juli häufig auf feuchten Wiesen. Die Raupe lebt im Mai und October an *Mentha aquatica*.
17. (125.) **Purpuralis** L. Häufig im Juli auf Wiesen. Die Var. *Ostrinalis* Hb. auf den Sandbergen bei Herrenhausen häufig.
18. (134.) **Cespitalis** Schiff. Sehr häufig auf Wiesen und auf dem Lindenerberge von Mai bis August.
19. (155.) **Hyalinalis** Hb. Im Juli nicht selten zwischen Brombeergebüsch.
20. (164.) **Nubilalis** Hb. (**Silacealis** Hb.) Im Juni einige Mal an Hecken, worin Hopfen stand, gefunden.
21. (173.) **Fuscalis** Schiff. Im Juni häufig auf Waldwiesen.
22. (176.) **Crocealis** Hb. Bei Misburg als Raupe an *Inula dysenterica* im Mai gefunden und im Juli erzogen.
23. (180.) **Stachydalis** Zk. Im Juli einige Mal im Walde gefunden.
24. (181.) **Sambucalis** Schiff. Häufig im Juli und August in Gärten und Wäldern.
25. (189.) **Prunalis** Schiff. Im Juni und Juli überall häufig. Die Raupe polyphag an Linden, Schlehen, *Geum urbanum*, *Prunus padus* etc.
26. (195.) **Olivalis** Schiff. Die Raupe im Mai an Erdbeerblättern gefunden und den Falter im Juli daraus erzogen.
27. (199.) **Pandalis** Hb. Bei Misburg auf feuchten Wiesen im Juni und Juli häufig.

28. (201.) **Ruralis** Sc. (**Verticalis** Schiff.) Die Raupe im Mai an Brennesseln, der Schmetterling häufig im Juni und Juli zwischen diesen Pflanzen.

9. *Eurycreon* Ld.

29. (204.) **Sticticalis** L. Im Juli und August auf den Sandbergen bei Herrenhausen einzeln.
30. (217.) **Palealis** Schiff. Die Raupe im September häufig in den Samendolden von wilden Möhren, überwintert in einem Gespinnste in der Erde und kömmt im Juli als Falter aus.
31. (219.) **Verticalis** L. (**Cinctalis** Tr.) Im Juli einmal im Garten gefangen.

10. *Nomophila* Hb.

32. (222.) **Noctuella** Schiff. (**Hybridalis** Hb.) Vom Juni bis October auf den Sandbergen bei Herrenhausen häufig.

11. *Psamotis* Hb.

33. (223.) **Pulveralis** Hb. Im Juli und August auf feuchten Wiesen bei Misburg häufig.

12. *Pionea* Gn.

34. (224.) **Forficalis** L. In zwei Generationen im Mai und Juni und im Juli und August häufig in Gärten und Kohlfeldern.

13. *Orobena* Gn.

35. (232.) **Extimalis** Sc. (**Margaritalis** S. V.) Im Juni und Juli an Rübsaatfeldern gefangen, auch einige Mal aus der Raupe, die in den Rübsaatschoten lebt, erzogen.
36. (233.) **Straminalis** Hb. (**Stramentalis** Hb.) Von Herrn Krösman angeblich im Juli und August viel erzogen.

14. *Perinephele* Hb.

37. (249.) **Lancealis** Schiff. Von Herrn Krösman aus Raupen, die er im October auf *Eupatorium cannabinum* faud, im Juni und Juli viel erzogen.

15. *Diasemia* Gn.

38. (257.) **Litterata** Sc. Im Mai und August häufig an dürren Stellen, z. B. auf dem Lindenerberge, gefunden.

16. *Agrotera* Schrk.

39. (275.) **Nemoralis** Sc. Im Juni in Buchenwäldern einzeln gefangen.

17. *Hydrocampa* Gn.

40. (282.) *Stagnata* Don. (*Nymphaealis* Tr.) Im Mai und Juli in der Masch häufig.
41. (283.) *Nymphaeata* L. (*Potamogalis* Tr.) Wie die Vorige.

18. *Paraponyx* Hb.

42. (288.) *Stratiotata* L. Wie die Vorige aber selten.

19. *Cataclysta* Hb.

43. (291.) *Lemnata* L. Im Juni und August an stehendem Wasser häufig.

II. Chilonidae.

20. *Schoenobius* Dup.

44. (300.) *Forficellus* Thnb. Im Juni und Juli auf feuchten Wiesen nicht selten.
45. (301.) *Mucronellus* Schiff. Im Juni in der städtischen Masch selten.

21. *Chilo* Zk.

46. (302.) *Phragmitellus* Hb. Aus der Raupe, die im März und April im Schilfrohr lebt, im Juli öfter erzogen.

III. Crambidae.

22. *Crambus* F.

47. (311.) *Alpinellus* Hb. Beim Misburger Kirchhofe im August einigemal gefunden.
48. (316.) *Cerusellus* Schiff. Häufig auf den Sandbergen bei Herrenhausen im Mai und Juni.
49. (318.) *Hamellus* Thnb. Bei Misburg im August auf dünnen Stellen ziemlich selten.
50. (321.) *Pascuellus* L. Von Ende Juni und im Juli häufig auf Wiesen.
51. (325.) *Ericellus* Hb. Im Juli und August auf Haideplätzen nicht selten.
52. (331.) *Pratellus* L. (*Pratorum* F.) Im Mai und Juni überall häufig.
53. (334.) *Dumetellus* Hb. Im Juni und Juli häufig auf Sandboden.
54. (335.) *Hortuellus* Hb. Im Juni und Juli auf Wiesen sehr häufig.
55. (337.) *Chrysonuchellus* Sc. Im Mai und Juni auf den Herrenhäuser Sandbergen häufig.

56. (342.) **Falsellus** Schiff. Aus Raupen, die im Mai im Moose der Dächer lebten, im Juli häufig erzogen.
57. (343.) **Verellus** Zk. Im Juli auf Waldwiesen selten.
58. (348.) **Pinellus** L. (**Pinetella** L.) Im Juli und August in der Eilenriede zwischen Nadelholz öfter gefunden.
59. (351.) **Myellus** Hb. Wie die Vorige.
60. (355.) **Margaritellus** Hb. Desgl. aber häufig.
61. (362.) **Fulgidellus** Hb. Bei Misburg zwischen Spartium-Gebüsch, im August selten gefunden.
62. (365.) **Fascelinellus** Hb. Auf den Herrenhäuser Sandbergen im Juni und Juli nicht selten.
63. (377.) **Culmellus** L. Im Juli und August auf Wiesen sehr häufig.
64. (381.) **Inquinatellus** Schiff. Im Juni und Juli auf dem Lindenerberge und bei Misburg auf dürren Plätzen häufig.
65. (382.) **Geniculeus** Hw. Auf dem Lindenerberge im August häufig.
66. (392.) **Tristellus** F. Vom Juli bis September überall häufig.
67. (393.) **Selasellus** Hb. (**Pratellus** H. S.) Auf den Wiesen hinter Misburg im August häufig.
68. (396.) **Lithargyrellus** Hb. Im August bei Misburg auf dürren Stellen selten.
69. (398.) **Perlellus** Sc. Im Juli und August auf feuchten Wiesen häufig.

IV. Phycideae.

23. Dioryctria Z.

70. (412.) **Abietella** Zk. Aus Raupen, die im Herbst in Zapfen von *Pinus picea* lebten, im Juni öfter erzogen, auch von Fichten abgeklopft.

24. Nephopteryx Z.

71. (418.) **Spissicella** F. (**Roborella** S. V.) Raupe im Mai in röhrenförmigem Gespinnste an Eichen, Schmetterling im Juli öfter erzogen.
72. (423.) **Rhenella** Zk. Aus Raupen, die im September zwischen Espenblättern lebten, im Juni öfter erzogen.
73. (429.) **Similella** Zk. Von Herrn Krösmann in drei Exemplaren erzogen.
74. (430.) **Albicilla** H. S. Von Herrn Major Comperl in einigen Exemplaren im Mai erzogen und einmal von mir in der Eilenriede gefunden.

75. (437.) *Janthinella* Hb. Im Juli auf Haidflächen selten.
76. (438.) *Argyrella* F. Hinter Hainholz auf Haidflächen im Juli häufig.

25. *Pempelia* Hb.

77. (441.) *Semirubella* Sc. In früheren Jahren von Herrn Hegewisch in den Limmer Wiesen gefunden.
78. (447.) *Formosa* Hw. Bei Misburg in Birkengehölzen, im Juli selten.
79. (448.) *Betulae* Göze. Raupe im Mai in zusammengesponnenen Birkenblättern bei Misburg zuweilen häufig, Schmetterling im Juni und Juli.
80. (451.) *Fusca* Hw. Im Juli öfter zwischen Birkengebüsch.
81. (453.) *Palumbella* F. Im Juli und August auf Haide häufig.
82. (455.) *Obductella* F. Im Juli einigemal auf Haide gefunden.
83. (457.) *Adornatella* Tr. Auf trockenen Sandflächen um Quendel häufig im Juli.
84. (458.) *Subornatella* Dup. Wie die Vorige.
85. (460.) *Ornatella* Schiff. Ebenso.

26. *Hypochoalcia* Hb.

86. (477.) *Ahenella* Zk. Auf dem Lindenerberge im Juni nicht selten.

27. *Cryptoblades* Z.

87. (513.) *Bistriga* Hw. (*Rutilella* Z.) Einige Mal aus Raupen, die im October an Erlen gefunden waren, im Mai erzogen.

28. *Acrobasis* Z.

88. (525.) *Consociella* Hb. Raupe im Mai auf Eichen in röhrenförmigen Gespinnsten häufig, Schmetterling im Juli.
89. (527.) *Tumidella* Zk. Wie die Vorige.
90. (528.) *Rubrotibiella* F. Desgl. aber seltener.

29. *Myelois* Z.

91. (544.) *Cribrum* Schiff. Die überwinterte Raupe häufig in Distelstengeln im Frühlinge gefunden und den Falter im Juni und Juli erzogen.
92. (558.) *Suavella* Zk. Raupe im Mai an Schlehen, Falter im Juli nicht selten.
93. (560.) *Advenella* Zk. Raupe im Mai an Weissdornblättern und Blüthen, Falter im Juli ziemlich selten.
94. (561.) *Epelydella* Z. Einmal von Herrn Krösmann erzogen von einer auf Schlehen gefundenen Raupe.

30. *Zophodia* Hb.

95. (597.) *Convolutella* Hb. Einige Mal aus Raupen, die im Juni in den unreifen Früchten von Stachelbeeren lebten, im folgenden Mai erzogen.

31. *Euzophera* Z.

96. (598.) *Terebrella* Zk. Raupe im Herbste in verkümmerten Zapfen der Fichte häufig, Falter im Juni und Juli.
97. (600.) *Pinguis* Hw. Im Juli und August gegen Abend an der Allee nach dem Pferdethurme an Eschenbäumen frisch entwickelt nicht selten gefunden.

32. *Homoeosoma* Curt.

98. (616.) *Nebulea* Hb. Raupe im Herbste in den Samenköpfen von *Carduus nutans*, Falter im Mai und Juni.
99. (617.) *Nimbella* Z. Im Mai und Juli auf den Herrenhäuser Sandbergen häufig.

33. *Anerastia* Hb.

100. (623.) *Lotella* Hb. Auf den Herrenhäuser Sandbergen im Juli nicht selten.

34. *Ephestia* Gn.

101. (633.) *Elutella* Hb. Häufig vom Juni bis August in Häusern und im Freien, Raupe im Frühling in trockenem Obste und Pflanzenstoffen.
102. (641.) *Interpunctella* Hb. Zweimal im Juli in Häusern gefunden.

V. *Galleriae*.

35. *Galleria*.

103. (642.) *Mellonella* L. Die Raupe in Bienenstöcken häufig, Schmetterling im Frühling und Juli und August.

36. *Aphomia* Hb.

104. (643.) *Sociella* L. (*Colonella* L.) Im Juli öfter in Wäldern gefunden.

37. *Melissoblastes* Z.

105. (645.) *Bipunctanus* Curt. Von Herrn Krösmann viel erzogen.

38. *Achroea* Hb.

106. (647.) *Grisella* F. Raupe lebt in Bienenstöcken von Wachs, Falter im Juni und Juli.

F. Tortricina.

39. Rhacodia Hb.

107. (648.) **Caudana** F. Einige Mal im August zwischen Gebüsch von Zitterpappeln gefangen.
108. (649.) **Efracrana** Froel. In einem Exemplare von Herrn Krösmann gefunden.

40. Teras Tr.

109. (652.) **Hastiana** L. Als Raupe im August und September an Weiden häufig gefunden und den Schmetterling in allen Varietäten im September und October erzogen.
110. (656.) **Mixtana** Hb. Raupe im Juli an Haide, Falter im October öfter erzogen. überwintert.
111. (660.) **Variegana** Schiff. (**Abildgaardana** Froel.) mit der ab. **Asperana** F. (**Nyctemerana** Hb.) öfter im August erzogen. Raupe im Mai auf Weissdorn und Apfelbäumen.
112. (664.) **Literana** L. mit der var. **Squamana** F. (**Asperana** S. V.) im September öfter an Eichenstämmen gefunden, die Stammart aber viel seltener.
113. (665.) **Niveana** F. (**Treueriana** Hb.) Im September und October, auch im Frühlinge überwintert an Birkenstämmen nicht selten.
114. (667.) **Lipsiana** Schiff. Im September in einigen Exemplaren zwischen *Vaccinium vitis idaea* gefangen.
115. (670.) **Sponsana** F. (**Favillaceana** Hb.) Aus Raupen, die im Juli auf Ahorn lebten, im September öfter erzogen.
116. (671.) **Rufana** Schiff. (**Rufana** Hb.) Einige Exemplare im Herbste in Wäldern gefangen.
117. (672.) **Schalleriana** L. Von Herrn Krösmann im August angeblich viel erzogen. Raupe nach von Heine mann im Mai auf *Symphytum officinale*.
118. (673.) **Comparana** Hb. In einigen Stücken im August gefangen.
119. (673^a.) **Comariana** Z. Sehr selten im Ricklinger Holze im August gefunden.
120. (676.) **Ferrugana** Tr. mit den Var. **Tripunctana** Hb. und **Brachiana** Fr. viel im August erzogen. Raupe im Juni auf Birken.
121. (678.) **Selasana** H. S. Ende Juni einige Exemplare zwischen Birken gefangen.
122. (679.) **Quercinana** Z. Von Eichenraupen im Juli erzogen.

123. (681.) **Forskaleana** L. Im Juni und Juli selten. Einmal erzogen von Raupen, die auf Feldahorn lebten.
124. (682.) **Holmiana** L. Raupe im Mai und Juni auf Weissdorn und Apfelbäumen häufig. Falter im Juni und Juli.
41. *Tortrix* Tr.
125. (685.) **Piceana** L. Raupe im Mai und Juni auf Föhren. Falter im Juli.
126. (686.) **Podana** Sc. (**Ameriana** Tr.) Im Juni häufig. Raupe im Mai hauptsächlich auf Eichen.
127. (688.) **Decretana** Tr. Bei Cananohe auf dem Moore im Juli nicht selten. Raupe im Mai an *Vaccinium uliginosum*. Bei der Zucht aus dem Eie kamen die Schmetterlinge noch im August aus.
128. (689.) **Crataegana** Hb. Einige Stück im Juli gefangen.
129. (690.) **Xylosteania** L. Raupe im Mai vorzüglich auf Eichen. Falter im Juli häufig.
130. (691.) **Rosana** L. (**Laevigana** Schiff.) Raupe im Mai auf Hainbuchen und sonstigem Laubholz, auch auf *Vaccinium uliginosum*. Falter im Juli sehr häufig.
131. (692.) **Sorbiana** Hb. Raupe auf Laubholz im Mai, Falter häufig im Juli.
132. (695.) **Costana** F. (**Spectrana** Tr.) Raupe im Mai und Juni auf *Epilobium hirsutum* und andern Sumpfpflanzen und den Falter im Juli erzogen.
133. (696.) **Corylana** F. Raupe im Mai und Juni polyphag an Laubholz und Kräutern. Falter im Juli und August häufig.
134. (698.) **Ribeana** Hb. Raupe im Mai auf Laubholz. Falter im Juli häufig.
135. (699.) **Cerasana** Hb. Raupe im Mai auf Schlehen und Obstbäumen nicht häufig. Falter im Juli.
136. (700.) **Cinnamomeana** Tr. Im Juli sehr selten in Wäldern gefangen.
137. (701.) **Heparana** Schiff. Raupe im Juni auf Laubholz gemein. Falter im Juli.
138. (702.) **Dumetana** Tr. Einige Mal im Juli erzogen. Raupe auf Schirmpflanzen im Mai gefunden.
139. (703.) **Lecheana** L. Im Juni häufig. Raupe im Mai an Eichen.
140. (709.) **Histrionana** Froel. Raupe im Frühling einige Mal auf Tannen gefunden und den Falter im Juli erzogen.
141. (712.) **Musculana** Hb. Raupe im Herbste in einem zusammengesponnenen Blatte von Himbeeren und Birken, überwintert erwachsen. Falter im Mai ziemlich häufig.

142. (713.) **Unifasciana** Dup. (**Obliterana** H. S.) Häufig im Mai und Juni an Hecken von Hainbuchen und Liguster, das Weibchen viel seltener.
143. (715.) **Diversana** Hb. Einige Mal von Herrn Krösman im Juni gefunden.
144. (719.) **Politana** Hw. (**Sylvana** Tr.) Raupe im Herbste an *Genista anglica* gefunden und den Falter im Mai erzogen. Auch im Juni bei Misburg und hinter Hainholz viel gefangen.
145. (720.) **Cinctana** Schiff. Im Juli und August beim und auf dem Misburger Kirchhofe häufig.
146. (725.) **Ministrana** L. Mai und Juni häufig. Raupe überwintert zwischen einem zusammengesponnenen Birkenblatte.
147. (727.) **Conwayana** F. (**Hoffmannseggana** Hb.) Raupe häufig im September und October in Eschensamen gefunden. Falter im Mai und Juni.
148. (728.) **Bergmanniana** L. Raupe im Mai häufig auf Rosen, Falter im Juni.
149. (729.) **Loeflingiana** L. mit der Var. **Ectypana** Hb. Raupe im Frühjahr auf Eichen. Falter im Juli häufig.
150. (730.) **Viridana** L. Raupe im Mai sehr häufig auf Laubholz, besonders Eichen, Falter im Juni.
151. (737.) **Forsterana** F. (**Adjunctana** Tr.) Raupe im Mai an *Vaccinium vitis idaea* einige Mal gefunden und den Falter im Juli erzogen.
152. (738.) **Viburniana** F. mit der Var. **Galiana** Curt. (**Scrophulariana** H. S.) Raupe auf dem Moore bei Cananohe an *Vaccinium uliginosum* im Mai und Juni häufig. Falter im Juli und August erzogen.
153. (755.) **Grotiana** F. Im Juni einzeln in Wäldern, auch einmal erzogen aus einer unbeachteten Raupe.
154. (756.) **Gnomana** Cl. Im Juni zuweilen häufig im Walde hinter Hainholz.
155. (761.) **Gerningana** Schiff. Im August auf Haide nicht selten, auch einmal erzogen. Die Raupe frass *Lotus corniculatus*.
156. (763.) **Prodromana** Hb. Raupe auf der breiten Wiese bei Misburg an *Potentilla anserina* im August nicht selten, Falter im Mai erzogen.
157. (764.) **Favillaceana** Hb. (**Terreana** Tr.) Im Mai in Laubholzwäldern häufig.
42. *Sciaphila* Tr.
158. (767.) **Osseana** Sc. (**Pratana** Hb.) Im Juli auf der kleinen Bult häufig gefangen.

159. (780.) **Wahlbomiana** L. mit den Var. **Virgaureana**, **Minorana** H. S. und **Communana** H. S. von allerhand Pflanzen im Juni und Juli viel erzogen.
 160. (783.) **Pasivana** Hb. Raupe im Juli auf Strohblumen, Falter im August nicht selten.
 161. (785.) **Nubilana** Hb. Raupe im Mai an Weissdorn häufig, Falter im Juni erzogen.

43. *Cheimatophila* Stph.

162. (790.) **Tortricella** Hb. (**Hyemana** Hb.) Im April an Eichen häufig, auch einige Mal erzogen.

44. *Exapate* Hb.

163. (792.) **Congelatella** Cl. (**Gelatella** L.) Raupe im Mai auf Weiden gefunden und den Falter im October erzogen.

45. *Olindia* Gn.

164. (793.) **Hybridana** Hb. Einige Exemplare bei Misburg im Juni am Waldrande gefangen.
 165. (794.) **Ulmana** Hb. Raupe im April auf *Ranunculus ficaria* in der Eilenriede häufig gefunden und den Falter im Juli erzogen.

46. *Cochylis* Tr.

166. (799.) **Hamana** L. Im Juni und Juli auf Wiesen häufig.
 167. (801.) **Zoegana** L. Wie die Vorige.
 168. (817.) **Schreibersiana** Froel. In der Nähe von Ulmen Ende Mai nicht selten.
 169. (822.) **Cruentana** Froel. (**Angustana** Tr.) Häufig im August auf Haide gefangen.
 170. (825.) **Ambignella** Hb. (**Roserana** Froel.) Im Juni und Juli im Walde nicht selten.
 171. (827.) **Straminea** Hw. (**Tischerana** Tr.) Einige Exemplare auf dem Kronsberge bei Bemerode im Juni gefunden.
 172. (847.) **Rutilana** Hb. Raupe häufig im Mai auf Wachholder, Falter im Juli erzogen.
 173. (852.) **Hartmanniana** Cl. (**Baumanniana** Schiff.) Im Mai und Juni auf Waldwiesen häufig.
 174. (854.) **Aleella** Schulze (**Tesserana** S. V.) Wie die Vorige.
 175. (855.) **Badiana** Hb. (**Rubigana** Tr.) Im Juni einzeln im Walde gefangen.
 176. (866.) **Smeathmanniana** F. Raupe im Herbste an den Saamen von *Achillea millefolium* gefunden und den Falter im Mai und Juni erzogen.
 177. (878.) **Implicitana** H. S. Im Juni selten auf Waldwiesen gefunden.

178. (879.) *Ciliella* Hb. (*Rubellana* Hb.) Raupe im Juni in dem Samen von Schlüsselblumen gefunden. Falter im Mai und Juli auf Waldwiesen häufig.
179. (884.) *Roseana* Hw. (*Dipsaceana* Dup.) Die überwinterte Raupe im April in dem Samen von *Dipsacus silvestris* gefunden und den Falter im Juli erzogen.
180. (889.) *Rupicola* Curt. (*Humidana* H. S.) Bis Misburg auf feuchten Wiesen im Juli in einigen Exemplaren gefangen.
181. (891.) *Mussehlana* Tr. Im Mai, Juni, August und September häufig auf Wiesen.
182. (892.) *Geyeriana* H. S. Ende Juni ein Stück auf einer feuchten Wiese bei Misburg gefunden.
183. (893.) *Manniana* F. R. Einzeln im Juli auf feuchten Wiesen.
184. (894.) *Notulana* Z. Im August an feuchten Gräben selten.
185. (903.) *Posterana* Z. Raupe in dem Samen von Disteln im Herbste, Falter im Mai und Juni nicht selten.
186. (906.) *Dubitana* Hb. Im Mai auf Waldwiesen einzeln.

47. *Retinia* Gn.

187. (915.) *Duplana* Hb. Im Mai einige Stück zwischen Fuhren gefangen.
188. (917.) *Posticana* Zott. Wie die Vorige.
189. (918.) *Pinivorana* Z. Im Juni und Juli zwischen Fuhren nicht selten, auch einmal erzogen.
190. (919.) *Turionana* Hb. Im Juni und Juli zwischen Fuhren häufig.
191. (921.) *Buoliana* Schiff. Raupe im Mai und Juni in den Maitrieben der Fuhren häufig. Falter im Juni und Juli.
192. (924.) *Resinella* L. Raupe im April und Mai in den Harzknollen der Fuhren, Falter im Mai häufig.

48. *Penthina* Tr.

193. (625.) *Profundana* F. Raupe im Juni auf Eichen, Falter im Juli und August ziemlich häufig.
194. (927.) *Salicella* L. Raupe im Mai auf Weiden, Falter im Juni und Juli häufig.
195. (929.) *Semifasciana* Hw. (*Acutana* Fr.) Raupe im Mai auf Sahlweiden, Falter im Juli und August nicht selten.
196. (930.) *Scriptana* Hb. (*Hartmanniana* L.) Raupe im Mai an Weiden, Falter im August und September ziemlich häufig.
197. (931.) *Capreana* Hb. (*Moestana* W. K.) Raupe im Mai an Ulmen selten gefunden und den Falter im Juni erzogen.

198. (932.) *Corticana* Hb. (*Capreana* Dup.) Zwischen Birken im Juli einzeln gefangen.
199. (933.) *Betulaetana* Hw. (*Leucomelana* Gn.) Raupe im Mai an Birken, Falter im August einzeln gefangen.
200. (934.) *Sororculana* Zett. (*Praelongana* Gn.) Im Mai selten zwischen Birken gefunden.
201. (935.) *Sauciana* Hb. Raupe im Mai auf Heidelbeeren, Falter im Juli nicht selten.
202. (937.) *Variegana* Hb. Raupe sehr häufig im Mai auf Obstbäumen und Weissdorn. Falter im Juni und Juli.
203. (938.) *Pruniana* Hb. Raupe häufig im Mai auf Schlehen, Falter im Juni und Juli.
204. (939.) *Ochroleucana* Hb. Raupe im Mai auf Rosen, Falter im Juni nicht selten.
205. (940.) *Dimidiana* Sodof. Raupe im September an Birken, Falter im Mai nicht selten.
206. (944.) *Sellana* Hb. Raupe in Distelköpfen und sonstigen Blumen im August, Falter im Mai, Juni, August und September.
207. (945.) *Gentiana* Hb. Raupe im Frühjahr in den Köpfen der Kardendisteln häufig, Falter im Juni und Juli.
208. (950.) *Nigricostana* Hw. mit der Var. *Remyana* H. S. Im Mai und Juli einzeln auf Grasplätzen in Wäldern.
209. (954.) *Postremana* Z. Einzeln Ende Mai in der Eilenriede gefangen.
210. (959.) *Mygindana* Schiff. Ein Stück im Juli in der Eilenriede gefunden.
211. (962.) *Striana* Schiff. Im Juni und Juli häufig auf Wiesen etc.
212. (963.) *Branderiana* S, (*Maurana* Hb.) Raupe im Mai auf Espen, Falter im Juni selten.
213. (967.) *Metallicana* Hb. Im Juli an Heidelbeeren einzeln.
214. (972.) *Palustrana* Z. Im Juni und Juli in Nadelwäldern häufig.
215. (976.) *Schulziana* F. (*Zinckenana* Froel.) Im August auf Haide häufig.
216. (978.) *Olivana* Tr. Auf sumpfigen Waldwiesen im Juni einzeln.
217. (980.) *Arcuella* Cl. (*Arcuana* L.) Im Mai und Juni häufig in Wäldern.
218. (981.) *Rivulana* Sc. (*Conchana* Hb.) Im Juni und Juli häufig auf Waldwiesen,
219. (982.) *Umbrosana* Frr. Im Juni häufig zwischen Erlenbüsch.

220. (983.) *Urticana* Hb. Sehr häufig im Mai in Wäldern, Raupe polyphag.
221. (984.) *Lacunana* Dup. Sehr häufig von Mai an, Raupe auf den verschiedensten Pflanzen.
222. (989.) *Cespitana* Hb. Im Juli häufig auf Haide.
223. (993.) *Bipunctana* F. Raupe im Mai häufig an Heidelbeeren, Falter im Juni.
224. (999.) *Hercyniana* Tr. (*Clausthaliana* Rtz.) Raupe im Frühling zwischen Tannennadeln nicht selten, Falter im Mai.
225. (1001.) *Achatana* F. Im Juni einige Stück an Brombeerhecken gefangen.
226. (1002.) *Trifoliana* H. S. Im Juni und Juli auf Kleefeldern nicht selten.
227. (1003.) *Antiquana* Hb. Einige Stück im Juli an Waldrändern gefunden.

49. *Aspis* Tr.

228. (1004.) *Uddmanniana* L. Raupe häufig im Mai und Juni auf Brombeeren, Falter im Juli und August.

50. *Aphelia* Stph.

229. (1006.) *Lanceolana* Hb. (*Signana* H. S.) Häufig im Juni bis August an feuchten Gräben.
230. (1011.) *Furfurana* Hw. (*Scirpana* H. S.) Seltner wie die Vorige in der städtischen Masch.

51. *Lobesia* Gn.

231. (1025.) *Permixtana* Hb. (*Fischerana* Tr.) Im Mai einzeln in Wäldern und Hecken.

52. *Eccopsis* Z.

232. (1027.) *Latifasciana* Hw. (*Venustana* Hb.) Selten im Juni und Juli in Wäldern.

53. *Grapholitha* Tr.

233. (1046.) *Hohenwartiana* Tr. mit der Var. *Jaceana* H. S. Die Raupe der Stammart in den Köpfen der Saudistel häufig im Herbst. Die var. in der städtischen Masch im Juli nicht selten.
234. (1049.) *Caecimaculana* Hb. Bei Misburg im Juli auf einer Wiese einzeln gefunden.
235. (1052.) *Modicana* Z. (*Modestana* H. S.) Im Juli einige Stück auf den Misburger Wiesen gefunden.
236. (1053.) *Hepaticana* Tr. Im Juni und Juli bei Misburg einzeln gefunden.
237. (1054.) *Confusana* H. S. Wie die Vorige.

238. (1066.) *Tedella* Cl. (*Comitana* S. V.) Raupe im Herbste zwischen Tannennadeln häufig, Falter im Mai um Tannen.
239. (1068.) *Demarniana* F. Rr. Um Birken im Juni einzeln.
240. (1070.) *Subocellana* Don. (*Campoliliana* Tr. Raupe im Herbste an der Unterseite der Saalweidenblätter. Falter im Mai häufig.
241. (1071.) *Nisella* Cl. (*Siliceana* Hb.) mit den Var. *Pavonana* Don. und *Decorana* Hb. Raupe im Mai häufig in den abgefallenen Kätzchen der Zitterpappeln gefunden, Falter im Juli und August.
242. (1072.) *Ustulana* Hb. Im Juli einige Mal gefunden.
243. (1073.) *Penkleriana* F. R. (*Mitterpacheriana* Tr.) Raupe im April in Erlenkätzchen, Falter im Juni und Juli nicht selten.
244. (1074.) *Ophthalmicana* Hb. Raupe im Mai und Juni auf Espen selten, Falter im August und September.
245. (1076.) *Solandriana* L. (*Parmatana* F. R.) mit den Var. *Sinuana* Hb. und *Trapezana* F. Raupe im Mai auf Birken, Schmetterling im August nicht selten.
246. (1077.) *Semifuscana* Stph. mit den ab. *Sciurana* H. S. und *Melaleucana* Dup. Raupe im Mai und Juni auf Saalwinden, Falter im Juli.
247. (1078.) *Sordidana* Hb. Raupe im Mai auf Erlen, Falter im August häufig.
248. (1079.) *Bilunana* Hw. (*Cretaceana* Froel.) Im Juli an Birkenstämmen einzeln.
249. (1080.) *Tetraquetrana* Hw. (*Frutetana* Hb.) Raupe sehr häufig im Herbste auf Birken und Erlen, Falter im April und Mai.
250. (1081.) *Immundana* F. R. Raupe im Herbste in Erlenkätzchen häufig, Falter im Mai.
251. (1085.) *Similana* Hb. (*Dissimilana* Tr.) Raupe im Mai auf Birken, Falter im Juli und August nicht häufig.
252. (1088.) *Incarnatana* Hb. (*Amoenana* Hb.) Einige Exemplare im Juli im Walde bei Misburg gefunden.
253. (1089.) *Suffusana* Z. Raupe im Mai auf Weissdorn, Falter im Juni und Juli nicht selten.
254. (1091.) *Tripunctana* F. (*Cynobana* Pr.) Raupe im Mai auf Rosen, Falter im Juni und Juli nicht selten.
255. (1092.) *Cynobana* F. (*Roborana* S. V.) Wie die Vorige.
256. (1096.) *Cirsiana* Z. Raupe überwintert in den Stengeln von Disteln und Scabiosen, Falter im Juli nicht selten.
257. (1105.) *Brunnichiana* Froel. Im Mai und Juni in der Nähe von Huflattich nicht selten.

258. (1107.) *Foenella* L. Raupe im Frühjahre in den Wurzeln von Artemisien, Falter im Juni und Juli von Herrn Krösmann oft erzogen.
259. (1124.) *Hypericana* Hb. Raupe im April und Mai auf *Hypericum* sehr häufig, Falter im Juni und Juli.
260. (1125.) *Albersana* Hb. Im Mai zwischen Gebüsch einzeln.
261. (1127.) *Tenebrosana* Dup. Die Raupe lebt in den unreifen Schoten der Erbsen im Juli und August häufig, Falter im Juni und Juli an Erbsenfeldern.
262. (1131.) *Roseticolana* Z. Raupe im Herbste an Hagebutten, Falter im Mai erzogen.
263. (1134.) *Funebrana* Tr. Die Raupe im Herbste in Schlehen und Zwetschen häufig, Falter im Mai an Schlehenhecken.
264. (1139.) *Succedana* Froel. Raupe im August in den unreifen Schoten von *Genista anglica* häufig gefunden und den Falter im Mai erzogen.
265. (1142.) *Servillana* Dup. Im Juni einige Stück an Sahlweiden gefangen.
266. (1143.) *Microgrammana* Gn. Auf dem Lindenerberge im Juli und August an *Ononis spinosa* gefangen.
267. (1144.) *Strobilella* L. Raupe im Herbst in Fichtenzapfen, Falter im April oft daraus erzogen.
268. (1148.) *Corollana* Hb. Sehr selten in der Nähe von Zitterpappeln im Mai gefangen.
269. (1149.) *Scopariana* H. S. (*Lathyrana* Tr.) Im April und Mai um *Genista* häufig. Raupe auf *Spartium* im August gefunden.
270. (1150.) *Cosmophorana* Tr. Im Juni um Föhren nicht selten.
271. (1151.) *Coniferana* Rtz. Im Juni an Tannen einzeln gefangen.
272. (1155.) *Pactolana* Z. Im Mai und Juni im Walde an Tannen nicht selten.
273. (1156.) *Woeberiana* Schiff. Im Juli aus der Rinde von Kirschbäumen oft erzogen.
274. (1157.) *Rufillana* Wlk. (*Pudicana* H. S.) Raupe im August auf den Wiesen hinter Misburg häufig an den Samen von *Peucedanum* und im Juli erzogen.
275. (1162.) *Compositella* F. (*Gundiana* Hb.) Im Mai und Juni häufig an Kleefeldern und auf Wiesen.
276. (1167.) *Perlepidana* Hw. (*Loderana* Tr.) Bei Misburg im Mai einige Exemplare gefangen.

277. (1168.) *Pallifrontana* Z. (*Filana* H. S.) Raupe im August in den grünen Schoten von *Astragalus glycyphyllos*, Falter Ende Mai selten.
278. (1171.) *Inquinatana* Hb. Im Mai einzeln an Tannen im Walde gefangen.
279. (1173.) *Dorsana* F. (*Jungiana* Froel.) Raupe in Erbsenschoten einzeln, Falter im Mai und Juni.
280. (1180.) *Aurana* F. Von Herrn Krösmann im Juli in einem Exemplare gefangen.

54. *Carpocapsa* Tr.

281. (1181.) *Pomonella* L. Raupe in Aepfeln im Herbste. Falter im Mai und Juni häufig.
282. (1182.) *Grossana* Hw. (*Fagiglandana* Z.) Raupe im August und September in Buchnüssen nicht selten, Schmetterling im Juni erzogen.
283. (1183.) *Splendana* Hb. Raupe im September in Eicheln häufig, Falter im Juni erzogen.

55. *Coptoloma* Ld.

284. (1186.) *Janthinana* Dub. (*Incisana* H. L.) Raupe im August in den Früchten des Weissdorns häufig, Falter im nächsten Mai erzogen.

56. *Phthoroblastis* Ld.

285. (1187.) *Fimbriana* Hw. Raupe bis April in faulem Eichenholze. Falter im April und Mai erzogen.
286. (1188.) *Argyrana* Hb. Raupe im März und April in Eichenborke, Falter nicht selten Ende April und Anfang Mai an Eichenstämmen.
287. (1189.) *Plumbatana* Z. Im April und Mai an Eichen- und Buchenstämmen selten.
288. (1194.) *Juliana* Curt. (*Nimbana* H. S. *Herrichiana* Hein.) Im Mai an Buchenstämmen in der Eilenriede einzeln gefunden, von Herrn Krösmann erzogen.
289. (1198.) *Spiniana* Dup. Raupe an dem Herrenhäuser Berggarten auf Weissdorn im Mai nicht selten gefunden und den Falter im Juni erzogen.
290. (1200.) *Populana* F. (*Ephippiana* Hb.) Raupe im Mai und Juni in der städtischen Masch an Sahlweiden gefunden und im Juli den Falter erzogen.
291. (1203.) *Regiana* Z. Von Herrn Krösmann aus Raupen, die im September und October unter Ahornrinde lebten, im Juni und Juli viel erzogen.

292. (1205.) *Ochsenheimeriana* Z. An der Tannenhecke des Herrenhäuser Berggartens im Mai in 5 Exemplaren gefangen.
 293. (1207.) *Flexana* Z. (*Vigeliiana* H. S.) Raupe im Herbst zwischen Buchenblättern nicht selten, Falter im Mai.
 294. (1208.) *Germmana* Hb. Im Mai an Hagebuchenhecken selten gefangen.
 295. (1209.) *Rhediella* Cl. Raupe in den unreifen Früchten von Weissdorn im Juli gefunden, Falter im Mai erzogen und gefangen.

57. *Tmetocera* Ld.

296. (1210.) *Ocellana* F. Ende Juni bis August häufig. Raupe im Mai und Juni auf Obstbäumen, Laubholz und Lärchen.

58. *Steganoptycha* H. S.

297. (1212.) *Incarnana* Hw. (*Minorana* Tr.) Juni bis August häufig. Raupe im Mai auf Eichen und Weissdorn.
 298. (1213.) *Neglectana* Dup. Im Juli an Weidenstämmen beim Seminargarten einzeln gefunden.
 299. (1215.) *Reconditana* H. S. Im Juli zwischen Erlén sehr selten.
 300. (1216.) *Simplana* F. R. Ende Mai selten an Zitterpappeln, auch einmal erzogen.
 301. (1220.) *Ramella* L. (*Triquetrana* Hb.) Ende Juni und im Juli zwischen Birken nicht selten.
 302. (1222) *Oppressana* Tr. Im Juni und Juli zwischen Weiden und Pappeln häufig.
 303. (1225.) *Corticana* Hb. Raupe im Mai auf Eichen, Falter im Juli und August an Eichenstämmen sehr häufig.
 304. (1226.) *Signatana* Dgl. (*Padana* Z. *Kroesmanniana* Hein.) Im Juli in der Eilenriede einzeln gefangen, auch aus der Raupe erzogen.
 305. (1229.) *Nanana* Tr. Raupe im April und Mai in Tannennadeln häufig, Falter im Juni.
 306. (1230.) *Ustomaculana* Curt. Raupe hinter Gross-Buchholz im Walde an *Vaccinium vitis idaea* im April und Mai nicht selten, Falter im Juni erzogen.
 307. (1232.) *Vacciniana* Z. Raupe an *Vaccinium uliginosum* im August häufig, Falter im Mai.
 308. (1235.) *Ericetana* H. S. Raupe im September zwischen zusammengesponnenen trocknen Espenblättern. Falter im Juni ziemlich selten.
 309. (1236.) *Fractifasciana* Hw. (*Cuphana* Dup.) Im Mai und Juni auf Haide häufig.

310. (1242.) **Granitana** H. S. Im Mai und Juni an der Tannennecke des Herrenhäuser Berggartens häufig.
311. (1246.) **Cruciana** L. Im Juni und Juli an Sahlweiden gefangen und von Herrn Krösmann öfter erzogen.
312. (1248.) **Trimaculana** Don. (**Ulmariana** Z.) Raupe im Mai auf Ulmen nicht selten, Falter im Juni erzogen.
313. (1249.) **Minutana** Hb. Raupe im Mai und Juni zwischen Pappelblättern nicht selten, Falter im Juli.

59. *Phoxopteryx* Tr.

314. (1250.) **Mitterbacheriana** Schiff. (**Penkleriana** Tr.) April bis Juli in Wäldern häufig. Raupe vom Herbst bis Frühjahr in zusammengesponnenen Eichblättern.
315. (1251.) **Obtusana** Hw. (**Segmentana** H. S.) Im Mai einzeln in der Eilenriede an Baumstämmen gefunden.
316. (1252.) **Upupana** Tr. Einmal von Herrn Major Comperl erzogen.
317. (1253.) **Laetana** F. (**Harpana** Hb.) Raupe im Herbst auf Espen, überwintert. Falter im Mai und Juni nicht selten.
318. (1254.) **Tineana** Hb. Bei Misburg im Juli einzeln gefangen.
319. (1256.) **Biarcuana** Stph. (**Fluctigerana** H. S.) mit der var. **Subarcuana** Dgl. (**Inornatana** H. S.) Die Stammart im Juni selten um Wollweiden gefangen, die var. **Subarcuana** oft von *Salix fusca* erzogen. Raupe in zusammengezogenen Blättern im August.
320. (1257.) **Diminutana** Hw. (**Cuspidana** Tr. Im Juni und Juli auf Waldwiesen einzeln gefangen.
321. (1258.) **Uncana** Hb. Im Mai und Juni auf Haide ziemlich häufig.
322. (1259.) **Unguicella** L. (**Unguicana** F.) Ende April und Anfangs Mai auf Haide gemein.
323. (1260.) **Siculana** Hb. Raupe im Juni und October auf *Rhamnus frangula* häufig. Falter im Mai und Juli.
324. (1264.) **Lundana** F. (**Badiana** Dup.) Raupe im October zwischen schotenförmig zusammengezogenen Wickenblättern im Walde bei Misburg häufig gefunden und den Falter im Mai erzogen.
325. (1265.) **Myrtillana** Tr. Im Mai nicht selten auf Heidelbeeren.
326. (1266.) **Derasana** Hb. Im Mai und Juni im Walde einzeln gefangen.

60. *Rhopobota* Ld.

327. (1268.) *Naevana* Hb. mit der var. *Geminana* Stph. Die Raupe von *Naevana* im Mai auf Apfelbäumen und *Plex aquifolium*, die von *Geminana* auf Heidelbeeren häufig, Falter im Juli und August.

61. *Dichrorampha* Gn.

328. (1273.) *Petiverella* L. Gemein um *Achillea millefolium* von Ende Mai bis zum Herbst.
329. (1274.) *Alpinana* Tr. Wie die Vorige.
330. *Flavidorsana* Knaggs. Abgebildet und beschrieben in „The Entomologist's Annual for 1867 London“. Steht zwischen *D. alpinana* und *D. petiverella*, das Männchen theilt die Kennzeichen der ersteren, das Weibchen die der letzteren Art; das Männchen ist jedoch leicht zu unterscheiden von *alpinana* durch seine dunklere Grundfarbe, von *petiverella* durch die Breite seiner schrägen Vorderrandstreifen, und von beiden durch die Helligkeit seines ausgezeichneten gelben Innenrandflecks; das Weibchen ist nicht leicht zu unterscheiden von einem Geschlechte von *D. petiverella*, obgleich die schrägen Vorderrandstreifen und die blauen metallischen Linien zwischen denselben etwas auffallender sind, als bei dieser Art. Ausserdem ist die Art etwas grösser. Gefangen im Juli an *Tanacetum vulgare*, ziemlich selten.
331. (1276.) *Simpliciana* Hw. (*Caliginosana* Tr.) Im Juni und Juli in der Nähe von *Artemisia vulgaris* nicht selten.
332. (1277.) *Agilana* Tgstr. Im Juni an *Tanacetum vulgare* ziemlich selten.
333. (1283.) *Plumbagana* Tr. (*Salicetana* Prittwitz.) Im Mai und Juni an unbebauten Orten einzeln gefunden.
334. (1285.) *Acuminatana* Z. (*Germanana* Tr.) Im Juni und August auf Wiesen nicht selten.
335. (1287.) *Consortana* Wlk. Im Mai auf Wiesen sehr selten gefunden.
336. (1298.) *Sylvicolana* Hein. Sehr selten im Juli an Erlen bei Misburg gefunden.
337. (1299.) *Plumbana* Sc. (*Blepharana* H. S.) Vom Ende Mai bis August überall häufig.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover](#)

Jahr/Year: 1874-1875

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Glitz Christian Theodor

Artikel/Article: [Fortsetzung des Verzeichnisses der bei Hannover im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge 23-42](#)