

VII Abhandlungen.

Nachtrag zu der 1875 erschienenen „Flora von Hannover“.

Von Dr. Ludw. Mejer.

Die in den seither verflossenen sechzehn Jahren neu aufgefundenen Arten sind durch gesperrten Druck hervorgehoben. Nicht aufgenommen habe ich die nicht eigentlich der Flora angehörigen, nur zufällig einmal beobachteten Hospitanten; ebenso habe ich auch die bei der Döhrener Wollwäscherei beobachteten Arten ausgeschlossen; diese sind passender einmal Gegenstand eines besondern Berichts. Auch habe ich in der begründeten Hoffnung, dass Herr Dr. v. Holle bald das Ergebnis seiner genauen und bedeutsamen Studien über unsere Rubusarten veröffentlichen wird, diese Pflanzengattung hier ganz vernachlässigt.

Ich habe nicht Bedenken getragen die schon gedruckt vorliegenden Forschungsergebnisse der Herren Apotheker Andréé (A.), Professor Buchenau (B.), Ober-Appellationsrat Nöldeke (N.) hier noch einmal zu bringen. (Andréé: Beiträge zur Flora von Münden. Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. Buchenau: Beiträge zur Flora von Rehburg und Umgebung. Jahresbericht des Bremer Naturwissenschaftlichen Vereins. Nöldeke: Flora von Lüneburg. 1888.)

Ausser diesen Herren, die besonders ihrer Entfernung wegen etwas vernachlässigtere Gebiete genauer durchforscht haben, verdanke ich auch Herrn Seminarlehrer Alpers (Alp.) sehr viel wertvolles Material.

- Clematis Vitalba* L. Waldrand beim Kirchr. Thurm.
Myosurus minimus L. Hinter der Eisenbahn am Wege nach dem Bornumerholze.
Batrachium hederaceum E. Mey. Ronnenberg. Alp.
B. aquatile E. Mey. Gefüllte Blüten im Warmb. Moor, Graben hinter der List.
B. confusum Godr. Misburg, Ahlten, Sehnde, Lehrte. N.
B. divaricatum Wimm. Holzmühle.
Ranunculus Lingua L. Zwischen Kreuzhorst u. Spissingshol, Winzlarer Wiesen, Stadt Rehburg. B.
R. polyanthemus L. Wülferode, Bolzum. Westseite des Benth. Berges. Alp. Eilenberg. A. Niedrige Form an der Hünenburg: *polyanthemoides* Borr.? A.
R. nemorosus L. Süntel, Westseite der Paschenburg. A.
R. sardous Crntz. Rehburg. B. Bissendorf.
Trollius europaeus L. Höver, Ahlten, Lehrte. N.
Helleborus viridis L. (Viel in der Gegend von Elze. Ehrh. Beiträge, III. 128.)
Aconitum Lycoctonum L. Bokmer Holz, Geim, Ahlter Wald.
Actaea spicata L. Bokmer Holz.
Nymphaea alba L. Bannsee b. Schneeren. B.
Corydalis intermedia Mer. Rehburger Berge. B. Benth. Berg. Alp.
C. solida Sm. (Hülfersberg. Ehrh.)
C. lutea D. C. Loccum. B. Badbergen. Alp.
Fumaria Vaillantii Lois. Lühnde.
Nasturtium officinale R. Br. Fösse, Neustadt. Misburg, Ahlten, Sehnde. N.
N. amphibium × *silvestre*. Ricklinger Beke.
Barbarea vulgaris R. Br. Bissendorf. N.
B. stricta Andr. Bissendorf, Ahlten, Sehnde. N.
Turritis glabra L. Zw. Sachsenhagen u. Wölpinghausen. B. Ahlter Wald. N. Paschenburg.
Cardamine hirsuta L. (Kölln. Feld. Ehrh.) Thiergarten. N.
C. pratensis L. *Var. dentata* Koch. Breite Wiese, Steuernd. Alp.
Alyssum calycinum L. Zw. Limmer u. Velber. Ilten, Bolzum. N.
Berteroa incana D. C. Bahnhof b. Bissendorf.
Lepidium ruderales L. Oft verwildert, bes. bei den Bahnhöfen, aber nicht erhalten.

- Hutchinsia petraea* R. Br. Am Iberge. Soltmann.
Capsella Bursa pastoris Mneh. *Var. apetala*. Münder. A.
Coronopus Ruellii All. Döhren jenseits der Leine, Selze.
 Münder. A. Ahlten, Anderten, Wülferode. N.
Isatis tinctoria L. Abhang zw. Eggersen u. Lauenstein.
 (Jahresber. des Westfäl. Prov.-Vereins.)
Viola hirta L. Ahlter Wald, Bokmerholz. N.
V. odorata × *hirta*. Eilenberg. A.
V. silvestris L. *Var. Riviniana*. Hinter Hainholz. Hünenburg.
V. canina L. *Var. montana*. Rehb. Berge. B. *Var. flavicornis* Sm. Ziegelei hinter Kleefeld.
V. mirabilis L. Ahlter Wald, Bokmer Holz. N.
Drosera anglica Huds. Mardorfer Moor. N.
Polygala comosa Schk. Eldagsen.
P. depressa Wender. Ziegelei hinter Kleefeld; städt. Föhrenkamp. Alp.
Gypsophila muralis L. Rehburger Berge, Kleefeld, Lehrte, Barsinghausen, Sehnde. Zw. Colshorn u. Ahlten. N.
Tunica prolifera Scop. Springer Kiesgrube. A.
Dianthus Armeria L. Bokmer Holz, Wülferode. N. Zwisch. Bergkirchen, Sachsenhagen u. Wölpinghausen. B.
D. deltoides L. Bult, Bischofshol, Marienwerder, Selze. Rehbürg. B.
Saponaria officinalis L. Bult. Alp.
Silene inflata Sm. Kronsberg b. Anderten. N.
Sagina apetala L. Barsinghausen.
Spergula Morisonii Bor. Sandberge hinter Herrenh., Hainholz. Zw. Rehbürg u. Düsseldorf. B.
Spergularia segetalis Fenzl. (Davenstedt. Ehrh.)
Holosteum umbellatum L. Steinbruch zw. Limmer u. Velber.
Stellaria uliginosa Murr. Vahrenwald.
Cerastium glomeratum Thuill. Hinter Bischofshol.
Elatine Hydropiper L. (nicht *Alsinastrum*!). Bei Engesen. Ehrh.
E. hexandra Schk. Am Steinhuder Meere. B.
Malva moschata L. Zw. Sachsenhagen u. Wölpinghausen. B.
Hypericum quadrangulum L. Hinter Herrenhaus., Ahlemer Holz.
H. tetrapterum Fr. Barsinghausen.

- H. tetrapt.* × *quadrangulum*. Mühlgraben b. d. Rahlmühle. A.
H. pulchrum L. Ahlter Wald. N.
H. montanum L. Bilmer Knick. N.
H. hirsutum L. Unt̄r der Deisterpforte in einem Graben auffällig reichblütig. Ahlter Wald, Sehnde. N.
Acer dasycarpum Ehrh. Georgstr., Georgengarten, Misburg, Chaussee b. Lahe.
Geranium pratense L. Lauenau, Sedemünder, Rinteln. A. Masch am Wege nach Ricklingen 1880.
G. palustre L. Zw. Weetzen u. Bente. Misburg, Geim, Wassel, zw. Wülferode u. Höver. N.
G. pyrenaicum L. Vor dem Berggarten in Herrenh., Springe in Gärten. Wassel. N. (Normalfarbig.)
G. dissectum L. Zw. Waldhausen u. Bischofshol. Mastbruch b. Rehb. B. Bissendorf, Höver. N.
G. columbinum L. Zw. Waldhausen u. Bischofshol. Bokmer Holz, Bolzum. N.
Impatiens nolitangere L. Ahlter Wald, Geim, Steinwedel. N.
Rhamnus cathartica L. Ahlemer Holz. Ahlter Wald. N.
Ulex europaeus L. Benth. Berg. Alp.
Cytisus capitatus Jacq. Zw. Bad u. Stadt Rehburg verwildert. B.
Anthyllis vulneraria L. Auf Sandland gebaut, dadurch verwildert z. B. b. Burgdorf.
Medicago falcata L. Anderten, Misburg. N.
Melilotus albus Desr. Vom Eisenbahndamm zw. Münder u. Springe sich weiter verbreitend. A. Bissendorfer Bahn. Lehrter Güterbahnhof. N.
Trifolium pratense L. *Var. multifidum* Ser. (*brachystylos* Knaf.) Bahn zwischen Seminargarten u. Hildesheimerstr.
Tr. arvense L. *Var. gracile* D. C. Sandberge hinter Herrenh.
Tr. medium L. Kirchr. Thurm. Rehburger Höhenzug. B.
Tr. fragiferum L. Kunstbrücke b. Limmer, an dem der Chaussee parallel laufenden Wege hinter d. List, Nenndorf. Misburg, Ahlten, Ilten, Sehnde, Lehrte. N. Selze.
Tr. montanum L. Breite Wiese b. Kirchröde.
Tr. agrarium L. Güterbahnhof b. Lehrte. N.

- Lotus tenuifolius* Rchb. Zwischen den Salinen. Lucernefeld b. Mündler. A. Petroleumbrunnen b. Sehnde, Döhren (hier kleinblättrige, hohe, reichstenglige Form). Alp.
- Vicia sepium* L. Weissblütig b. der Limmer Kunst.
- V. lathyroides* L. Grasplätze rechts von der Herrenh. Allee.
- Cracca villosa* Godr. u. Gren. Noch 1890 ein Exemplar an der Casseler Eisenbahn vor der Eilenriede. Altenhagen. Alp.
- Ervum tetraspermum* L. *Var. uniflorum*. Berghohl bei Wölpinghausen. B.
- Lathyrus tuberosus* L. Hinter Kleefeld. Alp.
- L. silvester* L. Gehrdener Berg u. *Var. ensifolius* Buek. Thiergarten. Alp.
- Spiraea Filipendula* L. (Am Dänenberge? Ehrh.)
- Fragaria elatior* Ehrh. Barsinghausen. Ahlter Wald. N. Bettenser Garten. Alp.
- Fr. collina* Ehrh. Bolzum. N.
- Potentilla argentea* L. Bult, hinter dem Döhr. Th., Marienwerder, Selze, Misburg, Ahlter Holz, Lehrte.
- P. procumbens* Sibth. Bissendorf an der Burgwedeler Chaussee. A. Excursion 1890.
- P. verná* L. Ahlemer Holz, Lauenstein, Hünenburg, Iberg.
- P. Fragariastrum* Ehrh. Ebersberg unter d. Cölln. Felde, Bunte Wiese. Alp. Ahlter Wald, Bokmer Holz. N.
- Agrimonia odorata* Mill. Lügde am Schildberge. Westfäl. Prov. - Verein.
- Rosa pimpinellifolia* D. C. Burgberg b. Lauenstein.
- R. tomentosa* Sm. Bissendorf. N.
- R. pomifera* Herrm. Paschenburg.
- Alchemilla vulgaris* L. Seelhorst.
- Sanguisorba officinalis* L. An der Leine b. Döhren 1882. Bolzum, Benth. B. Alp.
- Poterium muricatum* Spach. Unter Esparsette b. Mündler. A.
- Cotoneaster vulgaris* Lindl. (Am Ith im Amte Lauenstein. Ehrh. Beitr. III. 61.)
- Pirus arbutifolia* L. Eil.: Pferdeth., Burckharddenkmal.
- Epilobium hirsutum* L. Barsinghausen. Bolzum, Misburg, Wassel, Anderten. N.

- E. tetragonum* L. Moor b. Schneeren, Bokmer Holz. N.
E. obscurum Schreb. Zw. Weetzen u. Bente.
E. parviflorum × *montanum*. Süntel, Rahlmühle. A.
E. parviflorum × *roseum*. Gräben b. Münder. A.
E. parviflorum × *tetragonum*. Süntel. A.
E. parviflorum × *palustre*. Osterberg, Süntel. A.
E. montanum × *tetragonum*. Süntel. A.
E. montanum × *palustre*. Süntel. A.
E. tetragonum × *palustre*. Süntel. A.
Oenothera muricata L. Zw. d. Altenbeken. u. Casseler Eisenb.
Isnardia palustris L. Tümpel zw. Bothfeld u. List 1883.
 (Zum Schlage. Ehrh.)
Circaea alpina L. Rehburger Berge. B. Barenburg.
C. intermedia Ehrh. Barenburg.
Myriophyllum spicatum L. Steinhuder Meer. B.
M. alterniflorum D. C. Mardorfer Moor. N.
Ceratophyllum submersum L. Alte Leine dem Georgengarten
 gegenüber.
C. demersum L. Marienwerder.
Lythrum Hyssopifolia L. Bolzum. N.
Bryonia alba L. Herrenhausen, Altenhagen. Alp.
Br. dioica Jacq. Pymont. Alp.
Montia minor Gmel. Bischofshol. Nordrand d. Steinh. Meeres. Alp.
Corrigiola litoralis L. Ziegelei hinter Kleefeld.
Sedum purpureum Lk. Gross Buchholz, Bissendorf an der
 Burgwedeler Chaussee.
S. boloniense Loisl. Kirchhofsmauer in Bergkirchen. B.
S. reflexum L. Nenndorf.
Ribes Grossularia L. Hemminger Holz.
R. nigrum L. Zw. Seminargarten u. Döhrener Thurm.
Saxifraga granulata L. Stöcken. Alp.
Chrysosplenium oppositifolium L. Rehburger Berge. B.
Sanicula europaea L. Misburg, Ahlter Wald.
Cicutavivosa L. Loccumer Fischteiche. B. (Bothfelder Moor. Ehrh.)
Apium graveolens L. Zw. Ronnenberg u. Bente.
Heliosciadium inundatum Koch. Breite Wiese b. Thiergarten.
Pimpinella magna L. Vor Wettbergen rechts 1884: lebh. rosenroth.

- Bupleurum tenuissimum* L. Bei den Salinen. Apoth. Brandes. Zw. Ilten u. Lehrte. N.
- B. rotundifolium* L. Jeinsen. Alp.
- Selinum Curvifolium* L. Eilenriederand der bunten Wiese, Moorwiesen hinter Lahe. Mastbruch und zw. Rehburger Kiefernwald und Mönchhagen. B.
- Scandix Pecten Veneris* L. Am Lindener Berge öfters wieder; am Ahlemer Holze, Badenstedt. Alp. Höver, Ahlten, Sehnde. N.
- Chaerophyllum bulbosum* L. Bokmer Holz, Marienwerder, Selze.
- Conium maculatum* L. Kirchr. Th. Ahlten, Ilten, Bilm, Sehnde. N. Emmerthal. Alp. Loccum. B.
- Sambucus Ebulus* L. (Hotteln bei Algermissen. Ehrh.)
- S. racemosa* L. Rehburger Berge. B.
- Lonicera Xylosteum* L. Pferdethurm, Misburg.
- Symphoricarpus racemosus* Michx. Verwildert, z. B. Fischerstr., Limmer Kunst.
- Linnaea borealis* L. Städtischer Föhrenkamp an der Walsroder Chaussee. Dr. Krause. 1891 zum ersten Male spärlich blühend beobachtet.
- Galium Cruciata* Scop. Vinnhorst. Alp.
- G. tricornis* With. Am Kronsberge, Breite Wiese.
- G. boreale* L. Badbergen. Alp.
- Valeriana dentata* Poll. Bennemühlen. Alp.
- Dipsacus pilosus* L. Ahlter Wald, Geim. N. Bokmer Holz.
- Scabiosa columbaria* L. Langenfeld i. Süntel. Bokmer Holz, Bolzum. N.
- Eupatorium cannabinum* L. Pferdeth., zw. Döhrener Thurm u. Bischofshol, hinter Gr. Buchholz, unter der Barenburg.
- Erigeron acer* L. Grosse kahle Form am Iberge. A.
- Inula Helenium* L. Rand des Ahlter Waldes b. Misburg. N.
- I. salicina* L. Misburg, Bokmer Holz. N.
- I. britannica* L. Zw. Döhren u. Hemmingen, Ihme. Esperke. Alp.
- I. Conyza* D. C. Weissenstein, Ahlemer Holz.
- Pulicaria vulgaris* Gärt. Mardorf. B. Schneeren. N.
- P. dysenterica* Gärt. Weetzen. Zw. Misburg u. Sehnde. N.
- Bidens cernuus* L. Zw. Bischofshol u. Döhr. Th. *Var. minimus*. Münden. A. Städt. Föhrenkamp. Alp.
- Filago germanica* L. Hinter Bischofshol. Altenhagen. Alp.
- Gnaphalium nudum* Hoffm. Vinnhorst. Alp.

- Gn. luteo-album* L. Acker hinter dem Steuerndieb. Bissendorf. N.
Helichrysum arenarium D. C. Selze. Rehburger Berge. B.
Artemisia Absinthium L. Misburg. Mardorf. B.
Anthemis Cotula L. Garkenburg. Alp.
Matricaria discoidea D. C. Lindener u. Altenbekener
 Bahnhof. Alp. Döhr. Th.
Chrysanthemum corymbosum L. (Osterberg zw. Nordstemmen
 u. Hildesheim. Ehrh.)
Arnica montana L. An der Casseler Bahn vor der Eilenriede
 nach 1882 beobachtet.
Senecio paluster D. C. Ein Jahr an der alten Leine hinter
 der Fischerstr. in grosser Zahl.
S. viscosus L. Lehrte. N.
S. vernalis W. K. Beim Bettenser Garten unter Klee 1890. Alp.
S. erucaefolius L. Zwisch. Döhren u. Hemmingen. Kronsberg,
 Bokmer Holz. N. Steinkrug.
S. saracenicus L. Leine hinter Döhren.
S. paludosus L. Breite Wiese nördlich von der Plantage.
 Kirchhorst. N.
Cirsium lanceolatum Scop. Weissblütig am Osterberge. A.
C. acaule All. Deisterpforte.
C. oleraceum Scop. Zw. Döhr. Th. u. Bischofshol, Eldagsen.
 Mit dunkel purpurroten Blüten in Mastbrok b. Grasdorf.
C. arvense Scop. Blätter ganzrandig mit Sägezähnen, gross u.
 zahlreich. Bahndamm des Rangierbahnhofs Hainholz 1884.
Var. argenteum Vest. Osterberg. A.
C. hybridum Koch. Zw. Bischofshol u. Döhr. Th., Mastbrok.
C. acaule × *oleraceum* Naeg. Zwisch. Ilten u. Lehrte, Höver,
 Misburg. N.
Carduus nutans × *crispus* Sonder. Breite Wiese.
C. crispus × *nutans* Koch. Münder, Pöhle. A.
Onopordon Acanthium L. Wüfel. Alp. Überall aussterbend.
Lappa officinalis All. Zw. Döhr. Th. u. Bischofshol, Marienwerder.
L. macrosperma Wallr. Ahlter Wald, Andertsches Gehäge,
 Geim, Bokmer Holz, Ilten. N. Am Süntel mehrfach,
 Osterberg, Schierholz am Deister. A. Saupark, Deister-
 warte; zw. Eggestorf u. Springe. Heller.

- Carlina vulgaris* L. Rehburger Berge und Mastbruch. B. Gretenberg. N.
- Serratula tinctoria* L. Misburg, Höver, Ahlten, Sehnde, Gretenberg. N.
- Centaurea Jacea* L. *Var. nigrescens* Willd. Beim neuen Stollen im Süntel. A. *Var. decipiens* Thuill. (*Scabiosa* × *Jacea*?) Hildesheimer Chaussee bei Döhren links, hinter Laatzen rechts. Im Bruch bei Münden. A.
- C. Scabiosa* L. Ohne Strahlblüten b. Wülferode.
- Cichorium Intybus* L. Roth im Korn bei Misburg.
- Leontodon hispidus* L. Misburg, Sehnde. N. List, Steinbergen. Alp.
- Picris hieracioides* L. Zw. Limmer Kunst u. Herrenhausen, Masch vor Döhren, Havelse, Springe, Nenndorf. Misburg, Geim, Sehnde. N. Steinbergen, Pymont. Alp.
- Taraxacum officinale* Web. *Var. palustre*. Masch zw. Haarstr. u. Bella Vista 1888.
- T. laevigatum* D. C. Hünenburg, Thüster Berg; bei Münden unten weissfilzig behaart. A.
- T. erythrospermum* Wilms. An der Grenze der Dünen und der Leinemarsch hinter der Herrenh. Brauerei.
- Chondrilla juncea* L. Döhrener Kirchhof. Alp. Garkenburg (*Var. acanthophylla*. Borkh.) Alp. Sonst um Hannover ausgestorben.
- Lactuca Scariola* L. Bahnhof von Sehnde. N.
- Sonchus paluster* L. Ahlter Wald, Andertsches Gehäge. N.
- Crepis foetida* L. Lügde am Wege nach dem Schildberge. Westfäl. Prov.-Verein.
- C. paludosa* Mch. Wiesen zw. Berghol u. Spissingshol. B. Bokmer Holz.
- Hieracium Pilosella* L. *furcatum*. Garkenburg 1881.
- H. Pilosella* × *Auricula* nach Prof. Hampe bei Hannover nicht selten. Ich habe noch kein zweifelloses Exemplar gefunden.
- H. praealtum* Vill. Beim Springer Bahnhof. *Var. fallax* D. C. Lüdersser Berg.
- H. aurantiacum* L. Zw. Buchholz u. Misburg auf Wiesen. Alp. (Dollbergen Rüst.)

- H. collinum* Gochn. Georgengarten. Alp. Ahlemer Holz.
H. cymosum L. Münder. (Schulenburger Holz. Ehrh.)
H. caesium Fr. Vgl. die Abhandlung des Dr. v. Holle.
H. silvaticum L. Osterbruch, Schierholz. A.
H. ramosum W. K. Bei Misburg; auf Grisebachs Auctorität
 aufgenommen, ist nach N. zweifelhaft.
H. boreale Fr. Bergkirchen. B.
H. laevigatum Willd. b. *tridentatum* Fr. Rehburger Berge. B.
Phyteuma spicatum L. Bokmer Holz (gelbl. Blüten).
Campanula rapunculoides L. Marienwerder.
C. latifolia L. Ehrh. Standort ist Hotterten?
C. patula L. Bei Münder häufig. A.
C. persicifolia L. Bokmer Holz, Bolzum. N. Am Iberge
 robust, rauhhaarig. A.
C. Cervicaria L. (Schulenburger Holz. Ehrh.)
C. glomerata L. Misburg, Bokmer Holz, zw. Wülferode und
 Wassel, Bolzum. N.
Vaccinium uliginosum L. Im städtischen Föhrenkamp hinter
 Hainholz, kümmerlich.
V. Myrtillus × *Vitis Idaea melanocarpum*. Warm-
 bücher Moor 1888 gefunden.
V. macrocarpum Ait. Im Winzlarer Moor bei Hagenburg,
 wahrscheinlich schon seit langer Zeit angesiedelt. A.
Calluna vulgaris L. Weissblütig, bei Bissendorf.
Ledum palustre L. Bei Burgdorf. Dr. Krause. Den Stand-
 ort im Warmb. Moor zu bezweifeln liegt kein Grund vor.
Pirola minor L. Rehburger Berge. B. Altenhagen. Alp.
Chimophila umbellata Nutt. Beim Stephanstifte wieder-
 gefunden 1890 und Misb. altes Gehäge 1891. Alp.
Monotropa Hypopitys L. Föhrenkamp beim Pulverschuppen
 hinter Bischofshol, Saupark, Barenburg, Weissenstein,
 Barsinghausen, Brelingen. Rehburger Berge. B.
Menyanthes trifoliata L. Am Steinhuder Meere. B.
Gentiana cruciata L. Früher am Kronsberge. N. Deister-
 pforte, Samkebach. A. An den Felsen des Hohensteins
 angepflanzt.
 • *G. ciliata* L. Über den Hallerquellen. Bolzum. N.

- Cicendia filiformis* Rchb. Bult. Alp.
- Erythraea Centaurium* Pers. Bokmer Holz.
- E. pulchella* Fr. Misburg, Limmer. Gretenberg. N.
- Asperugo procumbens* L. Neuerdings wieder mehrfach gefunden bei Bothfeld, Vahrenwald, Misburg, Linden, Limmer. Alp.
- Cynoglossum officinale* L. Ahlemer Holz, Misburg, Höver, Bokmer Holz. N. Bettenser Garten. Alp.
- Symphytum officinale* L. Gartenmarsch, Döhren, Lauenau. Gelblich blühend an der alten Leine, Nenndorf. Münder. A.
- Echium vulgare* L. Fleischrot in der Garkenburg. Alp.
- Pulmonaria officinalis* L. *Var. obscura* Dumort. Wiese zw. Badenstedt u. Benther Berg. Alp.
- P. angustifolia* L. 1880 wiedergefunden Alp. (am Ith), gehört demnach zum sichern Bestande der Flora.
- Myosotis caespitosa* Schulz. Vor dem Osterberge b. Münder nach dem Ausschlagen eines Grabens aufgetreten. A.
- M. silvatica* Hoffm. Ahlter Wald. N. Rehburger Berge. B.
- Physalis Alkekengi* L. In Gärten b. Münder verwildert.
- Atropa Belladonna* L. Gehrdenener Berg. Alp. Oberhalb der Deisterpforte.
- Verbascum Thapsus* L. Hohenstein. Alp.
- V. thapsiforme* Schrad. *V. cuspidatum* Schrad. Selze.
- V. phlomoides* L. Garkenburg.
- V. adulterinum* Koch. Garkenburg, Luthe. Alp.
- Gratiola officinalis* L. Esperke. Alp.
- Digitalis purpurea* L. Rehburger Berge, beim Wölpinghäuser Forsthause. B.
- Linaria Cymbalaria* Mill. Deisterpforte, Gärten in Springe, Nenndorf.
- L. Elatine* Mill. Bult. Alp. Beim Thiern. Lehrte, Höver, Sehnde. N. Acker im Mastbruch, zw. Wölpinghausen u. Sachsenh. B.
- L. spuria* Mill. Höver. N.
- L. minor* Desf. Zw. Döhren u. Hemmingen, Breite Wiese, Springe. Misburg, Höver, Kronsberg, Lehrte, Sehnde. N.
- L. arvensis* Desf. Auf den genannten Standorten ausgestorben. Wahrscheinlich noch bei Selze und Steinwedel.

- Veronica montana* L. Hemminger Holz. Misburg in der Hast, Ahlter Wald. N. Rehburger Berge. B.
- V. latifolia* L. Bolzum. N. Marienburg. Alp.
- V. persica* Fries. Hinter der List, Kronsberg, Lühnde. Altenhagen, Hess. Oldendorf. Alp.
- V. opaca* Fr. Bei Vahrenwald auf Gemüsefeldern, Gärten in Springe.
- Melampyrum cristatum* L. Ahlter Wald, zw. Wülferode und Wassel, Sehnde. N. Rehb. Berge, Mastbruch, Mönchehagen. B.
- M. nemorosum* L. Bentherr Berg. Alp.
- Lathraea squamaria* L. Misburg, Ahlter Holz. N.
- Mentha sativa* L. Zw. Ronnenberg u. Bente.
- M. gentilis* L. Vor Bemerode, hinter Kl. Buchholz.
- Salvia pratensis* L. (Heuersen! bei Nordstemmen. Ehrh.) Altenhagen. Alp. Unter Lucerne bei Münden nebst *Var. versicolor* Kit. A.
- S. verticillata* L. Wülfeler Bahnhof. Alp.
- Calamintha Acinos* Clairv. Chaussee bei Selze.
- Clinopodium vulgare* L. Deisterpforte, Belvedere b. Barsinghausen. Misburg, Geim, Anderten, Bokmer Holz. N. (Lemmie. Ehrh.)
- Nepeta Cataria* L. Am Weissenstein b. Wülfinghausen.
- Lamium incisum* Willd. Erdbeerplantage Kirchrode, Springe. Sehnde, zw. Rethmar u. Evern. N.
- L. maculatum* L. Milchweiss b. Waltershagen. A.
- Galeopsis Ladanum* L. *V. latifolia* Hoffm. Misburg, Anderten, Sehnde, Bolzum, Höver, Ahlten. N.
- G. ochroleuca* Lmk. Rehburger Höhenzug (mit *V. grandiflora*). B.
- G. bifida* Bönningh. Äcker b. Münden. A.
- Stachys ambigua* Sm. Ilten. N.
- St. recta* L. Bokmer Holz. N.
- Betonica officinalis* L. (Zw. Wennigsen u. Lemmie. Ehrh.) Ahlter Wald, Wülferode, Geim, Bokmer Holz, Sehnde, Höver. N.
- Leonurus Cardiaca* L. Davenstedt, Havelse, Selze.
- Scutellaria minor* L. Feuchte Stellen auf Waldtrischen, namentl. zusammen mit *Potent. Torment.* Mastbruch s. o. von Rehburg. B.

- Brunella vulgaris* L. Rosenrot vom Moor beim Ahlter Walde, fleischfarbig b. Barsinghausen, hellblau b. Nenndorf.
- Ajuga reptans* L. Hellrot beim Kirchr. Thurm.
- A. genevensis* L. Döhren im Fiedler'schen Garten. Anderten. N.
- Teucrium Scorodonia* L. Steuerndieb, hinter Gr. Buchholz, Steinkrug. Rehburger Berge. B. Zw. Ilten u. Lehrte. N.
- T. Botrys* L. Bruchäcker am Eilenberge. A.
- T. Scordium* L. Misburg, Ilten, Lenthe. Höver. N.
- Pinguicula vulgaris* L. Bissendorf. N.
- Anagallis coerulea* Schreb. Sehnde. N.
- Centunculus minimus* L. Kronsberg über dem Mastbrok, zw. Limmer u. Velber, hinter Kleefeld, beim Eisenbahndamm hinter dem Lindener Berge, Vahrenwald. Münder. A. Sehnde. N. Steinhude. B.
- Primula acaulis* Jacq. Ahlemer Holz. Alp.
- Samolus Valerandi* L. Graben vor den Infant.-Schiesstätten hinter Vahrenwald. Misburg, Höver. N.
- Glaux maritima* L. Ilten. N.
- Littorella lacustris* L. Vahrenwalder Schanzen. Alp. Im N. u. NO. des Steinhuder Meeres. B.
- Plantago major* L. *V. minima* D. C. Holtenser Mergelgruben. Alp.
- P. lanceolata* L. Mit gehäuften Ähren auch b. Hannover. Alp.
- Amarantus retroflexus* L. Herrenhausen, Limmer, Buchholz.
- Chenopodium hybridum* L. Döhren.
- Ch. urbicum* L. Bornumer Flachsrotten, Salinen, Weg nach Ricklingen.
- Ch. murale* L. Barsinghausen, zw. Weetzen u. Bente.
- Ch. opulifolium* Schrad. An der Eilenriede bei Waldhausen, Gr. Buchholz, Celler Chaussee vor Bothfeld.
- Ch. glaucum* L. Schuttplätze hinter der List (bis 1888 massenhaft). Buchholz. Alp.
- Ch. polyspermum* L. Gärten in Springe, Barsinghausen, Tümpel hinter Lahe, Gr. Buchholz, Steuerndieb, Chauss. hinter d. List.
- Ch. Vulvaria* L. Auf der Bult. Alp.
- Rumex maritimus* L. Lehrte. N.
- R. maximus* Schreb. Wunstorfer Bahnhof. Alp.

- R. pratensis* M. u. K. List, Barsinghausen.
Polygonum Bistorta L. Misburg, vor dem Dorfe. Sehnde. N.
P. mite Schrank. Hinter Kl. Buchholz, im Mastbrok.
P. Dumetorum L. Eilenriede zwischen List u. Steuerndieb.
 Harberg zw. Rehburg u. Winzlar. B.
Asarum europaeum L. (Steinberg b. Hildesheim. Ehrh.)
Empetrum nigrum L. Resser Moor. Bissendorf. N.
Tithymalus Esula Scop. Ahlter Wald, Sehnde, Bolzum. N
Mercurialis perennis L. Ahlter Wald. N. Ricklinger Holz. Alp.
Parietaria officinalis L. An der Haarstr. u., wie es scheint.
 in Ilten verloren, zuletzt noch an der Gr. Pfahlstr.
Morus alba L. Ein Baum dem Herrenh. Berggarten gegen-
 über, in Döhren.
Castanea vesca Gaertn. (Georgengarten, Welfengarten,
 Herrenh. Berggarten.) Saupark, Deisterpforte.
Quercus sessiliflora Sm. Eilenr. beim Döhr. Thurm.
Salix rubra Huds. An der Ihme. Alp.
 (*S. aurita* × *purpurea* Wimm. ist *S. Cladostemma* Hayne.
 Verloren, kein Steckling ist angegangen.)
S. Caprea × *cinerea* Wimm. Beim Hainhölzer Rangierb. Alp.
S. Calodendron Wimm. Mehrere starke Bäumchen beim
 Entenfang. Apoth. Brandes.
S. nigricans Sm. u. Fr. Beim Pferdethurm. Forststr. Erck.
S. livida × *nigricans*. In der Eilenriede. Alp.
Alnus incana D. C. Bei den Schiessstätten hinter Vahrenwald,
 Thiergartenstr.
Myrica Gale L. Hagenburger Moor. A.
Hydrocharis Morsus ranae L. Ricklinger Beke.
Elodea canadensis Rich. Georgengarten, Vahrenwalder
 Schanzgräben, Wietzegraben zw. Bissendorf u. Burgwedel.
Alisma ranunculoides L. Misburg, Lehrte, Bissendorf, Elze
 bei Bissend. N.
Sagittaria sagittaeifolia L. Steinhuder Meer.
Butomus umbellatus L. Havelse, Marienwerder.
Scheuchzeria palustris L. Ohlhagener Moor b. Mardorf. N.
Triglochin maritimum L. Bei den Salinen. Apoth. Brandes.
Potamogeton oblongus Viv. Vahrenwalder Schanzgr. Misburg. N.

- P. lucens* L. Mardorf. B.
P. rufescens Schrad. Loccumer Fischteiche. B. Misburg.
P. gramineus L. Steinhuder Meer. Alp.
P. crispus L. Loccumer Fischteiche. B. Ricklingen, Marienwerder.
P. praelongus Wulf. Bei Neustadt in einem nach dem Steinhuder Meer abfließenden Graben. Apoth. Redeker 1886.
P. pusillus L. Loccumer Fischteiche. B.
P. pectinatus L. Steinhuder Meer (steril). B.
Lemna polyrrhiza L. Schiffgraben in der Eilenr., Marienwerder.
L. gibba L. (Mit Blüten von Ehrh. gefunden. S. Beitr. I. 43.)
Typha latifolia L. Tümpel hinter dem Altenb. Bahnh., Davenst.
T. angustifolia L. Altenbek Bahnhof. Misburg. N. Steinhuder Meer. B.
Sparganium ramosum Huds. Hinter Bischofsh. i. Eilenriedegraben.
Sp. simplex Huds. Breite Wiese.
Sp. minimum Fr. Winzlarer Wiesen. B.
Calla palustris L. Mardorf. N.
Acorus Calamus L. Steinhuder Meer. B.
Orchis Morio L. Vinnhorst. Alp.
O. mascula L. Bokmer Holz. Weissbl. am Ith. Stark wohlriechend bei Münders; trocken wie *O. fusca* duftend von einer Waldwiese im Süntel. A.
O. maculata L. Bokmer Holz. *Var. comosa* Andr. B. Münders (nicht von *O. mascula*).
Gymnadenia conopsea R. B. Vinnhorst. Alp.
Platanthera bifolia Rehb. Rehburger Berge. B.
Ophrys muscifera Huds. Hellbachsthal bei Rohden.
Epipogon aphyllus Sw. Zw. Hünenburg u. Iberg, am Osterberge. A.
Cephalanthera grandiflora Babingt. Beim Waldkater (Wülfinh.).
Epipactis latifolia All. Ahlter Wald, Mastbrok, Hemminger Holz, Saupark. Rehburger Berge. B.
E. palustris Crntz. Wiesen zw. Berghol u. Spissingshol. B.
Listera ovata R. Br. Eilenr. zw. Döhr. Th. u. Bischofshol 1891. Bokmer Holz, Ahlter Wald. N. Rehburger Berge. B.
Neotta Nidus avis Rich. Misburg.
Spiranthes auctumnalis Rich. Kirchröder Wiesen (nach einem vom Gärtner Schädler aufgenommenen Exemplare).

- Cypripedium Calceolus* L. Abhänge des Langenfelder Thales. A.
Sisyrinchium anceps Lamk. Wiesen bei Hainholz, Lehrte.
 Ith über Copenbrügge. Alp.
- Anthericum ramosum* L. Vom Lehrer Dieckhoff 1887
 am Wege von Gr. Buchholz nach dem Moore wieder auf-
 gefunden, also der Flora angehörend.
- Gagea arvensis* Schult. Ahlten, Ilten. N.
G. spathacea Schult. Rehburger Berge. B.
G. lutea Schult. Rehburger Berge. B.
- Allium carinatum* L. (Steinberg b. Hildesheim, Neustädter
 Aue. Ehrh.)
- Colchicum auctumnale* L. Zw. Kirchr. Th. u. Kirchrode, Eldagsen.
- Juncus conglomeratus* × *glaucus*. Holtenser Feld
 bei Münder. A.
- J. glaucus* Ehrh. Misburg.
- J. filiformis* L. Eilenr. zw. List u. Steuerndieb. Deisterkamm
 über dem Cölln. Felde. A.
- J. silvaticus* Reichard. Theenser Moor. A.
- J. obtusiflorus* Ehrh. Maschgräben zw. Döhren u. Hemmingen.
- J. compressus* Jacq. Zw. Herrenhausen u. Limmer, Havelse.
- Luzula campestris* D. C. *Var. pallescens*. Eilenriede beim
 Döhrener Thurm. Alp.
- Cyperus fuscus* L. Bult. Dieckhoff.
- Scirpus setaceus* L. Lahe.
- S. maritimus* L. Zw. Weetzen u. Bente.
- S. silvaticus* L. Havelse, Lahe.
- S. compressus* Pers. Fösse bei Limmer.
- Eriophorum vaginatum* L. Zw. Zoologischem Garten u. List,
 Pferdethurm. Alp.
- E. latifolium* Hoppe. Wiesen zw. Berghol u. Spissingshol. B.
 Bissendorf. N.
- Carex pulicaris* L. Im Mastbruch u. bei Winzlar. B. Vinn-
 horst. Alp.
- C. divulsa* Good. Laatzener Holz, Bokmer Holz. N.
- C. paradoxa* Willd. Seckbruch bei Misburg. N.
- C. leporina*. *V. argyroglochis* Hornem. Bergschmiede am
 Süntel. A. Rehburger Berge. B.

- C. stricta* Good. Zw. Herrenhausen u. Limmer.
C. caespitosa L. Warmbücher Moor nahe dem Ahlter Walde.
 Bissendorf. N.
C. tomentosa L. Sehnde. N.
C. praecox Jacq. Misburg. N.
C. strigosa Huds. Eilenriede hinter den Schiessständen, am
 alten Wege vom Pferdeth. nach dem Zool. Garten. Alp.
C. maxima Scop. Beim Waldkater.
C. flava L. Ahlter Wald, Sehnde. N. Zw. Mönchehagen u.
 Kreuzhorst. B.
C. distans L. Zw. Lehrte u. Ilten, Sehnde. N.
C. paludosa Good. An der Eilenriede hinter Bischofshol,
 Meerbachswiesen bei Mardorf. *Var. Kochiana* D. C.
 Eilenriedegraben zw. Bischofshol u. Döhr. Th.
Panicum sanguinale L. Am Graswege, Garten des Döhr. Th.
P. filiforme Greke. Döhren. Mardorf. B.
Alopecurus agrestis L. Sehnde. N.
Phleum Boehmeri Wibel. In der Nähe der Paschenburg. A.
Calamagrostis lanceolata Rth. Chaussee zw. List u. Bothfeld.
C. arundinacea Rth. Beim Weissenstein.
Koeleria cristata Pers. Breite Wiese b. Kirchrode. Misburg,
 Bolzum. N.
Aira caespitosa L. *V. pallida* Koch. Mardorf, Hagenburg. B.
Avena hybrida Peterm. Am Lindn. Berge u. sonst nicht selten.
A. pratensis L. Unter dem Schierholze. A.
A. pubescens L. Misburg, Sehnde. N.
A. flavescens L. Misburg, Anderten, Sehnde. N.
A. caryophyllea Web. Zw. Rehburg u. Hagenburg. B.
A. praecox P. B. Ziegelei hinter Kleefeld, Entenfang.
Triodia decumbens P. B. Bult.
Melica nutans L. Rand der Eilenr. nach der Bult zu beim
 Pferdeth., links von der Chaussee zw. List u. Steuerndieb.
 Eilenr. zw. Döhr. Th. u. Bischofshol, Bentherr Berg. Alp.
M. uniflora Retz. Ahlter Wald. N.
Poa compressa L. Masch, Nenndorf. Mauer in Döhren. Alp.
 Misburg, Bilm, Ilten, Sehnde. N.
Glyceria plicata Fr. Am Wege nach Misburg. Lehrte, Ahlten. N.

- G. aquatica* Presl. Hagenburg. B.
- Festuca myurus* Ehrh. Zw. Bückeburger Landwehr und der Salzquelle. B.
- F. sciuroides* Rth. (Buchholz, List, Benthe. Ehrh.) Harberg, Rehburger Berge, Bergkirchen. B. Nienstedt, Eilenberg. A.
- F. silvatica* Vill. Rehburger Berge. B.
- F. arundinacea* Schreb. Rehbürg. B.
- F. loliacea* Huds. Leine hinter der Fischerstr., Kunst bei Limmer, Weg nach dem Pferdeth. im Graben links, Gärten in Springe.
- F. elatior* × *Lolium italicum*. (Gleicht dem *L. italicum*; Ährchen etwas entfernter gestellt, deutlich gestielt.) Zwisch. Havelse u. Marienwerder.
- Brachypodium silvaticum* R. u. Schult. Weg nach dem Pferdeth. links bei den Gärten, zw. List u. Steuerndieb, zw. Pferdeth. und Bischofshol, Hemminger und Ricklinger Holz. Geim, Sehnde. N. Rehburger Berge. B.
- B. pinnatum* P. B. Wülferode, Geim. N.
- Bromus racemosus* L. Havelse.
- Br. commutatus* Schrad. Vor den Salinen. Kronsberg, Sehnde. N. Eilenberg, über Egestorf u. Böbbber. A.
- Br. arvensis* L. (Auf dem mit Erde vom Lindener Berg zu- geworfenen Stadtgraben an der Humboldtstr. in Menge, mehrere Jahre erhalten.) Sehnde. N.
- Br. serotinus* Beneken. Osterberg, Iberg. A.
- Br. erectus* Huds. Kronsberg, Misburg, verlassene Steinbrüche bei Bolzum. N.
- Br. tectorum* L. Lehrte, Misburg, Sehnde. N.
- Triticum caninum* Schreb. Eilenr. vom Neuen Hause bis zum Zool. Garten.
- Elymus europaeus* L. Ahlter Wald. N.
- Hordeum secalinum* Schreb. Bella Vista, Seelze. Winzlarer Wiesen. B.
- Lolium perenne* × *italicum*. Häufig da, wo *L. italicum* gebaut ist.
- Taxus baccata* L. Zwei alte Bäume an der Paschenburg.
- Abies alba* Mill. Marienwerder, Deister.

- Equisetum Telmateja* Ehrh. Chaussee zw. Hess. Oldendorf u. Krückeberg.
- E. silvaticum* L. Hinter Bischofshol. Rehburger Berge. B.
- E. pratense* Ehrh. Beim Forstort Morgenruhe bis 1890.
- E. hiemale* L. Flegessen.
- Pilularia globulifera* L. Vahrenwalder Schanzen. Alp. Zweiter Tümpel hinter List.
- Lycopodium Selago* L. Eichenholz rechts zw. Berghol und Wölpinghausen. B.
- L. annotinum* L. (Zw. Cölln. Feld u. Wennigsen. Ehrh.)
- Botrychium Lunaria* Sw. Kronsberg bei Anderten. N. Ilten, Totenthal über Barcksen; am Deister b. Nienstedt viel. A.
- Ophioglossum vulgatum* L. Kohlenberg b. Lauenstein, unter dem Ith auf sumpfigen Wiesen.
- Osmunda regalis* L. Winzlar. B.
- Grammitis Ceterach* Sw. (Schaumburg. Ehrh. Beitr. VII. 101.)
- Polypodium Dryopteris* L. Lohnder Holz bei Wunstorf. Alp.
- Aspidium lobatum* Sw. Ith, zw. Gr. u. Kl. Süntel.
- Polystichum Thelypteris* Rth. Lehrte, Hasperde. Schloss Ricklingen. Alp. Winzlar. B.
- P. cristatum* Rth. Nordrand des Ahlter Waldes, Lahe.
- Asplenium Trichomanes* L. Selzer Kirche.
- A. Ruta muraria* L. Selzer Kirche, Nenndorf.
- Scolopendrium officinarum* Sw. (Bei Springe. Ehrh. VII. 98.)
Teufelsküche im Ith.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover](#)

Jahr/Year: 1889-1891

Band/Volume: [40-41](#)

Autor(en)/Author(s): Mejer Ludwig

Artikel/Article: [VII Abhandlungen. Nachtrag zu der 1875 erschienenen „Flora von Hannover“ 19-37](#)