

1. Klasse. **Dicotylen.**

I. Familie. **RANUNCULACEEN** Juss.

1. Clematis L.

1. **Cl. Vitalba** L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau, Meinsen.

2. **Cl. recta** L.

Rgbz. Hi. 8. Die Standorte Petersdorf und Crimderode sind zu streichen.

2. Thalictrum Tourn.

4. **Th. flavum** L.

Rgbz. Ha. 8. Bauernbruch bei Eschenhausen.

Rgbz. Hi. Durch den ganzen Bezirk verbreitet.

Rgbz. L. 2. Zwischen Bockhorst und Schölisch; 6. Dingen, Schottwarden, Wremen, Misselwarden, Dorum, Cappel; 8. Am Osterholzer Kanal.

Rgbz. O. 8. Bohmte, Lintorf.

3. Hepatica Dill.

1. **H. nobilis** Schreb.

Rgbz. L. 2. Im Deepen-Rehm bei Ahrensmoor.

5. Anemone Tourn.

3. **A. ranunculoides** L.

Rgbz. Ha. 3. Lanenau.

Rgbz. O. 8. Im Gehölz zwischen Rabber und Wittlage.
Der Bastard: *Anemone nemorosa* × *ranunculoides*.

Rgbz. Hi. 8. Im Crimderoder Holze.

6. Adonis Dill.

2. **A. aestivalis** L.

Rgbz. Ha. 3. Unterhalb der Westeregge bei Hilsede.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal; 15. Am Luttmersberg bei Northheim, Levershausen.

3. **A. flammeus** Jasq.

Rgbz. Hi. 11. Bei Esebeck am Rande des Holzes nach Holtensen zu; 15. Am Suttmerberg bei Northheim.

7. *Myosurus* Dill.

1. *M. minimus* L.

Rgbz. S. 6. Wremen, Misselwarden, Dorum, Cappel.

8. *Batrachium* Dumort.

1. *B. hederaceum* Dumort.

Rgbz. L. 1. Warmbüchener Moor.

4. *B. Baudotii* van den Bossche.

Rgbz. S. 4. In den Marschen.

6. *B. divaricatum* Wimmer.

Rgbz. Ha. 2. Vor Limmer.

Rgbz. Hi. 1. Teich bei Gr.-Hlsede; 8. Kalte Wiede bei Sachswerfen.

7. *B. fluitans* Wimm.

Rgbz. Ha. 3. In der Aue bei Lauenau.

Rgbz. Hi. 2. In der Innerste bei Hasede.

Rgbz. L. 5. In der Bohme bei Dorfmark.

9. *Ranunculus* Hall.

3. *R. Lingua* L.

Rgbz. Ha. 1. An der Chaussee zwischen Stöcken und Behrenbostel; 5. Am Steinhuder Meer; 11. Am Dümmer See.

Rgbz. Hi. 4. An der Astbost bei Elze.

Rgbz. L. 5. Im Moore bei Westenholz.

Rgbz. A. Im Meedengebiete weit verbreitet.

5. *R. acer* L. Form. *micrantha*.

Rgbz. Hi. 8. An der Chaussee nach Petersdorf.

Form. *minor*.

Rgbz. Hi. 8. An Bergabhängen bei Stempeda.

6. *R. lanuginosus* L.

Rgbz. Ha. 4. An der Lauensteiner Burg.

8. *R. nemorosus* L.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

10. *R. bulbosus* L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

11. *R. sardous* Crntz.

Rgbz. Ha. 5. Wegränder am Vorwerke bei Steinhude.

Rgbz. L. 2. Lagholz bei Fallersleben.

12. **R. arvensis** L.

Rgbz. Ha. 3. Blumenhagen.

Rgbz. L. 2. Lagholz bei Fallersleben.

Rgbz. S. 2. Bei der Ziegelei Horst.

16. Delphinium Tourn.

1. **D. consolida** L.

Rgbz. Ha. 3. Blumenhagen.

Rgbz. S. 8. Bei der Mühle auf dem Heidkamp bei Osterholz eingeschleppt.

17. Aconitum Tourn.

3. **A. variegatum** L.

Rgbz. Hi. 8. Ilfelder Thal.

4. **A. Lycoctonum** L.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal, Alter Stolberg.

Die Varietät: *A. vulparia* Rehb.

Rgbz. Hi. 8. Alter Stolberg.

18. Actaea L.

1. **A. spicata** L.

Rgbz. Ha. 11. Lemförder Berg.

Rgbz. L. 2. Lagholz und Hohnstedter Holz bei Fallersleben.

III. Familie. NYMPHAEACEEN DC.

21. Nymphaea L.

1. **N. alba** L.

Rgbz. Ha. 11. Dümmer See.

Rgbz. L. 6. Soltan.

22. Nuphar Sm.

1. **N. luteum** Sm.

Rgbz. Hi. 3. In der Nette bei Sillium.

IV. Familie. PAPAVERACEEN DC.

23. Papaver Tourn.

1. **P. Argemone** L.

Die Varietät: *P. glabrum* Koch.

Rgbz. Hi. 8. Rüdigsdorf.

2. **P. Rhoeas** L.

Rgbz. A. Nur eingeschleppt.

V. Familie. FUMARIACEEN DC.

26. Corydalis DC.

1. **C. cava** Schwgg. u. K.

Rgbz. O. 8. Lintorf unter Hecken am Fusse des Berges.

Rgbz. A. 5. Bei Neufirrel verschwunden.

3. **C. intermedia** P. M. E.

Rgbz. Ha. 2. Im Hemminger Holze.

Rgbz. Hi. 15. Am Eingange des Rothethals bei Nörten.

4. **C. lutea** DC.

Rgbz. Ha. 3. An einer Mauer der Oberförsterei in Lauenau.

5. **C. claviculata** DC.

Rgbz. S. 6. Am Rande eines Gehölzes bei Holssel.

27. Fumaria Tourn.

1a. **F. Schleicheri** Soy. Willm.

Auf Äckern und Schutt.

Rgbz. Hi. 8. Im Geröll des Schuppenturms.

VI. Familie. CRUCIFEREN Juss.

28. Nasturtium R. Br.

2. **N. amphibium** R. Br.

Rgbz. A. 2. Borkum; 3. Spiekeroog.

29. Barbaraea R. Br.

1. **B. vulgaris** R. Br.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

Die Varietät: *B. arenata* Rehb.

Rgbz. Ha. 3. Am Felsenkeller bei Lauenau.

B. pseudostricta.

Rgbz. Hi. 8. Kalte Wiede bei Crimderode.

2. **B. stricta** Andr.

Rgbz. Ha. 3. Zwischen Lauenau und dem Deister.

Rgbz. S. 6. Misselwarden, Dormm, Padingbüttel, Cappel, Spieka.

30. *Turritis* Dill.

1. *T. glabra* L.

Rgbz. Hi. 5. Am Selter über Freden.

Rgbz. O. 7. Schleddehausen; 8. Bei Bohnte an der Bahn.

31. *Arabis* L.

1. *A. pauciflora* Greke.

Rgbz. Hi. 7. Der Standort am Mühlenberge bei Niedersachswerfen ist zu streichen.

6. *A. Halleri* L.

Die Varietät: *A. stolonifera* DC.

Rgbz. Hi. 8. Im dichten Gebüsch am Fusse des Kohnsteins bei Niedersachswerfen.

32. *Cardamine* L.

3. *C. silvatica* Lk.

Rgbz. Hi. 7. St. Andreasberg.

Rgbz. A. 4. Bei Aurich.

Die Varietät: *C. interrupta* Cz.

Rgbz. S. 4. Nordahner Gehölz; 6. Bederkesa, Holzurburger Gehölz; 8. Hasbütteler Holz.

6. *C. amara* L.

Rgbz. Ha. 1. Zwischen der Seelhorst und Bemerode.

Rgbz. O. 8. Bei Barkhausen in der Nähe der Mühle.

35. *Sisymbrium* L.

3. *S. Loeselii* L.

Rgbz. S. 6. Seit 1893 an der Mühle bei Sievern; 8. Seit 1893 an der Mühle auf dem Heidkamp bei Osterholz.

4. *S. Irio* L.

Rgbz. S. 8. Seit 1893 bei der Mühle auf dem Heidkamp bei Osterholz.

6. *S. Sinapistrum* Crntz.

Rgbz. Ha. 1. Schuttstellen auf den Lister Wiesen, an der Schwesternhausstrasse.

Rgbz. S. 8. Bei der Mühle auf dem Heidkamp bei Osterholz.

7. *S. Sophia* L.

Rgbz. S. 6. In Mulsum an der Landstrasse.

Rgbz. O. 8. Bei Bohnte an der Bahn.

37. *Alliaria* Adans.

1. *A. officinalis* Andrzej.

Rgbz. O. 8. Bei Rabber an der Hunte.

38. *Erysimum* L.

4. *E. odoratum* Ehrh.

Rgbz. Hi. 8. Giebichenhausen, Urbach.

7. *E. orientale* R. Br.

Rgbz. Hi. 5. Levershausen.

Rgbz. S. 4. Am Bahnhofe bei Neuhaus eingeschleppt.

39. *Brassica* L.

4. *B. nigra* Koch.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

Rgbz. Hi. 8. Im Bette der Zorge.

5. *B. lanceolata* Lange.

Rgbz. Hi. 8. Bei Crimderode eingeschleppt.

40a. *Eruca*.

1. *E. sativa* Lmk.

Rgbz. Hi. 8. Bei Steigerthal eingeschleppt 1897.

41. *Diplotaxis* DC.

1. *D. tenuifolia* DC.

Rgbz. Ha. 1. An einem Feldwege der Gr. Bult eingeschleppt 1899.

42. *Alyssum* Tourn.

2. *A. calycinum* L.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode.

Rgbz. S. 8. Bei der Mühle in Myhle.

43. *Berteroa* DC.

1. *B. incana* DC.

Rgbz. Ha. 11. Am Bahnhof bei Diepholz.

Rgbz. Hi. 1. Bei der Peiner Windmühle; 2. Zwischen Himmelsthür und Sorsum.

Rgbz. S. 2. Auf dem Exerzierplatz in Stade; 6. An der Mühle bei Sievern und Midlum; 8. Am Eisenbahndamm in Oldenbüttel, bei der Mühle auf dem Heidkamp in Osterholz.

Rgbz. O. 8. Bei Bohnte am Bahnhof.

46. *Erophila* DC.

1. *E. verna* E. Mey.

Die Varietät:

E. stenocarpa Jord.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle, Harzriege bei Petersdorf.

E. praecox DC.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle.

53. *Biscutella* L.

1. *B. laevigata* L.

Die Varietät: *B. saxatilis* DC.

Rgbz. Hi. 8 An der Ostseite des Kohnsteins bei Niedersachswerfen.

54. *Lepidium* L.

1. *L. Draba* L.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode.

4. *L. perfoliatum* L.

Rgbz. S. 8. Bei der Mühle in Myhle eingeschleppt.

5. *L. ruderale* L.

Rgbz. Ha. 1. Beim Schwesternhause.

Rgbz. S. 8. Bei der Mühle auf dem Heidkamp bei Osterholz.

6. *L. apetalum* Willd.

Rgbz. Hi. 8. Bei Crimderode eingeschleppt, 1897.

56. *Capsella* Vent.

1. *C. Bursa pastoris* Mnch.

Die Varietät: *C. integrifolia* Koch.

Rgbz. Hi. 8. Ilfelder Thal.

57. *Coronopus* Hall.

1. *C. Ruellii* All.

Rgbz. Ha. 1. In der Sandkühle bei Laatzen.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle.

Rgbz. S. 3. Am Deiche bei Bützflöth, Gehrdener Siedwand; 4. Bei der Oberndorfer Fähre, Bentwisch; 6. Im Lande Wursten fraglich.

60. *Bunias* L.

1. *B. orientalis* L.

Rgbz. Ha. 1. An der Schwesternhausstrasse seit 1897.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode.

Rgbz. L. 1. Zwischen Lage und Warmbüchen an der Chaussee 1898.

61. *Cakile Tourn.*

1. *C. maritima* Scop.

Rgbz. S. 6. Am Aussendeiche bei Misselwarden.

VII. Familie. CISTACEEN Dunal.

66. *Helianthemum Tourn.*

2. *H. Chamaecistus* Mill.

Rgbz. Hi. 7. St. Andreasberg; 15. Am Wieter bei Northeim.

VIII. Familie. VIOLACEEN DC.

67. *Viola Tourn.*

1. *V. palustris* L.

Rgbz. Ha. 3. An der Aue bei Lauenau.

Rgbz. O. 8. Büscherheide am Wege zum Nonnenstein.

6. *V. arenaria* DC.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode, Rüdigsdorf.

IX. Familie. RESEDACEEN DC.

68. *Reseda L.*

1. *R. lutea* L.

Rgbz. S. 2. Bei der Kamper Mühle und der Ziegelei Horst bei Stade; 4. Am Bahnhof bei Neuhaus. Eingeschleppt.

2. *R. luteola* L.

Rgbz. H. 4. Auf der Kendelke bei Mehle.

Rgbz. O. 8. Bei Barkhausen.

X. Familie. DROSERACEEN DC.

69. *Drosera L.*

1. *D. rotundifolia* L.

Rgbz. Ha. 11. Lemförde.

Rgbz. Hi. 1. In der Sandkuhle neben der alten Vöhrumer Landstrasse.

2. *D. anglica* Huds.

Rgbz. S. 3. Ritschermoor, Asselermoor, im Wilden Moor hinter dem Gr. Villah; 8. Zwischen Freissenbüttel und Hülseberg, Oldenbüttel.

Rgbz. A. 3. Zwischen Hopels und Neudorf, in Torfsümpfen bei Strudden.

3. **D. intermedia** Hayne.

Rgbz. Hi. 1. In der Sandkuhle neben der alten Vöhrumer Landstrasse.

Rgbz. A. 1. Auf Norderney.

Der Bastard: *D. rotundifolia* $\times$ *anglica*.

Rgbz. S. 8. In einem kleinen Moore bei Oldenbüttel.

XI. Familie. POLYGALACEEN Juss.

70. Polygala L.

4. **P. serpyllacea** Weihe.

Rgbz. Hi. 2. Am oberen Giesener Teiche.

XII. Familie. SILENACEEN DC.

73. Dianthus L.

2. **D. Armeria** L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

Rgbz. Hi. 8. Wiegersdorf.

3. **D. Carthusianorum** L.

Rgbz. Hi. 7. Niedersachswerfen.

4. **D. deltoides** L.

Rgbz. Ha. 3. Am Felsenkeller bei Lauenau.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

Rgbz. S. 8. Zwischen Ottersberg und Lilienthal.

74. Saponaria L.

1. **S. officinalis** L.

Rgbz. Ha. 1. An der Mauer des Bemeroder Kirchhofes eingeschleppt; 11. Brokum.

Rgbz. S. 4. Hackemühlen, Wohlenbeck, Kadenberge.

75. Vaccaria Med.

1. **V. parviflora** Mch.

Rgbz. Ha. 1. An der Hohenzollernstrasse am Rande der Eilenriede, auf Schuttstellen in den Wiesen hinter der List, an der Schulenburgers Chaussee; 2. An der Körting'schen Fabrik. Eingeschleppt.

Rgbz. Hi. 11. Angerstein.

77. *Silene* L.

2. *S. vulgaris* Grke.

Rgbz. Ha. 3. Bei Pohle und Rhaden.

Rgbz. S. 2. Am Bahndamm bei Haddorf; 8. Am Elm bei Hülseberg.

Rgbz. A. 4. An den Böschungen des Ems-Jade-Kanals bei Aurich eingeschleppt.

4. *S. dichotoma* Ehrh.

Rgbz. Hi. 2. Kl. Giessen; 8. Neustadt, Rüdigsdorf.

Rgbz. S. 4. Geversdorf.

5. *S. nutans* L.

Die Varietät: *S. glabra* Schkuhr.

Rgbz. Hi. 8. Alter Stolberg.

80. *Melandryum* Röhling.

Der Bastard: *M. rubrum* $\times$ *album*.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

Rgbz. Hi. 8. Am Zorgeufer bei Crimderode.

XIII. Familie. ALSINACEEN DC.

82. *Sagina* L.

2. *S. apetala* Arduino.

Rgbz. Ha. 4. In und um Hameln, Koenigsförde.

Rgbz. Hi. 8. Triften bei der Kuckucksmühle.

5. *S. nodosa* Fenzl.

Rgbz. L. 3. Im Moore hinter Lindwedel.

83. *Spergula* L.

2. *S. Morisonii* Boreau.

Rgbz. S. 8. Zwischen Freissenbüttel und Hülseberg, Schmidts Kiefern bei Garlstedt.

84. *Spergularia* Presl.

1. *S. segetalis* Fenzl.

Rgbz. Ha. 3. Unterhalb des Sanparks gegenüber der Sedemünder Papiermühle.

88. *Arenaria* L.

1. *A. serpyllifolia* L.

Rgbz. A. Auf dem Festlande Ostfrieslands selten.

Die Varietät: *A. viscida* Lois.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

90. *Stellaria* L.

1. *S. nemorum* L.

Rgbz. Ha. 3. Am Waltersbach bei Lanenau.

Rgbz. O. 8. Bei Wittlage im Rott an der Hunte.

2. *S. media* Cyr.

Die Varietät: *S. neglecta* Weihe.

Rgbz. Hi. 2. Am Rande des Giesener Holzes beim oberen Teiche.

2a. *S. pallida* Crep.

Auf Gartenland und Grasplätzen.

Rgbz. Ha. 1. Unter Bäumen im Parke von Herrenhausen.

91. *Moenchia* Ehrh.

1. *M. erecta* Fl. Wett.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühler Pfarrhof, Petersdorf, Leimbach.

93. *Cerastium* L.

1. *C. glomeratum* Thuill.

Rgbz. Ha. 1. Hinter der Seelhorst; 3. Meinsen.

3. *C. semidecandrum* L.

Die Varietät: *C. glutinosum* Fr.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode, Schurzfell.

6. *C. arvense* L.

Rgbz. A. Auf dem Festlande Ostfrieslands selten. 1. Auf Norderney eingeschleppt; 3. Aurich; 4. Leer, Filsum.

XVI. Familie. MALVACEEN R. Br.

94. *Malva* L.

1. *M. Alcea* L.

Rgbz. Ha. 3. Nienstedt, Meinsen; 4. Polle.

Rgbz. Hi. 8. Windlücke.

2. **M. moschata** L.

Rgbz. Ha. 4. Am Eisenbahndamm bei Coppenbrügge.

Rgbz. Hi. 13. Adelebsen.

Rgbz. S. 4. Zwischen Neuhaus und Kadenberge am Kanal;

6. Bei Padingbüttel verwildert.

6. **M. rotundifolia** L.

Rgbz. Ha. 1. Auf Schuttstellen im westlichen Teil der Lister Wiesen eingeschleppt.

Rgbz. Hi. 8. Am Zorgeufer bei Crimderode.

96. Lavatera L.

1. **L. thuringiaca** L.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz ist zu streichen, nächstes Vorkommen bei Windehausen.

XVII. Familie. HYPERICACEEN DC.

99. Hypericum L.

1. **H. perforatum** L.

Die Varietät: *H. microphyllum*.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

2. **H. quadrangulum** L.

Rgbz. Ha. 3. Unter dem Süntel; 11. Diepholz, Lemförde.

Rgbz. Hi. 7. Andreasberg; 8. Poppenberg.

Rgbz. S. 4. Hackemühlen, Lamstedt, auf dem Dobrock, an der Chaussee Kadenberge-Neuhaus.

Rgbz. O. 8. Essen.

Rgbz. A. Für Ostfriesland noch nicht nachgewiesen.

3. **H. tetrapterum** Fr.

Rgbz. Hi. 8. Hesselisch.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

4. **H. humifusum** L.

Rgbz. S. 6. Zwischen Elmlohe und Bederkesa; 8. Freissenbüttel.

6. **H. montanum** L.

Rgbz. S. 4. Rahden.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

XXI. Familie. LINACEEN DC.

104. **Linum** L.

1 a. **L. austriacum** L.

Unbebaute Orte. Eingeschleppt.

Rgbz. H. 5. Am Osterberg bei Langenholzen, 1899.

XXII. Familie. GERANIACEEN DC.

106. **Geranium** L.

2. **G. phaeum** L.

Rgbz. S. 5. Bei Otterndorf.

3. **G. pratense** L.

Rgbz. H. 8. Crimderode, Kalte Wiedeufer.

Rgbz. A. 4. Judenkirchhof bei Aurich, eingeschleppt.

5. **G. palustre** L.

Rgbz. O. 8. Zwischen Rabber und Wittlage.

8. **G. dissectum** L.

Rgbz. S. 6. Zwischen Misselwarden und Engbüttel an der Landstrasse.

9. **G. columbinum** L.

Rgbz. H. 3. Felsenkeller bei Lauenau.

XXIII. Familie. BALSAMINACEEN A. Rich.

108. **Impatiens** L.

1. **I. Noli tangere** L.

Rgbz. Ha. 11. Lemförder Berg.

2. **I. parviflora** DC.

Rgbz. Ha. 1. In der Eilenriede verwildert.

XXIV. Familie. OXALIDACEEN DC.

109. **Oxalis** L.

3. **O. corniculata** L.

Rgbz. S. 4. Am Dobrock beim Forsthause verwildert.

XXVII. Familie. RHAMNACEEN R. Br.

113. **Rhamnus Tourn.**

1. **R. cathartica** L.

Rgbz. S. 8. Zwischen Ottersberg und Lilienthal; 9. Blumenthal.

Rgbz. O. 8. Bei Lintorf auf dem Esel, im Garten des Apothekers Alpers in Lintorf.

XXIX. Familie. PAPILIONACEEN L.

116. *Ulex* L.

1. *U. europaeus* L.

Rgbz. Ha. 3. An dem Fahrwege von Köllnischfeld nach dem Georgsplatze.

Rgbz. Hi. 8. Bei Hasserode angepflanzt.

Rgbz. L. 5. Dorfmark bei Soltau.

Rgbz. A. 1. In den Dünen bei der Gasanstalt auf Norderney.

118. *Genista* L.

3. *G. germanica* L.

Rgbz. L. 1. Bei der Kronsberger Mühle. (Früher schon von Ehrhardt dort beobachtet.)

Rgbz. S. 4. Auf der Haide beim Basbecker Bahnhof, am Dobrock.

Die Varietät: *G. inermis*.

Rgbz. Hi. 11. Auf Waldblössen bei Göttingen.

122. *Anthyllis* L.

1. *A. Vulneraria* L.

Rgbz. Ha. 3. Zwischen Langenfeldt und Rhaden.

Rgbz. Hi. 15. Luttershausen.

Rgbz. L. 7. Holdenstedt.

Rgbz. S. 6. Im Lande Wursten manchmal auf Kleefeldern eingeschleppt.

Rgbz. O. 8. Bei Lintorf unter Klee.

Rgbz. A. 4. Auf dem Kanaldamm bei Aurich.

123. *Medicago* L.

1. *M. sativa* L.

Rgbz. S. 2. Am Bahndamm in der Nähe von Seemanns Gasthaus bei Stade; 4. Neuhaus; 8. Oldenbüttel.

2. *M. falcata* L.

Rgbz. S. 8. Bei der Osterholzer und Myhler Mühle. Eingeschleppt.

Rgbz. A. 4. Am Ems-Jade-Kanal eingeschleppt.

4. *M. minima* Bartolini.

Die Varietät: *M. mollissima* Spr.

Rgbz. Hi. 8. An Abhängen bei Crimderode.

5. **M. hispida** Gärtn.

Rgbz. Ha. 1. Auf Schuttstellen in der Masch.

Der Bastard: *M. sativa* × *falcata*.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode.

124. Melilotus Tourn.

3. **M. altissimus** Thuill.

Rgbz. Hi. 8. An offenen Waldstellen des Alten Stolbergs.

Rgbz. S. 2. Ziegelei Horst und Kipps Kalkofen bei Stade;

7. Am Schiffdorfer See.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

4. **M. officinalis** Desr.

Rgbz. S. 8. Am Wege nach Hambergen.

Rgbz. O. 8. Buscherheide.

Rgbz. A. Hier und da eingeschleppt.

5. **M. albus** Desr.

Rgbz. Ha. 3. Feggendorf; 11. Diepholz.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

125. Trifolium Tourn.

2. **T. alpestre** L. Form. *coeruleum*.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz (im frischen Zustande rein blau).

6. **T. striatum** L.

Rgbz. Ha. 1. In der Sandkuhle bei Laatzten (schon früher von Ehrhardt dort beobachtet).

Rgbz. Hi. 8. Triften bei der Kuckucksmühle.

Die Varietät:

T. procumbens Vocke.

Rgbz. Hi. 8. Im kurzen Rasen der Triften bei der Kuckucksmühle.

T. parviflorum Vocke.

Rgbz. Hi. 8. Tannenberghal bei Stolberg.

T. montanum Vocke.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

T. spadiceum Vocke.

Rgbz. Hi. 8. Tannenberghal bei Stolberg.

T. prostratum Vocke.

Rgbz. Hi. 8. Auf Kiesboden bei Schurzfell.

7. **T. medium** L.

Rgbz. S. 4. Rahden; 6. Knüppelholz bei Drangstedt.

15. **T. agrarium** L.

Rgbz. Ha. 3. Gehölz bei Nienfeld.

Rgbz. S. 8. Auf einem Acker in der Nähe des Elm bei Hülseberg eingeschleppt.

Rgbz. O. 9. Bei Buer.

Rgbz. A. 4. Am Ems-Jade-Kanal eingeschleppt.

126. Lotus Tourn.

1. **L. coniculatus** L. var. *tenuifolius* Reichl.

Rgbz. S. 6. Im Lande Wursten an Wegen häufig.

2. **L. uliginosus** Schk.

Rgbz. A. 1. Norderney, Juist.

127. Tetragonolobus Scop.

1. **T. siliquosus** Roth.

Rgbz. Hi. 8. Windlücke.

127 a. Galega L.

1. **G. officinalis** L.

Rgbz. Hi. 8. Bei Crimderode eingeschleppt 1897.

130. Astragalus Tourn.

1. **A. glycyphyllos** L.

Rgbz. Ha. 11. Lemförder Berg.

Rgbz. Hi. 4. Limberg bei Mehle; 8. Harzungen, Alter Stolberg.

131. Coronilla L.

2. **C. varia** L.

Rgbz. Hi. 8. Bei Crimderode eingeschleppt 1897.

135. Vicia L.

7. **V. angustifolia** All. Form. *amphicarpa* Aschers.

Rgbz. Ha. 1. In der Sandkuhle bei Laatzten; 10. An der Bassumer Chaussee bei der Ziegelei.

8. **V. lathyroides** L.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode.

136. Ervum Tourn.

2. **E. silvaticum** Peterm.

Rgbz. Hi. 3. Hainberg bei Sillium; 8. Steigerthal.

5. **E. tetraspermum** L.*Rgbz. S.* 4. Neuhaus, Lamstedt; 6. Misselwarden.*Rgbz. A.* Auf den Äckern der Marsch zerstreut.**139. Lathyrus Tourn.**3. **L. tuberosus** L.*Rgbz. Ha.* 3. Zwischen Lauenau und Pohle.4. **L. pratensis** L.Die Varietät: *L. sepium* Scopoli.*Rgbz. Hi.* 14. Bei Einbeck.7. **L. silvester** L.*Rgbz. S.* 2. Am Bahndamm zwischen Stade und dem Schwarzen Berge; 9. Am Weserufer bei Rönnebeck.Die Form *L. latifolius*.*Rgbz. Hi.* 8. Petersdorf.10. **L. paluster** L.*Rgbz. S.* 8. Oldenbüttel.11. **L. vernus** Bernh.*Rgbz. Hi.* 15. Am Wieter bei Northeim.13. **L. montanus** Bernh.*Rgbz. Hi.* 1. Am Landwehrgraben bei Peine; 8. Alter Stolberg.

XXX. Familie. DRUPACEEN DC.

141. Prunus L.4. **P. avium** L.*Rgbz. Hi.* 8. Windehäuser Holz, Hesseleisch.*Rgbz. O.* 8. Lintorf.

XXXI. Familie. ROSACEEN Juss.

142. Rosa Tourn.7. **R. tomentosa** Sm.*Rgbz. Hi.* 8. Falkenstein bei Niedersachswerfen.*Rgbz. S.* 8. In einer Hecke im Hoppenkamp bei Scharmbeck; 9. Bockhorn.Die Varietät: *R. venusta* Scheutz.*Rgbz. Hi.* 8. Alter Stolberg.*Rgbz. S.* 6. Drangstedt; 12. Scheessel, Hassendorf.

Die Varietät: *R. scabriuscula* Sm.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

Die Varietät: *R. cinerascens* Dumort.

Ang. Geb.: Rehseberg bei Walkenried.

Die Varietät: *R. subglobosa* Sm.

Rgbz. H. 8. Windehäuser Holz.

9. **R. canina** L.

Die Varietät: *R. sepium* Koch. Form. *pubescens*.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal, Petersdorfer Schluchten.

Die Varietät: *R. lutetiana* Léman.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthaler Höhen.

Rgbz. S. In der Oberwesermarsch.

Die Varietät: *R. dumalis* Bechstein.

Rgbz. Hi. 8. An der Stolberger Chaussee.

Rgbz. S. In der Oberwesermarsch.

Die Varietät: *R. biserrata* Méral.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

Die Varietät: *R. urbica* Léman.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz; 15. Northeim.

Rgbz. S. In der Oberwesermarsch.

Die Varietät: *R. glaucifolia* Op.

Rgbz. Hi. 8. An der Stolberger Chaussee bei Petersdorf.

Die Varietät: *R. eriostyla* Rap.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühler Schluchten.

10. **R. glauca** Vill. Form. *adenosepala*.

Rgbz. S. 5. In der Gegend von Westerwisch; 6. Zwischen Bederkesa und Fickmühlen.

Die Varietät: *R. subcanina* Christ.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle.

Die Varietät: *R. complicata* Christ.

Rgbz. Hi. 8. Schlucht über Steigerthal.

11. **R. dumetorum** Thuill.

Rgbz. Ha. 6. Um Nienburg.

Rgbz. Hi. 15. Northeim am Wieter.

Rgbz. S. In der Oberwesermarsch.

Die Varietät: *R. obtusifolia* Desv.

Rgbz. Hi. 8. Harzungen, Rüdigsdorf, Steigerthal.

Die Varietät: *R. ramealis* Pug.

Rgbz. Hi. 8. Rüdigsdorf.

Die Varietät: *R. Thuillieri* Christ.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz, Steigerthal.

Die Varietät: *R. trichoneura* Rip.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

12. ***R. coriifolia*** Fr. Form. *Cimbrica* Friderichsen.

Rgbz. S. 6. In Gebüsch zwischen Lehe und Langen.

Die Varietät: *R. frutetorum* Aut.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle, Crimderode, Windehäuser Holz, zwischen dem Wehrhäuschen und Schurzfell auf Kies, bei Petersdorf an der Chaussee beim Harzrigi.

Die Varietät: *R. subcollina* Christ.

Rgbz. Hi. 8. Wiegersdorf, Rüdigsdorf.

Die Varietät: *R. biserrata* Christ.

Rgbz. Hi. 8. Rüdigsdorf.

14. ***R. rubiginosa*** L.

Rgbz. A. 1. Norderney östlich von der Meierei.

Die Varietät: *R. comosa* Rip.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle, Steigerthal, Crimderode, Harzungen; 15. Northeim.

Die Varietät: *R. denudata* Gren.

Rgbz. Hi. 8. Hesseley bei Steigerthal.

Die Varietät: *R. umbellata* Leers.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal, Kuckucksmühle.

Die Varietät: *R. dimorphantus* Mts.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle.

15. ***R. micrantha*** Sm.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle, Rüdigsdorf.

Rgbz. S. 11. An dem nach Süden zu abfallenden Steilufer zwischen Baden und Uesen.

16. ***R. agrestis*** Savi.

Die Varietät: *R. pubescens* Rapin.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal, Crimderode, Rüdigsdorf.

Die Varietät: *R. arvatica* Pug.

Rgbz. Hi. 6. Vienenburg; 8. Kuckucksmühle.

17. **R. elliptica** Tausch.

Die Varietät: *R. calcarea* Christ.

Rgbz. III. 8. Steigerthaler Höhen.

Der Bastard: *R. canina* $\times$ *gallica* (*R. alba* L.).

Ang. Geb.: Bei Nordhausen verwildert.

143. **Rubus L.**1. **R. suberectus** Anderson.

Rgbz. III. 7. Grund; 8. Neustadt.

3. **R. plicatus** W. u. N.

Rgbz. HI. 8. Alter Stolberg; 9. Ravensberg, Lauterberg.

4. **R. nitidus** W. u. N.

Rgbz. HI. 15. Hammerstedter Grund bei Northeim.

5. **R. sulcatus** Vest.

Rgbz. III. 15. Semishai-Laube bei Northeim.

10. **R. affinis** W. u. N.

Rgbz. Ha. 3. Feggendorf.

ad 11. *R. candicans* Weihe.

Rgbz. HI. 15. Semishai-Laube und im Bürgerholz bei Northeim.

13. **R. villicaulis** Koehler.

Rgbz. III. 15. Hammerstedter Grund und Semishai-Laube bei Northeim.

15. **R. pubescens** W. u. N.

Rgbz. III. 8. Steigerthaler Höhen.

18. **R. silvaticus** W. u. N.

Rgbz. Ha. 10. Syke.

41. **R. vestitus** W. u. N.

Rgbz. Ha. 2. Gehrden.

42. **R. Menkii** W. u. N.

Rgbz. III. 8. Alter Stolberg.

45. **R. rudis** W. u. N.

Rgbz. HI. 7. Grund; 15. Hammerstedter Grund, Bürgerholz und Brunnen bei Northeim.

47. **R. Radula** Weihe.

Rgbz. III. 15. Semishai-Laube bei Northeim.

55. **R. Koehleri** W. u. N.

Rgbz. Ha. 1. An der Leine.

56. **R. Schleicheri** W. u. N.

Rgbz. Hi. 7. Herzberg.

59. **R. Bellardi** W. u. N.

Rgbz. Hi. 7. Im Sperrthal bei Andreasberg, Rehberger Graben; 15. Hammerstedter Grund bei Northeim.

ad 60. **R. dasyacanthos** G. Br.

Rgbz. Hi. 7. Rehberger Graben.

69. **R. saxatilis** L.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal, Alter Stolberg.

Rgbz. A. 5. Oldehufe.

144. **Geum** L.

2. **G. rivale** L.

Rgbz. S. 8. Stoteler Wald.

145. **Fragaria** L.

2. **F. moschata** Duchesne.

Rgbz. O. 7. Schleddehausen; 8. Schwagstorf.

3. **F. viridis** Duchesne.

Rgbz. Ha. 4. An den Steinbrüchen über Salzhemmendorf.

Rgbz. Hi. 2. Am Rande des Giesener Holzes am oberen Teiche; 5. Auf dem Kamme des Selter; 15. Am Wieter bei Northeim.

147. **Potentilla** L.

8. **P. reptans** L.

Fehlt auf dem Festlande Ostfrieslands.

10. **P. silvestris** Neck.

Die Varietät: *P. sciaphila* Zim.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode.

11. **P. verna** L.

Rgbz. Ha. 3. Pattensen.

17. **P. sterilis** Gcke.

Rgbz. L. 11. Tiergartenforst bei Lüneburg.

Der Bastard: *P. procumbens* × *silvestris*.

Rgbz. A. 4. Sandhorst, Ludwigsdorf.

148. *Alchemilla* Tourn.

1. *A. vulgaris* L.

Rgbz. S. 6. Zwischen Dorum und Padingbüttel, zwischen Altenwalde und Cuxhaven.

149. *Sanguisorba* L.

1. *S. officinalis* L.

Rgbz. O. 8. Büscherheide.

2. *S. minor* Scop.

Rgbz. Ha. 3. Altenhagen II, Hülsede.

150. *Agrimonia* Tourn.

1. *A. Eupatoria* L.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

Rgbz. A. Für Ostfriesland zweifelhaft.

151. *Spiraea* L.

2. *S. ulmifolia* Scop.

Rgbz. Hi. 8. In der Schlucht bei der Kuckucksmühle verwildert.

155. *Pirus* Tourn.

1. *P. communis* L.

Rgbz. Hi. 5. Rettberg bei Alfeld.

2. *P. Malus* L.

Rgbz. Ha. 10. Eschenhausen bei der Schule.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

Rgbz. A. 1. Norderney ein niedriger Busch; 5. Filsumer Gaste.

4. *P. domestica* Sm.

Rgbz. Hi. Windehäuser Holz ist zu streichen.

5. *P. Aria* Ehrh.

Rgbz. Hi. Die von Hampe für den Südharz angegebenen Standorte sind nicht zuverlässig.

6. *P. torminalis* Ehrh.

Rgbz. Hi. 2. Beaulieus Höhe bei Hildesheim; 3. Rettberg bei Alfeld; 11. Hengstberg bei Waake.

XXXII. Familie. ONAGRACEEN Juss.

156. *Epilobium* L.

2. *E. hirsutum* L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

Rgbz. S. 2. Deinstermühle bei Harsefeld; 4. Chaussee-
gräben bei Itzenbüttel und Neubaus, Nordahmer Gehölz;
6. Wehdener Damm; 7. Wulsdorf.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

11. **E. palustre** L.

Die Varietät: *E. lineare* Krause.

Rgbz. L. 3. Im Moore bei Lindwedel.

Die Bastarde:

E. parviflorum × *montanum*.

Rgbz. Ha. 8. Im Lindschlag bei Bassum.

Rgbz. Hi. 8. Ilfelder Thal.

E. obscurum × *parviflorum*.

Rgbz. Ha. 8. Im Lindschlag bei Bassum.

157. Oenothera L.

1. **O. biennis** L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau; 11. Diepholz.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

159. Circaea Tourn.

2. **C. intermedia** Ehrh.

Rgbz. Ha. 3. Im Burgholz bei Springe.

3. **C. alpina** L.

Rgbz. Ha. 3. Über dem Jagdschloss im Saupark; 9. Auf
der Vor- und Hohen Geest um Vilsen.

Rgbz. S. 5. Bei der Wassermühle im Dobrock.

XXXIII. Familie. HALORRHAGIDACEEN R. Br.

161. Myriophyllum Vail.

3. **M. alterniflorum** DC.

Rgbz. Ha. 5. Im Steinhuder Meer.

Rgbz. S. 8. Zwischen Ottersberg und Lilienthal.

XXXV. Familie. LYTHRACEEN Juss.

164. Peplis L.

1. **P. Portula** L.

Rgbz. Hi. 8. Am Kuhberg bei Crimderode.

XXXVIII. Familie. PORTULACACEEN Juss.

171. Montia Mich.

1. **M. minor** Gmel.

Rgbz. L. 6. Am Ausflusse des Ebsmoors bei Soltau.

2. **M. rivularis** Gmel.

Rgbz. Ha. 4. Ueber Hämelschenburg; 11. Diepholz.

Rgbz. L. 1. Warmbüchener Moor; 6. Soltau.

Rgbz. S. 6. Sievern; 8. Oldenbüttel.

Rgbz. A. An quelligen Orten der Geest und Vorgeest.

XXXIX. Familie. PARONYCHIACEEN St. Hil.

173. Corrigiola L.

1. **C. litoralis** L.

Rgbz. Hi. 8. Behra hinter Niedersachswerfen, im Zorgekies bei Niedersachswerfen.

Rgbz. A. 1. Am Süd-Wattstrand von Norderney.

174. Herniaria Tourn.

1. **H. glabra** L.

Rgbz. H. 2. Felder an der Bahnstrecke bei Letter.

Rgbz. S. 9. In der Gegend am Nordufer der Lesum und Wumme.

2. **H. hirsuta** L.

Auf Sandfeldern, an Ufern.

Rgbz. Ha. 1. Grabenrand am Wege durch die Lister Wiesen, nördlich der Celler Chaussee.

XLI. Familie. CRASSULACEEN DC.

209. Sedum L.

1. **S. maximum** Sut.

Rgbz. Ha. 11. Lemförder Berg.

2. **S. purpureum** Lk.

Rgbz. Ha. 5. Am Eisenbahndamm zwischen Dedensen und Luthe, an der Nienburger Chaussee hinter dem Aschenkrüge.

Rgbz. Hi. 15. Luttershausen.

Rgbz. L. 1. An der Chausseeböschung zwischen Bockmerholz und Wassel.

Rgbz. S. 4. An der Chaussee zwischen Neuhaus und Kadenberge, Geversdorf.

Rgbz. O. 8. Heithöfen.

Rgbz. A. 4. Egels, Walle, Wiesens, Haxtum.

6. **S. acre** L.

Die Varietät: *S. sexangulare* L.

Rgbz. O. 8. In Lintorf auf Alpers Gartenmauer, in Heithöfen auf der Mauer der Schule.

7. **S. boloniense** Loisl.

Rgbz. Ha. 3. Grabenrand beim Kirchhofe in Lauenau.

Rgbz. S. 6. Auf Dächern in Misselwarden; 7. An der Weser bei Geestendorf und Wulsdorf.

XLII. Familie. GROSSULARIACEEN DC.

211. Ribes L.

2. **R. alpinum** L.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz, Alter Stolberg.

4. **R. rubrum** L.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode.

Rgbz. A. 4. Egelser Wald.

XLIII. Familie. SAXIFRAGACEEN Vent.

212. Saxifraga L.

3. **S. tridactylites** L.

Rgbz. Hi. 2. Auf der Kirchhofsmauer in Kl. Giesen; 4. Auf dem Dreitsch bei Mehle.

4. **S. granulata** L.

Rgbz. Hi. 8. Triften bei Crimderode.

214. Parnassia Tourn.

1. **P. palustris** L.

Rgbz. Ha. 4. Gut Heinsen.

Rgbz. Hi. 4. Auf dem Dreitsch bei Mehle, Sehlede.

Rgbz. O. 8. Heithöfen.

XLIV. Familie. UMBELLIFEREN Juss.

220. Apium L.

1. **A. graveolens** L.

Rgbz. S. 6. Zwischen dem alten und neuen Deich bei Misselwarden.

227. Pimpinella L.

1. **P. magna** L.

Rgbz. A. 1. Auf Juist bei der Giftbude.

2. **P. saxifraga** L.

Die Varietät: *P. peteriifolia* Wallr. Form. *minima* Vocke.

Rgbz. Hi. 8. Triften über Steigerthal.

229. Sium L.

1. **S. latifolium** L.

Rgbz. Ha. 11. Diepholz.

230. Bupleurum Tourn.

1. **B. tenuissimum** L.

Rgbz. Hi. 8. Triften auf den Höhen bei der Kuckucksmühle.

Rgbz. L. 8. Heuersburg bei Lüchow.

Die Varietät: *B. nanum* DC.

Rgbz. Hi. 8. Bei der Kuckucksmühle.

4. **B. longifolium** L.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz ist zu streichen.

231. Oenanthe L.

2. **O. Lachenalii** Gmel.

Rgbz. S. 6. Neufeld bei Cappel, Wremen, Schmarren, Misselwarden, Padingbüttel-Altendeich.

3. **O. aquatica** Lmk.

Rgbz. Ha. 11. Dümmer See.

Rgbz. Hi. 8. Am Fusse des Windehäuser Holzes.

240. Selinum L.

1. **S. Carvifolia** L.

Rgbz. Hi. 8. Tiefenbacher Mühle.

241. Angelica L.

1. **A. silvestris** L.

Rgbz. Ha. 3. An der Aue bei Lauenau, im Deister.

Rgbz. Hi. 8. Stempeda.

252. Caucalis L.

1. **C. daucoides** L.

Rgbz. Hi. 4. Bei der Wittenburg, auf der Kendelke bei Mehle; 5. Rettberg bei Alfeld.

254. Torilis Adans.

3. **T. nodosa** Gärtn.

Rgbz. S. 6. Im Laude Wursten. Fraglich.

255. *Scandix* L.

1. *S. Pecten Veneris* L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau; 4. Salzhemmendorf.

Rgbz. Hi. 4. Bei der Wittenburg, auf der Kendelke bei Mehle; 5. Am Rande des Sackwaldes.

256. *Anthriscus* Hoffm.

3. *A. vulgaris* Pers.

Rgbz. S. 6. Am Deich bei Brinkamahof.

257. *Chaerophyllum* L.

2. *Ch. bulbosum* L.

Rgbz. Hi. 8. Kalte Wiede bei Niedersachswerfen.

Rgbz. S. 6. Im Lande Wursten fraglich.

259. *Conium* L.

1. *C. maculatum* L.

Rgbz. Ha. 11. Lemförde, Diepholz.

Rgbz. S. 3. Zwischen Hörne und Assel; 6. Dingen, Cappel, Schottwarden, Misselwarden, Mulsum, Dorum.

XLVI. Familie. CORNACEEN DC.

262. *Cornus* Tourn.

3. *C. suecica* L.

Rgbz. S. 6. Hymendorf.

XLVII. Familie. CAPRIFOLIACEEN Juss.

263. *Adoxa* L.

1. *A. Moschatellina* L.

Rgbz. Hi. 4. Limberg bei Mehle; 8. Bei der Sägemühle an der Ruine Hohnstein; 15. Im Suttmerholz bei Northeim.

265. *Sambucus* Tourn.

1. *S. nigra* L.

Die Varietät: *S. laciniata* Miller.

Rgbz. A. Eine Charakterpflanze von Ostfriesland.

2. *S. racemosa* L.

Rgbz. Ha. 1. Im Wietzenholze hinter Buchholz; 4. Kahnstein.

Rgbz. Hi. 4. In den Mehler Hölzern; 15. Am Wieter bei Northeim.

Rgbz. L. 3. Im Ahltener Wald.

XLVIII. Familie. RUBIACEEN DC.

269. Sherardia Dill.

1. **Sh. arvensis** L.

Rgbz. S. 4. Westersode, Oberndorf bei der Mühle.

270. Asperula L.

1. **A. arvensis** L.

Rgbz. Ha. 1. Auf einem Haferfelde in der Stadt-Masch eingeschleppt.

Rgbz. Hi. 13. Adelebsen.

271. Galium L.

4. **G. Aparine** L.

Die Varietät: *G. Vaillantii* DC.

Rgbz. Hi. 2. Gehrdenen Berg; 8. Felder bei Steigerthal.

Die Varietät: *G. spurium* L.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

Rgb. L. 3. Am Kronsberge.

5. **G. uliginosum** L.

Rgbz. Ha. 3. Am Wehr in der Aue bei Lauenau.

Rgbz. Hi. 8. Im Hesseley bei Steigerthal.

10. **G. verum** L.

Rgbz. S. 6. Am Strande zwischen Cuxhaven und Duhnen;

7. Am Deich bei Geestemünde.

11. **G. Mollugo** L.

Die Varietät: *G. elatum* Thuill.

Rgbz. H. 8. Windehäuser Holz.

Der Bastard: *G. verum* × *Mollugo*.

Rgbz. Ha. 3. Bei Nienfeld.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

14. **G. silvestre** Poll.

Rgbz. Ha. 11. Lemförder Berg.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

XLIX. Familie. VALERIANACEEN DC.

272. Valeriana Tourn.

2. **V. sambucifolia** Mik.

Rgbz. Ha. 10. Am Klosterbache hinter dem Marktplatze in Bassum.

273. Valerianella Poll.

1. **V. olitoria** Mnch.

Rgbz. S. 4. Brinkamahof; 6. Dingen, Schottwarden, Misselwarden, Wremen, Schmarren.

3. **V. dentata** Poll.

Rgbz. Hi. 1. Bei Peine.

L. Familie. DIPSACACEEN DC.

274. Dipsacus Tourn.

1. **D. silvester** Hudson.

Rgbz. O. 8. Wittlage.

2. **D. pilosus** L.

Rgbz. Ha. 3. Im Deister über Springe, vor Hülsede;

4. Polle.

Rgbz. Hi. 1. Bolzberg bei Peine; 8. Kalte Wiedeufer am Fusse des Kohnstein, Niedersachswerfen.

277. Scabiosa L.

1. **S. Columbaria** L.

Rgbz. Ha. 4. Bei Polle.

LI. Familie. COMPOSITEN Adans.

280. Petasites Tourn.

1. **P. officinalis** Mnch.

Rgbz. Ha. 2. Velber; 3. An der Aue bei Lauenau;

4. Lauenstein.

Rgbz. Hi. 1. Bei dem Kirchhofe des Dorfes Schmedenstedt.

Rgbz. O. 8. Wittlage, Lintorf.

281. Aster L.

10. **A. abbreviatus** Nees.

Rgbz. Hi. 8. Bei der Kuckucksmühle verwildert.

284. Erigeron L.

2. **E. acer** L.

Rgbz. Ha. 3. Hinter Hülsede, auf der Westeregge.

Rgbz. O. 8. Hülsede.

286. *Inula* L.

5. *I. Conyza* DC.

Rgbz. Ha. 3. Oberhalb Hilsede.

Rgbz. Hi. 1. In der Steingrube beim Bolzberg; 4. Limberg und auf der Kendelke bei Mehle.

6. *I. Britannica* L.

Rgbz. Ha. 3. Wiesen bei Messenkamp.

Rgbz. S. 6. Misselwarden.

287. *Pulicaria* Gärtn.

1. *P. vulgaris* Gärtn.

Rgbz. Hi. 8. Am Fusse des Kuhberges.

2. *P. dysenterica* Gärtn.

Rgbz. Hi. 4. Mehle; 15. Northeim.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

Rgbz. A. 2. Borkum.

Die Varietät: *P. squarrosa*.

Rgbz. Ha. 3. Springe.

Der Bastard: *P. dysenterica* × *vulgaris*.

Rgbz. Ha. 3. Bei Springe.

288. *Xanthium* Tourn.

3. *X. spinosum* L.

Rgbz. Ha. 1. An der Alten Peinerstrasse auf Äckern, verschleppt 1898.

290. *Galinsoga* R. u. Pay.

1. *G. parviflora* Cav.

Rgbz. Ha. 3. Hilsede; 5. Marienwerder.

Rgbz. S. 4. Neuhaus; 6. Misselwarden.

291. *Bidens* Tourn.

2. *B. cernuus* L.

Rgbz. Ha. 6. Wölpe, Holzbalge.

Rgbz. Hi. 1. Peine.

Die Varietät: *B. radiatus*.

Rgbz. Hi. 8. In der Zorge bei Niedersachswerfen.

292. *Rudbeckia* L.

2. *R. hirta* L.

Rgbz. S. 2. Auf einem Acker bei Ahrenswalde eingeschleppt.

293. *Filago* Tourn.

1. *F. germanica* L.

Rgbz. Ha. 1. Laatzen; 3. Meinsen; 11. Diepholz.

294. **Gnaphalium Tourn.**

3. **G. luteo-album** L.

Rgbz. Ha. 1. An den Kiesgruben bei Bemerode.

295. **Helichrysum Gärtn.**

1. **H. arenarium** DC.

Rgbz. Ha. 1. Gr.-Buchholz.

Rgbz. Hi. 1. Woltorf an den Sandgruben vor dem Holze.

Rgbz. S. 4. Wingst, Westerhamm, Bergkamp bei Neuhaus; 8. Am Bahndamm bei Freissenbüttel.

Rgbz. O. 8. Brokum.

297. **Cotula L.**

1. **C. coronopifolia** L.

Rgbz. S. 4. Geversdorf, Armstorf, Stinstedt; 5. Westermanna; 6. Dorum, Spaden, Krempel; 7. Bramstedt.

299. **Anthemis L.**

1. **A. tinctoria** L.

Rgbz. S. 4. Neuhaus. Eingeschleppt.

4. **A. Cotula** L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

Rgbz. S. 2. Hedendorf; 5. Süderende.

300. **Matricaria L.**

2. **M. discoidea** DC.

Rgbz. Ha. 1. An der Schwesternhausstrasse; 2. Bei den Salinen vor Badenstedt. Eingeschleppt 1898.

Rgbz. S. 8. Stubben auf dem Bahnhof. Eingeschleppt.

304. **Doronicum L.**

1. **D. Pardalianches** L.

Rgbz. S. 4. Bei Oberndorf verwildert.

306. **Senecio Tourn.**

1. **S. spatulifolius** DC.

Rgbz. Hi. 8. Leimbach, Kohnstein.

3. **S. paluster** DC.

Rgbz. L. 6. Brink bei Wolterdingen.

7. **S. vernalis** W. K.

Rgbz. Hi. 8. Neustadt, Rüdigsdorf.

Rgbz. L. 7. Flinten.

Rgbz. S. 8. Am Ehn bei Hülseberg.

Die Varietät: *S. eradiatus*.

Rgbz. Ha. 10. Beim Dorfe Freidorf.

8. **S. erucifolius** L.

Rgbz. Hi. 15. Am Wieter bei Northeim.

9. **S. Jacobaea** L. var. *discoideus* Koch.

Rgbz. Ha. 3. Bei Müllers Ruh im Deister bei Springe.

12. **S. nemorensis** L.

Rgbz. Hi. 8 Windehäuser Holz ist zu streichen; 15. Am Waldrand des Bürgerholzes bei Northeim.

13. **S. Fuchsii** Gmel.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

14. **S. saracenicus** L.

Rgbz. Hi. 4. Am Sahleufer bei Mehle.

308. Cirsium Tourn.

Die Bastarde:

C. oleraceum × *acaule* Hampe.

Rgbz. Ha. 3. Nienstedt, Meinsen.

C. oleraceum × *palustre*.

Rgbz. Ha. 3. Im Ranzen bei Lauenau.

310. Carduus Tourn.

4. **C. nutans** L.

Die Varietät: *C. subacaulis* Koch.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

Die Bastarde:

C. nutans × *crispus*.

Rgbz. Hi. 8. Schellenberg bei Steigerthal.

C. nutans × *acanthoides*.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle.

312. Lappa Tourn.

4. **L. nemorosa** Körnicke.

Rgbz. Ha. 3. Limberg, ausserhalb des Sauparks über der Sedemünder Papiermühle im Thale des Waltersbaches bei Nienstedt.

Rgbz. Hi. 15. Am Wieter bei Northeim.

Der Bastard: *L. officinalis* × *tomentosa*.

Rgbz. Hi. 8. Im Zorgekies bei Crimderode.

313. *Carlina* Tourn.

1. *C. acaulis* L.

Rgbz. Hi. 15. Am ersten Wieter, unterhalb des Weges.

314. *Serratula* L.

1. *S. tinctoria* L.

Rgbz. Ha. 4. Am Boxhorn bei Salzhemmendorf.

Rgbz. Hi. 8. Im Hesseley, Alter Stolberg.

316. *Centaurea* L.

1. *C. Jacea* L.

Rgbz. A. In Ostfriesland nur als Adventiv- und Ruderalpflanze auftretend.

Die Varietät: *C. decipiens* Thuillier.

Rgbz. Hi. 5. Rettberg bei Alfeld.

6. *C. Scabiosa* L.

Rgbz. Ha. 3. Zwischen Messenkamp und Nienstedt.

320. *Thrinicia* Rth.

1. *T. hirta* Rth.

Rgbz. Ha. 3. Vom Bahnhof Münden nach Theensen.

321. *Leontodon* L.

2. *L. hastilis* L.

Rgbz. Ha. 3. Meensen.

Die Varietät:

L. hispidus L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

Rgbz. S. 2. Dammhäuser Moor; 4. Westersode.

L. glabratus Koch.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthaler Triften.

324. *Tragopogon* Tourn.

2. *T. major* Jacq.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

3. *T. pratensis* L.

Rgbz. A. 2. Bei Schoonorth.

Die Varietät: *T. minor* Fr.

Rgbz. Hi. 15. Am Wieter bei Northeim.

326. *Podospermum* DC.

1. *P. laciniatum* Bisch.

Die Varietät: *P. subulatum*.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz, Harzungen, Rüdigsdorf.

327. *Hypochoeris* L.

1. *H. glabra* L.

Rgbz. S. 4. Lamstedt, Hackemühlen, Warstade.

328. *Achyrophorus* Scop.

1. *A. maculatus* Scop.

Rgbz. Hi. 7. St. Andreasberg.

329. *Taraxacum* Juss.

1. *T. officinale* Web.

Die Varietät: *T. palustre* DC.

Rgbz. A. Auf torfigen Wiesen an salzhaltigen Stellen, nicht auf den Inseln.

Die Varietät: *T. laevigatum* DC.

Rgbz. A. 1. Norderney auf der Schanze.

2. *T. erythrospermum* Wilms.

Rgbz. Hi. 2. Am Osterberge in der Nähe des Giesener Holzes.

330. *Chondrilla* Tourn.

1. *C. juncea* L.

Rgbz. Ha. 1. An der Mauer des Bemeroder Kirchhofes.

Rgbz. Hi. 8. Zwischen Osterode und Harzungen.

Rgbz. A. 1. Norden ist zu streichen.

334. *Sonchus* Tourn.

4. *S. paluster* L.

Rgbz. Ha. 5. Nöpke bei Neustadt a. Rbge.

335. *Crepis* L.

1. *C. foetida* L.

Rgbz. Ha. 4. Am Fusse des Eckberges bei Bodenwerder.

Rgbz. Hi. 5. Rettberg bei Alfeld; 8. Crimderode, Harzungen.

5. *C. tectorum* L.

Rgbz. S. 4. Lamstedt.

7. **C. paludosa** Mneh.

Rgbz. S. 4. Nordahn, Hackemühlen, Rahden.

8. **C. succisifolia** Tausch.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz, Alter Stolberg.

336. **Hieracium** Tausch.

4. **H. floribundum** W. u. Grab.

Rgbz. Hi. 8. Alter Stolberg.

5. **H. praealtum** Villars.

Rgbz. Hi. 8. Eichenforst, Kohnstein.

Die Varietät: **H. Bauhini** Besser.

Rgbz. Ha. 3. Lüddersser Berg.

10. **H. cymosum** L.

Rgbz. Hi. 8. Der Standort Windehäuser Holz ist zu streichen.

15. **H. bifidum** Kit.

Rgbz. Hi. 8. Todtenweg bei Urbach.

16. **H. caesium** Fr.

Rgbz. Hi. 8. Todtenweg bei Urbach.

18. **H. laevigatum** Willd.

Rgbz. S. 4. Zwischen Warstade und Basbeck.

Die Varietät: **H. tridentatum** Fries.

Rgbz. Hi. 8. Stolberger Chaussee.

21. **H. umbellatum** L.

Die Varietät: **H. abbreviatum** Hartm.

Rgbz. Ha. 10. Niehaus, Dimhäuser Haide.

Der Bastard: **H. silvestre** $\times$ **umbellatum**.

Rgbz. Hi. 8. Am Kohnstein.

LII. Familie. LOBELIACEEN Juss.

337. **Lobelia** L.

1. **L. Dortmanna** L.

Rgbz. S. 9. Farge.

LIII. Familie. CAMPANULACEEN Duby.

339. **Phyteuma** L.

1. **Ph. orbiculare** L.

Rgbz. Hi. 8. Ilfelder Thal.

2. **Ph. spicatum** L.

Rgbz. Ha. 11. Lemförder Berg.

Rgbz. S. 8. Stoteler Wald.

3. **Ph. nigrum** Schmidt.

Rgbz. S. 7. Adelstedt an einem Graben hinter der Schule.

340. Campanula Tourn.

5. **C. latifolia** L.

Rgbz. Hi. 8. Rothehütte.

6. **C. patula** L.

Rgbz. L. 4. Lamstedt.

7. **C. Rapunculus** L.

Rgbz. O. 8. Dahlinghausen.

10. **C. glomerata** L.

Rgbz. Ha. 3. Meinsen.

LIV. Familie. VACCINIACEEN.

343. Vaccinium L.

2. **V. uliginosum** L.

Rgbz. S. 2. Harsefeld; 14. Linteler Gehölz bei Lindorf.

3. **V. Vitis idaea** L.

Rgbz. Hi. 8. Karlshaus.

Rgbz. S. 4. Silberberg auf dem Dobrok; 14. Horst bei Tarmstedt, Hemel, Borchersdorf; 14. Linteler Gehölz.

4. **V. Oxycoccus** L.

Rgbz. Ha. 9. Hoya.

Rgbz. A. In den Mooren verbreitet.

LV. Familie. ERICACEEN Lindley.

334. Arctostaphylos Adans.

1. **A. Uva ursi** Spr.

Rgbz. Ha. 6. Bispingen.

345. Andromeda L.

1. **A. Polifolia** L.

Rgbz. O. 8. Wimmerheide.

LVI. Familie. RHODORACEEN Klotzsch.

348a. *Kalmia* L.

1. *K. angustifolia* L.

Rgbz. L. 1. Im Warmbüchener Moor, seit Jahren dort eingebürgert.

LVII. Familie. PIROLACEEN Lindley.

349. *Pirola* Tourn.

2. *P. rotundifolia* L.

Rgbz. Ha. 6. Nienburg.

Rgbz. L. 3. Misburg.

3. *P. media* Swartz.

Rgbz. Hi. 7. Am Jacob bei Andreasberg.

4. *P. minor* L.

Rgbz. S. 2. Meinkenhoop bei Harsefeld; 4. Nordahner Gehölz.

Rgbz. A. 5. Im Gehölz Kloster Barthe.

5. *P. uniflora* L.

Rgbz. S. 2. Meinkenhoop bei Harsefeld.

351. *Chimophila* Pursh.

1. *Ch. umbellata* Nutt.

Rgbz. L. 3. In einem Wäldchen bei Misburg.

352. *Monotropa* L.

1. *M. hypopitys* L.

Rgbz. S. 2. Landraths Tassen bei Harsefeld, Gehölz beim Steinbruch rechts der Chaussee Bliedersdorf-Harsefeld.

LXII. Familie. GENTIANACEEN Juss.

360. *Limnanthemum* Gmel.

1. *L. nymphaeoides* Lk.

Rgbz. Ha. 9. Im Bückener Moor.

Rgbz. S. 5. In einem Laufgraben südlich von Osterbruch.

Rgbz. A. 5. Meede bei Stieckhausen.

361. *Gentiana* Tourn.

1. *G. cruciata* L.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

3. *G. campestris* L.

Rgbz. Ha. 3. Westeregge bei Lanenau.

Rgbz. Hi. 4. Auf dem Dreitsch bei Mehle.

4. **G. baltica** Murbeck.*Rgbz. Hi.* 8. Wiesen bei Sophienhof.7. **G. germanica** Willd.Die Varietät: *G. strictior* Vocke.*Rgbz. Hi.* 8. Schluchten im Windehäuser Holze, Stempeda.8. **G. ciliata** L.*Rgbz. Ha.* 3. Zwischen Messenkamp und Nienstedt.*Rgbz. Hi.* 4. Auf dem Dreitsch bei Mehle.*Rgbz. O.* 8. Bei Barkhausen am Waldwege zum Esel.**362. Cicendia Adanson.**1. **C. filiformis** Delarbre.*Rgbz. O.* 8. Heithöfen.**363. Erythraea Richard.**1. **E. Centaurium** Persoon.*Rgbz. Ha.* 11. Diepholz.*Rgbz. S.* 6. In Misselwarden, in Dorum.*Rgbz. A.* 4. Am Deiche des Ems-Jade-Kanals.3. **E. pulchella** Fries.*Rgbz. Hi.* 1. In der Mergelgrube bei Schwiechelt.Die Varietät: *E. subacaulis* Vocke.*Rgbz. Hi.* 8. Windehäuser Holz.Der Bastard: *E. linariifolia* × *pulchella*.*Rgbz. A.* Ostfriesische Inseln.

LXIII. Familie. POLEMONIACEEN Lindley.

364. Polemonium Tourn.1. **P. coeruleum** L.*Rgbz. Hi.* 8. Ilfelder Thal ist zu streichen.**365. Collomia Nuttall.**1. **C. grandiflora** Douglas.*Rgbz. Ha.* 3. Am Bahndurchstich unter der Deisterpforte (99).

Ang. Geb.: Ellrich, Bodethal bei Altenbrak.

LXIV. Familie. CONVOLVULACEEN Juss.

366. Convolvulus Tourn.2. **C. Soldanella** L.*Rgbz. A.* 1. Norderney.

368. *Cuscuta* Tourn.

1. *C. europaea* L.

Rgbz. A. Für Ostfriesland zweifelhaft.

LXV. Familie. BORAGINACEEN Desv.

369. *Asperugo* Tourn.

1. *A. procumbens* L.

Rgbz. Ha. 2. Bei der Körting'schen Fabrik.

Rgbz. A. 1. Auf Norderney und bei Emden eingeschleppt.

370. *Lappula* Rupp.

1. *L. Myosotis* Moench.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

371. *Cynoglossum* Tourn.

1. *C. officinale* L.

Rgbz. Ha. 3. Im Steinbruche bei Nienstedt.

374. *Anchusa* L.

2. *A. arvensis* M. B.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

378. *Echium* Tourn.

1. *E. vulgare* L.

Rgbz. S. 7. Geestemünde am Deich bei dem Riedemannschen Petroleumschuppen, am Bahnhof Geestemünde.

380. *Myosotis* Dillen.

2. *M. caespitosa* Schultz.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

Rgbz. Hi. 1. Acker vor dem Hainholz bei Peine; 8. Gesundbrunnen bei Crimderode, Stempeda.

5. *M. silvatica* Hoffm.

Rgbz. Ha. 4. Kahnstein.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

LXVI. Familie. SOLANACEEN Juss.

382. *Solanum* L.

1. *S. nigrum* L.

Die Varietät: *S. glabratum*.

Rgbz. Hi. 8. Bei Crimderode eingeschleppt.

3. **S. alatum** Moench.

Rgbz. Ha. 1. Schuttplätze auf den Lister Wiesen; 3. Gestorf.

383. Physalis L.

1. **Ph. Alkekengi** L.

Rgbz. O. 8. Auf Gut Hünefeld.

LXVII. Familie. SCROFULARIACEEN R. Br.

389. Verbascum L.

2. **V. thapsiforme** Schrader.

Die Varietät: *V. cuspidatum* Schrader.

Rgbz. Hi. 8. Im Zorgebett bei Crimderode.

4. **V. Lychnitis** L.

Rgbz. Ha. 3. Im Saupark.

Der Bastard:

V. thapsiforme × *Lychnitis*.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode.

V. nigrum × *Lychnitis* Schiede.

Rgbz. Ha. 3. In einem Steinbruche in der Nähe der Hallerquellen.

390. Scrofularia Tourn.

2. **S. umbrosa** Dumortier.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau, Springe, Tienenberg, Süntel.

Rgbz. Hi. 1. Mergelgrube bei Schwiechelt; 2. Mastberg;

8. Zorgeufer, Krebsbachthal.

Rgbz. S. 4. Am Westerberge bei Lamstedt.

3. **S. vernalis** L.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

391. Antirrhinum L.

1. **A. Orontium** L.

Rgbz. Ha. 2. Letter.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle, Steigerthal.

Rgbz. O. 8. Wittlage.

392. Linaria Tourn.

1. **L. minor** Desf.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

2. **L. Cymbalaria** Miller.

Rgbz. Ha. 3. Domaine Lauenau.

Rgbz. Hi. 8. Neustadt.

3. **L. Elatine** Miller.

Rgbz. Ha. 3. Pohle.

Rgbz. Hi. 8. Urbach, Niedersachswerfen.

393. Gratiola L.

1. **G. officinalis** L.

Rgbz. Ha. 1. Am Bahndamm bei Herrenhausen eingeschleppt (98).

395. Limosella Lindern.

1. **L. aquatica** L.

Rgbz. Ha. 1. In einem Sumpfe in der Nähe des Stöckener Kirchhofes.

Rgbz. Hi. 8. Schurzfell, Kalte Wiede bei Crimderode.

Rgbz. L. 3. Bei Stelle.

Rgbz. S. 4. Bei Oberndorf.

396. Digitalis Tourn.

1. **D. purpurea** L.

Rgbz. Hi. 4. Im Mehler Holze.

Rgbz. S. 8. In Bergfelds Kiefern zwischen Freissenbüttel und Hülseberg eingeschleppt.

397. Veronica Tourn.

2. **V. Anagallis** L.

Rgbz. S. 9. Lesumer Moor; 11. Ufer der Wümme bei Fischerhude.

Die Varietät: *V. anagalloides* Guss.

Rgbz. S. 4. Neuhaus ist zu streichen.

Die Varietät: *V. aquatica* Bernhard.

Rgbz. Ha. 5. Neustadt.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal, Rüdigsdorf.

Rgbz. S. 4. Neuhaus, Geversdorf; 6. Otterndorf, Misselwarden; 11. Zwischen Sagehorn und Fischerhude.

Rgbz. A. 1. Lintel; 2. Borkum; 5. Oldehave, Stickelkamp.

11. **V. spicata** L.
Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.
15. **V. verna** L.
Rgbz. Ha. 3. Pattensen.
19. **V. Tournefortii** Gmelin.
Rgbz. S. 6. Wremen, Misselwarden, Padingbüttel.
20. **V. agrestis** L.

Die Varietät: *V. calycida* Fries.

- Rgbz. S.* 4. Auf Gemüsebeeten bei Neuhaus und Geversdorf.
21. **V. opaca** Fries.
Rgbz. Ha. 3. Rübenpflanzungen am westlichen Teile von Langenfeld.
22. **V. polita** Fries.
Rgbz. Ha. 3. Auf Kohlfeldern in Gestorf.

398. **Melampyrum Tourn.**

1. **M. cristatum** L.
Rgbz. Hi. 5. Rettberg bei Alfeld, am Rande des Sackwalds.
2. **M. arvense** L.
Rgbz. Hi. 5. Rettberg bei Alfeld, zwischen Brunkensen und Alfeld; 15. Levershausen.
3. **M. nemorosum** L.
Rgbz. Ha. 1. In Hecken bei Brink.

399. **Pedicularis Tourn.**

2. **P. palustris** L.
Rgbz. Ha. 5. Am Steinhuder Meer.
Rgbz. Hi. 1. Peine.

400. **Alectorolophus Haller.**

1. **A. minor** W. u. Greb.
Die Varietät: *A. fallax* Koch.
Rgbz. Ha. 3. Unter dem Hohenstein.
2. **A. major** Rehb.
Die Varietät: *A. hirsutum* Allioni.
Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

401. Euphrasia Tourn.1. **E. officinalis** L.

Die Varietät: *E. stricta* Schl.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

402. Lathraea L.1. **L. squamaria** L.

Rgbz. Hi. 4. Limberg bei Mehle; 8. Im Hesseley, Alter Stolberg.

Rgbz. S. 8. Bei Bredenbergr an zwei Stellen.

Ang. Geb.: Grüppenbüren.

LXVIII. Familie. OROBANCHACEEN Richard.

403. Orobanche L.3. **O. caryophyllacea** Smith.

Rgbz. Hi. 5. Am Heiligenhölzchen bei Langerholzen; 8. Alter Stolberg.

11. **O. purpurea** Jacquin.

Rgbz. Hi. 5. Am Rande des Sackwaldes über Sack.

LXIX. Familie. LABIATEN Juss.

404. Mentha Tourn.2. **M. silvestris** L.

Rgbz. Ha. 3. An der Aue bei Lauenau.

Rgbz. S. 4. Nordahn.

Die Varietät: *M. crispata* Schrader.

Rgbz. Hi. 8. Harzungen.

Die Varietät: *M. pubescens* Wirth. Form. *psilostachys*.

Rgbz. Hi. 8. Zorgeufer zwischen Nordhausen und Crimderode.

Die Bastarde:

M. aquatica × *silvestris*.

Rgbz. Ha. 3. In Hülse.

M. arvensis × *aquatica*.

Rgbz. Hi. 8. Zorgeufer zwischen Nordhausen und Crimderode; 15. Northeim.

M. arvensis × *crispata*.

Rgbz. Hi. 9. Oderbett bei Scharzfeld.

M. silvestris × *crispata*.

Rgbz. Ha. 3. An der Sambke bei Springe.

406. *Salvia* L.

1 a. *S. Sclarea* L.

Rgbz. Hi. 8. Bei Crimderode verwildert.

3. *S. pratensis* L.

Rgbz. Ha. 3. Am Wasserfall der Aue bei Lauenau.

Rgbz. Hi. 15. Levershausen.

Die Varietät: *S. micrantha* Wallr.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

Die Varietät: *S. laciniata* Wallr.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

4. *S. silvestris* L.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode.

5. *S. verticillata* L.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode.

407. *Origanum* Tourn.

1. *O. vulgare* L.

Rgbz. O. 8. Rabber.

408. *Thymus* Tourn.

1. *Th. Serpyllum* L.

Rgbz. A. Für Ostfriesland mit Sicherheit nur bei Hesel und bei Völlen, am Ems-Jade-Kanal eingeschleppt.

409. *Calamintha* Moench.

1. *C. Acinos* Clairville.

Rgbz. Hi. 1. Am Bolzberge bei Oelheim.

Rgbz. S. 4. Zwischen Westersode und Brockelbeck.

410. *Clinopodium* Tourn.

1. *C. vulgare* L.

Rgbz. Ha. 3. Messenkamp.

412. *Nepeta* L.

1. *N. Cataria* L.

Rgbz. S. 2. Bei Sanders Anlagen bei Stade eingeschleppt.

Die Varietät: *N. citriodora* Becker.

Rgbz. Hi. 8. An der Südseite des Kohnsteins bei Niedersachswerfen.

415. Lamium Tourn.**1. L. amplexicaule L.**

Die Varietät: *L. fallax* Flor. Siles. Uechtritz u. Fiek.

Rgbz. Ha. 4. Bei Hameln.

3. L. hybridum Vill.

Rgbz. Ha. 1. Grasdorf; 3. Bei Bennigsen am Fusswege nach Grasdorf.

Rgbz. S. 4. Oberndorf; 6. Dorumer Altendeich, Cappel, Dingen, Wremen, Misselwarden, Padingbüttel.

5. L. maculatum L.

Rgbz. S. 6. Fehlt im Lande Wursten.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

417. Galeopsis L.**1. G. Ladanum L.**

Die Varietät: *G. angustifolia* Ehrh.

Rgbz. Ha. 4. Polle.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthaler Triften.

Die Varietät: *G. viridis* Vocke.

Rgbz. Hi. 8. Im Porphyrsand bei Neustadt.

6. G. pubescenz Besser.

Rgbz. Hi. 8. Rüdigsdorf, Ilfelder Thal nahe der Thalmühle.

418. Stachys Tourn.**7. St. recta L.**

Rgbz. Hi. 4. Auf der Kendelke bei Mehle; 8. Braunsteinhäuser, Ilfelder Thal.

419a. Sideritis L.**1. S. montana L.**

Rgbz. Hi. 8. Bei Crimderode eingeschleppt.

420. Marrubium Tourn.**1. M. vulgare L.**

Rgbz. Hi. 4. Neben der Wittenburg; 8. Rüdigsdorf.

421. Ballote Tourn.**1. B. nigra L.**

Rgbz. S. 1. Steinkirchen; 2. Bliedersdorf, Harsefeld;

4. Lamstedt.

Rgbz. A. In Ostfriesland verbreitet.

422. Leonurus Tourn.

1. **L. Cardiaca** L.

Rgbz. Ha. 5. Marienwerder; 11. Diepholz.

Rgbz. S. 4. Lamstedt; 6. Bederkesa; 8. Brunshausen;
13. Tarmstedt.

2. **L. villosus** Desf.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode, dort vollkommen eingebürgert.

425. Brunella Tourn.

2. **B. alba** Pallas.

Rgbz. Hi. 8. Niedersachswerfen.

426. Ajuga L.

2. **A. genevensis** L.

Rgbz. Hi. 15. Levershausen.

4. **A. Chamaepitys** Schreber.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode, Harzungen.

427. Teucrium L.

1. **T. Scorodonia** L.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

2. **T. Botrys** L.

Rgbz. Hi. 4. Auf der Kendelke bei Mehle.

4. **T. montanum** L.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

LXX. Familie. VERBENACEEN Juss.

428. Verbena Tourn.

1. **V. officinalis** L.

Rgbz. Ha. 11. Diepholz, Lemförde.

LXXI. Familie. LENTIBULARIACEEN Richard.

429. Pinguicula Tourn.

1. **P. vulgaris** L.

Rgbz. S. 4. Am Balksee.

430. Utricularia L.

1. **U. vulgaris** L.
Rgbz. A. 2. Borkum ist zu streichen.
2. **U. neglecta** Lehmann.
Rgbz. A. 2. Borkum.
3. **U. intermedia** Hayne.
Rgbz. Ha. 5. Bei Mardorf.
Rgbz. A. Für Ostfriesland fraglich.
4. **U. minor** L.
Rgbz. Ha. 5. Winzlarer Moor.
Rgbz. A. 5. Friedeburg.

LXXII. Familie. PRIMULACEEN Ventenat.

431. Trientalis Rupp.

1. **T. europaea** L.
Rgbz. Ha. 1. Städtischer Föhrenkamp.
Rgbz. O. 8. Lintorf.
Rgbz. A. 3. Strooth bei Friedeburg.

432. Lysimachia Tourn.

1. **L. thyrsiflora** L.
Rgbz. Ha. 1. Lahe.
3. **L. vulgaris** L.
Die Varietät: *L. guestphalica* Weihe.
Rgbz. S. 4. Zwischen Neuhaus und Kadenberge, in der Nähe der Fähre bei Neuhaus, am Neuhäuser Kanal.

434. Centunculus Dill.

1. **C. minimus** L.
Rgbz. Ha. 3. Theensen.
Rgbz. L. 5. Fallingbostel.
Rgbz. S. 7. Bahnhof Geestemünde.

435. Androsace Tourn.

1. **A. elongata** L.
Rgbz. Hi. 8. Zorgebett zwischen Ilfeld und Niedersachsenwerfen.

436. Primula L.

3. **P. elatior** Jacquin.
Rgbz. Ha. 11. Diepholz, Lemförde.

4. **P. officinalis** Jaquin.

Die Varietät: *P. pannonica* Kerner.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz an steinigen Stellen zwischen lichtem Gebüsch.

437. Hottonia Boerhaave.

1. **H. palustris** L.

Rgbz. Hi. 4. Sehlde bei Mehle. -

LXXIII. Familie. PLUMBAGINACEEN Juss.

441. Statice L.

1. **S. Limonium** L.

Rgbz. S. 6. Auf den Aussendeichsländereien von Wremen bis zum Paddingbütteler Siel, Weddewarden.

LXXIV. Familie. PLANTAGINACEEN Juss.

442. Litorella Bergius.

1. **L. juncea** Bergius.

Rgbz. Ha. 1. Ziegelei bei Kirchrode.

443. Plantago L.

1. **P. major** L.

Die Varietät: *P. Winteri* Wirtgen.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

2. **P. media** L.

Rgbz. S. 4. Am Kanal zwischen Neuhaus und Kadenberge ausgesät; 6. Misselwarden.

Rgbz. O. 8. Bei Lintorf auf dem Esel.

3. **P. lanceolata** L.

Die Varietät: *P. capitellata* Sonder.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

6. **P. arenaria** W. u. K.

Rgbz. S. 4. Am Bahnhof bei Neuhaus eingeschleppt.

LXXVI. Familie. CHENOPODIACEEN Ventenat.

448. Salsola L.

1. **S. Kali** L.

Rgbz. S. 6. Im Lande Wursten fraglich.

450. *Chenopodium* Tourn.

7. *Ch. ficifolium* Smith.

Rgbz. Ha. 1. An der Masch auf Schutthaufen.

8. *Ch. polyspermum* L.

Rgbz. Ha. 10. Um Bassum.

Rgbz. S. 4. Oberndorf; 7. Bahnhof Geestemünde.

Die Varietät: *Ch. acutifolium* Kit.

Rgbz. Ha. 1. Bei Hannover.

9. *Ch. Vulvaria* L.

Rgbz. A. 1. Auf Norderney südlich vom Schiessstande.

11. *Ch. rubrum* L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

12. *Ch. glaucum* L.

Rgbz. Ha. 3. Zwischen Messenkamp und Hülsede.

454. *Atriplex* Tourn.

- 3a. *A. oblongifolium* W. u. K.

Trockene Hügel, Wege.

Rgbz. Hi. 8. Zorgeufer bei Crimderode. Geht jährlich mehr dem Harze zu.

LXXVII. Familie. POLYGONACEEN Juss.

455. *Rumex* L.

3. *R. conglomeratus* Murray.

Rgbz. S. 4. An der Oste bei Laumühlen.

9. *R. aquaticus* L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

Der Bastard: *R. Acetosa* × *Acetosella*.

Rgbz. Ha. 9. Eystrup ist zu streichen.

456. *Polygonum* Tourn.

1. *P. Bistorta* L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau, Messenkamp, Hülsede.

Rgbz. S. 8. Zwischen Westerbeck und Bargten.

Rgbz. O. 8. Osterkappeln.

Rgbz. A. 1. Norderney; 3. Aurich.

2. *P. amphibium* L.

Rgbz. A. 1. Norderney.

3. **P. lapathifolium** L.

Die Varietät: *P. prostratum* Wimmer.

Rgbz. S. 4. An der Oste bei Schwarzenhütten.

LXXVIII. Familie. THYMELAEACEEN Juss.

458. Daphne L.

1. **D. mezereum** L.

Rgbz. Hi. 4. In den Mehler Gehölzen; 15. Am Wieter bei Northeim.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

LXXXII. Familie. ARISTOLOCHIACEEN Juss.

462. Aristolochia L.

1. **A. Clematitis** L.

Rgbz. O. 8. Auf Gut Hünnefeld.

463. Asarum Tourn.

1. **A. europaeum** L.

Rgbz. Hi. 3. Im Wäldchen bei Gr. und Kl. Himstedt; 8. Alter Stolberg.

LXXXIII. Familie. EMPETRACEEN Nuttall.

464. Empetrum Tourn.

1. **E. nigrum** L.

Rgbz. Ha. 4. Schneereiner Moor, Kl. Heidorn.

Rgbz. L. 5. Krusenhausen bei Rietlhagen.

LXXXIV. Familie. EUPHORBIACEEN Juss.

465. Tithymalus Tourn.

8. **T. Cyparissias** Scopoli.

Rgbz. Hi. 2. Am Osterberge; 5. Am Rande des Sackwalds.

9. **T. Esula** Scopoli.

Rgbz. Ha. 9. Hoya; 11. Eisenbahndamm bei Diepholz.

Rgbz. Hi. 15. Northeim.

Rgbz. S. 2. Sanders Anlagen bei Stade; 5. Am Hader Kanal.

465. *Mercurialis* Tourn.

1. *M. perennis* L.
Rgbz. S. 4. Rhadener und Nordahner Gehölz.
Rgbz. A. Für Ostfriesland zweifelhaft.
2. *M. annua* L.
Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

LXXXV. Familie. CALLITRICHACEEN LA.

467. *Callitriche* L.

1. *C. stagnalis* Scop.
Die Varietät: *C. platycarpa* Kuetzing.
Rgbz. Hi. 8. Kalte Wiede.
3. *C. hamulata* Kuetzing.
Rgbz. Hi. 8. Kalte Wiede.

LXXXVI. Familie. CERATOPHYLLACEEN Gray.

468. *Ceratophyllum* L.

2. *C. demersum* L.
Rgbz. Ha. 5. Steinhuder Meer.

LCIII. Familie. CUPULIFEREN Richard.

479. *Quercus* Tourn.

2. *Q. sessiliflora* Smith.
Rgbz. S. 4. Fahlenberg, Wingst.

LCIV. Familie. BETULACEEN Richard.

483. *Alnus* Tourn.

1. *A. glutinosa* Gaertner.
Die Varietät: *A. macrocarpa* Vocke.
Rgbz. Hi. 8. Kuhberg auf Crimderoder Gebiet.
3. *A. serrulata* Willd.
In Wäldern angepflanzt.
Rgbz. Hi. 8. Kuhberg.

LCV. Familie. SALICACEEN Richard.

484. Salix Tourn.

1. **S. pentandra** L.

Rgbz. Hi. 1. Peine.

6. **S. purpurea** L.

Rgbz. Ha. 3. An der Aue bei Lauenau; 4. Polle.

Die Bastarde:

L. fragilis × *alba* (*S. Russeliana* Forbes).

Rgbz. Ha. 4. An der Aue bei Lauenau.

S. amygdalina × *viminalis* (*S. molissima* Ehrh.).

Rgbz. Ha. 3. Am Bache hinter Meinsen.

S. viminalis × *purpurea* (*S. rubra* Huds.).

Rgbz. Ha. 3. An der Aue bei Lauenau

Rgbz. Hi. 15. Northeimer Brunnen.

S. purpurea × *repens* (*S. Doniana* Smith.).

Rgbz. S. 4. Am Wege von Neuhaus nach Belum.

S. Caprea × *cinerea* (*S. Reichardtii* Kern.).

Rgbz. S. 4. Neuhaus.

XCVI. Familie. MYRICACEEN Richard.

486. Myrica L.

1. **M. Gale** L.

Rgb. Ha. 5. Winzlarer Moor.

II. Klasse. **Monocotylen.**

XCVII. Familie. HYDROCHARITACEEN DC.

487. Elodea, Richard und Michaux.

1. **E. canadensis** Rich. u. Mich.

Rgbz. Ha. 1. In der Wietze vor Langenhagen.

Rgbz. Hi. 8. Im Mühlengraben bei Crimderode.

Rgbz. L. 5. Bei Marklendorf.

Rgbz. S. 4. Hemm, Hemmoor, Bülkau-Austade-Spreuge;

6. Spaden.

Rgbz. A. 1. Juist; 5. Mitling-Mark.

488. *Stratiotes* L.

1. *S. aloides* L.
Rgbz. L. 5. Zwischen Marklendorf u. Buchholz, Westenholz.
Rgbz. S. 8. In der Hamme bei Worpsswede.

489. *Hydrocharis* L.

1. *H. Morsus ranae* L.
Rgbz. Ha. 7. Uchte; 11. Dümmer See.

XCVIII. Familie. ALISMACEEN Juss.

490. *Alisma* L.

3. *A. ranunculoides* L.
Rgbz. Ha. 11. Dümmer See.
4. *A. natans* L.
Rgbz. Ha. 8. Sulingen.
Rgbz. A. 4. Hatshusen.

491. *Sagittaria* L.

1. *S. sagittifolia* L.
Rgbz. Hi. 1. Bei Peine.

XCIX. Familie. BUTOMACEEN Richard.

492. *Butomus* Tourn.

1. *B. umbellatus* L.
Rgbz. Ha. 11. Diepholz, Dümmer See.
Rgbz. S. 8. Zwischen Osterholz und Scharmbeck, in der Hamme bei Worpsswede.

C. Familie. JUNCAGINACEEN Richard.

493. *Scheuchzeria* L.

1. *S. palustris* L.
Rgbz. S. 2. Moor hinter dem Gr. Villah bei Hammah;
3. Drochtersen-Ritscher-Bützflether Moor.
Rgbz. A. 4. Im Lengener Moore.

494. *Triglochin* L.

1. *T. palustris* L.
Rgbz. Ha. 11. Diepholz.

CI. Familie. POTAMEEN Juss.

495. *Potamogeton* Tourn.

1. *P. natans* form. *amphibia*.
Rgbz. Ha. 1. Vahrenwalder Heide.

2. **P. polygonifolius** Pourret.

Rgbz. S. 4. Wohlenbeck.

5. **P. alpinus** Balbii.

Rgbz. S. 4. Warstade, Balksee; 8. In der Billerbecke bei Stubben.

7. **P. gramineus** L.

Die Varietät: *P. terrestre-fluitans* Beckmann.

Rgbz. Ha. 1. Breite Wiese.

Die Varietät: *P. heterophyllus* Fr.

Rgbz. L. 1. Entenfang bei Celle.

Rgbz. S. 7. In den Gräben am Sellstedter See, Brameler Seite.

9. **P. lucens** L.

Die Varietät: *P. acuminata* Schumacher.

Rgbz. Ha. 5. Steinhuder Meer; 11. Dümmer See.

Rgbz. S. 4. In der Aue bei Kehdingbruch.

12. **P. perfoliatus** L.

Rgbz. Ha. 5. Steinhuder Meer.

Die Varietät: *P. gracilis* Fries.

Rgbz. S. 2. Bei Stade im Stadtgraben.

Die Varietät: *P. rotundifolius* Sond.

Rgbz. S. 10. Etelsen bei Achim in der Alten Aller.

13. **P. crispus** L.

Die Varietät: *P. serratus*.

Rgbz. Ha. 11. Lemförder Gräben.

Die Varietät: *P. planifolius*.

Rgbz. Hi. 8. Kalte Wiede.

14. **P. compressus** L.

Rgbz. S. 4. Bei Oberndorf am Zehntweg, Moordeich;

11. In Gräben am Bahndamm zwischen Sagehorn und Ottersberg.

15. **P. acutifolius** Link.

Rgbz. S. 4. Cadenberge, in der Aue zwischen Neuhaus und dem Bahnhof.

16. **P. obtusifolius** M. u. K.

Rgbz. S. 4. Mühlenteich bei Hackemühlen, Wahlenbecker Moor, bei der Basbecker Wassermühle, beim Balksee.

Ang. Geb.: Walkenrieder Teiche.

17. **P. mucronatus** Schrader.

Rgbz. Hi. 8. Der Standort Niedersachswerfen ist zu streichen.

Rgbz. S. In dem Landstriche zwischen Ottersberg und Lilienthal, nördlich der Wumme.

Rgbz. A. 3. Kattrepel ist zu streichen.

18. **P. pusillus** L.

Rgbz. Ha. 3. In Teichen bei Springe.

Rgbz. Hi. 8. Niedersachswerfen.

19. **P. rutilus** Wolfgang.

Rgbz. Ha. 10. In einem Bache zwischen der Bassumer und Apelstedter Ziegelei, hinter Wildeshausen an der Chaussee nach Ahlhorn, Eschenhausen.

20. **P. trichoides** Cham. u. Schld.

Rgbz. S. 3. In Gräben des Bützflether Aussendeichs;

4. Dingvörden, in Aussendeichsgräben bei Neuhaus.

Ang. Geb.: Walkenried.

22. **P. marinus** L.

Rgbz. S. 6. Bei Spieka-Neufeld fraglich.

Rgbz. A. Im Regierungsbezirk fraglich.

23. **P. densus** L.

Rgbz. Hi. 8. Tümpel an der Stolberger Chaussee.

Rgbz. S. 2. Zwischen Schölisch und Stadermoor; 3. Hamelvörderener Aussendeich; 11. Zwischen Sagehorn und Ottersberg.

Die Bastarde:

P. praelongus × *lucens*.

Rgbz. S. 2. Altluneberger See.

P. polygonifolius × *gramineus*.

Rgbz. A. 2. Borkum.

497. Zannichellia Micheli.

1. **Z. palustris** L.

Rgbz. Ha. 3. Bei der Bleiche in Springe.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

Die Varietät: *Z. major* Boenningh.

Rgbz. Hi. 8. Rosmannsbach bei Himmelgarten.

Die Varietät: *Z. pedicellata* Wahlenberg.

Rgbz. S. 6. In Binnendeichsgräben und Wasserlöchern;

7. Zwischen Bremerhaven und Brinkamahof.

III. Familie. LEMNACEEN L.

500. **Lemna L.**

1. **L. trisulca** L.

Rgbz. Ha. 1. In einem Graben der Döhrener Masch blühend (1897).

4. **L. polyrrhiza** L.

Rgbz. Ha. 5. Winzlarer Moor.

CIV. Familie. ARACEEN Juss.

502. **Calla L.**

1. **C. palustris** L.

Rgbz. Ha. 1. Breite Wiese; 11. Diepholz.

Rgbz. L. 5. In Moorgruben bei Westerholz.

CV. Familie. TYPHACEEN Juss.

504. **Typha Tourn.**

2. **T. angustifolia** L.

Rgbz. Hi. 8. In Ausschachtungen an der Stolberger Chaussee.

505. **Sparganium Tourn.**

6. **S minimum** Fries.

Rgbz. Ha. 6. Wölpe.

Rgbz. L. 5. Auf den Grindau-Wiesen westlich von Lindwedel.

Rgbz. S. 4. Neuhaus, Wohlenbeck; 7. Hosermühlen, Bramel, am Sellstedter See.

Rgbz. O. 8. Im Wimmer Bruch bei Lintorf.

Rgbz. A. 4. Zwischen Oldehufe und Bagband.

CVI. Familie. ORCHIDACEEN Juss.

506. **Orchis L.**

1. **O. purpurea** Hudson.

Rgbz. Ha. 4. Am Heinser Haag des Kabnsteins; 5. An einem grasigen Abhange des Sacker Feldes.

Rgbz. Hi. 4. Limberg bei Mehle.

Die Varietät: *O. moravica* Jacq.

Rgbz. L. 3. Im Ahltener Wald bei Misburg.

6. **O. Morio** L.*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal.*Rgbz. O.* 8. Lintorf.*Rgbz. A.* 3. Spiekeroog.8. **O. laxiflora** Link.Die Varietät: *O. palustris* Jacq.*Rgbz. Hi.* 1. Auf einer sumpfigen Wiese beim Dorfe Schmedenstedt.12. **O. incarnata** L.*Rgbz. Ha.* 9. Wöpser Moor.*Rgbz. S.* 8. Zwischen Bredenbeck und Scharmbeckstotel, auf der grossen Weide bei Barenwinkel.*Rgbz. A.* 1. Norderney.**507. Gymnadenia R. Br.**1. **G. conopea** R. Br.*Rgbz. Ha.* 3. Feggendorf.*Rgbz. L.* 6. Soltau; 7. Uelzen.*Rgbz. O.* 8. Im Wimmer Bruch bei Lintorf.**508. Platanthera Richard.**1. **P. bifolia** Rehb.*Rgbz. A.* 1. Norderney westlich von der Meierei.2. **P. chlorantha** Custer.*Rgbz. S.* 6. Im Walde bei Tetendorf; 8. Stoteler Wald.**509. Ophrys L.**1. **O. muscifera** Hudson.*Rgbz. Hi.* 8. Giebichenhagen bei Neustadt.2. **O. apifera** Hudson.*Rgbz. Hi.* 5. Am Rettberg bei Alfeld, oberhalb Hoersum. (Im Juli 1898 wurden am ersteren Standorte 15, am letzteren 60 Exemplare beobachtet.)**512. Epipogon Gmelin.**1. **E. aphyllus** Schwartz.*Rgbz. Hi.* 2. Finkenberg; 8. Eichenforst, Alter Stolberg.**513. Cephalanthera Richard.**1. **C. grandiflora** Babington.*Rgbz. Hi.* 4. Limberg bei Mehle.*Rgbz. O.* 8. Dahlinghausen.

3. **C. rubra** Richard.

Rgbz. Hi. 5. Rettberg bei Alfeld.

514. Epipactis Richard.

1. **E. latifolia** Allioni.

Rgbz. Ha. 10. Friedeholz bei Bassum: 11. Lemförder Berg.

Rgbz. L. 2. Clieversberg bei Fallersleben.

Rgbz. S. 2. Im Deepen-Wehm bei Ahrensmoor.

2. **E. violacea** Durand Duquesney.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz, Hesseley.

4. **E. microphylla** Schwartz.

Rgbz. Hi. 8. Giebichenhagen bei Neustadt.

5. **E. palustris** Crantz.

Rgbz. S. 8. Zwischen Linteln und Barenwinkel.

Rgbz. O. 8. Wimmer.

515. Listera R. Br.

1. **L. ovata** R. Br.

Rgbz. S. 7. Im Gehölz bei Hassbüttel, an der Billerbecke bei Stubben.

2. **L. cordata** R. Br.

Rgbz. Hi. 8. Die Standorte Neustadt und Ilfelder Thal sind zu streichen.

516. Neottia L.

1. **N. Nidus avis** Richard.

Rgbz. Ha. 4. Am Heinser Hang des Kahnsteins.

Rgbz. Hi. 1. Bei der Oberger Ziegelei.

Rgbz. L. 3. Im Andertenschen Interessentenforst; 6. Bei Soltau im Kuhbach.

Rgbz. S. 4. Im Gehölz bei Rahden.

517. Spiranthes Richard.

1. **S. autumnalis** Richard.

Rgbz. Hi. 4. Auf dem Dreitsch bei Mehle.

518. Goodyera R. Br.

1. **G. repens** R. Br.

Rgbz. L. 3. Fuhrberger Holz.

521. *Malaxis* Swartz.

1. *M. paludosa* Swartz.

Rgbz. S. 1. An der Este bei Fischbeck; 13. Bei Siegerts Kolonat bei Bremervörde.

522. *Cypripedium* L.

1. *C. Calceolus* L.

Rgbz. Hi. 5. An einem grasigen Abhang des Sacker Feldes.

CVIII. Familie. AMARYLLIDACEEN R. Br.

526. *Leucoium* L.

1. *L. vernum* L.

Rgbz. Ha. 3. Im Süntel.

CIX. Familie. LILIACEEN DC.

529. *Gagea* Salisbury.

5. *G. minima* Schultes.

Rgbz. Hi. 1. Harzberg bei Peine.

6. *G. lutea* Schultes.

Rgbz. Ha. 10. Zwischen Osterbinde und Eschenhausen.

Rgbz. Hi. 4. Limberg bei Mehle.

Rgbz. S. 4. Gebüsch bei Rahden, Warstade, bei Cadenberge, Nordahner Gehölz.

530. *Fritillaria* L.

1. *F. Meleagris* L.

Rgbz. S. 2. An der Alten Schwinge bei Stade.

531. *Lilium* Tourn.

1. *L. bulbiferum* L.

Rgbz. S. 2. Am Bahndamm bei Seemanns Gasthaus in der Nähe von Stade; 7. Nesse, Stotel.

2. *L. Martagon* L.

Rgbz. Hi. 2. Im Giesener Holze; 4. Auf der Vinie hinter Wittenburg; 15. Im Wieter bei Northeim.

532. *Anthericum* L.

2. *A. ramosum* L.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal, Windehäuser Holz.

533. *Ornithogalum* Tourn.

1. *O. umbellatum* L.

Rgbz. Ha. 11. Diepholz.

Rgbz. S. 8. Freissenbüttel.

Rgbz. A. 5. Auf der Filsumer Gaste.

535. *Allium* L.

1. *A. ursinum* L.

Rgbz. Hi. 8. Kaulberg, Alter Stolberg.

8. *A. vineale* L.

Rgbz. Hi. 8. Kuckucksmühle; 15. Am Wieter bei Northeim, Levershausen.

Rgbz. S. 4. Am Ostedeich bei Neuhaus.

9. *A. scorodoprasum* L.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

10. *A. oleraceum* L.

Rgbz. Ha. 4. Brevörde bei Polle.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

536. *Endymion* Dumortier.

1. *E. non scriptus* Garcke.

Rgbz. S. 4. Im Park des Geesthof.

538. *Narthecium* Moehring.

1. *N. ossifragum* Hudson.

Rgbz. Ha. 11. Lemförde.

542. *Polygonatum* Tourn.

1. *P. verticillatum* Allioni.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

543. *Paris* L.

1. *P. quadrifolius* L.

Rgbz. S. 4. Gehölz bei Rhaden, Neuhaus; 8. In Hecken bei Westerbeck.

Rgbz. O. 8. Lintorf.

CX. Familie. COLCHICACEEN DC.

1. *C. autumnale* L.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

CXI. Familie. JUNCACEEN Bartling.

545. *Juncus* Tourn.

4. *J. glaucus* Ehrhart.
Rgbz. S. 4. Neuhaus, Hemm; 6. Spadener Moor.
6. *J. filiformis* L.
Rgbz. Ha. 5. Winzlarer Moor.
9. *J. acutiflorus* Ehrhart.
Rgbz. A. Fehlt auf den Inseln.
10. *J. obtusiflorus* Ehrhart.
Rgbz. Ha. 3. Am Wege zum Ranzen bei Lauenau.
Rgbz. Hi. 1. Peine.
17. *J. Gerardi* Loiseleur.
Rgbz. Ha. 3. Lauenau.
Rgbz. Hi. 1. In der Mergelgrube bei Schwiechelt.
18. *J. Tenageia* Ehrhart.
Rgbz. Ha. 3. Am Wege zum Ranzen bei Lauenau.
Rgbz. A. Für Ostfriesland noch nicht nachgewiesen.
19. *Juncus bufonius* L. var. *fascicularis* Bertoloni.
Rgbz. Ha. 1. Bei Pattensen.

546. *Luzula* Desvaux.

5. *L. multiflora* Lejeune.
Die Varietät: *L. congesta* Lejeune.
Rgbz. S. 8. Oldenbüttel.
7. *L. sudetica* Presl.
In Bergwäldern.
Rgbz. Hi. 8. Am Rehberger Graben, Brocken.

CXII. Familie. CYPERACEEN Juss.

549. *Cladium* Patr. Br.

1. *C. Mariscus* R. Br.
Rgbz. Ha. 5. Mardorf.

550. *Rhynchospora* Vahl.

2. *Rh. fusca* R. u. Schultes.
Rgbz. Ha. 6. Wölpe.
Rgbz. S. 4. Zwischen Lamstedt und Rahden; 8. Freissenbüttel; 13. Wistedt.

551. *Heleocharis* R. Br.

2. *H. uniglumis* Link.

Rgbz. S. 3. Asseler Moor.

552. *Scirpus* Tourn.

2. *S. pauciflorus* Lightfoot.

Rgbz. Ha. 3. Springe.

Rgbz. S. 4. Lamstedt, Hackemühlen, Basbeck, Rallden.

3. *S. parvulus* R. u. Schultes.

Rgbz. Hi. 6. Bei Salzgitter.

3. *S. fluitans* L.

Rgbz. L. 5. Bei Lindwedel in der Nähe der Mühle.

Rgbz. S. 6. Im Veermoor zwischen Spaden und Depstedt, im Westermoor und Wohlenbecker Moor, am Neuhaus-Bülkauer Kanal; 8. Zwischen Ottersberg und Lilienthal, Giehlermühlen; 10. Verden.

5. *S. setaceus* L.

Rgbz. S. 8. Garlstedt, Vorwohlde, Barenwinkel.

7. *S. Tabernaemontani* Gmelin.

Rgbz. Ha. 3. Zwischen Lauenau und Meinsen.

8. *S. triqueter* L.

Rgbz. S. 3. An der Oste auf der Braak.

9. *S. pungens* Vahl.

Rgbz. A. 5. An der Leda bei Leer.

10. *S. maritimus* L.

Die Form.: *L. compacta* Hoffm.

Rgbz. Ha. 3. Hallerburg bei Eldagsen.

Rgbz. A. 3. Langeoog.

13. *S. compressus* Persoon.

Rgbz. Ha. 3. Bensen am Süntel.

553. *Eriophorum* L.

3. *E. polystachyum* L.

Rgbz. Hi. 1. Peine; 8. Kuckucksmühle, Rothehütte.

4. *E. latifolium* Hoppe.

Rgbz. Hi. 1. Peine.

Rgbz. S. 4. Moor bei Nordahn; 8. An der Billerbecke bei Stubben.

Rgbz. A. In Ostfriesland nicht häufig; 4. Ihloverfehn.

554. Carex Micheli.**1. C. dioica L.***Rgbz. S.* 8. Scharmbeck, Oldenbüttel.Die Varietät: *C. Metteniana* C. B. Lehm.*Rgbz. S.* 8. Oldenbüttel.**3. C. pulicaris L.***Rgbz. S.* 6. Im Veermoor zwischen Spaden und Depstedt; 8. Freissenbüttel, Hasbüttel, Stubben; 13. Tarmstedt.**11. C. muricata L.***Rgbz. S.* 6. Schottwarden, Wremen, Schmarren, Misselwarden; 7. Vierhofen bei Geestendorf, an der Geeste bei Lehe; 8. Schäferberg bei Oldenbüttel.**12. C. virens Lmke.***Rgbz. Ha.* 3. Am Deister oberhalb Springe.**14. C. paniculata L.***Rgbz. A.* 6. Bei Weener.**21. C. elongata L.***Rgbz. A.* 4. Eickebuch nahe bei der Ehe.**23. C. canescens L.**

Die Varietät:

C. laetevirens Ascherson.*Rgbz. Ha.* 10. Im Friedeholze bei Harpstedt.*C. subloliacea* Anderson.*Rgbz. Ha.* 9. Wachendorf, Vilsen; 10. Im Friedeholze bei Harpstedt.**28. C. Goodenoughii Gay.**Die Varietät: *C. turfosa* Fries.*Rgbz. Ha.* 6. Nienburg; 10. Im Garbruch bei Bassum.**29. C. acuta L.**Die Varietät: *C. personata* Fries.*Rgbz. Hi.* 1. Im Torfmoor hinter Telgte.**32. C. limosa L.***Rgbz. S.* 2. Zwischen dem Stader Moor und Kl. Villah;

3. Zwischen dem Asseler Moor und Gr. Villah; 10. Verden.

Rgbz. A. 3. Friedeburg; 4. Im Lengener Moor.**34. C. tomentosa L.***Rgbz. Hi.* 8. Windehäuser Holz, Alter Stolberg; 14. An Hube bei Einbeck.**35. C. ericetorum Pollich.***Rgbz. S.* 2. Hagen.

38. **C. pilulifera** L.

Rgbz. Hi. 2. Am Rüensiek über Söhre; 8. Kuhberg; 14. Adelebsen.

Rgbz. A. Nicht auf den Inseln.

Die Varietät: *C. longibracteata* Lge.

Rgbz. Ha. 9. Vilsen, Wachendorf; 10. Friedeholz bei Bassum, Rollinghausen.

43. **C. nitida** Host.

Rgbz. Hi. Das Vorkommen dort ist zu streichen.

46. **C. glauca** Murray.

Rgbz. Ha. 3. Zwischen Lauenau und Meinsen.

Rgbz. S. 4. Lamstedt, am Westerberge, am Hader Kanal zwischen Baum und Mardenhörn, am Balksee; 8. Schäferberg und Kattenhorn bei Freissenbüttel.

50. **C. silvatica** Hudson.

Rgbz. A. 5. Holte im Oberledingerlande.

52. **C. Hornschuchiana** Hoppe.

Rgbz. Ha. 4. An der Weser bei Hameln.

Rgbz. S. 4. Rahden; 6. Spadener Moor; 8. Schäferberg und Heimelberg bei Freissenberg.

Die Varietät: *C. atra* Buchenau.

Rgbz. S. 4. Zwischen Wohlenbeck und Basbeck.

54. **C. distans** L.

Rgbz. Hi. 8. Kuhberg, Gumpe.

Rgbz. S. 4. Aussendeichwiesen bei Neuhaus; 6. An der Geeste bei Lehe und nach Spaden zu.

Rgbz. A. 5. In den Heseler Kämpen.

55. **C. flava** L.

Rgbz. S. 8. Zwischen Bredenbergr und Scharmbeckstotel.

Die Varietät: *C. cyperoides* Marss.

Rgbz. Ha. 1. Auf der Bult bei den Kugelfängen.

Rgbz. A. 1. Norderney.

56. **Pseudo-Cyperus** L.

Rgbz. S. 4. Auf dem Dobrock, Schuppenfeld, Hemmoor; 6. Am See bei Bederkesa.

57. **C. rostrata** Withering.

Die Varietät: *C. latifolia* Ascherson.

Rgbz. Ha. 9. Bruchhausen; 10. Im Moor bei Ringmar.

Rgbz. A. Im Moore.

59. **C. acutiformis** Ehrhart.

Die Varietät: *C. Kochiana* DC.

Rgbz. L. 13. Zwischen Moisburg und Heimbruch.

Rgbz. S. 2. Am Neukloster Holz, im Rübker Moor, im Gr. Bracken bei Harsefeld; 4. Zwischen Neuhaus und Kadenberge.

62. **C. filiformis** L.

Rgbz. S. 4. Basbeck, Westersode, Brummermoor bei Warstade; 6. Spadener Moor nach Lehe zu.

63. **C. hirta** L.

Die Varietät: *C. hirtaeformis* Pers.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode, Rossmannsbach, Windlücke.

Rgbz. S. 5. Misselwarden; 8. Zwischen Buschhausen und Barenwinkel.

Die Bastarde:

C. paniculata × *remota* (*C. Bönninghausiana* Weihe).

Rgbz. S. 2. Hattorf; 4. In der Nähe des Forsthauses Dobrock hinter dem Pavillon.

C. flava lepidocarpa × *Hornschuchiana* (*C. Lentzii* Kneucker).

Rgbz. S. 8. Schäferberg bei Freissenbüttel, zwischen Buschhausen und dem Stoteler Wald.

C. Hornschuchiana × *flava*.

Rgbz. S. 6. Im Spadener Moor.

CXIII. Familie. GRAMINEEN Juss.

560. **Hierochloa** Gmelin.

1. **H. odorata** Wahlenberg.

Rgbz. Ha. 1. Hiddestorf.

Rgbz. S. 6. Wremen, Misselwarden, Mulsum, Dorum, Padingbüttel.

561. **Anthoxanthum** L.

2. **A. Puellii** Lec. u. Lamotte.

Rgbz. L. 3. Feldweg am vorderen Gehölz bei Misburg.

Rgbz. S. 4. Auf der Herrlichkeit bei Westersode; 8. Auf Äckern beim Gut Elm.

Rgbz. A. 2. Borkum.

562. **Alopecurus** L.

1. **A. pratensis** L.

Rgbz. A. Nur spärlich vorkommend.

2. **A. agrestis** L.

Rgbz. Ha. 1. Bei der Kleefelder Ziegelei.

Rgbz. S. 3. Am Aussendeich bei Krummendeich; 4. Am Eisenbahndamm bei Warstede-Basbeck, Hemm, Bülsdorf; 6. Im Lande Wursten; 7. An der Unterelbe verbreitet.

563. Phleum L.

3. **Phl. asperum** Villars.

Rgbz. S. 10. Bei Verden eingeschleppt.

567. Calamagrostis Adanson.

1. **C. lanceolata** Rth.

Rgbz. Ha. 3. Messenkamp, Meinsen.

4. **C. epigeios** Roth.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz, Alter Stolberg.

Rgbz. S. 8. Elm bei Scharmbeck.

Die Varietät: *C. glauca* Rehb.

Rgbz. S. 8. Oldenbütteler Gehölz.

6. **C. varia** Link.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

7. **C. arundinacea** Roth.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

569. Milium L.

1. **M. effusum** L.

Rgbz. A. 3. Im Gehölz Hopels, Egels.

570. Stipa L.

1. **St. pennata** L.

Rgbz. Hi. 8. Die Pflanze des Windehäuser Holzes ist die Varietät: *St. Grafiana* Steven.

572. Sesleria Scopoli.

1. **S. coerulea** Arduino.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz, Alter Stolberg.

573. Koeleria Persoon.

2a. **K. albescens** DC. Auf den ostfriesischen Inseln, wurde früher für *K. glauca* DC. gehalten.

574. *Aira* L.

4. *A. discolor* Thuillier.

Rgbz. Ha. 5. Mardorf.

Rgbz. A. 3. Wittmund.

577. *Arrhenatherum* PB.

1. *A. elatius* M. u. Koch.

Rgbz. S. 8. Bahndamm bei Oldenbüttel, zwischen Osterholz und Linteln.

Rgbz. A. 4. Gut Eschen.

578. *Avena* Tourn.

8. *A. caryophyllea* Weber.

Rgbz. Hi. 8. Kuhberg.

Rgbz. S. 4. Bei Heessel; 7. Am Kirchhof bei Wulsdorf, Brunshausen, Seebeck.

9. *A. praecox* PB.

Rgbz. Hi. 8. Kuhberg.

581. *Melica* L.

1. *M. ciliata* L.

Rgbz. Hi. 8. Der Standort Alter Stolberg ist zu streichen.

3. *M. uniflora* Retzius.

Rgbz. Hi. 8. Alter Stolberg, Steinberg.

Rgbz. S. 14. Im Hollah bei Kuhstedt.

582. *Briza* L.

1. *B. media* L.

Rgbz. S. 6. Zwischen Misselwarden und Engbüttel an der Landstrasse.

585. *Poa* L.

4. *P. serotina* Ehrhardt.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

5. *P. Chaixi* Villers.

Rgbz. Hi. 8. Neustadt; 13. Adelebsen.

8. *P. compressa* L.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

587. *Catabrosa* PB.

1. *C. aquatica* PB.

Rgbz. S. 4. Warstade, Basbeck; 6. In Gräben in Sievern;

9. St. Magnus.

Rgbz. A. 4. Am Südrande des Ihlover Holzes, Grossefehn, Ulbergen, Aurich.

592. *Festuca* L.

3. *F. myuros* Ehrhart.

Rgbz. Ha. 10. An der Chaussee hinter der ersten Brücke vor Ringmar.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode, Stolberger Chaussee.

Rgbz. S. 10. Verden.

6. *F. heterophylla* Haenke.

Rgbz. Ha. 4. Um Hameln.

9. *F. gigantea* Villers.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

Rgbz. O. 8. Rabber.

10. *F. arundinacea* Schreber.

Rgbz. Ha. 3. Lauenau.

593. *Brachypodium* PB.

1. *B. silvaticum* R. u. Schultes.

Rgbz. S. 2. Auf dem Gr. Bracken bei Harsefeld.

2. *B. pinnatum* PB.

Rgbz. Ha. 3. Über Bakede am Knick; 4. Salzhemmen-
dorf, Polle.

Rgbz. S. 8. Bei Oldenbüttel am Eisenbahndamm, beim Gasthaus und am Bahnhof eingeschleppt.

594. *Bromus* L.

2. *B. racemosus* L.

Rgbz. Ha. 1. Auf Schuttstellen in den Lister Wiesen.

Rgbz. A. 1. Norderney, Juist.

4. *B. arvensis* L.

Rgbz. Ha. 3. Auf dem Wege nach dem Ranzen bei Lauenau.

Rgbz. A. 4. Bei Aurich eingeschleppt.

6. *B. asper* Murray.

Die Varietät: *B. serotinus* Beneken.

Rgbz. Ha. 4. Polle.

Rgbz. Hi. 15. Am Wieter bei Northeim.

7. **B. erectus** Hudson.

Rgbz. Ha. 3. Bachränder am Fahrweg nach Köllnisch Feld, am Wege nach dem Ranzen bei Lauenau.

Rgbz. S. 6. An der Landstrasse von Misselwarden nach Engbüttel.

Rgbz. A. 4. Am Kanaldeich eingeschleppt.

8. **B. inermis** Leysser.

Rgbz. Ha. 3. Pattensen.

Rgbz. L. 3. Auf dem Kronsberg.

597. Elymus L.

1. **E. europaeus** L.

Rgbz. Hi. 14. Einbecker Wald.

599. Lolium L.

3. **L. temulentum** L.

Rgbz. A. Aus Ostfriesland noch nicht bekannt.

Die Varietät: *L. arvense* Withering.

Rgbz. Ha. 10. Bei Eschenhausen auf Leinäckern.

4. **L. remotum** Schrank.

Rgbz. S. 8. Freissenbüttel, Wellhöfen.

Gymnospermen.

CXIV. Familie. CONIFEREN Juss.

603. Juniperus Tourn.

1. **J. communis** L.

Rgbz. S. 6. Ringstedt; 7. Frelsdorf; 13. Auf der Geest in der Gegend von Zeven.

Rgbz. A. 5. Bei Langholt.

Kryptogamen.

CXV. Familie. EQUISETOREEN DC.

608. Equisetum L.

1. **E. arvense** L. Form. *decumbens* G. F. W. Meyer.

Rgbz. Ha. 10. Im Karrenbruch bei Bassum.

2. **E. maximum** Lmk.

Rgbz. Ha. 3. Am Deister bei Blumenhagen, an der Chaussee von Lauenau nach Einbeckhausen.

Rgbz. Hi. 5. Am Selter; 15. Zwischen Imbshausen und Westerhof.

3. **E. silvaticum** L.

Rgbz. Ha. 3. Breite Holz bei Springe.

Rgbz. S. 8. Hülseberg, Büttel.

Rgbz. A. 4. Ihlover Gehölz, Oldehufe Beningafehn, zwischen Strudden und Etzel.

Die Varietät: *E. serotinum* A. Br.

Rgbz. Ha. 3. Westlich von Müllers Ruh bei Springe.

6. **E. limosum** L. Form. *Linnaeanum* Döll.

Rgbz. Ha. 10. Bei Osterbinde.

Rgbz. Hi. 15. In den Bahnausschachtungen bei Northeim.

Form. *polystachyum* Ly.

Rgbz. Ha. 10. Im Karrenbruch bei Bassum.

Form. *uliginosum* Mühlenberg.

Rgbz. S. 10. In Tümpeln an der Weser.

Rgbz. A. 2. Borkum.

7. **E. hiemale** L.

Rgbz. S. 4. Auf dem Dobrock, Nordahner Holz.

CXVI. Familie. LYCOPODIACEEN DC.

1. **L. Selago** L.

Rgbz. S. 4. Westerberg; 7. Zwischen Wellen und Beverstedt in der Nähe der Lüne; 8. Hülseberg; 13. Im Gehölz bei Freiensen, zwischen Badenstedt und Kirchtimbte.

2. **L. annotinum** L.

Rgbz. Ha. 10. Im Ringmarer Bruch, im Forstort „Dicker Sünder“, in der Dämse bei Alten Marhorst.

Rgbz. S. 2. Im Meinkenhoop bei Harsefeld.

Rgbz. A. 3. Bei Marx.

5. **L. clavatum** L.

Rgbz. Ha. 3. Am Nesselberge bei Altenhagen.

Rgbz. Hi. 4. In den Mehler Gehölzen; 8. Am Kuhberg bei Niedersachswerfen.

6. **L. complanatum** L.

Rgbz. S. 8. Bei Garlstedt unter Kiefern.

Die Varietät: *L. Chamaeryparissus* A. Br.

Rgbz. Ha. 5. Im Moore bei Schneeren.

Rgbz. S. 4. Zwischen Lamstedt und Nordahn, zwischen Lamstedt und Hackemühlen, am Balksee, Westerberg; 6. Zwischen Neuenwalde und Debstedt; 13. Kirchtimpte.

CXVIII. Familie. ISOËTACEEN Bartling.

611. Isoëtes L.

1. **I. lacustris** L. Form. *curvifolia*.

Rgbz. S. 7. Im Wollingster See.

CXXI. Familie. OPHIOGLOSSACEEN R. Br.

614. Botrychium Swartz.

1. **B. Lunaria** Swartz.

Rgbz. Ha. 10. Bei Bassum an der Bremer Chaussee.

Rgbz. L. 8. Bergen a. D.

Rgbz. S. 8. Am Bahndamm bei Mühle.

Rgbz. A. 1. Juist.

4. **B. Matricariae** Sprengel.

Rgbz. A. 1. Norderney ist zu streichen.

CXXII. Familie. OSMUNDACEEN R. Br.

616. Osmunda L.

1. **O. regalis** L.

Rgbz. Ha. 5. Winzlarer Moor, Schneererener Moor.

Rgbz. L. 1. An der Wittbeck bei Wittbeck, Wolthausen;

3. An der Chaussee nach Walsrode hinter Mellendorf.

Rgbz. A. 5. Stiekelkamp, Oldehufe, im Wilden Moor.

CXXIII. Familie. POLYPODIACEEN R. Br.

617. Ceterach Willd.

1. **C. officinarum** Willd.

Rgbz. Ha. 4. An der Kirchhofsmauer in Ärzten ist zu streichen.

619. *Phegopteris* Fée.

1. *Ph. polypodioides* Fée.

Rgbz. Ha. 3. Breite Holz bei Springe; 5. Am Südostende des Ricklinger Moores.

2. *Ph. Dryopteris* Fée.

Rgbz. Ha. 3. Burgholz bei Springe, im Ranzen bei Lauenau.

Rgbz. O. 8. Hüsede.

3. *Ph. Robertiana* A. Br.

Rgbz. Ha. 3. Unter der Deisterwarte.

Rgbz. Hh. 6. An der alten Chaussee Goslar-Zellerfeld.

621. *Aspidium* R. Br.

1. *A. lobatum* Swartz.

Rgbz. Ha. 4. Am Breitenstein.

Rgbz. Hh. 7. Im Kleinen Totenthal bei Hahnenklee;

8. Hufhaus.

622. *Polystichum* Roth.

1. *P. Thelypteris* Roth.

Rgbz. Ha. 5. Am Ufer des Steinhuder Meeres östlich von Steinhude, Winzlarer Moor.

Rgbz. S. 6. Wehdener Moor bei Wehdenerdamm, im Veermoor zwischen Spaden und Debstedt; 7. Cassebrucher Gehölz.

2. *P. montanum* Roth.

Rgbz. Ha. 1. Am Nordrande des Föhrenwaldes auf der Mecklenheide, Städtischer Föhrenkamp; 3. Breite Holz bei Springe.

Rgbz. A. 4. Sandhorst.

3. *P. Filix mas* Roth. Form. *bifidum*.

Rgbz. Ha. 4. Bodenwerder.

4. *P. cristatum* Roth.

Rgbz. Ha. 7. Winzlarer Moor; 11. Diepholz.

5. *P. spinulosum* DC.

Die Varietät: *P. dilatatum* DC.

Rgbz. Ha. 3. Breite Holz bei Springe.

Rgbz. A. Auf der Heide und am Saum der Moore.

Das Bastard: *P. cristatum* × *spinulosum* Milde.

Rgbz. Ha. 8. Im Moor bei Bokel.

Rgbz. L. 2. Gifhorn.

634. *Asplenium* L.

1. *A. Trichomanes* L.

Rgbz. Ha. 3. In Lauenau.

Rgbz. O. 8. Hüsede, Essen, Wehrendorf.

3. *A. Ruta-muraria* L.

Rgbz. Ha. 3. An der Mauer der Barsinghäuser Klosterkirche, in Lauenau.

Die Varietät:

A. pseudo-serpentine Milde.

Rgbz. Ha. 4. An alten Mauern in Hasperde.

A. leptophyllum Luerssen.

Ang. Geb.: An Mauern in Pyrmont.

6. *A. Felix femina* Bernhadi.

Die Varietät: *A. fissidens* Döll.

Rgbz. Ha. 10. Siekholz bei Bassum.

Die Varietät: *A. pruinatum* Moore.

Rgbz. Ha. 4. Bodenwerder.

636. *Blechnum* L.

1. *B. Spicant* Withering.

Rgbz. Ha. 4. Bei Altenhagen am Nesselberge; 5. An der Nienburger Chaussee vor dem Aschenkrug.

Rgbz. Hi. 4. In den Mehler Gehölzen.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover](#)

Jahr/Year: 1897-1899

Band/Volume: [48-49](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Dicotylen 128-200](#)