© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

Das Vorkommen und die stratigraphische Stellung der „humeralis-Schichten" im nordwestdeutschen Weissen Jura.

Vortrag, gehalten zu Hannover in der Herbst-Hauptversammlung des Niedersächsischen geologischen Vereins am 19. Oktober 1912.

Von **Fr. Schöndorf** in Hannover.

Inhaltsübersicht.

		Seite
1.	Geschichtliches	24
2.	Charakteristik der „Zone der *Rhynchonella pinguis*" nach Heinr. Credner 1863/65	27
3.	Charakteristik der „Zone der *Terebratula humeralis*" nach C. Struckmann 1878	30
4.	Fossilliste der „*humeralis*-Schichten" nach C. Struckmann und Heinr. Credner	33
5.	Die „*humeralis*-Schichten" im Weißjuraprofil am Bahnhof Linden-F. bei Hannover	36
6.	Kritische Bemerkungen zu der von Heinr. Credner mitgeteilten Fossilliste	40
7.	Kritische Bemerkungen zu der von C. Struckmann mitgeteilten Fossilliste	49
8.	Die Wirbeltierfauna der „*humeralis*-Schichten"	55
9.	Die „*humeralis*-Schichten" am Harz bei Goslar	58
10.	Die „*humeralis*-Schichten" am Ith und Selter	59
11.	Die „*humeralis*-Schichten" am Deister, Süntel und Wesergebirge	61
12.	Zusammenfassung	61

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover

Jahr/Year: 1909-1911

Band/Volume: 60-61

Autor(en)/Author(s): Schöndorf Friedrich

Artikel/Article: Das Vorkommen und die stratigraphische Stellung der „humeralis-Schichten“ im nordwestdeutschen Weissen Jura. 3023