

# Ameisenfauna

## von Elberfeld und Umgegend.

Herr Josef von Hagens zu Düsseldorf, Landgerichtsrath a. D., früher in Elberfeld und Mitglied unseres Vereins, ein Kenner der Ameisen, hat die Güte gehabt, mir ein Verzeichniss der in hiesiger Gegend von ihm aufgefundenen Arten dieser Insecten-Familie zuzustellen.

Indem ich dieses Verzeichniss mit den von Herrn v. Hagens dazu gegebenen Notizen über Menge, specielle Fundorte etc. hier folgen lasse, bemerke ich, dass die allein von Hr. v. H. aufgefundenen Arten mit †, die allein von mir entdeckten mit \* bezeichnet, und die von uns Beiden gesammelten ohne weitere Bezeichnung geblieben sind. — Die systematische Anordnung und eingeklammerte Bemerkungen rühren von mir her.

Elberfeld, Juli 1878.

Cornelius, Oberlehrer a. D.

---

### I. Gruppe Formicidae.

1. *Camponotus ligniperdus* Latreille, häufig (besonders im Haardtbusch in hohlen Bäumen und auf Wegen).
2. *Lasius fuliginosus* Ltr., häufig (in morschen Bäumen, stark glänzend und riechend).
3. „ *niger* Linné-*fuscus* Foerster, häufig (Colonien in freier Erde, in Gärten, an Bäumen, selbst in Häusern).
4. „ *brunneus* Ltr.-*timidus* Foerstr., seltener.
5. „ *flavus* de Geer, häufig (u. a. auf der Haardt).
6. „ *umbratus* Nylander, seltener (u. a. an den Sandgruben bei der Lüntenbeck).
7. „ *mixtus* Nyl., dessgl.
8. „ *affinis* Schenck, dessgl.
- \* 9. „ *alienus* Foerstr., (selten).

10. *Formica rufa* L., im Barmer Wald (Boltenberg, nur 1 mal einen hohen Haufen gefunden, überhaupt nicht häufig).
11. *Formica pratensis* de G.-congerens Nyl., häufig.
12. „ *sanguinea* Ltr., sehr häufig.
13. „ *rufibarbis* Fabricius-cunicularis Ltr., dessgl.
14. „ *fusca* Ltr.-glebaria Foerstr., häufig (z. B. am Kisberge).
- \* 15. „ *gagates* Olivier — *picea* Nyl., (selten).
16. *Tapinoma erraticum* Ltr., Nützenberg (unter Steinen) nicht selten.

## II. Gruppe *Poneridae*.

17. *Ponera contracta* Ltr., selten (hinter der Varresbeck unter Steinen, ♂ ♂ auch im Gaswasser).

## III. Gruppe *Myrmicidae*.

- † 18. *Stenamamma Westwoodii* Stephens, selten, bei *Formica pratensis* gefunden 27. Juni 1863.
19. *Leptothorax acervorum* Fb., häufig, Nützenberg unter Steinen.
- † 20. *Leptothorax muscorum* Nyl., dessgl.
- \* 21. *Strongylognathus testaceus* Schenck, (selten).
22. *Tetramorium caespitum* L., häufig.
23. *Asemorhopterus lippulum* Nyl., selten, besonders ♀, das ♂, am 21. October 1864 auf Steinpfosten a. d. Wupper gefunden, war bisher noch unbekannt.
24. *Myrmica ruginodis* Nyl., häufig (besonders auch im Gaswasser).
25. „ *laevinodis* Nyl., dessgl.
26. „ *scabrinodis* Nyl., dessgl.
27. „ *lobicornis* Nyl., seltener.
- \* 28. „ *rugulosa* Nyl., dessgl.
29. *Myrmecia Latreillei* Curtis, selten.

Die Zahl der hier aufgeführten Arten macht beinahe den dritten Theil der in ganz Europa vorkommenden (94) Arten aus.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Elbersfeld](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Cornelius Carl

Artikel/Article: [Ameisenfauna von Elbersfeld und Umgegend 103-104](#)