

Mitteilungen aus dem Provinzial-Herbarium.

Von

Beckhaus, Superintendent.

(Fortsetzung.)

Es sind sämtliche Exemplare des Herbars berücksichtigt, so weit sie innerhalb der Provinz gesammelt und so weit sie geordnet sind; die noch ungeordneten sind mit den Standorten bereits im Repertorium angegeben:

Ordo: **Campanulaceae.**

Lobelia Dortmannia L. Moorteiche des Ladberger Feldes b. Lotte (sehr schöne lange vielbl. Ex. ! Fleddermann). Im kleinen Wechter Moorteich (Fldd.). Bei Neuhaus (Fldd.).

Jasione montana L. Münster (Wilms), Tecklenburg (Borgstette), Höxter sehr selten (Beckhaus).

var. simplex, einköpfig, bis kurz unter den Blütenkopf beblättert, mit Blattrieben. Wehdem am Fuß der kahlen Horst (Bs.). Von *perennis* Lam. durch kleine Statur und wellige Blätter verschieden, sehr rauhhaarig.

(Phyteuma orbiculare L. nur von Schellrode. Wittich).

Ph. spicatum L. Typicum Freudenberg (Dr. Utsch) Mittelform mit bläulichen Narben und Knospen. Münster b. Heithorn (Ws.), Albersloh (Holtmann), Höxter (Bs.).

Ph. nigrum, Schm. Lotte (Fldd.).

Campanula glomerata Kuriker Berg (Bachmann). Form *farinosa* (Anderz.), Beckum (Hn.), Ahlen (Lahm), Form *aggregata* (W.) Höxter (Bs.).

(C. Cervicaria L. Nur von Erfurt. Wittich.)

C. rotundifolia L. Münster (Ws), Lotte (Fldd.) *var. tenuifolia* Münster (Wienkamp), eadem *parviflora* Höxter (Bs.), *var. montana* Winterberg (Bs.), *var. albiflora* Hilstrup (Ws.).

C. patula L. Münster (Ws. Wilms jun.), Höxter (Bs.).

C. Rapunculus L. Münster (Bmn.), Freudenberg (U.).

C. persicifolia L. Hohensyburg (Ws.), Tecklenburg (Ws. jun.), *forma albiflora* et *albo-coerulea* Höxter (Bs.), *forma pubescens* Beverungen (Bs.).

C. rapunculodes L. Münster (Ws.), *albiflora* Höxter (Bs.), *parviflora* Höxter (Bs.), *var. racemo homomallo* Höxter (Bs.).

C. Trachelium L. Münster (Ws.), Tecklenburg (Borgst.), *albiflora* Höxter (Bs.), *glomerata parviflora* Höxter (Bs.).

Specularia Speculum DC. Rheine (Ws.), Lengerich (Ws. jun., Fldd.).

Sp. hybrida DC. Oelde (Hn.), Paderborn (Bs.).

Ordo: **Ericaceae.**

(Vaccinium Myrtillus L. Nur von Oldenburg. Overbeck).

V. Vitis Idaea L. Münster (Ws. Ws. jun. Lahm).

- Vaccinium uliginosum** L. Münster (Ws.), Ibbenbüren (Fldd.).
V. Oxycoccus L. Telgte (Ws.), Freudenberg (U.).
Andromeda polifolia L. Münster (Ws. Lahm), Lippstadt (Dr. H. Müller *var. latifolia*), Wesel (Ws. jun.), Rheine (Fldd. 1 Ex. 9 blütig) !
Arctostaphylos Uva ursi Spr. Silberberg b. Osnabrück (Fldd.).
Calluna vulgaris Salisb. Münster (Ws. Bn.), Lotte (Fldd.).
Erica Tetralix L. Münster (Ws.), *var. pallescens* Münster (Ws.), *albiflora* Münster (Ws.).
Pirola rotundifolia L. Albersloh (Hn.).
P. media Sw. Astenberg (Bs.), Münster (Ws. Halte ich für *rotundifolia*!).
P. minor L. Albersloh (Ws. Bn.), Lengerich (Lahm), Oelde (Hn.), Burgsteinfurt (Lahm), Höxter (Bs.), Rheine (Fldd.).
P. secunda L. Wehden (Bs.), Paderborn (Bs.), Lippspringe (Bs.), Albersloh (Hn.), Wilda b. Warburg (Everken).
Monotropa Hypopitys L. a. *hirsuta* Münster (Ws.), Albersloh (Hn.), Lotte (Fldd.).
 b. *glabra* Detmold (Bs.), Salzkotten (Dr. H. M.), Tecklenburg (Ws. jun.).

Ordo: **Aquifoliaceae.**

- Ilex Aquifolium** L. Lengerich (Ws. jun.), *forma heterophylla culta* (Ws.).

Ordo: **Oleaceae.**

- Ligustrum vulgare** L. Münster q. sp. (Ws.).
Syringa vulgaris L. Münster culta (Ws.).
Fraxinus excelsior L. Münster (Ws.).

Ordo: **Asclepiadeaceae.**

- Cynanchum Vincetoxicum** R. Br. Lengerich (Ws. jun. Fldd.), *forma scandens* Höxter (Bs.). (Eine *var. ramosa* von Haimbach am Rhein Fldd.)

Ordo: **Apocynaceae.**

- Vinca minor** L. Münster (Ws. Ws. jun.), *forma fol. variegatis* Höxter (Bs.).

Ordo: **Gentianaceae.**

- Menianthes trifoliata** L. Freudenberg (N.).
Limnanthemum nymphaeodes LK. Gaesdonk (Lahm).
Gentiana cruciata L. Kuriker Berg (Hn.), Münster (Ws.), Diestedde (Hn.), Rhoden (Stöcker), Wever (Dr. H. M.).
G. Pneumonanthe L. Münster (Bn. Lm.), Rheine (Fldd.), *f. angustifolia* Münster (Ws.).
G. campestris L. Seddinghausen am Haar (Dr. H. M.), Lengerich (Fldd.).
G. Amarella B. Albersloh (Hn.), Lotte (Fldd.), *var. uliginosa* Münster (Ws. Bn.).
G. germanica W. Lengerich (Ws. Ws. jun.), Hamm (Ws.), Lotte (Fldd.), *f. pallens* Höxter (Bs.).
G. ciliata L. Lengerich (Ws. jun.), Hamm (Ws.), Lünninghausen (Hn.), Lotte (Fldd.), Altenberge (Fldd.).

- Cicendia filiformis** Rchb. Münster (Ws. Bn.), Albersloh (Hn.), Rheine (Fldd.).
Erythraea Centaurium Pers. Münster (Ws.).
E. pulchella Fr. Lengerich (Ws.), Münster (Bn.), *f. major* Lotte (Fl.).

Ordo: **Convolvulaceae.**

- Convolvulus arvensis** L. Münster (Ws.), *albiflorus* Rheine (Ws.).
C. sepium. Lotte (Fldd.).
Cuscuta europaea L. Münster (Ws.), Lotte (Fldd.), *var. Viciae* Höxter (Bs.).
C. Epithymum L. Münster (Bn.), Lotte (Fldd.), *f. pallens* Lippspringe (Bs.),
var. Trifolii (Bab.), Lemgo (Ws.), Lippe (Echterling).
C. Epilinum Whl. Freudenberg (N.), Münster (Ws. jun.), Lotte (Fldd.).
Cuscutina suaveolens Pfeiff. Höxter (Bs.).

Ordo: **Asperifoliaceae.**

- Lappula Myosotis** Mch. Warburg (Bs.).
Cynoglossum officinale L. Hönnethal (Ws.), Altenberge (Lahm), Liesborn (Hn.),
Lotte (Fldd.).
Borago officinalis L. q. Sp. Fledd.
Anchusa officinalis L. Wesel (Ws. jun.).
A. arvensis MB. Tecklenburg (Ws. jun. Bgst.).
Symphytum officinale L. a. *album* Freudenberg (N.), *fol. lanceolatis* Höxter
(Bs.), *micrantha* Brakel (Bs.), b. *patulum* Wllr. Vreden (Ws.).
Echium vulgare L. Münster (Ws.), *albiflorum* Höxter (Bs.), Freudenberg (U.),
parviflorum (sed stamin. exclusis) Rheine (Ws.).
Pulmonaria officinalis L. a. *obscura* Dum. Blattstiel noch einmal so lang als
die Platte, in der Form des Blattes kein wesentlicher Unterschied. Münster
(Ws. Bn.), Burgsteinfurt (Ws.), Osnabrück (Ws. jun.), b. *fol. maculatis* Lies-
born (Hn.), Höxter (Bs.). Zwei ausgezeichnete Exempl. von Xanten (Ws. jun.).
(P. montana Lej. Lüdenscheid, erst später eingeschickt.)
Lithospermum arvense L. Münster (Ws.), Tecklenburg (Bgst.).
L. officinale Münster (Ws. Bn.), Albersloh (Hn.).
L. purpureo-coeruleum L. Höxter (Bs.).
Myosotis palustris Rth. *f. grandiflora* Höxter (Bs.), *f. montana* Astenberg (Bs.).
M. cespitosa Sch. Münster (Ws. Bn.).
M. silvatica Hffm. Ennigerloh, Lippborg (Hn.), Münster (Bn.), Lippspringe (Bs.),
lactea Höxter (Bs.).
M. intermedia LK. Münster (Ws.), Lotte (Fldd.).
M. hispida Schl. Münster (Ws.), Höxter (Bs.).
M. versicolor Sm. Münster (Bn.), Schwerte (Ws.).
M. stricta LK. Münster (Ws.), Osnabrück (Fldd.).

Ordo: **Solanaceae.**

- Solanum nigrum.** Münster (Ws.), Lotte (Fldd.), *var. stenopetalum* A. Br.,
Höxter (Bs.), *var. chlorocarpum* Höxter (Bs.), *var. moschatum* Höxter (Bs.).
S. miniatum Bernh. Höxter (Bs.).

(*Solanum humile* Rhede ist nicht dieses.)

S. Dulcamara L. Münster (Ws.), Lotte (Fldd.), *f. albiflorum* Münster (Ws.).

Physalis Alkekengi L. Höxter (Bs.).

Atropa Belladonna. Lotte (Fldd.).

Lycium barbarum L. Münster (Ws.), Tecklenburg (Bgst.).

Hyoseyamus niger L. Höxter (Bs.), Rheine (Lm.).

Datura Stramonium L. Drensteinfurt (Hn.), Osnabrück (Fldd.).

Ordo: **Personatae.**

Verbascum Thapsus L. Münster (Ws.), *var. montanum* (Schrad.) Tecklenburg (Bgst. Ws. jun.).

V. Thapso-nigrum. Höxter (Bs.).

(**V. nigro-thapsiforme.** Münster bot. Garten Ws.).

V. phlomodes L. Höxter (Bs.).

V. phlomodes var. australe. Höxter (Bs.). Bot. Garten zu Münster (Ws.) *var. nemorosum* (Schrad.), Höxter (Bs.).

V. Lychnitis L. Warburg (Bs.).

V. nigro-Lychnitis. (Schiedeanum Koch) Freudenberg (U.).

V. nigrum L. Münster (Ws.).

V. Blattaria L. Münster q. sp. (Ws.).

Gratiola officinalis L. Rheine (Fldd. Ws.).

Scrofularia nodosa L. Münster (Ws. jun.).

S. Ehrharti Stev. Stadtlohn (Ws.), Münster (Ws.), Osnabrück (Fldd.), *var. Neesii* Wirtg. Höxter (Bs.).

S. vernalis L. Attendorn (v. d. Marck).

Linaria Cymbalaria Mill. Tecklenburg (Ws.), Höxter (Ws.), Osnabrück (Fldd.), *forma* Höxter (Bs.).

L. Elatine Mill. Albersloh (Ws.), Münster (Ws.), Lotte (Fldd.).

L. spuria Mill. Hersfeld (Hn.), Albersloh (Hn.), Münster (Ws. jun.), Beckum (Fldd.).

L. minor Desf. Albersloh (Ws.), Tecklenburg (Brgst.), Lotte (Fldd.).

L. vulgaris Mill. Münster (Ws.), *f. Peloria* Höxter (Bs.).

Antirrhinum Orontium L. Paderborn (Westhoff), Münster (Ws.), Lotte (Fldd.).

Digitalis purpurea L. Münster (Ws.), Freudenberg (U.), *f. flor. dilute purpureis* Freudenberg (U.).

(**D. grandiflora** nur aus dem bot. Garten zu Münster Ws.)

Veronica hederifolia L. Münster (Ws.).

V. agrestis L. Münster (Bn.), Liesborn (Hn.), Münster (Wienk.).

V. polita Fr. Münster (Ws.), Schwerte (Ws.).

V. opaca Fr. Liesborn (Hn.).

V. persica Poir. Höxter (Bs.), Beverungen (Bn.), Münster (Bn.).

V. triphylla L. Münster (Bn.).

V. verna L. Bielefeld (Bs.).

V. serpillifolia L. Münster (Ws. Bn.).

V. longifolia L. Münster (Ws.), Rheine (Fldd.).

V. spicata L. Lippspringe (Bs.).

- Veronica scutellata** L. Münster (Bn.), Lotte (Fldd.).
V. Anagallis L. Osnabrück (Fldd.).
V. aquatica Bernh. Höxter (Bs.), *var. dasypoda* Ue. Münster (Bn.).
V. Beccabunga L. Freudenberg (U.), *forma* Höxter (Bs.).
V. Chamaedrys L. Münster (Ws.).
V. montana L. Münster (Bn.), Burgsteinfurt (Lm.), Albersloh (Hn.), Freudenberg (U.), Lotte (Fldd.).
V. officinalis L. Freudenberg (U.), Lotte (Fldd.).
V. prostrata L. Warburg (Bs.), β *latifolia* Warburg (Bs.).
V. Teucrium L. Wesel (Ws. jun.).
Limosella aquatica L. Albersloh (Hn.), Lippstadt (Hn.), Lotte (Fldd.).
Melampyrum arvense L. Lotte (Fldd.).
M. barbatum W. K. Höxter (Bs.).
M. cristatum L. Höxter (Bs.), β *pallidum* Höxter (Bs.).
M. pratense L. Münster (Ws.), *var. heterophyllum* Höxter (Bs.), Tecklenburg (Bgst.).
(M. silvaticum L. nur vom Harz und Schwarzwald.)
Pedicularis silvatica L. Münster (Bn.), Freudenberg (U.), *f. albiflora* Freudenberg (U.).
P. palustris L. Telgte (Ws.), Freudenberg (U.), Tecklenburg (Brgst.).
Alectorolophus major Rchb. Münster (Bn.).
A. angustifolius Heynh. Höxter (Bs.).
A. minor W. & Gr. Münster (Ws.), Höxter (Bs.). Mittelform zu *major* (oder Bastard ?) Wehdem (Bs.).
Euphrasia Odontites L. Lotte (Fldd.), *albiflora* Münster (Ws.).
E. officinalis L. Münster (Ws.), Höxter (Bs.). Verschiedene Formen von Höxter (Bs.), *var. montana* (Jord.), Astenberg (Bs.).
E. nemorosa Pers. Münster (Ws. Bn., auch unter dem Namen *ericetorum* Jord.), *f. grandiflora* Höxter, Lippspringe (Bs.), *var. micrantha* Rchb. Freudenberg (U., von da auch die typische Form mit weißer und gelber Krone), Höxter (Bs.), Tecklenburg (Bgst.); mit dunkelblauer Krone, Lippspringe (Bs.).
Orobanche ramosa L. Brochterbeck (Fldd.), Botan. Garten zu Münster (Ws.).
O. coerulea Vill. Bielefeld (Bs.).
O. Rapum Thuill. Lotte (Fldd.), Münster (Ws.), Freudenberg (U.), Osnabrück (Fldd.).
O. minor Sutt. Münster (Bussmann), Albersloh (Hn.), Alverskirchen (Hn.), Handorf (Wienk.), Gaesdonk (Lm.).
O. rubens Wlls. Höxter (Bs.), β *pallens* A. Br. Höxter (Bs.).
Lathraea Squamaria L. Böddecken (Bs.), Hamm (v. d. Marck).

Ordo: Labiatae.

- Elsholzia cristata** W. Lotte q. sp. (Fldd.).
(Mentha rotundifolia L. nur aus dem Bot. Gart. Ws.)
M. silvestris L. a. *angustifolia* Lippstadt (Hn.), *glabrescens* Driburg (Ws.), dieselbe, andere Form Freudenberg in Gärten (U.), *albiflora* Höxter (Bs.), *parviflora* Höxter (Bs.), *f. candicans* Höxter (Bs.), Delbrück (Dr. Müller).

- b. *latifolia* (meist = *nemorosa* W.), Stadflohn (Ws.), Osnabrück (Fldd.), Höxter (Bs.).
- Mentha arvensis** × **silvestris**. Höxter (Bs.).
- (M. piperita** L. Cult. Ws.)
- M. crispata** Schrad. Nieheim bei Höxter (Bs.).
- M. aquatica** L. Münster (Ws.), *f. subspicata* Driburg (Bs.), *f. hirsuta* Driburg (Bs.), *f. verticillata* Wirtg. Höxter (Bs.), *f. multiverticillata* Wirtg. Höxter (Bs.).
- M. arvensi-aquatica** Wirtg. *f. pseudo-nepetodes* Höxter (Bs.), *f. riparia* Höxter (Bs.), eadem *subglabra* Beverungen (Bs.).
- M. pubescens** W. Viele Formen Höxter (Bs.), *f. major* Wirtg. Höxter (Bs.), *var. (?) dentata* Bukh., Höxter (Bs.).
- M. silvestri-aquatica**. Höxter (Bs.).
- M. gentilis** L. *typica* Höxter (Bs.), *ovata grandiflora* Höxter (Bs.), eadem *foliosa* Höxter (Bs.), eadem *hirta (aquatico-gentilis ?)* Höxter (Bs.), *elliptica f. gracilis* Höxter (Bs.).
- M. arvensis**. Astenberg (Bs.), *albiflora* Münster (Ws.), *acuta* Rab. Freudenberg (U.), *forma (silvestri-arvensis ?)* Höxter (Bs.), *forma fol. verticillorum decrescentibus* Höxter (Bs.).
- M. aquatico-arvensis** Wirtg. Höxter (Bs.), *f. grandiflora* Höxter (Bs.), *f. villosa* Höxter (Bs.), *f. lanuginosa* Höxter (Bs.), *f. pahudosa* (Schreb.).
- M. sativa** L. Höxter (Bs.).
- M. Pulegium** L. Münster (Ws.), Wadersloh (Hn.), Hamm (Fldd.).
- Lycopus europaeus** L. Münster (Ws.), *f. pubescens* Höxter (Bs.).
- Salvia pratensis** L. Höxter (Bs.), Siegerland (Fldd.), Wesel (Ws.) *f. pinnatifida* Warburg (Bs.).
- Origanum vulgare** L. Münster (Ws.), Schwerte (Ws.), Büren (Lm.), *f. albiflorum* Münster (Ws.).
- Satureja hortensis** L. Münster q. sp. (Ws.).
- Thymus Serpillum** L. Münster (Ws.), Lengerich (Ws. jun.), *flor. omn. verticill.* Höxter (Bs.), *subcitratus* (Schreb.) Höxter (Bs.), Bergform vom Astenberg (Bs.), *polytrichus* Driburg (Bs.).
- Calamintha Acinos** Clairv. Münster (Ws.), Rheine (Bn.), Drensteinfurt (Hn.), Lengerich (Ws. jun.), *f. villosus* (Pers.) Höxter (Bs.), *f. diffusus* (Bungh.), Höxter (Bs.).
- C. Clinopodium** Benth. Münster (Ws.).
- Melissa officinalis**. Höxter q. sp. (Bs.).
- Nepeta cataria** L. Büren (Lm.), Lotte (Fldd.).
- Glechoma hederacea** L. Münster (Bn. Ws.), *f. pubescens* Höxter (Bs.).
- Phystegia imbricata** Hook. *var. Ludovici* Dülmen q. sp. (Cosack).
- Hyssopus officinalis** L. Osnabrück q. sp. (Fldd.), *f. albiflora*. Bielefeld (Fldd.).
- Lamium maculatum** L. Münster (Ws. Bn.), Dorsten (Fldd.). Viele Formen von Höxter (Bs.), *f. albiflora* Höxter (Bs.).
- L. purpureo-maculatum** Ws. Münster (Ws.). Von *maculatum* nur verschieden durch magere, kurze Stengel und kleine Blätter, welche aber noch feiner als bei der gewöhnlichen Form von *maculatum* geschlitzt sind. Kann deshalb sehr wohl eine *forma macra* von *maculatum* sein.

- Lamium album** L. Münster (Ws.), *f. galea rubescente* Höxter (Bs.).
- L. incisum** W. Münster (Ws.), Holzminden (Bs.).
- L. amplexicaule** L. Münster (Ws.).
- L. purpureum** (Ws.) cum *f. carneiflora*.
- Galeobdolon luteum** Huds. *typicum* Höxter (Bs.), *f. montanum* Pers. Freudenberg (U.), Höxter (Bs.), Münster (Ws.).
- Galeopsis Ladanum** L. a. *Typica* fehlt; b. *angustifolia* a. *canescens* Ehrh. Münster (Ws.), Rheine (Fldd.), Höxter (Bs.), *f. albiflora* Höxter (Bs.), β . *typica* Beckum (Ws.), Sauerland (Fldd.), Höxter (Bs.), *albiflora* Höxter (Bs.).
- G. intermedia** Vill. Höxter (diese = *Ladanum* \times *Tetrahit* ?) *var. angustifolia* (Blätter ringsum regelmäÙig gezahnt und nach der Basis nicht lang verschmälert!) Elkeringhausen und Olsberg (B.).
- Galeopsis ochroleuca** Lam. Münster (Ws. Ws. jr.), Liesborn (Hn.), Albersloh (Hn.), Lotte (Fldd.), Osnabrück (Fldd.).
- G. Tetrahit** L. Münster (Ws.), Lotte (Fldd.) *f. major* Höxter (Br.), *f. Reichenbachii* Rent. Höxter (Bs.).
- G. bifida** Bng. Münster (Ws.), Höxter (Bs.), *f. hispídissima* Höxter (Bs.).
- G. versicolor** Curt. Stadthohn (Ws.), Münster (Ws. Bn. Westhoff), Mastholte (Hn.).
- Stachys alpina** L. Brilon (Berthold).
- St. germanica** L. Höxter (Bs.).
- St. arvensis** L. Freudenberg (U.), Albersloh (Ws.), *f. pallida* Waltrop (Ws.).
- St. recta** L. Höxter (Bs.).
- St. annua** L. Beckum (Hn.), Drensteinfurt (Hn.), *f. parviflora* Höxter (Bs.).
- Betonica officinalis** L. *var. hirta* Münster (Fldd.), Drensteinfurt (Fldd.), *var. stricta* Höxter (Bs.).
- Marrubium vulgare** L. Höxter (Bs.), Albersloh (Hn.), Rheine (Fldd.), Lotte (Fldd.), unteres Lippethal (Wirtz).
- Leonurus Cardiaca** L. Wadersloh (Libeau), Gladbeck (Lm.), Liesborn (Hn.).
- Scutellaria galericulata** L. Münster (Ws.), Lotte (Fldd.).
- S. minor** L. Albersloh (Hn.), Gaesdonk (Lm.), Tecklenburg (Fldd.), Lotte (Fldd.), Bentheim (Fldd.).
- Prunella grandiflora** L. Brilon (Berthold), *var. hastata* Warburg (Bs.), *f. parviflora* Warburg (Bs.).
- P. alba** Pall. Driburg (Bs.), *var. hybrida* (Kneif), Driburg (Bs.).
- P. vulgaris** L. Münster (Ws.), Lotte (Fldd.), *f. albiflora* Schwerte (Ws.), *f. parviflora* Höxter (Bs.), *f. pinnatifida* Höxter (Bs.).
- Ajuga reptans** L. Freudenberg (U.), Lotte (Fldd.), *f. montana* Höxter (Bs.), *f. albiflora* Höxter (Bs.).
- A. genevensis** L. Beverungen (Bs.), Brakel (Bs.), *f. rubriflora* Brakel (Bs.), *f. parvifolia* Beverungen (Bs.).
- A. Chamaepitys** L. Münster (Ws.), Höxter (Bs.), Beckum (Fldd.) Rheine (Fldd.).
- Teucrium Scorodonia** L. Freudenberg (U.), Lotte (Fl.).
- T. Botrys** L. Münster (Ws.), Ravensberg (Fl.), Beckum (Hn.), Paderborn (Ws.).
- T. Scordium** L. Münster (Ws. Ws. jr. Wienk.), Sendenhorst (Hn.), Wolbeck (Hn.), Drensteinfurt (Fl.), Lippstadt (Dr. Müller).

Notizen zu den vorhergehenden Ordnungen aus dem Echterling'schen Herbarium.

- Lobelia Dortmannia** L. Hövelhof (v. Frankenberg).
- Vaccinium Myrtillus** L. Findet sich mit weissen Beeren auf der Höhe der Velmerstoet.
- Lithospermum officinale** L. Stand 1816 in Menge auf der Meierei in Österholz, wo es aber von Fr. Hentze ausgesät war.
- Pulmonaria officinalis** L. Die Expl. gehören zu der Form obscura.
- Anchusa officinalis** L. Driburg (v. Schlechtendal). NB. Ich habe es dort nie gesehen.
- Physalis Alkekengi** L. Nassegrund bei Blomberg in einer Mergelgrube.
- Verbascum nigro-Lychnitis**. Klut bei Hameln (Pflümer).
- Digitalis ambigua** Murr. Kommt auch im Lippeschen im Amt Varenholz vor.
- Lathraea Squamaria** L. Ist auch bei Eschenbruch oberhalb der Kixmühle vom Apotheker Wessel gefunden, ferner 1 Exemplar von meinem Sohne August bei Röhrentrup in einem Schlagholze.
- Galeopsis intermedia** des Herb. ist = *Ladanum typ.*
- Stachys ambigua** Sm. Bach zwischen Reelkirchen an der Chaussee nach Meinberg im Gebüsch unterm Kohlberge. Blätter schmal, aber verhältnismässig lang gestielt, Behaarung von *silvatica*.
- Ballota borealis** Schweigg (als *albo*). Hecken bei Detmold, Lage in Höntrup. Die Richtigkeit der Bemerkung: „*B. nigra* (= *vulgaris* LK.) ist bei uns die häufigste“ bezweifle ich.
- Menta**. Das Herbar enthält einige interessante Opiz'sche und Weihe'sche Arten; ein Standort (Minden) ist indes nur zu *M. Weiheana* Op. genannt. Ausserdem finden sich viele Formen der *Ment. exsicc.* von Wirtgen ed. I.
- M. citrata** Ehrh. Die beiden Exemplare vom Lippeschen Standort sind richtig benannt.
- Scutellaria galericulata** L. *var. pubescens*. Das Exemplar ist stärker behaart, als ich die Form bis jetzt sah: Oberer Stengelteil und Blattunterseite, bes. an den Nerven, sowie Blattrand stark kurz rauhaarig, Kelch fast kurzzottig. Augustdorf auf Sandäckern.
- S. minor** L. Das Exemplar ist nicht im Lippeschen ges. Bemerkte wird: Wurde vom Lehrer Schöndorff am Wege von Oerlinghausen nach Schöttmar, wenn ich nicht irre, in der Nähe von Heupke, gefunden und uns von ihm einige Exemplare mitgeteilt, von denen ich eins an das Museum in Detmold abgegeben habe.

Nachtrag zu den früheren Angaben über *Rubus*.

Von Dr. Utsch in Freudenberg.

- Rubus saxatilis** L. Höxter: Ziegenberg über'm Petrifelde, beim Otternkrug (Beckh.), Holzminden (Dauber), Oerlinghausen am Tönsberg, Osnabrück bei Hasbergen in alten Steingruben am Fuss des Flüggebergs, Engter bei Colon

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [11_1882](#)

Autor(en)/Author(s): Beckhaus Conrad Friedrich Ludwig

Artikel/Article: [Mitteilungen aus dem Provinzial-Herbarium. Fortsetzung. 88-95](#)