

Weitere Beiträge zur Flora von Westfalen.

Von Holtmann, Lehrer a. D.

Die in gegenwärtiger Zusammenstellung aufgeführten Pflanzen sind zum grösseren Teile an den hier angegebenen Standorten in den letzten sieben Jahren entdeckt, und die betreffenden Standorte derselben in der neuen Flora Westfalens von Beckhaus noch nicht enthalten. Ein nicht geringer Teil dieser Funde ist ein Ergebnis der Forschungen des Studiosus Brockhausen, der auf meine Anregung unter anderen namentlich die Gegenden von Stadtlohn, Osterwick, Billerbeck, Horstmar und Riesenbeck eifrig und mit dem zu erwartenden Erfolge durchsuchte und mir von Zeit zu Zeit bereitwilligst Belag-Exemplare seiner Entdeckungen übersandte.

- Anemone hepatica* L. Osterwick. Telgte bei Rumphorst im Walde zahlreich.
- „ *Pulsatilla* L. Haltern am Lippeufer neben dem Brückenhaus in Unmenge (v. Spiessen).
- Helleborus viridis* L. Osterwick am Berghaus (Wald).
- Delphinium Consolida* L. Rinkerode auf einem Acker östlich der Bahn am Wege in die Bauerschaft Hemmer in auffallender Menge.
- Sisymbrium Sophia* L. Münster auf einem in der Nähe vom Neuthor befindlichen Schuttplatz.
- Lepidium perfoliatum* L. Mecklenbeck auf dem Hofe eines Kolonen (1893).
- „ *rudiverale* L. Münster auf einem wildbewachsenen Grundstück am Servatii-Platz in Menge.
- Bunias orientalis* L. Münster in der Nähe des Bahnhofs an dem östlichen Abhänge des Bahndammes.
- Berteroa incana* DC. Osterwick auf einem Ackerfeld. Darfeld. Wettringen Laubwald beim Dorf. Bei Dorsten.
- Cardamine amara* L. Darfeld, Billerbeck.
- „ *hirsuta* L. } Bei Medebach häufig (v. Spiessen).
- „ *silvatica* Lk. }
- „ *silvatica* Lk. Riesenbeck.
- Erucastrum Pollichii* Schimp. Auf einem Felde an der Chaussee zwischen Ahaus und Stadtlohn. Hinter Haus Dellwig bei Lütgendortmund nach Neukrengeldanz zu (v. Spiessen).
- Reseda lutea* L. An der Chaussee von Horstmar nach Eggenrode auf der Höhe.
- Saponaria Vaccaria* L. Westkirchen nach Ennigerlon hin auf dem Finkenberg.
- Silene dichotoma* Ehrh. Münster auf einem Kleefeld am Wege von Stapelskotten nach Pleister Mühle zerstreut (1894).
- Lychnis noctiflora* Döllinger. Dülmen bei Uckelmanns Ziegelofen Kolon Einhaus gegenüber (v. Spiessen).
- Spergularia rubra* Prest. Maria Veen rechts von der Bahnstation sehr zahlreich.
- Holosteum umbellatum* L. Riesenbeck in der ganzen Umgegend.
- Malva Alcea* L. Stadtlohn. Horstmar in der ganzen Umgegend.
- „ *moschata* L. var. *albiflora*. Stadtlohn an einem Abhänge bei der Stadt.

- Hypericum hirsutum* L. In der Gemeinde Osterwick sehr häufig.
- „ *Elodes* L. Tecklenburg im Wechter Moor sehr zahlreich. Stadtlohn.
- Geranium phaeum* L. Horstmar zwischen dort und Darfeld.
- „ *palustre* L. Osterwick. Zwischen Laer und Holthausen.
- „ *pratense* L. Einzeln bei Medebach, Haus Dellwig bis Lütgendortmund auf Rasenplätzen (v. Spiessen).
- „ *pyrenaicum* L. Münster vor dem Neuthor in einer Wiese an der Steinfurter Chaussee rechts beim Kolon Wittenkötter zahlreich.
- Anthyllis vulneraria* L. Osterwick zwischen dort und Darfeld.
- Lathyrus silvestris* L. Horstmar in der ganzen Umgegend.
- Melilotus officinalis* Desr. Münster an Abhängen zwischen der Steinfurter- und der Grevener Chaussee zahlreich.
- Medicago falcata* L. var. *hybrida* Gaud. Nienberge zwischen dort und Wilkinghege an der Chaussee.
- Trifolium agrarium* L. Handorf am Wege von der Bahnstation nach Eggers kurz vor Haus Havichhorst. Osterwick. Bei Medebach am Hesseberg (v. Spiessen).
- Ononis repens* L. Schöppingen.
- Vicia villosa* Roth. Osterwick zwischen dort und Darfeld.
- Agrimonia eupatoria* L. var. *odorata*. Münster an der Chaussee nach Wolbeck. Zwischen Amelsbüren und Venne nicht selten.
- Geum rivale* L. Osterwick.
- Potentilla sterilis* Grckr. In der Gegend von Osterwick gemein.
- Rosa rubiginosa* L. Nienberge zwischen dort und Wilkinghege auf einer Trift an der Chaussee.
- Sanguisorba officinalis* L. Osterwick, Darfeld.
- Epilobium tetragonum* L. var. *obseurum* Schreb. Albachten an einem tiefen Graben am Wege zur Bahnstation.
- Oenothera biennis* L. Westbevern bei Haus Langen, dort besonders auf einem grossen, mit jungen Eichen bepflanzten Felde äusserst zahlreich und mit *Echium vulgare*.
- Hippuris vulgaris* L. Darfeld.
- Corrigiola littoralis* L. Stadtlohn.
- Saxifraga tridactylites* L. Roxel, Bauerschaft Altenroxel. Bei Havixbeck. Äcker zwischen Horstmar und Schöppingen, sowie zwischen Schöppingen und Osterwick.
- Chrysosplenium alternifolium* L. Bei Osterwick gemein.
- Helosciadium inundatum* Koch. Münster unweit Römer Wirt nach Sebon hin an einem Tümpel zahlreich.
- Carum Carvi* L. Darfeld, Wiesen in der Nähe des Schlosses.
- Silaus pratensis* Bess. Osterwick auf Wiesen häufig.
- Cornus stolonifera* Mchx. Münster an dem Park der Militär-Schiessstände auf der Loddenhaide.
- Sambucus Ebulus* L. Osterwick. Eggenrode.

- Asperula odorata* L. Mecklenbeck in dem unweit Appels rechts von der Weseler Chaussee nach Albachten hin befindlichen Eichenwalde (am 8. Nov. v. J. noch frische Exemplare).
- Valerianella auricula* DC. Münster, nahe dem „hohen Schemm“ auf einem Acker am Fusswege nach Pleistermühle.
- Dipsacus pilosus* L. Horstmar an der Chaussee nach Darfeld. Osterwick.
- Scabiosa columbaria* L. Handorf bei Havichhorst Mühle an der Werse. Telgte, unweit der Stadt nach Münster hin rechts am Chausseeegraben ziemlich zahlreich.
- Inula Helenium* L. Horstmar zwischen der Bahnstation und dem Dorf spärlich.
- „ *salicina* L. An der Chaussee von Osnabrück nach Lotte.
- Artemisia pontica* L. Dreierwalde im Dorf an einer Mauer ziemlich zahlreich.
- Anthemis tinctoria* L. An der Bahn zwischen Altenberge und Nordwalde.
- Rudbeckia laciniata* L. Handorf bei Eggers an einer sumpfigen Grube Prachtexemplare. Darfeld, Gräben an der Chaussee von dort nach Osterwick massenhaft und mit *Geranium phaeum*.
- Cirsium arvense* L. var. *complanatum*. Münster unweit der Koburg in einer früheren Sandgrube unter Kartoffeln.
- Senecio viscosus* L. Münster in der Nähe des Bahnhofs an dem östlichen Abhänge des Bahndammes massenhaft verbreitet. Hiltrup in der Nähe der Bahnstation in Menge.
- „ *paludosus* L. }
 „ *palustris* DC. } Bei Dülmen: Süskenbruch und Entenkoi (v. Spiessen).
- Crepis biennis* L. Albersloh bei der Ziegelei an der Chaussee nach Rinkerode.
- Coryza squarrosa* L. Billerbeck an der Chaussee von dort nach Darfeld.
- Bidens cernuus* L. Osterwick.
- Doronicum caucasicum* MB. Coesfeld in den Büschen bei Varlar (wahrscheinlich Gartenflüchtling).
- Arnica montana* L. Stadtlohn in einer unweit der Stadt gelegenen Heide. Metelen.
- Phyteuma spicatum* L. Iburg.
- Specularia Speculum* Alph. DC. In den Gemeinden Osterwick und Horstmar gemein. Dülmen bei Thier zum Berge (v. Spiessen).
- Vaccinium uliginosum* L. Gross Reken, Riesenbeck.
- „ *Oxycoccus* L. Gross Reken zwischen dort und Coesfeld sehr häufig und mit *Sphagnum ampullaceum*.
- Pyrola rotundifolia* L. Zwischen Darfeld und Horstmar an der Chaussee. Bei Stadtlohn. Zwischen Ahaus und Stadtlohn.
- Monotropa hypopitys* L. var. *glabra*. Osterwick.
- Gentiana amarella* var. *Germanica*. Horstmar am Herrenwald und an der Chaussee von Horstmar nach Darfeld.
- Gentiana cruciata* L. Osterwick an vielen Stellen.
- „ *ciliata* L. Brochterbeck.
- „ *filiformis* L. Gross Reken, Eggenrode.

- Pulmonaria officinalis* L. In den Gemeinden Osterwick und Schöppingen ganz
gemein.
- Anchusa officinalis* L. Münster in der an der Kinderhauser Chaussee bei
Kranefeld befindlichen früheren Sandgrube.
- Symphytum officinale* L. Münster an den Gräben der Chaussee nach Wolbeck
in der Gegend der Delstruper Schule und rechts von der Chaussee
an einem nach Lütkenbeck sich hinziehenden Fahrwege ausser-
ordentlich zahlreich und in allen Farben-Varietäten.
- Lithospermum officinale* L. Osterwick.
- Myosotis hispida* Schlechtl. Kinderhaus an einem Abhange in der Nähe der
Bahnhofstation zahlreich.
- Solanum nigrum* L. var. *humile* Bernh. Dülmen beim Kötter vor den Bauern-
büschen (v. Spiessen).
- Datura Stramonium* L. Darfeld.
- Hyoscyamus niger* L. Darfeld in der Nähe der Bahnhofstation.
- Verbascum Thapsus* L. Münster in einer nach der Koburg hin befindlichen
früheren Sandgrube, eine ganze Reihe stattlicher Exemplare.
- Scrophularia Ehrhartii* Stev. Münster im Gebüsch an einem Tümpel am
Wege nach Lütkenbeck.
- Pedicularis palustris* L. Coesfeld, Gross Reken, Stadtlohn.
- Veronica montana* L. Münster: in dem zwischen dem „hohen Schemm“ und
Nottarp an der hohen Werseuferböschung befindlichen Gehölz.
- Limosella aquatica* L. Dülmen: Süskenbruch und Grossenteichsmühle (v.
Spiessen).
- Linaria Elatine* Mill. Horstmar auf einem Acker am Herrenwalde.
- Antirrhinum Orontium* L. Stadtlohn, Darfeld.
- Melampyrum arvense* L. In den Gemeinden Albersloh und Rinkerode an ver-
schiedenen Stellen.
- Orobanche rapum* Thuill. Horstmar in der Nähe des Dorfes. Osterwick.
- Ballota nigra* L. Handorf bei Havichhorst Mühle (wahrscheinlich in jüngster
Zeit angesiedelt).
- Teucrium Botrys* L. Osnabrück auf einem Kalkhügel bei Moskau.
- Stachys Betonica* Benth. Münster: hinter Stapelskotten an der Wolbecker Chaussee.
- Trientalis europaea* L. Iburg am Fusse des Dörenberges. Auf dem Borken-
bergen bei Dülmen (v. Spiessen).
- Anagallis arvensis* L. var. *coerulea* mit *carnea*. Gemeinde Laer.
- Lysimachia nemorum* L. Amelsbüren an einem Waldrande an der Chaussee
nach Hiltrup zahlreich. In der Gemeinde Osterwick ganz häufig.
- Samolus Valerandi* L. Gross Reken in der Heide. Stadtlohn.
- Amarantus retroflexus* L. Münster: bei der Sudmühle (Herbst 1893).
- Chenopodium bonus Henricus* L. Münster am Wege von Abschnittsthor nach
Altenroxel.
- Rumex maritimus* L. Münster: auf moorigem Sumpfboden am Wege nach
Lütkenbeck.
- Polygonum Bistorta* L. Bei Rorup und Osterwick.

- Daphne Mezereum* L. Darfeld.
- Aristolochia Clematidis* L. Asbeck beim Dorf. Billerbeck an der Quelle der Berkel.
- Mercurialis perennis* L. Osterwick.
- Salix pentandra* L. Münster: an dem Park der Militär-Schiesstände auf der Loddenheide, prächtige Exemplare.
- Salix purpurea* L. (als kräftiger Baum). Darfeld in der Nähe des Schlosses.
- Myrica Gale* L. Stadtlohn, Ahaus, Metelen.
- Elodea canadensis* Georgsmarienhütte in einem Teich. Clarholz.
- Alisma natans* T. Münster: unweit Römer Wirt, etwa 10 Minuten von da, nach Sebon hin in einem Tümpel zahlreich. Telgte in einem Tümpel am Wege nach den Fürstenteichen. Heiden: Tümpel in der Nähe des Dorfes. Stadtlohn: Kölke im Lohner Bruch.
- Scheuchzeria palustris* L. Dülmen: Entenkoi (v. Spiessen).
- Calla palustris* L. Spelle, Beesten, Freeren, dort in Gräben und Tümpeln gemein. Hopsten, Dülmen: Entenkoi (v. Spiessen).
- Orchis Morio* L. In den Gemeinden Liesborn, Wadersloh, Stromberg auf Wiesen und Kämpen häufig. Angelmodde.
- Orchis sambucina* L. Brochterbeck im „Bockerthal“ im Gebüsch.
- Malaxis paludosa* Sw. Maria Veen, etwa 5 Minuten von da an einem Graben ziemlich zahlreich.
- Neottia nidus avis* Rich. Bei Billerbeck häufig.
- Cephalanthera grandiflora* Bab. Osterwick.
- Epipactis palustris* Cr. Dülmen: Süskenbruch. Medebach. (v. Spiessen).
- „ *Helleborine* Cr. In der Gegend von Stadtlohn gemein.
- Paris quadrifolia* L. Rheine, Osterwick, Darfeld.
- Ornithogalum Boucheanum*. Gravenhorst (dort verwildert).
- Allium ursinum* L. Horstmar bei der Schlossruine. In den Gemeinden Osterwick und Billerbeck an vielen Stellen.
- „ *oleraceum* L. Osterwick.
- Muscari botryoides* Mill. Stadtlohn.
- Scirpus fluitans* L. Stadtlohn dort in den Heiden gemein.
- Eriophorum gracile* Koch. Venner Moor, dort zahlreich verbreitet, stellenweise in Menge.
- Carex pulicaris* L. In der Gemeinde Albersloh sehr häufig und stellenweise in überraschender Menge, so z. B. in der „Hohen Wart,“ in „Lammerdings Heide“ und in der „Tiergartenheide“.
- Carex flava* L. (in einer sehr üppigen Form). Amelsbüren nach Bredeweg hin im Chausseegraben.
- Carex canescens* L. Albersloh, Gehölz beim Hause Sunger.
- Setaria viridis* R. Br. }
Panicum crus galli L. } In der Gegend von Stadtlohn gemein.
- Alopecurus agrestis* L. Osterwick.
- Arundo Calamagrostis* L. Hilstrup unweit Rotländer im Walde recht zahlreich.
- Melica uniflora* Retz. Osterwick im „Bergkamp“ (Wald) bei Varlar häufig.

- Lycopodium Selago* L. Riesenbeck an mehreren Stellen, z. B. Eulenfels.
 „ *annotinum* L. Osterwick an mehreren Stellen.
Osmunda regalis L. Gross Reken, Metelen.
Aspidium aculeatum var. *angulare* Al. Br. Leichlingen an der Wupper bei
 Schloss Nesselrath (v. Spiessen).
Asplenium Trichomanes. Dülmen: Grossenteichsmühle (v. Spiessen).
Scelopendrium vulgare Sm. Horstmar in der Stadt in einem alten Brunnen
 beim Rentmeister Bisping massenhaft.

Flora von Paderborn.

(Fortsetzung).

Neu untersucht von Dr. Baruch und Lehrer Nölle in Paderborn.

I. Nachträge und Ergänzungen zu 1894. *)

Ranunculaceae.

- Anemone Pulsatilla* L. Auch sonst auf Haideboden zwischen Marienloh
 und Lippspringe.
 „ *nemorosa* L. Unter Hecken auf dem Kalberdanz. Im Busch
 bei Scharmede. Auf den Tallewiesen u. s.
 222. *Ranunculus lanuginosus* L. Sehr selten. Wald an der Warthe.
 „ *auricomus* L. Häufig im Rosenberge bei Driburg.
 „ *sceleratus* L. An einem Graben im Riemecke.
 × 223. *Trollius europaeus* L. Seltene Gartenpflanze. Neuenbeken bei Uhdn.
 224. *Helleborus niger* L.. Dsgl. Garten an den Mühlen (Turnaus Hof).
 × *Actaea spicata* L. Neu angesiedelt im Ziegenbg. bei Wewer.

Nymphaeaceae.

- × *Nymphaca alba* L. Teiche d. Neuanlagen am Schützenpl. Teiche bei
 Scharmede.

Papaveraceae.

- Papaver somniferum* L. Zuweilen verwildert. So in einem Graben
 am Wege zur Insel.
 225. „ *dubium* L. Zerstreut auf Sandäckern bei Neuhaus und am
 Schützenpl.
 × 226. *Eschscholtzia crocea* Benth. Ottoscher, Dr. Brüningscher Garten.

Cruciferae.

- × 227. *Lepidium Draba* L. Am Bahndamm zwischen Paderborn und Scher-
 mede gesellig. Sonst fehlend.
Alyssum calycinum L. Chausseeграben hinter d. Wilh.berge, nahe
 der Thune.

*) Neu gefundene und noch nicht aufgeführte Pflanzen sind mit fort-
 laufender Zahl versehen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst](#)

Jahr/Year: 1894-95

Band/Volume: [23_1894-1895](#)

Autor(en)/Author(s): Holtmann Max

Artikel/Article: [Weitere Beiträge zur Flora von Westfalen. 202-207](#)