

Verzeichnis neuer Standorte seltnerer Pflanzen.

Von H. Brockhausen und Johs. Elbert in Münster.

Ranunculaceae.

- Thalictrum flavum* L. Häufig an der Werse von der Wolbecker Chaussee bis Angelmodde.
- Myosurus minimus* L. Auf Äckern bei Pleistermühle, Angelmodde, Wolbeck, Sudmühle.
- Ranunculus lanuginosus* L. Nienberge, Dissen, Rothenfelde.
- „ *Lingua* L. Uffeler Moor bei Hörstel.
- Aconitum Lycoctonum* L. Knüllberg bei Dissen.
- Actaea spicata* L. Knüllberg bei Dissen, Iburg, Lengerich, Tecklenburg.

Cruciferae.

- Lepidium ruderales* L. Am Kanal auf Mauritz, Gimfte.
- „ *Draba* L. Neuenkirchen bei Rheine.
- Coronopus Ruelli* All. An der Werse bei Angelmodde.
- Allyssum calycinum* L. Bei Deitmerts Ziegelei auf der Coerdeheide.
- Turritis glabra* L. Bahnhof Handorf, Stapelskotten, Haskenau, Senden.
- Diplotaxis tenuifolia* D. C. Bahndamm bei der Schleuse, Wüllen, Stadtlohn.
- Erucastrum Pollichii* Schimp. Moskau bei Osnabrück.

Polygalaceae.

- Polygala amara* L. Loddenheide, nicht weit vom Römerwirt.

Silenanaeae.

- Dianthus deltoides* L. Coerdeheide, Gimfte.
- „ *Armeria* L. Am Wege von Senden nach Venne.

Alsinaceae.

- Holosteum umbellatum* L. Neuthor, Rheine, Emsdetten.

Malvaceae.

- Malva mosehata* L. Varlar bei Coesfeld.

Geraniaceae.

- Geranium palustre* L. Pleistermühle, Osterwick.
- „ *pyrenaicum* L. Nienberge.

Papilionaceae.

- Ulex europaeus* L. Landweg am Gut Bisping bei Rinkerode, Gr. Reken.
- Anthyllis Vulneraria* L. Rinkerode, Darfeld, Brochterbeck, Rothenfelde.
- Trifolium agrarium* L. Osterwick, Billerbeck, Drensteinfurt.

Rosaceae.

- Geum rivale* L. Osterwick, Emsdetten.
Potentilla verna L. Brochterbeck, Dissen.

Sanguisorbaceae.

- Sanguisorba officinalis* L. Schiffahrter Damm, Darfeld, Osterwick, Dissen.

Onagraceae.

- Circaea alpina* L. Loddenheide beim Römerwirt.

Paronychiaceae.

- Montia fontana* L. Wasserform bei Angelfmodde, Hilstrup, Römerwirt.

Crassulaceae.

- Sedum purpurascens* Koch. Lütkenbeck, Nordwalde.
 „ *reflexum* L. Saerbeck, Ravensberg.

Saxifragaceae.

- Saxifraga granulata* L. Ochtrup.
Chrysoplenium oppositifolium L. Siebenquellen bei Georgmarienhütte.

Umbelliferae.

- Cicuta virosa* L. Uffeler Moor.
Peucedanum palustre Mönch. Coerdeheide, Loddenheide, Hilstrup, Venne.

Loranthaceae.

- Viscum album* L. Recklinghausen (leg. Wegner), Handorf.

Caprifoliaceae.

- Sambucus Ebulus* L. Billerbeck, Darup, Osterwick, Eggerode.
 „ *racemosa* L. Iburg.

Dipsacaceae.

- Dipsacus pilosus* L. Darfeld, Osterwick, Lengerich.

Compositae.

- Aster Tripolium* L. Ascheberg, Hilstrup.
Gnaphalium germanicum Willd. Hilstrup, Senden.
Helichrysum arenarium D. C. Hörstel, Saerbeck.
Artemisia pontica L. Darup.
Arnica montana L. Metelen, Hörstel, Stadtlohn, Davensberg.
Carduus oleraceus L. Schiffahrter Damm, Eggers, Rothenfelde, Dissen.

Vacciniaceae.

- Vaccinium uliginosum* L. Nur in wenigen verkümmerten Exemplaren auf der Coerdeheide.
Oxycoccus palustris Pers. Coerdeheide auf einer kleinen Insel im Sumpf.

Lobeliaceae.

- Lobelia Dortmanna* L. Uffeler Moor.

Ericaceae.

Pirola secunda L. Auf dem Hüggel bei Georgmarienhütte.

Gentianaceae.

Gentiana cruciata L. Billerbeck, Osterwick.

„ *germanica* Willd. Nienberge, Horstmar, Rinkerode, Lengerich.

„ *ciliata* L. Lengerich, Brochterbeck, Billerbeck, Coesfeld, Rothenfelde, Ravensberg.

Erythraea pulchella Fr. Maikotten, Coerdeheide, Bahnhof Nienberge.

„ *Centaurium Pers.* var. *alba*. Rorup.

Asperifoliaceae.

Myosotis caespitosa Schultz. Jägerhaus, Wolbeck.

Personatae.

Scrophularia Ehrharti Stev. Coerdeheide, Loddenheide, Lehmheide bei Handorf, im Sumpf der Hornheide, Pleistermühle, Angelmodde, Wolbeck, Hiltrup, Jägerhaus, Telgte, Nienberge, Senden, Venne, Roxel u. a. O.

Linaria Elatine Mill. Albersloher Weg, Bahnhof Nienberge, Angelmodde, Rothenfelde, Hiltrup.

Linaria spuria Mill. Bahnhof Nienberge, Altenberge, Rothenfelde-Laer.

Digitalis purpurea L. Angelmodde, Loddenheide beim Römerwirt, Haus Kannen am Kappenberger Damm.

Veronica agrestis L. Sebon, Rothenfelde.

Limosella aquatica L. Lütkenbeck, Loddenheide, auf der Höhe des Whedeburges im Teutoburger Walde.

Pedicularis palustris L. Haus Langen, Gr. Reken, Coesfeld, Stadtlohn.

Orobanche minor Sutt. Wolbeck.

„ *caryophyllacea* Sm. Haus Hall bei Gescher.*)

Labiatae.

Galeopsis versicolor L. Nienberge, Hiltrup.

Stachys Betonica Benth. Lütkenbeck, Jägerhaus.

Ballota nigra L. Asbeck, Ravensberg.

Leonurus cardiaca L. Gravenhorst, Dissen.

Scutellaria minor L. Am Fusse der Dörenther Klippen, bei Riesenbeck.

Teucrium Botrys L. Laerer Berg.

Ajuga Chamaepitys Schreb. Laerer Berg.

Lentibulariaceae.

Utricularia minor L. Steveder Venn, Uffeler Moor.

Primulaceae.

Anagallis coerulea Schreb. Bahnhof Nienberge, Altenberge, Horstmar.

*) Dieser Fundort bereits in Karschs Flora, 6. Aufl., angegeben. Reeker.

- Anagallis coerulea* Schreb. var. *alba*. Horstmar.
Centunculus minimus L. Coerdeheide, Maikotten, Pleistermühle, Angelmodde.
Samolus Valerandi L. Maikotten, Jägerhäuschen am Schiffahrter Damm,
 Stadtlohn, Osterwick.

Oleraceae.

- Chenopodium bonus Henricus* L. Im Dorfe Handorf, Brochterbeck, Everswinkel, Rothenfelde.

Polygonaceae.

- Polygonum Bistorta* L. Stapelskotten, Darup, Wolbeck.
 „ *orientale* L. An der Wolbecker Chaussee bei Angelmodde.

Santalaceae.

- Daphne Mezereum* L. Billerbeck, Darfeld, Osterwick.

Empetraceae.

- Empetrum nigrum* L. Hörstel, Dreierwalde, Hopsten.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia platyphyllos* Scop. Neuthor, Nienberge.
Mercurialis perennis L. Asbeck, Darfeld, Osterwick.

Cupuliferae.

- Quercus sessiliflora* Sm. Dörenberg, Vermold.

Hydrocharitaceae.

- Stratiotes aloides* L. Teich an der Wolbecker Chaussee, Lütkenbeck, Handorf, Haskenau, Haus Langen, bei Schulze Terborg Westbevern, Hiltrup.

Alismaceae.

- Alisma natans* L. Römerwirt, Borken.
 „ *ranunculoides* L. Coerdeheide, Sudmühle, Maikotten, Jägerhaus, Pleistermühle.
Triglochin palustre L. Coerdeheide, Rothenfelde, Uffeler Moor.
 „ *maritimum* L. Hembergen.

Potameae.

- Potamogeton alpina* Balb. var. *fluitans*. Sebon.
 „ *graminea* L. var. *heterophylla* Schreb. Ziegelei Sudmühle.
 „ „ L. var. *homophylla* Beckh. Uffeler Moor.
Zannichellia palustris L. Westbevern, Uffeler Moor.

Thyphaceae.

- Sparganium minimum* Fr. Emsdetten (leg. Wegner), Telgte.

Orchidaceae.

- Orchis incarnata* L. Haus Langen.

Malaxis paludosa Sw. Uffeler Moor, Maria Veen, Steveder Venn.

Asparagaceae.

Paris quadrifolia L. Stapelskotten, Osterwick, Darfeld, Billerbeck, Horstmar.

Liliaceae.

Allium vineale L. Wienburg.

Narthecium ossifragum Huds. Uffeler Moor, Kaiserei bei Riesenbeck, Neuenkirchen.

Juncaceae.

Juncus tenuis Willd. Früher zerstreut auf Torf- und Lehmboden, heute überall gemein.

Juncus Tenageia Ehrh. Früher häufiger, heute Coerdeheide, Gasselsstiege, Gelmer Heide, Wald bei der Hubertusburg.

Cyperaceae.

Cyperus flavescens L. Ziegelei bei Sudmühle.

Cladium Mariscus R. Br. Der alte Standort auf der Coerdeheide wird wegen der Trockenheit bald ganz eingehen; der neue Standort liegt diesselts Jägerhaus an der Telgter Chaussee.

Heleocharis acicularis L. Coerdeheide, Sudmühle.

Scirpus Pollichi Godr. Gren. Laer.

Eriophorum vaginatum L. Hornheide, Osterwick.

Carex dioica L. Coerdeheide bei den alten Lehmgruben.

„ *pulcaris L.* Coerdeheide häufig.

„ *disticha Huds.* Coerdeheide, Wolbeck, Angelmodde, Loddenheide.

„ *paniculata L.* Bei Dorf Handorf.

„ *Oederi Ehrh.* Coerdeheide, Sudmühle, Angelmodde.

„ *distans L.* Coerdeheide.

„ *filiformis L.* „

„ *irrigua Sm.* Coerdeheide, nicht weit von der Liebesinsel.

Gramineae.

Koeleria cristata Pers. Am Bahndamm der Eisenbahn nach Rheine bei der „Mergelgrube“.

Poa aeroides Koel. Gasselsstiege gemein.

Equisetaceae.

Equisetum silvaticum Ehrh. Kaiserei bei Riesenbeck, Fuestruper Berge, Maikotten.

Lycopodiaceae.

Lycopodium Selago L. Eulenfels und Kaiserei bei Riesenbeck, Tecklenburg.

„ *annotinum L.* Loddenheider Wald, hinter Sebon, Osterwick.

„ *chamaecyparissus A. Br.* Hörstel.

Polypodiaceae.

Asplenium Trichomanes L. Hohlweg bei Eggers am Schiffahrter Damm.

Scolopendrium vulgare Sm. Polsum (Wegner).

Osmundaceae.

Osmunda regalis L. Kappenberger Damm, Gr. Reken, Steveder Venn, Stadthohn, Metelen.

Ophioglossaceae.

Ophioglossum vulgatum L. Coerdeheide am Bahndamm der Rheiner Eisenbahn, Laer bei Wolbeck, Hochlar bei Recklinghausen (leg. Wegner).

Marsiliaceae.

Pilularia globulifera L. Römerwirt, Deitmers Ziegelei auf der Coerdcheide. (Der alte Standort auf Vormanns Heide ist eingegangen.)

Nachtrag: Während des Druckes gefunden:

Littorella lacustris L. Jägerhaus, am Wege nach Haus Langen.

