

### Anlage III. zum Berichte der botanischen Section.

Von einem der thätigsten Mitglieder der botanischen Section ist eine ausführliche Zusammenstellung aller bemerkenswerthen Pflanzen der von ihm durchforschten Gegenden eingesandt. Es ist das als ein schätzenswerther Beitrag zur Flora Westfalens überhaupt zu betrachten. Würden uns aus andern Bezirken ähnliche Zusammenstellungen geliefert, so könnte bald eine neue vollständige Flora Westfalens bearbeitet werden. Die vorliegende Arbeit, welche in der Sectionssammlung niedergelegt ist, enthält so reiches Material an Specialien über Verbreitung und Standorte, dass wir auf dieselbe verweisen müssen. Nachstehend nur eine gedrängte Uebersicht des Bemerkenswerthern. Die Beläge für das Ganze sind vom Verfasser eingesandt und bereits dem Provincial-Herbar einverleibt.

Der Vorstand der bot. Section.

#### Beiträge zur Flora von Westfalen

an Gefässpflanzen des Kreises Beckum und der angrenzenden Theile der Kreise Warendorf, Wiedenbrück, Lippstadt und Soest, sowie des Amtsbezirks Wolbeck, von M. Holtmann, Lehrer zu Albersloh.

*Hepatica triloba* Gil. Beckum, Dolberg und Albersloh.

*Anemone ranunculoides* L. Liesborn an verschiedenen Stellen in Wäldern häufig.

*Adonis aestivalis* L. Bei Beckum und Walstette auf Aeckern nicht selten.

*Ranunculus lanuginosus* L. Bei Benninghausen und zwischen Herzfeld und Lippborg in Wäldern, oft in grosser Menge.

*Ranunculus Philonotis* Ehrh. Liesborn im Südfelde und faulen Felde häufig.

*Helleborus viridis* L. Wadersloh, Waldränder bei Vahlhaus und Brexel mit *Vinca minor*.

*Aquilegia vulgaris* L. Wadersloh, Herzfeld und Albersloh (auch bei Oelde Ws.).

*Actaea spicata* L. Bei Beckum, Gebüsch am Wege nach Diestedde.

*Arabis hirsuta* Scop. Liesborn und Albersloh.

*Viola palustris* L. Liesborn, Wadersloh und Albersloh.

*Viola hirta* L. In der Nähe von Herzfeld.

*Gypsophila muralis* L. Benninghausen, Liesborn und Albersloh auf Aeckern.

*Vaccaria parviflora* Mch. Ennigerloh bei Stumpenhorst und Vellern am Wege nach Ennigerloh. Aecker.

*Silene gallica* L. Cappel bei Lippstadt und Wadersloh. Aecker.

*Sagina apetala* L. Liesborn und Wadersloh, häufig auf Aeckern.

- Spergula Morisonii* Boreau. (Sp. pentandra Ant. non L.) Haideboden bei Liesborn, in Menge.
- Holosteum umbellatum* L. Aecker zwischen Oelde und Ennigerloh, häufig.
- Malva Alcea* L. Liesborn, Bauerschaft Herzfeld und von da nach Lippborg, so wie zwischen Albersloh und Sendenhorst, ziemlich verbreitet.
- Hypericum pulchrum* L. In Gebüschchen der Umgegend von Liesborn.
- Geranium palustre* L. Zwischen Diestedde und Beckum.
- Geranium pratense* L. Liesborn, Wiesen des Amtmanns.
- Melilotus alba* Desr. Dorf Langenberg am Wege nach Wiedenbrück, zahlreich.
- Vicia villosa* Roth. Liesborn, Wadersloh, zwischen Lippstadt und Erwitte und bei Albersloh. Aecker.
- Vicia lathyroides* L. Lippstadt, am Wege nach Lipperode. Weiden. Häufig.
- Lathyrus sylvestris* L. Beckum und Albersloh.
- Prunus Padus* L. Bei Liesborn, Hecken und Gebüschchen, sehr verbreitet.
- Potentilla fragariastrum* Ehrh. Liesborn, zwischen Wadersloh und Stromberg und Alverskirchen, Wälder und Gebüschchen, ziemlich häufig.
- Rosa rubiginosa* L. Liesborn, Beckum, Dolberg und Albersloh.
- Rosa tomentosa* L. Liesborn, Wadersloh, Albersloh und zwischen Stromberg und Oelde nicht selten.
- Epilobium roseum* Schreb. Bei Liesborn und Cappel.
- Epilobium tetragonum* L. Albersloh an verschiedenen Stellen recht zahlreich.
- Hippuris vulgaris* L. Liesborn, im Biesterbach, Rottbach, in der Liese und Glenne, stellenweise massenhaft.
- Lythrum Hyssopifolia* L. Albersloh bei Hagemann sumpfige Stelle an der Strasse.
- Bupleurum rotundifolium* L. Beckum, Ennigerloh und Albersloh nach Rinkerode und nach Wolbeck hin, auf Aeckern.
- Cicuta virosa* L. Bei Rietberg am Ufer der Ems.
- Helosciadium repens* Koch. Liesborn an mehreren Stellen.
- Helosciadium inundatum* Koch. Zwischen Beckum und Diestedde, auch Albersloh bei Beul an der Thiergartenhaide.
- Falcaria Rivini* Host. Albersloh bei Grosse Ahrenhorst.
- Selinum Carvifolia* L. Liesborn, Herzfeld bis Beckum und nach Dolberg hin, auch in den Gemeinden Albersloh und Rinkerode häufig.
- Thysselinum palustre* Hoffm. Wadersloh, auch Albersloh Weg nach Sendenhorst.
- Caucalis daucoides* L. Bei Albersloh, besonders Rinderode häufig. Fehlt in Umgegend von Stromberg, Oelde, Diestedde, Herzfeld, Wadersloh und Liesborn.
- Chaerophyllum bulbosum* L. In der Umgegend von Liesborn und Wadersloh häufig.
- Viscum album* L. Liesborn und Herzfeld auf Apfelbäumen.
- Sambucus Ebulus* L. Liesborn, Benninghausen und Merklingshausen in Menge.
- Lonicera Xylosteum* L. Liesborn Weg nach Benninghausen und Wadersloh Weg nach Stromberg.
- Galium sylvaticum* L. Liesborn, ebenso bei Benninghausen an mehreren Stellen.
- Inula Helenium* L. In den Gemeinden Herzfeld und Wadersloh auffallend stark verbreitet.

- Inula salicina* L. Bei Herzfeld, nach Diestedde und in der Gegend von Beckum nach Oelde hin, in Wiesen immer mehr verbreitet (droht ein lästiges Unkraut zu werden Ws.).
- Conyza squarrosa* L. Bei Liesborn und Wadersloh.
- Gnaphalium luteo-album* L. Zwischen Liesborn und Cappel.
- Helichrysum arenarium* dC. Liesborn auf einer Weide.
- Arnica montana* L. Liesborn im grossen Holz und Amelsbüren ohnweit Heithorn.
- Senecio nemorensis* L. Sendenhorst in der Richtung nach Albersloh in Gebüsch häufig.
- Senecio paludosus* L. Liesborn Teiche, Suderlage am Ufer der Glenne.
- Cirsium oleraceum* Scop. Liesborn, Wadersloh, Herzfeld, Diestedde, Albersloh, sehr verbreitet. (Fehlt bei Münster und nordwestlich gänzlich. Ws.)
- Centaurea solstitialis* L. Albersloh bei Grosse Ahrenhorst.
- Crepis paludosa* Mnh. Albersloh, Liesborn, Herzfeld, Stromberg und nach Oelde hin, meist sehr verbreitet.
- Hieracium aurantiacum* L. Lippstadt zwischen Bruchbaum und Cappel, ziemlich zahlreich.
- Phyteuma spicatum* L. form. *P. nigrum* Schmidt. Liesborn im Holz, Albersloh und zwischen Wolbeck und Sendenhorst (auch Gebüsch beim Gute Heithorn Amelsbüren Ws.).
- Campanula glomerata* L. Beckum, Ennigerloh und Vellern.
- Campanula rapunculoides* L. Liesborn, Wadersloh, Albersloh und Ennigerloh.
- Specularia hybrida* Alph. dCand. Oelde in der Richtung nach Stromberg und nach Ennigerloh auf Aeckern ziemlich zahlreich.
- Vaccinium Oxycoccos* L. Lippstadt bei Cappel.
- Pyrola minor* L. Stromberg, Oelde und Wadersloh.
- Pyrola secunda* L. Albersloh in der Hohenwarth links am hohen Wege, Kiefernwaldung.
- Monotropa Hypopitys* L. Albersloh in Kiefernwaldungen am Wege nach Münster. Dort auch die var. *hirsuta* Koch.
- Gentiana cruciata* L. Bei Diestedde Weg nach Oelde in einer Kalkwiese zahlreich.
- Gentiana amarella* L. form. *G. uliginosa* Rohb. Bei Cappel in der Lipperhaide und Albersloh in der Hohenwarth.
- Gentiana ciliata* L. Zwischen Stromberg und Oelde und bei Dolberg (auch bei Beckum Höcksberg Ws.)
- Cynoglossum officinale* L. Liesborn und Wadersloh.
- Myosotis sylvatica* Hofm. Bei Ennigerloh, Hoetmar und zwischen Dolberg und Lippborg.
- Physalis Alkekengi* L. Beckum am Wege nach Ahlen in einem Graben.
- Hyoscyamus niger* L. Liesborn Abteiplatz und Cappel Stiftsplatz.
- Datura Stramonium* L. Drensteinfurt, Bauerschaft Norddorf in Menge in einem Graben am Wege.
- Linaria Elatine* Mill. Im ganzen Gebiete auf Kalkäckern verbreitet, besonders bei Albersloh und Rinkerode.
- Linaria spuria* Mill. Ebenso z. B. Herzfeld, Stromberg, Beckum, Dolberg, Ennigerloh, Ostenfelde, Drensteinfurt, Albersloh und Rinkerode.

- Antirrhinum Orontium* L. Liesborn und Wadersloh, Aecker.  
*Digitalis purpurea* L. Liesborn und Wadersloh an vielen Stellen häufig.  
*Veronica longifolia* L. Angelmodde an der Angel.  
*Veronica montana* L. Liesborn, Wadersloh, Stromberg, Sünninghausen und Albersloh.  
*Limosella aquatica* L. Lippstadt, zwischen Cappel und Böbbing auf dem sumpfigen Boden der Glenne in Menge.  
*Pedicularis palustris* L. Ebendasselbst in einer Sumpfwiese.  
*Orobanche minor* Sutt. Alverskirchen bei Lütke Holling, Kleeäcker.  
*Mentha Pulegium* L. Liesborn, Wadersloh und Cappel bei Lippstadt.  
*Mentha sylvestris* L. Hellinghausen bei Lippstadt.  
*Calamintha Acinosa* Clairv. Ennigerloh und Drensteinfurt im Berkenfelde recht häufig.  
*Galeopsis versicolor* Curt. Liesborn, Mastholte und an dem Lippstadt-Rhedaer Wege auf Aeckern zahlreich.  
*Stachys annua* L. Beckum in der Nähe der Steinbrüche.  
*Ballota nigra* L. Liesborn, Wadersloh, Herzfeld, Ennigerloh, Benninghausen und Lippstadt.  
*Leonurus Cardiaea*. Liesborn und Wadersloh.  
*Ajuga Chamaepitys* Schreb. Beckum, Ennigerloh und Albersloh. Aecker.  
*Teucrium Botrys* L. Beckum in Nähe der Station und auf dem Höcksberge.  
*Teucrium Scordium* L. Liesborn am Rottbach, Wadersloh Bauerschaft Basel, Lippstadt Lipperhaide bei Cappel und Rhedaer Chaussee, Sendenhorst bei Schlotte, Albersloh Thiergartenhaide, und bei Grosse Westarp, auch zwischen Wolbeck und Telgte.  
*Pinguicula vulgaris* L. Nicht in der Gegend von Lippstadt, wohl aber bei Diestedde und Albersloh.  
*Trientalis europaea* L. Nur bei Liesborn im Walde von Schulze Spork gefunden.  
*Primula officinalis* Jacq. Nur bei Liesborn in der Richtung nach Wadersloh an mehreren Stellen ziemlich häufig.  
*Samolus Valerandi* L. Wadersloh und Albersloh verschiedentlich in zahlreicher Menge.  
*Littorella lacustris* L. Albersloh nasse Haideplätze bei der Ziegelei, und in der Thiergartenhaide nach Wolbeck.  
*Chenopodium hybridum* L. Zwischen Lippborg und Dolberg.  
*Rumex maritimus* L. Drensteinfurt, Bauerschaft Norddorf am Wege nach Albersloh.  
*Polygonum Bistorta*, Liesborn und Albersloh an mehreren Stellen.  
*Aristolochia Clematitis* L. Herzfeld, Bauerschaft Heckentrup in der wilden See.  
*Euphorbia Esula* L. Dolberg an der Chaussee nach Beckum bei den Kalkhügeln in Menge.  
*Mercurialis perennis* L. Wälder, bei Liesborn an mehreren Stellen, ferner bei Cappel, Dolberg, Ennigerloh und Albersloh.  
*Mercurialis annua* L. Liesborn als Gartenunkraut sehr häufig. (Fehlt in manchen Bezirken z. B. bei Münster gänzlich Ws.)

- Stratiotes aloides* L. Kommt im Kreise Beckum und der Gegend von Lippstadt nicht vor, wohl aber bei Alverskirchen und Albersloh.
- Alisma ranunculoides* L. Cappel bei Lippstadt, Albersloh und Wadersloh.
- Potamogeton rufescens* Schrad. Liesborn im Rottbach, Albersloh Bauerschaft Ahrenhorst. Tümpel.
- Potamogeton rufescens* var. *fluitans* Sm. Albersloh beim Hause Sunger in einem Bache. (Eine sehr eigenthümliche Form. W.)
- Potamogeton gramineus* L. Albersloh bei Ahrenhorst.
- Potamogeton pectinatus* L. Cappel in der Lipperhaide in Gräben.
- Potamogeton densus* L. Liesborn in der Liese häufig, dort auch die var. *P. serratus* L., ferner Albersloh auf der West.
- Typha angustifolia* L. Lippstadt bei Overhagen im Eisenbahngraben, Albersloh Bauerschaft Rummeler.
- Calla palustris* L. Liesborn, Suderlage in einem Sumpfe bei der Schule, sehr zahlreich.
- Orchis purpurea* Huds. (*O. fucca* Jacq.) Stromberg Abhänge rechts von der Kirche, sehr häufig in den Wäldern zwischen St. und Oelde.
- Orchis militaris* L. Beckum am Höcksberge.
- Platanthera bifolia* Rchb. Liesborn, Albersloh, Ennigerloh, Wolbeck, Sendenhorst, stellenweise sehr häufig.
- Platanthera montana* Rchb. fil. Albersloh an verschiedenen Stellen der Umgegend nicht selten.
- Herminium Monorchis* B. Br. Beckum und Höcksberge (und bei Boyenstein. Ws.).
- Ophrys muscifera* Huds. Beckum am alten Wege und am Höcksberge, auch bei Ennigerloh spärlich. Häufig zwischen Stromberg und Oelde, so wie bei Albersloh, Bauerschaft West und Storp.
- Ophrys apifera* Huds. Beckum am Höcksberge ziemlich zahlreich.
- Cephalanthera grandiflora* Bbgt. Beckum, Sünninghausen, Albersloh und Rinkerode. Wälder.
- Spiranthes autumnalis* Rich. Liesborn, Wadersloh, Benninghausen und Albersloh.
- Cypripedium Calceolus* L. Wald zwischen Oelde und Stromberg, links am Wege.
- Leucojum vernum* L. Liesborn, Bauerschaft Göttingen bei Gentrup in einem Graben, in noch viel grösserer Menge in dem nahe liegenden Walde, offenbar nicht verwildert, zugleich mit *Gagea spathacea*, *G. lutea*, *Anemone ranunculoides* etc.
- Galanthus nivalis* L. Cappel, Liesborn in Gräben, sehr häufig im grossen Holz dort.
- Gagea spathacea* Schult. Liesborn in Wäldern an mehreren Stellen, desgleichen Wadersloh bis nach Diestedde hin. Die Pflanze ist also im südöstlichen Theile des Kreises Beckum ziemlich verbreitet.
- Allium ursinum* L. Liesborn an mehreren Waldstellen.
- Allium vineale* L. Aecker bei Albersloh, Bauerschaft Ahrenhorst und Alst, in letzterer mit der folgenden Art.
- Allium oleraceum* L. auch bei Liesborn, dort nur Zwiebeln tragend, Beckum im Stadtfelde häufig und blühend.

- Colchicum autumnale* L. Lippstadt bei Böckerfoerde, Lippborg, Wiese bei Forstman. (Ist bei Münster und nördlich nicht verbreitet. Ws.)
- Cyperus fuscus* L. Liesborn, Bauerschaft Hentrup.
- Heleocharis uniglumis* Lk. Liesborn Wiese bei Niehoff.
- Scirpus pauciflorus* Lightf. Liesborn im grossen Holz, Albersloh, Bauersch. West.
- Scirpus maritimus* L. Liesborn, linkes Ufer des Biesterbaches.
- Scirpus compressus* Pers. Wadersloh, Bauerschaft Borenfeld, Albersloh, Bauerschaft West.
- Eriophorum vaginatum* L. Cappel bei Lippstadt und Albersloh bei der Bockholtschen Ziegelei.
- Eriophorum gracile* Koch. Bei Langenberg, Bauersch. Allerbeck, Sumpf am Wege.
- Carex dioica* L. Albersloh, Bauerschaft Rummeler mit der folgenden Art.
- Carex pulicaris* L. Auch in der Gemeinde Liesborn an mehreren Stellen häufig.
- Carex arenaria* L. Lippstadt, Gegend nach Cappel hin.
- Carex paniculata* L. Wiese am Wege von Diestedde nach Oelde hinter dem Parke von Crassenstein.
- Carex canescens* L. Liesborn, Cappel, Albersloh, Bauerschaft West und beim Hause Sunger.
- Carex stricta* Good. Mastholte nach Rietberg hin in Gräben.
- Carex flava* L. Bei Liesborn an mehreren Stellen. (Auch zwischen Stromberg und Beckum Ws.)
- Carex riparia* Curt. In der Gegend von Liesborn und Albersloh an mehreren Stellen.
- Oryza clandestina* Al. Br. (*Leersia oryzoides* Sw.) Lippstadt bei Cappel in der Gegend von Böbbing.
- Melica uniflora* Retz. Liesborn, Stromberg, Albersloh.
- Melica nutans* L. Liesborn, Bauersch. Göttingen vor der Tempelbrücke im Walde.
- Poa serotina* Ehrh. Liesborn am Biesterbach.
- Catabrosa aquatica* P. B. (Aira L.) Vor Oelde bei der Stromberger Chaussee. Sumpf. Auch bei Albersloh.
- Agropyrum caninum* R & S. (*Triticum* L.) Liesborn Gegend von Haus Herzfeld.
- Equisetum sylvaticum* L. Liesborn an mehreren Stellen und bei Albersloh ziemlich häufig.
- Lycopodium annotinum* L. Albersloh, Bauerschaft Rummeler.
- Ophioglossum vulgatum* L. Liesborn, Stromberg und Sendenhorst.
- Botrychium Lunaria* Sw. Liesborn am Abhange der Strasse nach Beckum, sparsam.
- Osmunda regalis* L. Zwischen Lippstadt und Cappel. Sehr häufig.
- Polystichum Thelypteris* Rth. Cappel bei Lippstadt und Albersloh beim Hause Sunger und bei der Ziegelei.
- Polystichum Oreopteris* dCand. Liesborn an der Strasse nach Benninghausen ziemlich häufig.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst](#)

Jahr/Year: 1874

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Holtmann Max

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora von Westfalen 123-128](#)