

## Anlage V. zum Jahresberichte der zoologischen Section.

## Verzeichniss der Spinnen Westfalens.

Von Ferd. Karsch jun.

## Ordo Araneina, echte Spinnen.

Subordo I. *Orbitelae*, Radspinnen.1. Fam.: *Epeiroidae*, Kreuzspinnen.1. Subfam.: *Epeirinae*.1. Genus: *Epeira* (Walck.), Kreuzspinne.

1. *Ep. angulata* (Clerck), Höckerkreuzspinne. In Gärten der Stadt Münster.
2. *Ep. bicornis* (Walck.). Selten, auf Waldwiesen.
3. *Ep. diademata* (Clerck), Steinbindenkreuzspinne. Ueberall gemein.
4. *Ep. alsine* (Walck.), Waldkreuzspinne. Selten, im Grase der Wälder.
5. *Ep. marmorea* (Clerck), marmorirte Kreuzspinne. In Hecken häufig.
6. *Ep. pyramidata* (Clerck), Pyramiden-Kreuzspinne. Wie vorige gemein.
7. *Ep. quadrata* (Clerck), Gevierte-Kreuzspinne. Wie vorige, aber seltener.
8. *Ep. cornuta* (Clerck), Hornkreuzspinne. Im Schilf gemein.
9. *Ep. patagiata* (Clerck), Bramkreuzspinne. In Hecken gemein.
10. *Ep. scolopetaria* (Clerck), Pistolenkreuzspinne. Städtische Schwimmanstalt.
11. *Ep. umbratica* (Clerck), Schattenkreuzspinne. Unter Baumrinde.
12. *Ep. sollers* (Walck.), geschickte Kreuzspinne. Auf Haide häufig.
13. *Ep. agalena* (Walck.), trübe Kreuzspinne. Selten auf Gesträuch.
14. *Ep. cucurbitina* (Clerck), kürbisfarbene Kreuzspinne. Ueberall häufig.
15. *Ep. adianta* (Walck.), bedachte Kreuzspinne. Auf Haide.
16. *Ep. acalypha* (Walck.), unbedachte Kreuzspinne. Im Schlossgarten.

2. Genus: *Cyrtophora* (Sim.)

17. *C. conica* (Pallas), kegelförmige Kreuzspinne. In Wäldern durch ihr zwischen den Baumstämmen ausgespanntes Radgewebe lästig.

3. Genus: *Singa* (C. Koch), Singa.

18. *S. hamata* (Clerck), Haken-Singa. In Hecken.
19. *S. pygmaea* (Sund.), Zwerg-Singa. Selten.

4. Genus: *Cercidia* (Thor.), Haarkammspinne.

20. *Cerc. prominens* (Westr.) und *scutifera* (Westr.). Sehr selten. In Wäldern.

5. Genus: *Zilla* (C. Koch), Zilla.

21. *Z. x-notata* (Clerck), Schönblatt-Zilla. In Häusern und Gärten der Stadt.
22. *Z. atrica* (C. Koch), schwärzliche Zügelspinne. Auf Haide am Nadelholz. Beide Arten sehr gemein.

6. Genus: *Meta* (C. Koch), Meta.

23. *M. segmentata* (Clerck), ausgelegte Meta. In Hecken gemein.
24. *M. Mengei* (Blackw.). Nur in Wäldern, ziemlich häufig.

7. Genus: *Tetragnatha* (Walon.), Vierkiefer.

25. *T. extensa* (Linn.), ausgestreckter Vierkiefer. Alter-Weiber-Sommer. Ueberall gemein.

Subordo II. *Retitelariae*, Netzspinnen.Fam. I. *Theridioidea*.1. Genus: *Pachygnatha* (Sund.), Dickkiefer.

26. *P. Clerckii* (Sund.), Clercks Dickkiefer. Auf der Mauer am Aegidii-Thor.  
 27. *P. De Geerii* (Sund.), De Geers Dickkiefer. Im Grase gemein.  
 28. *P. Listeri* (Sund.), Listers Dickkiefer. Nehmen alle am Alten-Weiber-Sommer  
 regsten Antheil.

2. Genus: *Episinus* (Walck.).

29. *E. truncatus* (Walck.) Sehr selten.

3. Genus: *Tapinopa* (Westr.), Flachkopf.

30. *T. longidens* (Reuss), langzähliger Flachkopf. Im Moose der Wälder.

4. Genus: *Erigone* (Sav. et Aud.).

31. *E. longipalpis* (Sund.), langtasterige Erigone.  
 32. *E. graminicola* (Sund.), Grasscharfzahn.  
 33. *E. rufa* (Reuss), röthliche Erigone.  
 34. *E. rubens* (Blackw.), rothe Kniespinne.  
 35. *E. isabellina* (C. Koch), isabellfarbene Kniespinne.  
 36. *E. cristata* (Blackw.), Helmbusch-Hügelauge.  
 37. *E. apicata* (Blackw.), Helm-Stielkopf.  
 38. *E. acuminata* (Blackw.). Alle acht mehr oder weniger selten auf Gesträuch  
 und im feuchten Moose der Wälder.  
 39. *E. antica* (Reuss). Scheint selten zu sein.

5. Genus: *Linyphia* (Latr.), Weberspinne.

40. *L. triangularis* (Clerck), kurzkieferige Weberspinne. In Hecken.  
 41. *L. macrogatha* (Menge), langkieferige Weberspinne. (Zweifelhafte Art.)  
 42. *L. montana* (Clerck), Bergweberspinne. An Geländern häufig.  
 43. *L. clathrata* (Sund.), gegitterte Weberspinne. Auf Haide nicht selten.  
 44. *L. frutetorum* (C. Koch). In Feldhölzern auf Gebüsch.  
 45. *L. pusilla* (Sund.), Zwerg-Weberspinne. Im Grase und Haidekraut.  
 46. *L. emphana* (Walck.), Spiegelbild-Weberspinne. In Wäldern selten.  
 47. *L. thoracica* (Reuss.), Harnisch-Weberspinne.  
 48. *L. minuta* (Blackw.), kleine Feinspinne.  
 49. *L. nebulosa* (Sund.), finstere Feinspinne.  
 50. *L. bucculenta* (Clerck), bausbackige Fadenspinne.  
 51. *L. dorsalis* (Reuss), gebänderte Fadenspinne.  
 52. *L. frenata* (Reuss), Zügelnetzspinne.  
 53. *L. straminea* (C. Koch). Alle sieben nicht selten auf niederen Pflanzen.  
 54. *L. socialis* (Sund.), gesellige Fluchtspinne. An Baum- namentlich Birken-  
 stämmen in Wäldern.

6. Genus: *Nesticus* (Thor.).

55. *N. cellulanus* (Clerck), Kellerfeinspinne, nur in Kellern.

7. Genus: *Ero* (C. Koch), Ero.

56. *E. tuberculata* (De Geer), höckerige Ero. Sehr selten in den Gärten der Stadt,  
 dem Schlossgarten und in Wäldern auf Gebüsch.

8. Genus: *Phyllonotis* (Thor.), Netzspinner.

57. *Ph. lineata* (Clerck). Ueberall gemein auf Gesträuch.

9. Genus: *Theridium* (Walck.), Wildspinne.

58. *Th. formosum* (Clerck), schöne Wildsp. 62. *Th. tinctum* (Walck.), besprenk. Wildsp.

59. *Th. riparium* (Blackw.), Ufer-Wildsp. 63. *Th. denticulatum* (W.), gezierte Wildsp.

60. *Th. pictum* (Walck.), bezeichnete Wildsp. 64. *Th. sisyphium* (Clerck), Sisyphus-Wdsp.

61. *Th. varians* (Hahn), veränderl. Wildsp. 65. *Th. pulchellum* (W.), hübsche Wildsp.

66. *Th. pallens* (Blackw.), bleiche Wildspinne. Alle neun nicht selten in Wäldern.

67. *Th. bimaculatum* (Linn.), zweifleckige Nesthüterin. Im feuchten Grase häufig.

10. Genus: *Steatoda* (Sund.), Fettspinne.

68. *St. bipunctata* (Linn.), Zweipunkt-Fettspinne. In Wohnungen gemein.

69. *St. guttata* (Reuss), Krustenspinchen. Selten in Waldungen am Boden.

11. Genus: *Lithyphantes* (Thor.).

70. *L. corollatus* (L.), Steinweberin. Uppenberg bei Kinderhaus unter Steinen.

### Subordo III. *Tubitelariae*, Röhrenspinnen.

I. Fam.: *Agalenoidea*, Trichterspinnen. — Subfam. I.: *Amaurobinae*, Finsterlinge.

1. Genus: *Dictyna* (Sund.), Lauerspinne.

71. *D. arundinacea* (Linn.), Rohr-Lauerspinne. Nützlich in den Weinbergen.

72. *D. variabilis* (C. Koch), veränderliche Lauerspinne. Schlossgarten.

73. *D. viridissima* (Walck.), grüne Lauerspinne. In den Gärten der Stadt.

2. Genus: *Amaurobius* (C. Koch), Finsterling.

74. *A. ferox* (Walck.), wilder Finsterling.

75. *A. fenestralis* (Stroem.), Fenster-Finsterling; beide in Kellern.

76. *A. terrestris* (C. Koch), Erdfinsterling. In der Erde in Waldungen, auf Haide unter Steinen. (Zweifelhafte Art.)

Subfam. II.: *Agaleninae*, Schnellläufer.

1. Genus: *Tegenaria* (Latr.), Deckenspinne.

77. *Teg. Derhanii* (Scop.), Derhanis Deckenspinne. In Häusern meist vagabundierend.

78. *Teg. domestica* (Clerck), Winkelhausspinne. In Haus und Garten gemein.

79. *Teg. agrestis* (Walck.), Feldspinne. Seltener als vorige in Wäldern und Hecken.

80. *Teg. atrica* (C. Koch), bei Essen a. d. R. an altem Gemäuer.

2. Genus: *Hahnia* (C. Koch).

81. *H. nova* (Blackw.), emsige Hahnin. Im Moose der Waldungen.

3. Genus: *Agalena* (Walck.), Schnellläufer.

82. *Ag. labyrinthica* (Clerck), Labyrinth-Schnellläufer. Auf Haideland gemein.

4. Genus: *Tetrax* (Sund.), Webspinne.

83. *T. denticulata* (Oliv.), gezähnte Webspinne. Ziemlich selten in Waldungen.

5. Genus: *Agroeca* (Westr.), Feldspinne.

84. *Ag. brunnea* (Blackw.), braune Feldspinne. Alter-Weiber-Sommer.

Subfam. III.: *Argyronetinae*, Wasserspinnen.

Genus: *Argyroneta* (Latr.), Silberschwimmer.

85. *Arg. aquatica* (Clerck), Wassersilberschwimmer. In Gräben der Loddenhaide.

II. Fam.: *Drassoidae*.

1. Genus: *Zora* (C. Koch), Schnellläufer.

86. *Z. maculata* (Blackw.), bunter Schnellläufer. Im Moose der Wälder.

2. Genus: *Anyphaena* (Sund.), Netzzerstörer.  
 87. *An. accentuata* (Walck.), accentuirter Netzzerstörer. Im Laubwald, häufig zwischen zusammenges. Blättern. Sein Platz im System ist sehr schwankend.

3. Genus: *Clubiona* (Latr.), Graurock.

88. *Cl. pallidula* (Clerck), heller Graurock.  
 89. *Cl. phragmitis* (C. Koch), = *holosericea* (De Geer).  
 90. *Cl. subsultans* (Thor.), = *erratica* (C. Koch). Alle häufig im Grün.  
 91. *Cl. corticalis* (Walck.), Rinden-Graurock. In Gärten der Stadt unter Steinen.  
 92. *Cl. compta* (C. Koch), geschmückter Graurock. In Waldungen zwischen zusammengesponnenen Blättern.  
 93. *Cl. trivialis* (C. Koch), gemeiner Graurock. Gern im Moose der Wälder.  
 94. *Cl. subtilis* (L. Koch), winziger Graurock. Zwischen zusammengesponn. Blättern.

4. Genus: *Chiracanthium* (C. Koch), Stacheltaster.

95. *Ch. nutrix* (Walck.), Ammen-Stacheltaster. An feuchten Stellen an Grashalmen.  
 96. *Ch. carnifex* (Fabr.), tödtender Stacheltaster. Gern zwischen Nadelholz.

5. Genus: *Phrusolithus* (C. Koch), Steinwächter.

97. *Ph. festivus* (C. Koch), hübscher Steinwächter. Auf Haide unter Steinen, bei Nienberge nicht selten.

6. Genus: *Micaria* (Westr.), Schillerspinne.

98. *M. fulgens* (Walck.), glänzende Schillerspinne. Alter-Weiber-Sommer. Selten.  
 99. *M. pulicaria* (Sund.), flohartige Schillerspinne. Im Moose der Wälder. Selten

7. Genus: *Drassus* (Walck.), Fänger.

100. *Dr. quadripunctatus* (Linn.), Vierpunkt-Fänger. In Häusern häufig.  
 101. *Dr. gotlandicus* (Thor.). Seltener als der vorige.  
 102. *Dr. scutulatus* (L. Koch), beschilterter Fänger.  
 103. *Dr. troglodytes* (C. Koch), Höhlenfänger. In Wäldern. Selten.  
 104. *Dr. lapidicola* (Walck.), Stein-Fänger. Unter Steinen am Wege, auf Haide.  
 105. *Dr. severus* (C. Koch). Bei Ibbenbüren an der betenden Jungfrau.

8. Genus: *Melanophora* (C. Koch), Schwarzrock.

106. *M. Petiverii* (Scop.). Auf Haide unter Steinen.  
 107. *M. pumila* (C. Koch), Zwerg-Schwarzrock. Uppenberg, unter Steinen.

III. Fam.: *Dysderoidae*, Kieferspinnen.

1. Genus: *Segestria* (Latr.), Sechsauge.

108. *Seg. sexoculata* (Linn.), Sechsauge. Ueberall unter Baumrinde, in den Mauerritzen

2. Genus: *Dysdera* (Latr.), Dysdere.

109. *Dysd. Cambridgii* (Thor.), Cambridge's Dysdere. Selten.

3. Genus: *Harpaetes* (Templeton), Räuber.

110. *Harp. Hombergii* (Scop.), Homberg's Räuber. Ibbenbüren bei der betenden Jungfrau unter Steinen. Selten.

Subordo IV. *Laterigradae*, Krabbenspinnen.

- I. Fam.: *Thomisoidae*, Faden-Krabbensp. — Subfam. I.: *Philodrominae*, Jagd-Krabbensp.

1. Genus: *Artanes* (Thor.), Artanes.

111. *Art. fusco-marginatus* (De Geer), Braunsaum-Artanes. An Baumstämmen.  
 112. *Art. pallidus* (Walck.), bleicher Artanes. Ebenda. Gern im Nadelwald.  
 113. *Art. margaritatus* (Clerck), gesprenkelter Artanus. Ebenda, doch seltener.



2. Genus: *Philodromus* (Walck.), Gernläufer.

114. *Phil. aureolus* (Clerck), goldfarbener Gernläufer. Auf Gebüsch im Sonnenschein.  
115. *Phil. dispar* (Walck.), ungleicher Gernläufer. Im Moose der Wälder.

3. Genus: *Thanatus* (C. Koch), Mordspinne.

116. *Than. formicinus* (Clerck), Ameisen-Mordsp. Im Moose zwischen Ameisen. Selten.  
Subfam. II.: *Thomisinae*, Fadenspinne.

1. Genus: *Thomisus* (Walck.), Fadenspinne.

117. *Thom. atomarius* (Panz.), bemalte Fadenspinne. Im Moose und am Wege.  
118. *Thom. brevipes* (C. Koch), kurzbeinige Fadenspinne. Ebenda, nicht selten.

2. Genus: *Misumena* (Latr.), Jagdfadenkrebsspinne.

119. *Mis. vatia* (Clerck), O-bein-Jagdfadenkrebsspinne. In den Gärten der Stadt, auf Blumen und überall gemein.

3. Genus: *Diaea* (Thor.), Diäe.

120. *Diaea dorsata* (Fabr.), Rückenblatt-Diäe. Selten, auf Nadelholz.

4. Genus: *Xysticus* (C. Koch), Wegkrabbenspinne.

121. *Xyst. cristatus* (Clerck), Kamm-Wegkrabbenspinne.

122. *Xyst. Kochii* (Thor.), Koch's Wegkrabbenspinne.

123. *Xyst. lanis* (C. Koch), Henker-Wegkrabbenspinne.

124. *Xyst. ulmi* (Hahn), Ulmen-Wegkrabbenspinne.

125. *Xyst. sabulosus* (Hahn), Sand-Wegkrabbenspinne.

126. *Xyst. bifasciatus* (C. Koch). Alle auf Gestrüch und am Wege häufig.

5. Genus: *Coriarachne* (Thor.), Wanzenpinne.

127. *Cor. depressa* (C. Koch), platte Wanzenpinne. Unter Baumrinde in Nadelholzwaldungen.

## Subordo V. *Citigradae*, Schnellläufer.

I. Fam.: *Lycosoideae*, Wolfspinnen.

1. Genus: *Lycosa* (Latr.), Wolfspinne.

128. *L. hortensis* (Thor.), Garten-Wolfspinne. Stellenweise nicht selten.

129. *L. arenaria* (C. Koch), Sand-Wolfspinne. Uppenberg.

130. *L. lugubris* (Walck.), dunkle Wolfspinne. In Waldungen

131. *L. monticola* (C. Koch), Berg-Wolfspinne. Baumberge.

132. *L. amentata* (Clerck), bunte Wolfspinne. An feuchten Stellen gemein.

133. *L. paludicola* (Clerck), Sumpf-Wolfspinne. Ueberall häufig.

134. *L. pullata* (Clerck), kleine Wolfspinne. Ueberall nicht selten.

2. Genus: *Tarentula* (Sund.), Tarantel.

135. *T. fabrilis* (Clerck), geschickte Tarantel. Uppenberg. Selten.

136. *T. barbipes* (Sund.), Bartfuss-Tarantel. Nienberge, nicht selten.

137. *T. pulverulenta* (Clerck), staubige Tarantel. In Waldungen.

138. *T. meridiana* (Hahn), Mittags-Tarantel. In Nadelholzwäldern.

139. *T. cuneata* (Clerck), Keilschien-Tarantel. In Wäldern, auf Haide.

140. *T. miniata* (C. Koch), Mennig-Tarantel. Uppenberg.

3. Genus: *Trochosa* (C. Koch), Läufer.

141. *Tr. ruricola* (De Geer), Landstreicher. Am Wege.

142. *Tr. terricola* (Thor.), Erdläufer. Bei Lengerich unter Steinen.

143. *T. picta* (Hahn), bunter Erdläufer. Auf Aeckern.

4. Genus: *Pirata* (Sund.), Korsar.  
 144. *P. leopardus* (Sund.), Leopard-Korsar. Auf Sandhügeln.  
 145. *P. piratica* (Clerck), Fluss-Pirat. An und auf Sümpfen und Flüssen.  
 146. *P. latitans* (Blackw.), versteckter Pirat.

5. Genus: *Dolomedes* (Latr.), Ränkespinner.  
 147. *Dol. fimbriatus* (Clerck), gesäumter Ränkespinner. Am Wasser.

6. Genus: *Ocyale* (Sav. et Aud.), Wassertreter.  
 148. *Oc. mirabilis* (Clerck), bewundernswerther Wassertreter.  
 149. *Oc. murina* (C. Koch), zweifelhafte Species, höchst wahrscheinlich nur Varietät von *Oc. mirabilis* (Cl.).

## Subordo VI. *Saltigradae*, Springspinnen.

### I. Fam.: *Attoidea*, Hüpfspinnen.

1. Genus: *Salticus* (Latr.), Springspinne.  
 150. *Salt. formicarius* (De Geer), Ameisen-Springspinne. Im Moose der Wälder zwischen Ameisen laufend.
2. Genus: *Epiblemum* (Hentz), Hüpfjäger.  
 151. *Ep. scenicum* (Clerck), Harlekin-Hüpfjäger. An Baumstämmen.  
 152. *Ep. histrionicum* (C. Koch), höchst wahrscheinlich nur Varietät der vorigen, aber lokal; bei Letmathe traf ich nur diese Form zahlreich an.
3. Genus: *Heliophanus* (C. Koch), Glanzhüpfspinne.  
 153. *Hel. cupreus* (Walck.), kupferfarbene Glanzhüpfspinne. Auf Gesträuch.  
 154. *Hel. flavipes* (Hahn), gelbfüßige Glanzhüpfspinne. Wie vorige.  
 155. *Hel. auratus* (C. Koch), goldige Glanzhüpfspinne. Mit voriger. Uppenberg auch unter Steinen.
4. Genus: *Ballus* (C. Koch), Wurfhüpfspinne.  
 156. *B. depressus* (Walck.), platte Wurfhüpfspinne. Selten auf Gesträuch.
5. Genus: *Marpessa* (C. Koch), Marpesse.  
 157. *Marp. muscosa* (Clerck), bunte Marpesse. An Baumstämmen, Geländern.
6. Genus: *Euophrys* (C. Koch), Schönkopfhüpfspinne.  
 158. *Euophr. frontalis* (Walck.), Stirnschönkopfhüpfspinne. Im Moose der Wälder.  
 159. *Euophr. petrensis* (C. Koch), Steinschönkopfhüpfspinne. Uppenberg unter Steinen.
7. Genus: *Attus* (Walck.), Springspinne.  
 160. *A. pubescens* (Fabr.), feinbehaarte Hüpfspinne. Ueberall gemein.  
 161. *A. floricolus* (C. Koch), Blumenhüpfspinne. Im Schilf und Rohr.  
 162. *A. saxicola* (C. Koch), Steinhüpfspinne. Uppenberg an Steinen.  
 163. *A. crucigerus* (Walck.), bekreuzte Hüpfspinne. Ebenda, nicht selten.  
 164. *A. falcatus* (Clerck), Sichel-Hüpfspinne. Im Grase, in Hecken gemein.  
 165. *A. erraticus* (Walck.), schweifende Hüpfspinne. Uppenberg.
8. Genus: *Yllenus*.  
 166. *Yll. saltator* (Sim.), Springinsfeld. Aufenthalt mir unbekannt. Nur ein Exemplar gefunden.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [5\\_1876](#)

Autor(en)/Author(s): Karsch Ferdinand Anton Franz

Artikel/Article: [Verzeichniss der Spinnen Westfalens. 79-84](#)