

Systematisch-statistische Uebersicht der Thüringischen Laubmoose.

I. Systematische Uebersicht der Thüringischen Laubmoose.

Mit Angabe ihres Vorkommens in den aufgestellten

IV Moosregionen

(nach Schimper's Sinopsis muscor. europaeum).

Von

A. Röse.

	I.	II.	III.	IV.
Musci acrocarpi.				
Ordo I. <i>Cleistocarpi.</i>				
Trib. I. Phascaceae.				
Fam. Ephemeraceae				
<i>Ephemerum serratum</i>	+	+		
<i>Ephemerella recurvifolia</i>	+			
<i>Physcomitrella patens</i>	+			
Fam. Phasceae				
<i>Microbryum Floerkean.</i>	+	+		
<i>Sphaerangium muticum</i>	+	+		
<i>triquetrum</i>	+	+		
<i>Phascum cuspidatum</i> c. Var.	+	+		
<i>bryoides</i>	+	+		
<i>curviculum</i>	+	+		
Trib. II. Bruchiaceae				
Fam. Pleuridieae				
<i>Pleuridium nitidum</i>	+	+		
<i>subulatum</i>	+	+		
<i>alternifolium</i>		+		
<i>Sporledera palustris</i>		+		

	I.	II.	III.	IV.
Ordo II. <i>Stegocarp.</i>				
Trib. I. <i>Weisiaceae</i> .				
Fam. <i>Weisieae</i>				
<i>Systegium crispum</i>	+	+		
<i>Gymnostom. rostellatum</i>		+		
<i>microstom.</i>	+	+		
<i>squarrosum</i>		+		
<i>tenue</i>		+		
<i>Weisia viridula</i> c. Var.	+	+	+	+
<i>mucronata</i>		+		
<i>Weisia fugax</i> c. Var.	—	—	+	+
<i>denticulata</i>	—	—	+	—
<i>crispula</i>	—	—	—	+
<i>cirrhatta</i> }	—	—	+	—
Var. <i>saxicola</i> }				
Fam. <i>Dieraneae</i>				
<i>Cynodontium Bruntoni</i>	—	+	+	+
<i>palycarpum</i>	—	—	+	+
<i>β. strumifer.</i>	—	—	+	+
<i>Dichodontium pellucidum</i>	—	+	+	—
<i>β. gracilesc.</i>	—	—	+	—
<i>Dieranella crispa</i>	—	+	—	—
<i>Schreberi</i>	+	+		
<i>squarrosa</i>	—	—	+	+
<i>cerviculata</i> c. Var.	—	+	+	+
<i>varia</i>	+	+	—	—
<i>rufescens</i>	+	+	—	—
<i>subulata</i>	—	—	+	—
<i>curvata?</i>				
<i>heteromalla</i>	+	+	+	+
Var. <i>sericea</i>	—	+	—	—
<i>Dieranum montanum</i>	—	+	+	+
<i>flagellare</i>	—	+	—	—
<i>longifolium</i>	—	—	+	+
<i>fulvum</i>	—	—	+	—
<i>fuscescens</i>	—	—	+	+
<i>fragilifol.</i>	—	+	—	—
<i>scoparium</i> c. Var.	+	+	+	+
<i>palustre</i>		+	+	+

	I.	II.	III.	IV.
Schraderi	—	—	—	+
spurium	—	+	+	—
undulatum	—	+	+	—
Dicranodontium longirostre	—	—	+	+
Campylopus flexuosus	—	—	+	+
β. Mülleri	—	—	+	—
fragilis	—	—	+	—
turfaceus	—	+	—	—
Trib. II. Leucobryaceae.				
Leucobryum glaucum	+	+	+	+
Trib. III. Fissidentaceae.				
Fissidens bryoides	+	+	+	—
exilis	—	+	+	—
incurvus	+	+	+	—
β. pusillus	—	+	+	—
(Fissidens) crassipes	+	—	—	—
osmundioides	+	—	—	—
taxifolius	+	+	+	—
adianthoides	+	+	+	+
Trib. IV. Seligeriaceae.				
Fam. Seligerieae.				
Anodus Donianus	—	+	+	—
Seligeria pusilla	—	+	+	—
tristicha	—	+	+	—
recurvata	—	+	+	—
Brachyodus trichodes	—	—	+	+
Campylostelium saxicola	—	—	+	+
Blindia acuta	—	—	+	—
Trib. V. Pottiaceae.				
Fam. Pottieae.				
Pharomitrium subsessilis	+	+	—	—
Pottia cavifolia c. Var.	+	+	—	—
minutula c. Var.	+	+	—	—
truncata c. Var.	+	+	+	+
Heimii	+	+	—	—
Anacalypta Starkeana	+	—	—	—
caespitosa	—	+	—	—

	I.	II.	III.	IV.
(Trichost. pallidisetum H. M.)				
lanceolata	+	+	—	—
Didymodon rubellus	—	+	+	—
cordatus Jur.	—	+	—	—
cuspid. Schim.	—	—	+	+
cylindricus	—	—	+	+
Eucladium verticillatum	—	—	+	—
Fam. Distichieae				
Distichum capillaceum	—	+	+	+
Fam. Ceratodonteae.				
Ceratodon purpureus	+	+	+	+
Trichodon cylindricus	—	+	+	—
Fam. Trichostomeae.				
Leptotrichum tortile	—	+	+	+
β. pusillum	—	+	—	—
homomallum	?	+	+	+
vaginans	—	—	+	+
flexicaule	—	+	+	—
pallidum	—	+	+	—
Trichostomum rigidulum	—	+	+	—
tophoceum	+	+	—	—
Barbula rigida	+	+	—	—
brevirostris	+	—	—	—
ambigua	+	—	—	—
aloides	+	—	—	—
unguiculata c. Var.	+	+	—	—
fallax c. Var.	+	+	+	—
vinealis	—	—	+	—
β. campestris	—	+	—	—
gracilis	—	+	—	—
Hornschuchian.	—	+	—	—
revoluta	—	+	+	—
convoluta	—	+	+	—
inclinata	—	+	+	—
tortuosa	—	+	+	—
squarrosa	—	+	—	—
muralis c. Var.	+	+	+	+
subulata	+	+	+	—

	I.	II.	III.	IV.
Barbula papillosa	+	+	—	—
latifolia	+	—	—	—
ruralis	+	+	+	+
Trib. VI. Grimmiaceae.				
Fam. Cinclidoteae				
Cinclidotus fontinalis	+	—	—	—
Fam. Grimmieae				
Grimmia conferta	—	+	—	—
apocarpa c. Var.	+	+	+	+
plagiopodia	—	+	—	—
obricularis	—	+	—	—
pulvinata c. Var.	+	+	+	—
Schultzei	—	—	—	+
contorta	—	—	—	+
Hartmanni	—	—	+	+
Doniana	—	—	—	+
ovata c. Var.	—	—	+	+
lencophaca	—	+	+	—
commutata	—	+	+	+
montana	—	—	+	—
Racomitrium patens	—	—	+	—
aciculare	—	—	+	+
β . rivularis	—	—	—	—
protensum	—	—	+	+
sudeticum	—	—	—	+
heterostich.	—	+	+	+
β . alopecur.	—	—	+	—
fasciculare	—	—	+	+
lanuginosum	—	+	+	+
canescens	—	+	+	+
β . ericoides	—	—	+	+
Fam. Hedwigieae				
Hedwigia ciliata	—	+	+	+
Fam. Ptychomitrieae				
Coscinodon pulvinatus	—	—	+	—
Fam. Zygodontaeae				
Amphoridium Mougeotii	—	—	+	+
Zygodon viridissimus	—	—	+	—

	I.	II	III.	IV.
Fam. Orthotrichieae				
Ulotia Ludwigii	—	+	+	+
Hutschinsiae	—	—	+	+
Bruchii	—	+	+	+
crispa	—	+	+	+
crispula	—	+	+	+
Orthotrichum cupulatum	—	+	+	—
Sturmii	—	—	+	+
obtusifolium	+	+	—	—
pumilum	+	+	—	—
fallax	+	+	—	—
affine	+	+	+	+
patens	—	+	—	—
speciosum	+	+	+	+
rupestre	—	+	+	—
stramineum	—	+	+	+
diaphanum	+	+	—	—
leiocarpum	—	+	+	—
Lyelii	—	+	+	—
Fam. Tetrarhidaeae				
Tetrarhis pellucida	—	+	+	+
Tetradontium Brownian.	—	—	+	+
Fam. Encalyptaceae				
Encalypta vulgaris	+	+	+	+
ciliata	—	+	+	+
streptocarpa	—	+	+	+
Trib. VII. Schistostegaceae				
Schistostega osmundacea	—	+	+	—
Trib. VIII. Splachnaeae				
Tayloria serrata	—	—	—	+
Splachnum sphaericum	—	—	—	+
ampullaceum	—	+	—	—
Trib. IX. Funariaceae				
Fam. Physcomitriaceae				
Pyramidula tetragona	—	+	—	—
Physcomitrium sphaericum	+	+	—	—
pyriforme	+	+	—	—
Entosthodon fasciculare	+	—	—	—
Funaria hygrometrica	+	+	+	+

	I.	II.	III.	IV.
Trib. X. Bryaceae				
Fam. Bryeae				
Leptobryum pyriforme	—	+	+	+
Webera elongata	—	—	+	+
β . macrocarpa	—	—	+	—
nutans c. Var.	—	+	+	+
cruda	—	+	+	+
annotina	—	+	+	—
carnea	+	+	—	—
albicans	—	+	+	—
Bryum pendulum	+	+	+	—
inclinatum	—	+	—	—
intermedium	—	+	+	+
bimum	+	+	+	+
pallescent	—	+	+	—
erythrocarp.	—	+	+	+
atropurpur.	+	+	—	—
argenteum	+	+	+	—
β . julacum	—	—	+	—
alpinum	—	+	+	—
caespitium	+	+	+	+
capillare	—	+	+	+
pseudotriquetr.	+	+	+	+
pallens	—	+	+	—
Duvalii	—	—	+	+
turbinatum	—	—	+	—
β . latifol.	—	—	+	+
roseum	+	+	+	—
Fam. Cylindrotheceae				
Lescuraea striata	—	—	—	+
Platygyrium repens	—	+	—	—
Cylindrothecium concinnum	—	+	—	—
Climacium dendroides	+	+	+	+
Fam. Pylaesieae				
Pylaesia polyantha	+	+	+	—
Fam. Hypneae				
Isothecium myurum	+	+	+	+
Orthothecium intricatum	—	—	+	—
Homalothecium sericeum	+	+	+	+

		I.	II.	III.	IV.
Fam. Hypneae					
	Camptothecium lutescens	+	+	+	—
	nitens	+	+	+	+
	Brachythecium salebrosum	—	+	+	—
	β. brevipilum	—	—	+	—
	glareosum	+	+	+	—
	Mildeanum	—	+	—	—
	albicans	+	+	—	—
	velutinum	+	+	+	+
	reflexum	—	—	+	+
	Starkii	—	—	+	+
	rutabulum	+	+	+	+
	rivulare	—	+	+	+
	populeum	—	+	+	+
	plumosum	—	+	+	+
	Var. homomall.	—	—	+	—
	Eurhynchium myosuroides	—	—	+	+
	strigosum	—	+	+	—
	striatum	+	+	+	+
	velutinoides	—	—	+	—
	crassinervium	—	—	+	—
	Vaucherii	—	—	+	—
	piliferum	—	+	+	—
	praelongum	+	+	+	—
	Var. atrovirens	—	—	+	—
	Swartzii	—	—	+	—
	Stockesii	—	+	+	—
	Rhynchostegium tenellum	—	+	+	—
	Teesdalii	—	+	+	—
	depressum	—	+	+	—
	confertum	—	+	+	—
	rotundifolium	—	+	—	—
	murale	—	+	+	—
	megapolitanum	+	—	—	—
	rusciforme	+	+	+	+
	Thamnium alopecurum	—	+	+	—
	Plagiothecium latebricola	—	+	—	—
	silesiacum	—	+	+	+
	denticulatum	+	+	+	+

	I.	II.	III.	IV.
Plagiothecium Roeseanum	—	+	+	+
Schimperii	—	—	+	+
sylvaticum	—	—	+	+
undulatum	—	+	+	+
Amblystegium subtile	+	+	+	+
confervoides	—	+	+	—
serpens	+	+	+	—
irriguum	—	+	+	+
Var. fallax	—	+	+	+
fluviatile	—	—	—	+
riparium	+	+	+	—
Juratzkanum	—	+	—	—
Hypnum Sommerfelti	—	+	+	—
chrysophyllum	+	+	+	—
stellatum	+	+	+	+
Wilsoni	—	+	—	—
Sendtneri	—	+	—	—
exannulatum	—	+	+	+
fluitans	—	+	+	—
Var. purpurasc.	—	—	—	+
uncinatum	—	—	+	+
Var. plumulosum	—	—	—	+
commutatum	—	+	+	—
filicinum	+	+	+	+
rugosum	—	+	+	—
incurvatum	—	+	+	—
pallescens	—	—	—	+
reptile	—	—	—	+
curpressiforme	+	+	+	+
c. Var.				
pratense	—	+	—	—
arcuatum	—	+	+	—
Mnium cuspidatum	—	+	+	—
affine β . elatum	—	+	+	+
undulatum	+	+	+	+
rostratum	—	+	+	+
hornum	—	+	+	+
serratum	—	+	+	—
spinosum	—	+	+	—

	I.	II.	III.	IV.
Mnium spinulosum	—	+	—	—
punctatum	—	+	+	+
stellare	—	+	+	+
Fam. Meesieae				
Meesia uliginosa	—	+	—	—
tristicha	—	+	—	—
Paludella squarrosa	—	+	+	—
Fam. Aulacomnieae				
Aulacomnium androgyn.	—	+	+	+
palustre	—	+	+	+
Fam. Bartramieae				
Bartramia ityphylla	—	+	+	+
pomiformis	—	+	+	+
β. crispa	—	—	+	+
Halleriana	—	—	+	+
Oederi	—	—	+	—
Philonotis fontana	—	+	+	+
calcarea	—	+	—	—
Trib. XI. Poytrichiaceae				
Atrichum undulatum	+	+	+	+
angustatum	—	+	—	—
tenellum	—	+	—	—
Oligotrichum hercynicum	—	—	—	+
Pogonatum nanum	+	+	+	—
aloides	—	+	+	+
urnigerum	—	+	+	+
alpinum	—	—	—	+
Polytrichum gracile	—	+	—	—
formosum	—	+	+	+
piliferum	—	+	+	+
juniperinum	—	+	+	—
strictum	—	+	+	+
commune	+	+	+	+
Trib. Buxbaumiaceae				
Diphyscium foliosum	—	+	+	+
Buxbaumia aphylla	—	+	+	—
indusiata	—	+	+	—

	I.	II.	III.	IV.
Ord. II. <i>Musci pleurocarpa.</i>				
Trib. I. Fontinalaceae				
Fontinalis antipyretica	+	+	+	+
Trib. II. Neckeraeae				
Fam. Neckereae				
Neckera pennata	—	+	+	—
crispa	—	+	+	+
complanata	—	+	+	+
Menziesii	—	—	+	—
Homalia trichomanoides	+	+	+	+
Fam. Leucodonteae				
Lencodon sciuroides	+	+	+	+
Antitrichia curtipendula	—	+	+	+
Trib. III. Hookeriaceae				
Hookeria lucens	—	+	+	—
Trib. IV. Leskeaceae				
Fam. Leskeae				
Leskea polycarpa	+	+	+	—
β. paludosa	+	+	—	—
nervosa	—	—	—	+
Anomodon longifolius	—	+	+	+
attenuatus	+	+	+	+
viticulosus	+	+	+	+
Fam. Pseudoleskeae				
Pseudoleskea atrovirens	—	—	+	+
catenulata	—	+	+	—
Fam. Thuidieae				
Heterocladium dimorphum	—	+	—	—
heteropterum	—	—	+	+
Thuidium tamariscinum	—	+	+	+
delicatulum	+	+	+	—
abietinum	+	+	+	—
Trib. V. Fabroniaceae				
Anisodon Bertrami	—	+	—	—
Trib. VI. Hypnaceae				
Fam. Pterogonieae				
Pterogonanthum filiforme	—	—	+	+
Pterogonium gracile	—	—	+	—
Hypnum molluscum	—	+	+	+

	I.	II.	III.	IV.
Hypnum Crista-castrensis	—	+	+	+
palustre	+	+	—	—
molle	—	—	—	+
ochraceum	—	—	+	—
cordifolium	+	+	+	—
giganteum	—	+	—	—
cuspidatum	+	+	+	+
Schreberi	+	+	+	+
purum	—	+	+	+
stramineum	—	+	+	+
Hylocomium splendens	+	+	+	+
umbratum	—	—	+	+
brevirostrum	—	—	+	+
squarrosum	+	+	+	+
triquetrum	+	+	+	+
loreum	—	+	+	+
Ordo III. Musci schizocarpi.				
Trib. Andreaceae				
Andreaea petrophila	—	—	+	+
rupestris	—	—	+	—
falcata	—	—	—	+
Sphagnaceae.				
Sphagnum acutifolium	—	+	+	+
Var. tenellum	—	—	+	+
purpur.	—	—	+	+
fuscum	—	—	+	+
timbriatum				
(Girgensohnii)	—	+	+	+
cuspidatum	—	+	+	+
Var. plumos.	—	—	—	+
recurvum	—	+	+	—
teres	—	+	+	+
rigidum	—	+	+	+
subsecundum	—	+	+	+
rubellum	—	—	—	+
tenellum				
(molluscum)	—	+	—	+
cymbifolium	—	+	+	+
Sa. 374 der Thüring. Laubmoose				
	110	268	261	175

Zusammenstellung nach Trib., Famil. und Regionen.

	I.	II.	III.	IV.
Musci acrocarpi.				
Phascaceae				
Ephemereae	3	1	—	—
Phasceae	6	6	—	—
	9	7	—	—
Bruchiaceae				
Pleuridieae	2	3	—	—
Bruchieae	—	1	—	—
	2	4	—	—
Weisiaceae				
Weisieae	3	7	4	3
Dicraneae	5	17	20	14
	8	24	24	17
Leubryaceae				
Leucobryeae	1	1	1	1
	1	1	1	1
Fissidentaceae				
Fissident.	6	6	6	1
	6	6	6	1
Seligeriaceae				
Seligerieae	—	4	4	—
Blindieae	—	—	1	—
Brachyodontae	—	—	2	2
	—	4	7	2
Pottiaceae				
Pottieae	10	6	4	2
Distichieae	—	1	1	1
Ceratodont.	1	2	2	1
Trichostom.	9	23	13	5
	20	34	20	9
Grimmiaceae				
Cinclidoteae	1	—	—	—
Grimmieae	2	10	16	15
Hedwigieae	—	1	1	1
Ptychmitricae	—	—	1	—
Latus	3	11	18	16

	I.	II.	III.	IV.
Transport				
Grimmiaceae	3	11	18	16
Zygodonteae	—	—	2	1
Orthotrich.	6	16	13	9
Tetraph.	—	1	2	2
Encalypt.	1	3	3	3
	10	31	38	31
Schistostegaceae				
Schistosteg.	—	1	1	—
	—	1	1	—
Splachnaceae				
Splachneae	—	1	—	1
Taylorieae	—	—	—	1
	—	1	—	2
Funariaceae				
Physcomitr.	4	4	1	1
	4	4	1	1
Bryaceae				
Bryeae	9	32	32	18
Meesieae	—	3	1	—
Aulacom.	—	2	2	2
Bartram.	—	4	6	5
	9	41	41	25
Polytrichiaceae				
Polytrich.	3	12	9	9
	3	12	9	9
Buxbaumiac.				
Buxbaum	—	3	3	1
	—	3	3	1
Musci pleurocarpi:				
Fontinalaceae				
Fontinal.	1	1	1	1
	1	1	1	1
Neckeraceae				
Neckereae	1	4	5	3
Leucodont.	1	2	2	2
	2	6	7	5

	I.	II.	III.	IV.
Hookeriaceae				
Hooker.	—	1	1	—
	—	1	1	—
Leskeaceae				
Leskeae	4	5	4	4
Pseudolesk.	—	—	2	1
Thuidieae	2	4	4	2
	6	9	10	7
Fabroniaceae				
Habrodon.	—	1	—	—
	—	1	—	—
Hypnaceae				
Pterogon.	—	—	2	1
Cylindroth.	1	3	1	2
Pylaesieae	1	1	1	—
Hypneae	27	64	72	45
	29	68	76	48
Musci schizocarpi:				
Andreaeaceae				
Andreaeae	—	—	2	2
	—	—	2	2
Sphagna:				
Sphagnaceae				
Sphagneae	—	9	11	13
	—	9	11	13
Sa. Musci acrocarpi	72	173	153	99
„ pleurocarpi	38	86	95	61
„ schizocarpi	—	—	2	2
Sphagna	—	9	11	13
	110	268	261	175

II. Uebersicht nach Familie, Gattung und Species.

Familie.	Gatt.	Spec.	Familie.	Gatt.	Spec.
1) Ephemereae	3	3	Transport	61	213
2) Phasceae	3	6	30) Aulacomnieae	1	2
3) Pleuridieae	1	3	31) Bartramieae	2	7
4) Bruchieae	1	1	32) Polytrichieae	4	14
5) Weisieae	3	11	33) Buxbaumieae	2	3
6) Dieraneae	7	30	Musci acrocarpi	70	239
7) Leucobryeae	1	1	34) Fontinalieae	1	1
8) Fissidentaeae	1	8	35) Neckereae	2	5
9) Seligerieae	2	4	36) Leucodontaeae	2	2
10) Blindieae	1	1	37) Hookerieae	1	1
11) Brachyodont.	2	2	38) Leskeae	2	5
12) Pottieae	5	12	39) Pseudolesk.	1	2
13) Distichieae	1	1	40) Thuidieae	2	5
14) Cerotodontaeae	2	2	41) Habrodont.	1	1
15) Trichostomeae	3	28	42) Pterogon.	2	2
16) Cinclidoteae	1	1	43) Cylindroth.	4	4
17) Grimmieae	2	23	44) Pylaesieae	1	1
18) Hedwigieae	1	1	45) Hypneae	12	89
19) Ptychomitrieae	1	1	Musci pleuroc.	31	118
20) Zygodontaeae	2	2	46) Andreaeae	1	3
21) Orthotricheae	2	19	Musc. schizoc.	1	3
22) Tetraphideae	2	2	47) Sphagneae	1	14
23) Encalypteae	1	3	Sphagna	1	14
24) Schistostegeae	1	1	Summa:		
25) Splachneae	1	2	Musc. acrocarp.	70	239
26) Taylorieae	1	1	„ pleuroc.	31	118
27) Funarieae	4	5	„ schizoc.	1	3
28) Bryeae	4	36	Sphagna	1	14
29) Meesieae	2	3			
Latus	61	213		103	374

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [NF_4](#)

Autor(en)/Author(s): Röse A.

Artikel/Article: [Systematisch-statistische Uebersicht der Thüringischen Laubmoose. 291-306](#)