

Die Fauna von Württemberg.

Die Käfer.

Von A. von der Trappen, Stuttgart.
(Fortsetzung.)

Trichocellus Gglb.

1. *placidus* GYL. Im Botnanger Sumpf und im Schönbuch auf austrocknendem Sumpfboden an der Glemsquelle unter vermodernden Pflanzen.
4. A 5. A 7.

Dichirotrichus Duv.

1. *obsoleteus* DEJ. Kappelesberg bei Fellbach. A 6. (Dö.).

Diachromus Er.

1. *germanus* L. Botnanger Sumpf. A 6. (Ph.). Ulm (O.-A.). Attenweiler (M.).

Anisodactylus Dej.

1. *binotatus* F. Überall, von E 7. bis E 5. mit
a. *spurcaticornis* DEJ.
2. *nemorivagus* DUFT. Münster a. N. E 4. Reutlingen (K.). Laimnau (M.).
3. *signatus* PANZ. Schönbuch. Tübingen (K.). Heilbronn (N. S. Sc.). Hohenneuffen (Ph.). Ulm (O.-A.). M 5. A 10.

Amara Bon.

1. *concinna* ZIMM. Schönbuch und Schurwald. A 4. bis A 6.
2. *strenua* ZIMM. Schönbuch, im ausgetrockneten Bärensee, einmal z. h. (Ph.). A 8.
3. *tricuspidata* DEJ. Rohrdorf (M.).
4. *plebeja* GYL. Im Schönbuch 1920 h. auf dem Boden des ausgetrockneten Bärensees. Rohr. Burgholz bei Cannstatt und Schurwald (Ph.). Ulm (O.-A.). A 8. bis A 10.
5. *similata* GYL. Stuttgart und Cannstatt z. h. Schönbuch s. Vaihingen a. Enz (Dö.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). E 3. bis 7. E 9. und i. W.
6. *ovata* F. Stuttgart, Besigheim, unteres Rems- und Glemstal. Heilbronn (Sc.). Rohr (Ph.). Ulm (O.-A.). Laimnau (M.).

Auf der Alb: Bad Boll und Gutenberg. Owen (Ph.). Fast das ganze Jahr, aber immer e.

7. *montivaga* STURM ist bei uns z. h., wenn auch meist e. Vom ganzen mittleren Neckar bekannt. Ferner: Mergentheim, Lenninger Tal und Neuffen. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). Nur einmal fand ich sie im unteren Remstal in Menge nach einem Gewitter-Hochwasser der Rems und darunter eine hübsche Aberration in zwei Stücken, welche stark punktierte Zwischenräume der Streifen auf den Fld. haben. A 4. bis M 6. M 8. bis A 10. und i. W.

8. *nitida* STURM. Stuttgart (Ph.). Münster a. N., Besigheim und unteres Remstal. Tübingen (M.). A 4. bis E 5. A 9.
ab. *imbella* REITT. Stuttgart.
9. *communis* PANZ. Stuttgart, Weißenhof und am Neckar. Schönbuch. Heilbronn (Sc.). Ulm (O.-A.). 5., 7. und i. W.
Ich habe ein Stück mit beiderseits verdoppeltem Scutellarstreif.
10. *convexior* STEPH. An Neckar und Rems. Mergentheim. Gutenberg. 4., 5., 9. und i. W. Manchmal z. z.
11. *lunicollis* SCHIÖDTE. Stuttgart. Schönbuch. Besigheim. Unterer Remstal. Auf dem Kniebis h. Ulm (O.-A.). 4., 6., 9.
12. *Schimperi* WENCKER. Stuttgart, det. HUB. Unterer Remstal. Besigheim. Kißlegg. Seltenheit.
13. *curta* DEJ. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Owen (Ph.). Lautertal (Dö.). 5., 6. E 8. M 10.
14. *aenea* DEJ. Überall h. A 9. bis M 6.
Ich habe auch ein ganz schwarzes Stück, ohne Metallschein, von Stuttgart und ein schön violettblaues von Geislingen a. St.
Einmal fand sich unter vielen typischen Stücken eines, bei dem die beiden Scutellarstreifen nur durch je eine Reihe von freistehenden Punkten angedeutet sind. Von Stuttgart.
15. *spreta* DEJ. Besigheim und Mergentheim. 4., 12.
16. *famelica* ZIMM. Reutlingen (K.).
17. *eurynota* PANZ. Stuttgart (Ph.). Lenninger Tal (Dö. und von mir). M 5.
18. *familiaris* DUFT. Am Neckar, auch bei Lorch. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). 4., 5., 8., 9. und i. W.
19. *lucida* DUFT. Stuttgart. Schönbuch. Besigheim. Kniebis. Randeck und Gutenberg. Tübingen (M.). 4., 5., 6. und i. W.
20. *tibialis* PAYK. Tübingen (M.).
21. *ingenua* DUFT. Reutlingen (K.).
22. *fusca* DEJ. Cannstatt i. A. (Dö.).
23. *cursitans* ZIMM. Stuttgart und Mergentheim i. W.
24. *municipalis* DUFT. Stuttgart und Mergentheim i. W.
25. *erratica* DUFT. Stuttgart. Schönbuch. Deizisau. Großes Lautertal. 4., 5., 6. und i. W.
26. *bifrons* GYLL. Münchingen (Dö.). Reutlingen (K.).
27. *infima* DUFT. Reutlingen (K.).
28. *brunnnea* GYLL. Leinstetten (M.). Reutlingen (K.).
29. *sabulosa* SERV. R. F. G. I. 164: Württemberg. Ulm (O.-A.).
30. *apricaria* PAYK. Ulm (O.-A.). Laubach (M.).
31. *fulva* DEG. Stuttgart, am Neckar (Dö.). Schurwald (Ph.). Hohentengen (M.). 8.
32. *consularis* DUFT. Stuttgart und Mergentheim i. W.
33. *aulica* PANZ. Heimsheim, Rotenacker und Urach (Ph.). Ulm (O.-A.). Oggelshausen (N. S.). Kißlegg. Hohentengen (M.). 6., 8., 9. und i. W.
34. *nobilis* DUFT. Ulm (O.-A.). Dieses Alpentier kann mit dem Hochwasser der Iller in die Ulmer Gegend kommen.

35. *equestris* DUFT. Stuttgart. Münster a. N. Heilbronn (Sc.). Ulm (O.-A.). Kirchheim u. T. (Dö.). E 4. und i. W.
var. *zabrooides* DEJ. Reutlingen (K.).

Zabrus Clairv.

1. *tenebrioides* GOEZE. Vor langer Zeit fand ich bei Eutingen einige Stücke auf Kornähren, seitdem sah ich ihn nie wieder. Holzgerlingen und Heimsheim (Ph.). Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.). M 5., A und E 9.

Stomis Clairv.

1. *pumicatus* PANZ. An Neckar, Enz, Nagold und Tauber. Ulm (O.-A.). Meist e., selten einmal in größerer Zahl. 4., A 5. und i. W.

Pterostichus Bon.

1. *punctulatus* SHALL. Schönbuch (Ph.).
2. *dimidiatus* OL. Reutlingen (K.). Hohenneuffen und Urach (Ph.). Laubach (M.). M 8., A 9.
3. *lepidus* LESKE. Bopfingen. Geislingen a. St. Teck. Gutenberg. Urach (Ph.). Schussenried. E 5. bis M 9. Bei uns nicht s. h.
4. *cupreus* L. Fildern. Schönbuch. Unteres Remstal. Münster a. N. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). E 4. bis A 6. M 8. bis A 9. Ebenfalls bei uns n. h.
5. *coeruleuscens* L. Überall, fast das ganze Jahr h. Stücke vom Kniebis sind alle kleiner. Auf der Alb findet man auch *Nigrinos*.
6. *inaequalis* MARSH. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
7. *vernalis* PANZ. Im Unterland h. Teinach h. Ulm (O.-A.). Buchau. E 10. bis M 5. und A 7. bis A 9.
8. *macer* MARSH. Noch im vorigen Jahrhundert fand ich am Einkorn bei Hessental unter einem Stein eine ganze Kolonie. Jetzt fand Z. einige Stücke bei Plochingen. Ulm (O.-A.). M 5., M 6. Die Art muß eine äußerst lückenhafte Verbreitung haben.
9. *aterrimus* HERBST. Cannstatt (Dö.). Ulm (O.-A.).
10. *oblongopunctatus* F. Rings um Stuttgart und im Schönbuch s. h. in Wäldern. Ulm (O.-A.). Wiblingen bei Ulm. Isny und Laimnau (M.). A 10. bis E 4.
11. *angustatus* DUFT. Tübingen (M.). Ulm (O.-A.).
12. *niger* SCHALL. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Eisenbach. Seekirch (M.). A 9. und i. W.
13. *vulgaris* L. Stuttgart. Schönbuch. Besigheim. Kniebis. Fuchseck (Alb). Ulm (O.-A.). Schussenried. Urlau (M.). E 3. bis M 4., M 6., M 7.
14. *nigrita* F. Schönbuch. Horb. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). Kißlegg. Laubach (M.). A 5. und i. W. Bei uns n. h.
15. *anthracinus* ILL. Stuttgart. Schönbuch. Münster a. N. Heilbronn (N. S. Sc.). Teinach. Ulm (O.-A.). Riedlingen. Hohentengen (M.). M 6., M 7., A 8. und i. W.
16. *gracilis* DEJ. Reutlingen, zweimal (K.). Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.).
17. *minor* GYL. Heilbronn (N. S. Sc.). Hohentengen (M.).
18. *interstinctus* STURM. Im ganzen Unterland. 4., M 8., A 9. und i. W. Laubach (M.).

19. *strenuus* PANZ. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Kniebis. Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.). M 9. bis M 4., M 6.
 20. *diligens* STURM. Stuttgart. Botnang. Schönbuch. Besigheim. Teinach, h. Kniebis. Geislingen a. St. Ulm. Buchau. Hohentengen (M.). E 8. bis A 7.
 21. *unctulatus* DUFT. Stuttgart. Schönbuch. Münster a. N. König. Deizisau. Kißlegg. M 3., 4., 9. und i. W. z. h.
 22. *pumilio* DEJ. Schönbuch, h. Kniebis, s. h. im Waldmoos. Hirsau, h. Baßgeige, e. Urach, e. Ulm (O.-A.). Kißlegg, h. M 9. bis M 7.
 23. *aethiops* PANZ. Stuttgart, h. Hirsau. Calw. Gutenberg. Fuchseck. Ulm (O.-A.). Kißlegg. Laubach (M.). 4., 5., A 6., A 9. und i. W.
 24. *madidus* F. Schönbuch. Hall. Reutlingen (K.). Urach. Ulm (O.-A.). M 6., A 8., E 9. Wohl alle unsere Stücke gehören zu
a. *concinnus* STURM.
 25. *melas* CREUTZ. Stuttgart. Unteres Remstal. Besigheim. Geislingen a. St. Owen (Ph.). Gutenberg. Ulm (O.-A.). Schussenried. Hohentengen (M.). A 4. bis M 6., M 7., A 9.
 26. *Burmeisteri* HR. (*metallicus* F.). Stuttgart. Schönbuch. Calw. Kniebis. Mittlere Alb. Ulm (O.-A.). Treherz (M.). 5. und i. W.
 27. *cristatus* DUFT. Heimsheim (Ph.). Reutlingen (K.). Urach und Rottweil (Ph.). M 4., A 8., E 9.
- P. maurus* DUFT. Angeblich von Rohrdorf (M.). Eine alpine Art.

Abax Bon.

1. *ater* VILL. Stuttgart. Schönbuch. Eltingen. Unteres Remstal. Kniebis. Gutenberg. Schussenried. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). Außer 8. das ganze Jahr.
2. *parallelopipedus* DEJ. Subsp. des südlichen *A. exaratus* DEJ. Von Ph. im Schurwald und von mir einmal 4 Stück bei Gutenberg gefunden. M 4., E 5.
3. *parallelus* DUFT. Überall g. A 4. bis A 6., 9. und i. W.
4. *ovalis* DUFT. Stuttgart. Schönbuch. Gutenberg und Kißlegg. Ulm (O.-A.). Ahlen (M.). 5., 6., 8., 9., 10. und i. W.
5. *carinatus* DUFT. Attenweiler (M.).

Molops Bon.

1. *elatus* F. Weit verbreitet u. g. Auch am Kniebis und im Oberland. A 4. bis M 6.
2. *piceus* PANZ. Ebenfalls weit verbreitet, also im Schwarzwald noch nicht gefunden. E 9. bis E 4. Er hat also eine ganz andere Erscheinungszeit wie die verwandte Art.

Platyderus Steph.

1. *rufus* DUFT. Reutlingen (K.).

Calathus Bon.

1. *fuscipes* GOEZE. Überall g. E 3. bis M 7., A 10.
2. *erratus* SAHLB. Heilbronn (N. S. Sc.). Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.).
3. *ambiguus* PAYK. Auf der Alb, unter Steinen (K.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).

4. *mela noce p h a l u s* L. Überall und oft h. E 4. bis M 6. und i. W.
5. *mollis* MARSH. Reutlingen (K.). Laubach (M.).
6. *micropterus* DUFT. Calw, i. A. Wildbader Wildsee, 1 Stück. Auf der Alb (K.). M 7. und i. W.
7. *piceus* MARSH. Hirsau, 1 Stück, A 4.

Sphodrus Clairv.

1. *leucop hthal m u s* L. Reutlingen, s. s. (K.).

Aechmites Schauf. (*Lacmostenus* BON.)

1. *terr icola* HERBST. Stuttgart, in Kellern, oft s. h. Öhringen, einmal (K.). Ulm (O.-A.). Hohentengen und Laimnau (M.). 4. und E 6. bis M 10.

Dolichus Bon.

1. *halensis* SCHALL. Hohentengen und Laimnau (M.).

Synuchus Gyll.

1. *nivalis* PANZ. Schönbuch (Ph.). Urach und Lenningen (Ph.). Ulm (O.-A.). M 6., M 8.

Olisthopus Dej.

1. *Sturm i* DUFT. Heimsheim, E 4 (Ph.).
2. *rotundatus* PAYK. Cannstatt (Dö.). Reutlingen, s. s. (K.). Mittlere Alb. Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.). M 4.

Agonum Bon.

1. *im pressum* PANZ. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.).
2. *sex punctatum* L. Stuttgart. Schönbuch. Welzheimer Wald. Wildbader Wildsee. Ulm (O.-A.). Treherz (M.). 4., 5., 7. und i. W.
a. *montanum* HEER. Welzheimer Wald u. sonst.
3. *viridicuprum* GOEZE. Tübingen, einmal (K.). Ulm (O.-A.).
4. *gracilipes* DUFT. Ulm (O.-A.). Wolfegg (M.).
5. *marginatum* L. Diese Art war früher, um 1900, am Neckar, z. B. bei Gaisburg äußerst h. Jetzt findet man sie dort nur noch recht s., was wohl auf die Bahnbeleuchtung zurückzuführen ist, die der ganzen Insektenfauna schwer geschadet hat. Botnang. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). 5., 7. und i. W.
6. *Müller i* HERBST. Kommt überall das ganze Jahr s. h. vor.
7. *atratum* DUFT. Öhringen und Reutlingen (K.).
8. *versutum* GYLL. Schönbuch (Ph.). Tübingen (M.). Ulm (O.-A.). E 5.
9. *lugens* DUFT. Reutlingen (K.).
10. *viduum* PANZ. Stuttgart. Schönbuch. Deizisau. Horb. Besigheim. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). Überall das ganze Jahr h.
v. *moestum* DUFT. Überall, auch im Schwarzwald, noch viel häufiger als die Stf.
11. *livens* GYLL. Attenweiler (M.).

Platynus Bon.

1. *scrobiculatus* F. Ich fand selbst ein Stück auf den Fildern. Östliche Art, aber aus Bayern schon bekannt. Trotzdem ein sehr bemerkenswerter Fund. Irrtum ausgeschlossen, da mir das Tier beim Sammeln sofort aufgefallen war. A 9.
2. *assimilis* PAYK. In unsr. Wäldern überall z. h. A 9. bis E 5.
3. *longiventris* MANNH. Urlau (M.).
4. *ruficornis* GOEZE. Überall s. h. E 9. bis M 6.

5. *obscurus* HERBST. Stuttgart. Bietigheim. Besigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Seekirch und Unterstadion (M.). 4. und i. W. meist e.

6. *dorsale* PONTOFF. Wohl überall vorkommend, aber vom Schwarzwald fehlen Angaben. Oft in sehr großen Gesellschaften unter Steinen. M 9. bis M 5.

Europophilus Chaud.

1. *sicutulus* DEJ. Stuttgart, am Neckar, s. Schönbuch. A 3., A 5. und i. W.
2. *micanus* NIC. Vom Neckar-H.-W. bei Stuttgart und König. Schönbuch. Heilbronn (O.-A.). Reutlingen, nur einmal (K.). Ulm (O.-A.). Im allgemeinen s. s., aber einmal siebte ich im Februar auf der Pfaffenwiese im ehemaligen Rotwildpark eine große Anzahl, als das Grundwasser bis dicht unter die Moospolster stand, zusammen mit weit über 100 anderen Käferarten. Nur i. W. und im ersten Frühjahr.
3. *fuliginosus* PANZ. Stuttgart. Schönbuch. Besigheim. Reutlingen, einmal (K.). Fast das ganze Jahr, aber sehr e. Nur einmal in größerer Zahl mit dem vorigen. Auch von Buchau und Kißlegg.
4. *gracilis* GYLL. An Neckar und Rems e. beim H.-W. Schönbuch, an einigen Stellen, besonders auf der Pfaffenwiese z. h. Ulm (O.-A.). Buchau und Kißlegg. Rohrdorf (M.). Die Funde verteilen sich über das ganze Jahr.

Masoreus Dej.

1. *Wetterhali* GYLL. Ende vorigen Jahrhunderts fand DEJJE 1 Stück in einer Ritze in einem Holzpfahl bei Stuttgart.

Lebia Latr.

1. *cyancephala* L. Stuttgart, im Steinbruch beim Kochenhof, bisher nur einmal, aber in A. gefunden. Zur Stf. gehörten nur 20 %, der Rest war die unten genannte Aberration. M 6. Ulm (O.-A.). Laimnau (M.). a. *femoralis* CHAUD. Stuttgart. Kochenhof. M 6.
2. *chlorocephala* HOFFM. Im ganzen Unterland n. s., aber meist e. Nur einmal fand ich sie bei Bietigheim am Fuß einer Weide in großer Zahl gemeinsam überwinternd. Ulm. Bopfingen. A 9. bis M 4.
3. *crux minor* L. Stuttgart, Kochenhof. Korntal. Rotenacker (Dö.). Eratsmoos bei Kißlegg. Laimnau und Leinstetten (M.). M 6. und i. W. Bemerkenswert ist das Vorkommen dieser Art auf Steppenheide und im Torfmoor.
4. *marginata* GEOFFR. Fildern. Schönbuch. Stromberg. Winnenden. Buoch. Öhringen, n. s. (K.). Heilbronn (N. S. Sc.). M 3. bis E 6.
Alle Arten der Gattung leben auf Büschchen und Kräutern, so daß man sie meist im Streif sack oder Klopfschirm findet.

Demetrias Bon.

1. *monostigma* SAM. Eberstal (M.).
2. *atricapillus* L. Im ganzen Unterland an Flüssen und Bächen s. h. Eberstal (M.).
3. *imperialis* Germ. Reutlingen (K.).

Dromius Bon.

1. *linearis* OL. Im Unterland h. Ulm (O.-A.). Wiblingen bei Ulm. Laubach (M.). E 6. bis E 3.

2. *agilis* F. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Immer am Fuß alter Waldbäume im Moos. E 10. bis M 3.
3. *marginalius* F. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).
4. *fennestratus* F. Reutlingen (K.). Laubach (M.).
5. *quadrimaculatus* L. Rings um Stuttgart z. h. E 10. bis M 3. Ulm (O.-A.). Laubach (M.).
6. *quadrinotatus* LENK. (PANZ.). Stuttgart. Bietigheim. Königstein. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). M 3., A 9. und i. W.
 - a. *biplagiatus* HEYD. Einmal bei Bietigheim. Heilbronn (O.-A.).
 - a. *basalis* SCHILSKY. Stuttgart. Unteres Remstal, h.
7. *sigma* Rossi. Stuttgart, am Neckar h. Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). A 3., A 4. und i. W.
8. *melanocephalus* DEJ. Stuttgart, beim Neckar-H-W. s. i. W. Laubach (M.).
a. *nigriventris* THOMS. Stuttgart, am Neckar, etwas häufiger als die Stf. Besigheimer Galgenberg. Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). E 10. bis A 4.

Metabletus Sch.-Goeb.

1. *pallipes* DEJ. Reutlingen, an alten Schranken (K.).
2. *truncatellus* L. Am Neckar beim H-W. h. Teinach. Ulm (O.-A.).
3. *foreatus* GEOFFR. Cannstatt (Dö.). Reutlingen (K.). Seekirch (M.).

Microlestes Sch.-Goeb.

1. *minutulus* GOEZE. Schönbuch. Gutenberg. Ulm (O.-A.). A 6., A 8.
2. *maurus* STURM. Im Unterland und auf der mittleren Alb h. A 8. bis E 5.

Cymindis Latr.

1. *humeralis* GEOFFR. Cannstatt (Dö.). Weikersheim. Wielandstein (Dö.). Lonsee, i. A. (Z.). Leinstetten (M.). M 4., A 8.
2. *axillaris* F. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). Lonsee, einige, unter *humeralis*, A 8.

Brachynus Web.

1. *expoldens* DUFT. Überall s. h., manchmal in großen Gesellschaften. M 3. bis E 5.
2. *crepitans* L. Ebenfalls überall h. Auf der Alb häufiger als der andere. A 4. bis M 6. und A 10.

Haliplidae.

Peltodytes Rég. (Cnemidotus Er.)

1. *caesus* DUFT. (*impressus* PANZ.). Ulm (O.-A.). Buchau E 8.

Brychius Thoms.

1. *elevatus* PANZ. Ulm (O.-A.).

Haliphus Latr.

1. *obliquus* F. Stuttgart (Dö.). Ulm (O.-A.). Altshausen. Buchau. A 5., M 8., M 9.
2. *confinis* STEPH. Nur im Oberland. Buchau. Schussenried. Altshausen. Kißlegg. A 5., 9.

3. *lineatocollis* MARSH. Cannstatt (Dö.). Fildern. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Arnegg. Buchau. Schussenried. Kißlegg. E 4., E 5., E 8. bis A 10.
Vom Bärensee habe ich ein aberratives Stück mit tiefem Mittelgrübchen auf dem Hsch.
4. *ruficollis* DEG. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Besigheim. Ulm. Arnegg. Schussenried. Altshausen. Buchau. Kißlegg. Ochsenhausen (M.). E 7. bis M 5.
5. *Heydeni* WEHNCKE. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Buchau. Kißlegg. E 4., A 5. und A 9.
6. *fluvialis* AUBÉ. Stuttgart. Schönbuch. Öffingen. Heilbronn (N. S. Sc.). Mergentheim. Ulm (O.-A.). Bad Boll. Arnegg. Schussenried. Buchau. Kißlegg. E 8. bis M 4.
7. *lineolatus* MANNH. (WEHNCKE). Buchau, nur 1 Stück. E 8. (det. HUB.).
striatus NEWB. (WEHNCKE). Stuttgart. Schönbuch. Buchau. Kißlegg. 8., 9.
- Wehnckeii* GERH. Stuttgart. Schönbuch. Buchau. Schussenried. E 3., M 4., E 8., A 9.
Diese beiden letzten Formen sind im WINKLER-Katalog zwar zu *lineolatus* gezogen, doch halte ich sie für wohl unterschieden.
8. *immaculatus* GERH. Schönbuch. E 5. (det. HUB.). Ulm (O.-A.).
9. *fulvicollis* ER. Schönbuch. Münster a. N. Arnegg. Kißlegg. Ochsenhausen (M.). A 5., 9., 10.
10. *variegatus* STURM. Tennhof bei Öffingen. M 3.
11. *fulvus* F. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.).
12. *flavicollis* STURM. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Arnegg. Schussenried. Buchau. A 5., A 6., E 8. bis E 9.
13. *laminatus* SCHALL. Stuttgart. Horb. Ulm (O.-A.). Buchau. E 4., E 8. und i. W.

Dytiscidae.

Noterus Clairv.

1. *classicornis* MÜLL. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Schussenried. Kißlegg. Urlau (M.). A 4., E 8. bis A 10.
2. *clavicornis* DEG. Stuttgart. Offingen. Söflingen bei Ulm. Federsee. Urlau (M.). M 3. bis M 5., A 9.

Laccophilus Leach.

1. *hyalinus* DEG. (*virescens* BRAHM.). Stuttgart. Schönbuch. Söflingen bei Ulm. Schussenried. Buchau. Seekirch (M.). Kißlegg. M 3. bis M 5., E 8. bis E 10.
a. *testaceus* AUBÉ. Schönbuch.
2. *minutus* L. (*obscurus* PANZ.). Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Buchau, auch im Federsee. Kißlegg. M 3. bis M 5., E 8.
3. *variegatus* GERM. Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.).

Hydrovatus Motsch.

1. *cuspidatus* KUNZE. R. F. G. I. 207.

Hyphydrus Ill.

1. *ovatus* L. Stuttgart. Schönbuch. Schurwald. Tennhof bei Öffingen. Ulm (O.-A.). Schussenried. Altshausen. Kißlegg. Urlau (M.). M 3. bis A 5.; 9. Oft in größter Menge.

Bidessus Sharp.

1. *unistratus* SCHRANK (ILL.). Ulm (O.-A.). Kißlegg. Urlau (M.). A 9.
2. *geminus* F. Degerloch. Schönbuch. Münchingen. Ulm (O.-A.). Schussenried. Kißlegg. Urlau (M.). A 4., E 8. bis A 10. Sehr viel häufiger als der vorige. Bei Kißlegg kommen Stücke mit reduzierter Mittelbinde vor.

Coelambus Thoms.

1. *impressopunctatus* SCHALL. Stuttgart. Cannstatt (Dö.). Ulm (O.-A.). Buchau. Seekirch (M.). Kißlegg. E 8., A 9.
2. *parallelogrammus* AHR. Ulm (O.-A.).
3. *confluens* F. Reutlingen (K.).

Hygrotes Steph.

1. *inaequalis* F. Stuttgart. Cannstatt (Dö.). Schönbuch. Ulm (O.-A.). Arnegg. Altshausen. Buchau. Seekirch (M.). Kißlegg. 5. und E 8. bis E 9. Manchmal in größter Menge.
 - a. *parvulus* F. 1 Stück unter vielen Hunderten der Stf. bei Alts-hausen.
2. *versicolor* SCHALL. Reutlingen, s. (K.). Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). Offenbar bei uns s. s., sonst könnte er uns nicht entgangen sein.

Hydroporus Clairv.

1. *dorsalis* F. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.).
2. *erythrocephalus* L. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Schussen-ried. Buchau. Kißlegg. Urlau (M.). Überall s. h. M 3. bis M 5. und E 8. bis E 10.
 - a. ♀ *deplanatus* GYLL. Schönbuch und Kißlegg, n. s. unter der Stf.
3. *rufifrons* DUFT. Kißlegg, 1919 im 9. s. s., 1921 im selben Monat i. M.
4. *angustatus* STURM. Schönbuch, h. Schussenried. Buchau, im Ried und im Federsee. Seekirch (M.). Altshausen. Kißlegg, h. E 3. bis M 5. und E 8. bis E 10.
5. *palustris* L. Überall s. h., auch vom Kniebis. A 3. bis M 6. und E 8. bis E 10.
 - a. *lituratus* PANZ. Überall noch viel häufiger als die Stf.
 - a. *apicalis* SCHILSKY. Von dieser Form fand ich einmal in einem kleinen, aber tiefen Torfloch im Gründlenmoos bei Kißlegg über 30 ganz gleiche Stücke (det. HUB.). Das Loch enthielt außerdem nur noch 8 Stück *Agabus melanarius*. A 9.
6. *striola* GYLL. Buchau und Kißlegg, s. E 8. und M 9.
7. *tristis* PAYK. Schönbuch. Wildbader Wildsee (leg. KNEUCKER). Buchau. Gründlenmoos bei Kißlegg. M 6., E 8. bis M 10.
8. *umbrosus* GYLL. Schönbuch. Arnegg. Altshausen. Buchau. Kißlegg. A 4. und E 8. bis M 9.
9. *piceus* STEPH. Wildbader Wildsee (leg. KNEUCKER: DR. KARL MÜLLER, Das Wildseemoor.). 1924.
10. *elongatus* STURM. Kißlegg, 9. In den Jahren 1919 und 1921 je einige Stücke gefunden (det. HUB.).

11. *m elanocephalus* MARSH. (GYLL.). Schönbuch, s. Rottweil (M.). Kißlegg, s. A 5., M 9.
12. *obscurus* STURM. Buchau und Kißlegg. E 8., A 9.
13. *marginatus* DUFT. Reutlingen, s. (K.).
14. *planus* F. Stuttgart. Schönbuch. Kniebis. Seekirch (M.). Kißlegg. E 3. bis M 6. und A 9. bis M 10.
15. *pubescens* GYLL. Tübingen, s. (K.). Ulm (O.-A.).
16. *nigrita* F. Stuttgart. Schönbuch, s. Kniebis, s. Seekirch (M.). E 3.. A 4., 6.
17. *memnonius* NIC. Schönbuch, s. Kniebis, z. h. A 4. bis M 6.
a. ♀ *castaneus* AUBÉ. Schönbuch. Kniebis. Wildbader Wildsee (leg. KNEUCKER).
18. *m elanarius* STURM. Heilbronn (N. S. Sc.). Buchau, s. Kißlegg, z. h. M 6., M 7., E 8., A 9.
19. *ferrugineus* STEPH. Schönbuch und Kniebis, s. s. E 5.

Graptodytes Seidl.

1. *pictus* F. Stuttgart. Schönbuch. Arnegg. Ulm. Altshausen. Buchau. Seekirch (M.). Kißlegg. E 3. bis M 5. und E 8. bis M 10. Überall s. h.
a. *cruciatus* SCHILSKY. Kißlegg, s. s.
2. *granularis* L. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Altshausen. Buchau. Seekirch (M.). Kißlegg. A 4., E 8. bis M 9.
3. *bilineatus* STURM. Tübingen (M.).
4. *lineatus* F. Söflingen bei Ulm, s. h. Altshausen. Kißlegg. Urlau (M.). M 5., 9. Wo er auftritt, ist er gewöhnlich i. M.

Deronectes Sharp.

1. *latus* STEPH. Heilbronn (O.-A.). Urlau (M.).
2. *platynotus* GERM. Wetzgau (M.).
3. *duodecimpustulatus* F. Schönbuch. 2 Stück fand PH. in meiner Gegenwart in einem kleinen Weiher beim Bärensee. Alles weitere Suchen war vergebens.
4. *depressus* F. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.).
5. *elegans* PANZ. Schussenried. A 9., s. s. Seekirch (M.).
6. *assimilis* PAYK. R. F. G. I. 213. Ulm (O.-A.). Urlau (M.).
a. *frater* KUNZE. Reutlingen (K.).
7. *septentrionalis* GYLL. Buhlbach (M.).
8. *Sanmarki* SAHLB. Ulm (O.-A.).
9. *halensis* F. Schönbuch, beim Mönchsbrunnen. E 10. Ulm (O.-A.). Urlau (M.).

Copelatus Er.

1. *ruficollis* SCHALL. Schönbuch, e. E 4. Ulm (O.-A.). Kißlegg, in größter Menge frischentwickelt, A 9.

Platambus Thoms.

1. *maculatus* L. Schönbuch. Bad Boll. Schussenried. Kißlegg. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). A 9., A 10.
ab. *ornatus* SCHILSKY. Bei Kißlegg z. s.

Agabus Leach.

1. *didymus* OL. Einmal 1 Stück bei Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.).

2. *guttatus* PAYK. Schönbuch. Stuttgart. Am Kniebis s. h. in den Bächen. Alpirsbach. Bad Boll h. Kißlegg. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). 5., 6., M 10. Wildseemoor bei Wildbad (KNEUCKER).
3. *biguttatus* OL. Schönbuch e. Am Kniebis in Bächen und Moorlöchern z. h. Buhlbach (M.). Seekirch (M.). M 4., M 6.
4. *melanarius* AUBÉ. Schönbuch e. Am Kniebis in den Bächen z. h. Alpirsbach e. Bei Kißlegg einmal im Gründlenmoos 8 Stück in einem Torfloch. M 5., M 6., A 9., A 10.
5. *bipustulatus* L. Stuttgart. Cannstatt. Fildern. Schönbuch. Kniebis. Buchau. Kißlegg. Ulm (O.-A.). Weit verbreitet und sehr regelmäßig auftretend, doch nie in Menge beobachtet. Außer 7. das ganze Jahr.
6. *subtilis* ER. Heilbronn, z. (Sc.). Tübingen (M.).
7. *chalconotus* PANZ. Stuttgart. Alpirsbach. Schönbuch. Die Art war früher um Stuttgart h., hat dann lange Jahre gänzlich gefehlt, wurde aber 1921 und 1922 in der Glemsquelle wieder z. gefunden. 4., 5.
8. *paludosus* F. Schönbuch. Kißlegg. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). Immer nur e. 4., 9., 10.
9. *uliginosus* L. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.).
10. *congener* PAYK. War früher z. im Dürrbach bei Stuttgart, aber seit Jahren nicht mehr. Buchau, Kißlegg, stets e. Urlau (M.). E 8., A 9.
11. *affinis* PAYK. Heilbronn (Sc.). Schönbuch. Kißlegg. Manchmal e., meist aber in großen Gesellschaften, bis zu 50 Stück, an ganz beschränktem Platz. Die ganze, scheinbar gleiche Umgebung enthält dann kein einziges Stück. 4., 9., 10.
12. *nubulosus* FORST. Cannstatt Dö. Schönbuch, einmal 1 St. (Ph.). Offenbar s. s.
13. *Sturmi* GYLL. Stuttgart. Schönbuch. Söflingen bei Ulm. Buchau. Kißlegg.
In manchen Jahren s. h., dann wieder z. s. E 3. bis M 5. und A 9. bis E 10.
14. *fuscipennis* PAYK. R. F. G. I. 225. Seekirch (M.).
15. *undulatus* SCHRANK. Kißlegg, am 24. 6. im unteren Schloßbühlweiher an einer einzigen Stelle frisch entwickelt und i. A. (Ph.). Seekirch (M.).
16. *labiatus* BRAHM. Ulm (O.-A.). Reutlingen, als *femoralis* PAYK. (K.).

Ilybius Er.

1. *fenestratus* F. Söflingen b. Ulm. Kißlegg. A 9.
2. *fuliginosus* F. Stuttgart. Schönbuch. Schussenried, Buchau. Ulm (O.-A.). Überall g. M 4. bis A 9.
3. *craassus* THOMS. Wildbader Wildsee, leg. KNEUCKER. (Dr. KARL MÜLLER: Das Wildseemoor. 1924.)
4. *subaeneus* ER. Seekirch (M.). Kißlegg. A 9.
5. *ater* DEG. Schönbuch. Ulm (O.-A.) Urlau (M.). 5., E 7., M. 9. Bei uns keineswegs h.
6. *obscurus* MARSH. Söflingen bei Ulm. Kißlegg. Attenweiler (M.). M 5., 9.
7. *guttiger* GYLL. Ulm (O.-A.). Kißlegg. 9.
8. *aenescens* THOMS. Kißlegg, i. A. E 6. in einem sehr nassen *Sphagnum*-Graben im Burgermoos (Ph.).
9. *angustior* GYLL. R. F. G. I. 227.

Rhantus Lac.

1. *pulverosus* STEPH. (*punctatus* FOURC.). Cannstatt (Dö.). Schönbuch. Fildern. Heilbronn (N. S. Sc.). Tübingen (M.). Ulm (O.-A.). Altshausen. Kißlegg. 4., 9.
2. *notatus* F. Reutlingen (K.).
3. *suturrellus* HARR. (*bistriatus* ER.). Heilbronn (N. S. Sc.). Reutlingen (K.).
4. *bistriatus* BERGSTR. (*adspersus* F.). Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.).
5. *exoleatus* FORST. Fildern. Schönbuch. Söflingen bei Ulm. Buchau. Kißlegg. A 4. bis A 5., 9.
 - a. *insolatus* AUBÉ. h. unter der Stf.
 - a. *melanopterus* ZETT. Kißlegg.

Nartus Zaitz.

1. *Grapi* GYLL. Schönbuch, manchmal n. s. Heilbronn (N. S. Sc.). Uhn. Kißlegg, n. s. 5., 9.

Colymbetes Clairv.

1. *fuscus* L. Cannstatt und Öffingen, g. (Dö.). Scheint nicht alle Jahre gleich g. zu sein, denn ich selbst fand an denselben Fundstellen nur ganz wenige Stücke.
2. *striatus* L. Reutlingen (K.).

Hydaticus Leach.

1. *semninger* DEG. Stuttgart. Schönbuch h. Altshausen. Kißlegg. Ulm (O.-A.). 5., E 8. bis M 9.
2. *transversalis* PONTOFF. Öffingen, im Tennhofweiher. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). M 3.
 - ab. *interruptemaculatus* GERH. Tennhofweiher.

Graphoderes Thoms.

1. *cinereus* L. Öffingen. Tennhofweiher (Dö.). Ulm (O.-A.).
2. *zonatus* HOPPE. Cannstatt (Dö.). Reutlingen (K.).

Acilius Leach.

1. *sulcatus* L. Stuttgart. Korntaler Seewald. Schönbuch. Buchau. Heilbronn (Sc.). Ulm (O.-A.). Urlau (M.). A 3. bis E 8.
In der Sammlung Sc. in WNS ein ♀ mit fehlender Behaarung der Fld.

Dytiscus L.

1. *latissimus* L. Im Zellersee bei Schussenried in den Fischreusen. Urlau (M.).
2. *semisulcatus* MÜLL. (*punctulatus* F.). Schönbuch. Ulm (O.-A.). Isny (M.). E 10. n. h.
3. *marginalis* L. Stuttgart. Schönbuch. Korntaler Seewald. Altshausen. Ulm (O.-A.). Urlau (M.).
In einer Badanstalt in Herrenberg beobachtete ich, daß die Tiere immer in einer oben geschlossenen Badkabine auftauchten. Außen war keiner zu sehen. E 3., E 6., M 7.
 - a. ♀ *conformis* KUNZE. Stuttgart.
4. *circumcinctus* AHR. Altshausen. M 9. Ulm (O.-A.). Isny (M.). Auch nicht h.
5. *circumflexus* F. Isny (M.). Reutlingen, s. (K.).

Cybister Curtis.

1. *lateralis marginalis* DEG. Schussenried PH. Ulm (O.-A.). Urlau (M.). Reutlingen (K.).

Die großen Dytisciden sind in den oberschwäbischen Seen und Weihern sicher viel weiter verbreitet, aber ziemlich schwer festzustellen, da sie im tiefen, offenen Wasser leben.

Gyrinidae.**Gyrinus Geoffr.**

1. *marius* GYL. Schönbuch, Altshausen, Kißlegg. Ulm (O.-A.). Oft in Menge. E 3., 7., 8., M 9.
2. *distinctus* AUBÉ. Schönbuch, i. A. E 9. (PH.).
3. *columbus* ER. Schönbuch. E 7. Nur einmal, aber i. A.
4. *natalator* L. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Buchau. Urlau (M.). M 3. bis E 5., M 7., 9.
 - a. *Wankowiczi* RÉG. Kißlegg.
 - a. *substriatus* STEPH. (*natalator* AHR.). Öffingen. Ulm (O.-A.). Altshausen.
5. *Suffriani* SCRIBA. Einmal 1 Stück im oberen Schloßbühlweiher bei Kißleg, rev. HUB.

Diese Art muß äußerst selten sein, denn gerade diesen Weiher haben wir zu dritt oft und eingehend untersucht. A 9.
6. *caspius* MÉN. (*elongatus* AUBÉ). Fildern. Kißlegg. 9. Nicht h.
7. *bicolor* PAYK. Reutlingen (K.). Eberhardzell (M.).
8. *minutus* F. Ulm (O.-A.). Arnegg, in Torflöchern in größter Menge. Kißlegg, s. h. Urlau (M.). 9.

Orectochilus Lac.

1. *villosum* MÜLL. Tübingen (K.). Ulm (O.-A.).

Palpicornia.**Hydrophilidae.****Hydraeninae.****Ochthebius Leach.**

1. *exsculptus* GERM. Einmal i. A. beim N-H-W. Heilbronn (N. S. Sc.). Steinach. M 4 und i. W.
2. *gibbosus* GERM. Stuttgart, einmal 1 Stück beim N-H-W. M 4.
3. *impressicollis* CAST. Besigheim, 1 Stück (det. Dr. FL.). M 4.
4. *bicolon* GERM. Stuttgart, 1 Stück beim N-H-W (det. Dr. FL.). E 4.
5. *impressus* MARSH. K. S. 228. Ulm (O.-A.). Laubach (M.).
6. *foveolatus* GERM. Rottweil (PB.). Rohrdorf (M.). Ulm (O.-A.).

Alle Arten sind bei uns selten, wohl deshalb, weil bei uns sandige Flussufer fehlen.

Hydraena Kug.

1. *palastris* EV. Reutlingen (K.).
2. *riparia* KUG. Stuttgart. Fildern. Ulm. Schussenried. Altshausen. Kißlegg. Laubach (M.). 3., 4., 5., 9., A 10. Unsere häufigste Art.

3. *nigrita* GERM. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Bad Boll. Rottweil (Pb.). E 3., A 10.
- s. *subimpressa* REY. Bad Boll. A 10. Im trockenen Herbst 1919 in Wasserresten eines fast ausgetrockneten Baches i. M.
4. *gracilis* GERM. Ulm (O.-A.). Bad Boll, mit der vorigen. Kißlegg. Laubach (M.). A 9., A 10.
5. *pulchella* GERM. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.). Rohrdorf (M.).
6. *atricapilla* WATERH. Ulm (O.-A.). Rohrdorf (M.).
7. *pygmaea* WATERH. Rohrdorf (M.).

Limnebiniae.

Limnebius Leach.

1. *truncatellus* THUNBG. Heilbronn (N. S. Sc.). Ludwigsburg (Pb.). Schönbuch. Ulm (O.-A.). Schussenried. Buchau. Kißlegg. A 4., M 8. bis A 9.
2. *papposus* MULS. Schönbuch (Pb.). Ulm (O.-A.).
3. *crinifer* REY. Schussenried. Buchau. Kißlegg. A 5., A 9.
4. *nitidus* MARSH. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Schussenried. Buchau. A 5., A 8., A 9.
5. *aluta* BED. Heilbronn, 5 Stück (N. S. Sc.).
6. *picinus* MARSH. Ulm (O.-A.). Altshausen. M 9.

Helophorinae.

Helophorus F.

1. *nubilus* F. Stuttgart. Cannstatt. Münster a. N. Besigheim. Teinach. Ulm (O.-A.). Kißlegg. Wohl das ganze Jahr. Mir fehlen nur Angaben vom 7. und 10.
2. *aquaticus* L. Heilbronn. Stuttgart. Mergentheim. Teinach. Bad Boll. Ulm (O.-A.). M 4., A 9 und i. W.
 - a. *aequalis* THOMS. Mergentheim i. W. beim Tauber-H-W.
3. *arvernicus* MULS. Nur Ulm (O.-A.).
4. *brevipalpis* BED. Stuttgart. Münchingen. Unteres Remstal. Mergentheim. A 9. und i. W.
5. *granularis* L. Heilbronn. Schönbuch. Mergentheim. Rottweil (Pb.). Ulm (O.-A.). Bad Boll. Laubach (M.).
 - v. *griseus* HERBST. Ebenso h. wie die Stf. E 3. bis E 5., M 8. und i. W., also wohl das ganze Jahr.
6. *viridicollis* STEPH. Stuttgart. Schönbuch. Kniebis. Wildb. Wildsee. Bad Boll. Laubach (M.). Wohl das ganze Jahr.
7. *Mulsanti* REY. (*dorsalis* MARSH.). Rohrdorf (M.).
8. *dorsalis* MARSH. (*quadrisignatus* BACH). Stuttgart, i. W.
9. *pumilio* ER. Ulm (O.-A.).

Hydrochus Leach.

1. *elongatus* SCHALL. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Kißlegg. Laubach (M.). M 4. bis M 5.
2. *carinatus* GERM. Münchingen. Ulm (O.-A.). Altshausen. M 9.
3. *brevis* HERBST. Ulm (O.-A.).
4. *angustatus* GERM. Reutlingen (K.). Laubach (M.).

Sphaeridiinae.**Coelostoma Brul.**

1. *orbiculare* F. Stuttgart. Münster a. N. Schönbuch. Besigheim. Köngen. Teinach. Ulm (O.-A.). Buchau. Kißlegg. 9., 5.

Sphaeridium F.

1. *biustulatum* F. Schönbuch. Unteres Remstal. Münchingen. Teinach. Baßgeige.

Alle bekannten Aberrationen kommen auch bei uns vor. M 8. bis A 5. Vom Sommer fehlen Angaben.

2. *scarabaeoides* L. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Gutenberg. Burren. Kißlegg. Laubach (M.). A 5. bis A 6., M 8., M 9.

Cercyon Leach.

1. *ustulatus* PREISSL. Stuttgart. Schönbuch. Am Neckar von Horb bis Besigheim. Ulm (O.-A.). Gutenberg. Buchau. Urlau (M.). Im Winter und bis A 6.

2. *lugubris* OL. Stuttgart, i. W. beim N-H-W. Schönbuch (Pb.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).

3. *impressus* STURM. Stuttgart. Schönbuch. Mergentheim. 5., 10. und i. W.

4. *haemorrhoidalis* F. Sehr gemein, fehlt wohl nirgends. E 8. bis E 5. Geht auch an Aas.

5. *marius* THOMS. Heilbronn, h. (N. S. Sc.). Cannstatt (Pb.). Ich selbst fand ihn nie.

6. *bifrenestratus* KÜST. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).

7. *lateralis* MARSH. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). A 3. bis E 5. n. s. s.

8. *terminatus* MARSH. Stuttgart. 2 Stück in einem Rattenbett mit vielen anderen Käferarten, (det. HUB.) i. W. Dies sind die einzigen aus Württ. bekannten Stücke.

9. *pygmaeus* ILL. Stuttgart. Münchingen. Köngen. Mergentheim. Ulm (O.-A.). Buchau. Hohentengen (M.). M 8. bis A 5.

- a. *merdarious* STURM. Z. s. u. d. Stf. Buchau. Stuttgart.

10. *unipunctatus* L. Überall gemein, i. W. und Frühjahr.
a. *impunctatus* KUW. s., Stuttgart.

11. *quisquilius* L. Stuttgart. Schönbuch. Horb. Köngen. Mergentheim. Teinach. Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.). 3., 7. und i. W.

12. *nigriceps* MARSH. Heilbronn, ganz wenige Stücke (N. S. Sc.).

13. *tristis* ILL. Stuttgart, einmal vor langen Jahren beim N-H-W.

14. *granarius* ER. Stuttgart. Schönbuch. Unteres Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). Nagold (M.). Buchau. Das ganze Jahr.

15. *convexusculus* STEPH. Stuttgart. Bad Boll. Buchau. Kißlegg. E 8. bis M 5.

16. *subscutatus* REY. Heilbronn, 1 St. (N. S. Sc.). Schurwald, 1 St., i. W. Seltenheit.

17. *analisis* PAYK. (*flavipes* THUNBG.). Stuttgart. Schönbuch. Unteres Remstal. Am Neckar von Horb bis Besigheim. Teinach. M 9. bis A 5.

Megasternum Muls.

1. *boletophagum* MARSH. Gemein und überall das ganze Jahr. Fand sich auch in einem Rattenbett.

Cryptopleurum Muls.

1. *minutum* F. Äußerst gemein. Überall das ganze Jahr z.
2. *crenatum* PANZ. Im Gegensatz zum vorigen äußerst selten. Ich habe 2 Stück von Stuttgart. Heilbronn, ganz wenige Stücke (N. S. Sc.) i. W.

Hydrophilinae.**Crenitis Bed.**

1. *punctostriata* LETZ. Wildb. Wildsee, leg. KNEUCKER. (Dr. KARL MÜLLER: Das Wildseemoor. 1924.)

Hydrobius Leach.

1. *fuscipes* L. In allen stehenden Gewässern. Das ganze Jahr, oft in Menge.
 - a. *Rottenbergi* GERH. Ebenso h. wie die Stf. und ebenso verbreitet.
 - a. *subrotundatus* STEPH. z. h. unter der Stf.
 - a. *chalconotus* STEPH. z. s.

Anacaena Thoms.

1. *globulus* PAYK. Stuttgart. Schönbuch. Bei Cannstatt und Münster am Neckarufer. Teinach. Bad Boll. Kißlegg. Verbreitet u. z., aber lange nicht so wie der nächste. A 9. bis A 5.
2. *limbata* F. Stuttgart. Schönbuch. Am Neckar von Königstein bis Besigheim. Ulm (O.-A.). Bad Boll. Arnegg. Altshausen. Buchau. Kißlegg. Vom Schwarzwald fehlen Angaben. E 8. bis M 5.
3. *bipustulata* MARSH. Stuttgart. Unteres Remstal. Mergentheim. Bad Boll. Laubach (M.). A 9. bis A 3. Selten, lange nicht 1 % der anderen Arten.

Laccobius Er.

1. *minutus* L. Stuttgart. Schönbuch. Münster a. N. Ulm (O.-A.). Buchau. 4., 5., 8. und i. W.
2. *bipunctatus* F. Schönbuch. Buchau. Kißlegg. 3., 4., A 8. bis A 10.
3. *nigriceps* THOMS. Schönbuch. Teinach. Schussenried. Buchau. Kißlegg. A 8. bis A 5.
 - a. *maculiceps* ROTTENBG. Unteres Remstal. Münster a. N.
4. *sinuatus* MOTSCH. Ulm (O.-A.). Diese Art ist für Deutschland meines Wissens sonst nirgends angegeben. In Sammlung PIESBERGEN ist aber 1 Stück von Karlsbad, das von EDMUND REITTER bestimmt ist, so daß die Möglichkeit des Vorkommens nicht ganz ausgeschlossen ist. Nachprüfung ist nicht möglich.
5. *scutellaris* MOTSCH. Stuttgart. Schönbuch. Besigheim. Kißlegg. A 4. M 6. M 8. bis A 10.
6. *alutaceus* THOMS. Stuttgart. Schönbuch. Unteres Remstal. Arnegg. Altshausen. Buchau. Kißlegg. Laubach (M.). E 8. bis M 5.

Helochares Muls.

1. *lividus* FORST. Ulm (O.-A.). Altshausen. Kißlegg. 9., 10.
2. *griseus* F. Schönbuch. Altshausen. Buchau. Kißlegg. Laubach (M.). A 4. bis M 5., E 8. bis M 9.

Enochrus Thoms. (*Philydrus* SOL.).

1. *melencephalus* OL. Stuttgart. Münster a. N. Besigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O. A.). M 4. bis A 5. n. h.

2. *frontalis* ER. Heilbronn (N. S. Sc.). Schönbuch. Kißlegg. M 4. bis A 6., 9.
3. *fusci pennis* THOMS. Stuttgart. Buchau, auch im Federsee selbst. E 8. bis A 5.
a. *nigricans* SCHWARZ. Buchau.
4. *quadripunctatus* HERBST. Heilbronn (N. S. Sc.). Schönbuch. Münster a. N. Buchau. A 5. und E 8. Ich fand diese Art immer nur ganz vereinzelt.
5. *bicolor* F. Stuttgart (Pb.).
6. *testaceus* F. Ulm (O.-A.). Buchau, im Federsee. Kißlegg. E 8. bis M 9.
7. *minutus* F. Stuttgart. Buchau, im Federsee. E 8., A 9.
8. *coarctatus* GREDL. Schönbuch. Altshausen. Buchau, im Federsee. A und M 5., E 8. bis M 9.

Cymbiodyta Bed.

1. *marginella* F. Heilbronn (N. S. So.). Kniebis. Ulm (O.-A.). Altshausen. Kißlegg. Eberstal (M.). M 4., M 6., 9.

Chaetarthria Steph.

1. *seminulum* HERBST. Stuttgart. Münster a. N. Schönbuch. Mergentheim. Ulm (O.-A.). M 3. bis A 5. und i. W.

Hydrophilus Leach.

1. *caraboides* L. Cannstatt. Öffingen. Stuttgart. Schönbuch. Tübingen (Pb.). Ulm (O.-A.). Urlau (M.). E 3. bis E 5. Diese sonst so häufige Art hat um Stuttgart mindestens 10 Jahre ganz gefehlt.

Hydrous Leach.

1. *piceus* L. Cannstatt (Dö.). Ulm (O.-A.). Kißlegg, im Wuhrmühlweiher. Urlau (M.). M 5., A 9.
2. *aterrimus* ESCHZ. Ulm (O.-A.). Altshausen, in Torflöchern beim Altenweiher. 9.

Berosus Leach.

1. *signaticollis* CHARP. Schönbuch (N. S. Dö.). Laubach (M.). A 4.
2. *luridus* L. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Altshausen. Laubach (M.).

Staphylinoidea.

Silphidae.

Necrophorus F.

1. *germanicus* L. Zuffenhausen. Bei Cannstatt von Dö. zahlreich geködert. M 6. bis M 7.
2. *humator* GOEZE. Cannstatt (Dö.). Münchingen. Ulm (O.-A.). M 5. und E 9. Markgröningen i. M.
3. *sepultor* CHARP. Stuttgart (Dö.). E 7.
4. *investigator* ZETT. Stuttgart und Cannstatt (Dö.). Reichenbach i. Täle (M.). E 7.
5. *interruptus* STEPH. Stuttgart. Münchingen. Schönbuch (Dö.). Laubach (M.). 7., E 9.
6. *vespilloides* HERBST. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.).

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1930.

7. *vespillo* L. Stuttgart. Cannstatt und Fellbach (Dö). Ulm (O.-A.).
Buchau. Laubach (M.). 5., 7.

8. *vestigator* HERSCH. Cannstatt i. A., Zuffenhausen (Dö.). Ulm (O.-A.). 8.

Necrodes Leach.

1. *litoralis* L. Stuttgart und Cannstatt (Dö.). Ulm (O.-A.).

Thanatophilus Sam.

1. *rugosus* L. Reutlingen (K.). Laubach (M.).

2. *sinuatus* F. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). 7.

3. *dispar* HERBST. Laubach (M.).

Oeceoptoma Sam.

1. *thoracicum* L. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Kißlegg. Treherz (M.). Ist aber viel weiter verbreitet. 4., 5.

Aclypea Rtt. (Blitophaga Rtt.).

1. *opaca* L. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). 4., 5.

2. *undata* MÜLL. Cannstatt (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.).

Xylodrepa Thoms.

1. *quadripunctata* SCHREB. Stuttgart. Schönbuch. Alb. Weit verbreitet u. h. 4., 5.

Silpha L.

1. *carinata* HERBST. Auf der Alb bei Gutenberg s. Ulm (O.-A.). E 5., A 6.

2. *obscura* L. Wohl überall. Im Frühjahr und Sommer.

3. *tristis* ILL. (*granulata* THUNBG.). Illingen (Dö.). Ulm (O.-A.).

Ablattaria Rtt.

1. *laevigata* F. Auf der Alb bei dem kleinen Friedhof in der Nähe der Diepoldsburg finden wir die Art seit Jahrzehnten regelmäßig. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). 5., 6.

Phosphuga Leach.

1. *atrata* L. Ganz gemein und überall das ganze Jahr.

Necrophilus Latr.

1. *subterraneus* DAHL. Ulm (K. S. 240 u. O.-A.). Reichenbach im Täle (M.).

Agyrtes Fröl.

1. *castaneus* F. Heilbronn z. h. (N. S. Sc.). Vor langen Jahren fing ich 1 Stück auf dem Cannstatter Wasen im Flug.

Leptinus Müll.

1. *testaceus* MÜLL. Heilbronn, einige Stücke (N. S. Sc.). Urach, 1 Stück im überrieselten Moos oberhalb des Uracher Wasserfalls. (UHMANN, E. Bl. 1924, S. 56.)

Nemadus Thoms.

1. *colonoides* KR. Heilbronn (N. S. Sc.). i. A.

Ptomophagus III.

1. *subvillous* GOEZE. Stuttgart. Horb. Fildern. Ulm (O.-A.). Kißlegg.
Immer nur einzeln. M 5. M 9. und i. W.

v. *sericatus* CHAUD. Stuttgart. Fildern. Am Neckar, der Rems und der Enz. Sehr viel häufiger als der vorige. A 9. bis E 6.

Nargus Thoms.

1. *badius* STURM. Stuttgart. Cannstatt. Schurwald. Waiblingen. Heilbronn (N. S. Sc.). M 10. bis M 4.
2. *Wilkinii* SPENCE. Stuttgart. Schönbuch. Korntal. Münchingen, h. Eltingen. E 8. bis A 5.
3. *brunnneus* STURM. Stuttgart, s. Witthau. Unterer Remstal. Rotenacker. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.). Auf den Steppenheide-Plätzen etwas häufiger. M 9. bis M 6.
4. *anisotomoides* SPENCE. Stuttgart. Schönbuch. Witthau. Korntal. Unterer Remstal. Rotenacker. Mergentheim. Ulm (O.-A.). Reichenbach i. Täle (M.). Die häufigste Art. A 9. bis M 6.

Choleva Latr.

1. *spadicea* STURM. Am Nordrand des Korntaler Seewalds 1 Stück am 30. 10. gesiebt.
2. *pascoviensis* RTT. Stuttgart, am Neckarufer, 1 Stück det. HUB. M 5.
3. *agilis* ILL. Stuttgart. Schönbuch. Mergentheim. Kniebis. M 4., E 5. und i. W.
4. *oblonga* LATR. Schmieden. Heilbronn, einige Stück (N. S. Sc.).
5. *cisteloides* FRÖL. Stuttgart. Schönbuch. Schmieden und Vaihingen a. F. (Dö.). Ulm (O.-A.). Riedlingen. Kißlegg. Hohentengen (M.). A 4. bis M 6. und i. W.
6. *Sturmii* BRIS. Unterer Remstal, s. Heilbronn (N. S. Sc.). A 9.
7. *elongata* PAYK. Heilbronn, z. h. (N. S. Sc.).

Catops Payk.

1. *picipes* F. Ulm (O.-A.). Reutlingen (K.). Kißlegg, s. M 9.
2. *fuscus* PANZ. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.) n. h. M 5.
3. *nigricans* SPENCE. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).
4. *fuliginosus* ER. Heilbronn in Menge (N. S. Sc.).
5. *grandicollis* ER. Reutlingen, s. (K.).
6. *nigrita* ER. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn h. (N. S. Sc.). Reutlingen, einmal (K.). Buchau, Kißlegg z. s. A 4. und 9.
7. *coracinus* KELLN. Heilbronn, nur ganz wenige Stücke (N. S. Sc.).
8. *morio* F. Stuttgart. Cannstatt. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Buchau. M 7. und i. W.
9. *neglectus* KR. Schönbuch, s. Kißlegg, s. E 8., A 9.
10. *chrysomeloides* PANZ. Münster a. N. s. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Reichenbach im Täle (M.). E 5.
11. *longulus* KELLN. Für Heilbronn von Sc. in der O.-A. angegeben, doch habe ich die Stücke in seiner Sammlung nicht gefunden.
12. *tristis* PANZ. Stuttgart. Schönbuch. Besigheim. Winnenden. Einkorn. Schurwald (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). Calw. Teinach. Wiblingen b. Ulm. Kißlegg. A 9. bis E 5.
13. *alpinus* GYLL. Stuttgart. Cannstatt. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Buchau. E 4., A 5., A 9. und i. W.
14. *humatus* SPENCE. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Kißlegg. A 9. und i. W.

15. *Watsoni* SPENCE. Stuttgart. Schönbuch. Besigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm. Gutenberg. Laubach (M.). M 10. bis M 7.
a. *amoenus* RTT. Großes Lautertal. Ulm. Buchau.

Colon Herbst.

1. *latum* KR. Schönbuch, 1 Stück det. Dr. FL. Calw, ebenfalls nur 1 Stück. A 6. und i. W. Gilt als äußerst selten.
2. *clavigerum* HERBST. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.). Eberstal (M.).
3. *affine* STURM. Heilbronn, ganz wenige Stücke (N. S. Sc.).
4. *fusco cornue* KR. Heilbronn, ebenfalls nur ganz wenige Stücke. Laubach (M.).
5. *denticipes* SAHLBG. Heilbronn, ebensowenige (N. S. Sc.). Ich fand ein ♂ bei Gutenberg am 29. 5.
v. *denticulatum* KR. Heilbronn, einige (N. S. Sc.).
6. *brunneum* LATR. Heilbronn, wenige (N. S. Sc.). Gutenberg. E 5.
v. *episternale* CZWAL. Stuttgart. A 7.
7. *calcaratum* ER. Heilbronn, z. z. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).

Das Sammeln der *Colon*-Arten ist bei uns sehr vernachlässigt worden.

Liodidae.

Triarthron Schm.

1. *maerkeli* MAERK. Vaihingen a. F., 1 Stück (Dö.). Heilbronn, auch nur 1 Stück (N. S. Sc.). E 6.

Hydnobius Schm.

1. *punctatus* STURM. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.).

Liodes Latr.

1. *pallen* STURM. Reutlingen (K.).
2. *rhaetica* ER. Sindelfingen, 1 Stück (Z).
3. *cinnamomea* PANZ. Reutlingen (K.).
v. *oblonga* ER. Heilbronn, 2 Stück (N. S. Sc.).
4. *triepkei* SCHM. Reutlingen, einmal (K.).
5. *calcarata* ER. Stuttgart. Eßlingen und Vaihingen a. F. (Dö.). Unteres Remstal. Gutenberg. Ulm (O.-A.). Schussenried. Kißlegg. Eberstal (M.). E 5. bis M 7.
Dieses ist bei uns die einzige verhältnismäßig häufige Art der Gattung.
6. *dubia* KUG. Schönbuch und Schurwald (Dö.). Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.).
7. *obesa* SCHM. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.).
8. *brunnea* STURM. Reutlingen (K.).
9. *badiia* STURM. Laubach (M.).

Cyrtusa Er.

1. *subtestacea* GYLL. Buchau. M 7.

Colenis Er.

1. *immunda* STURM. Stuttgart. Unteres Remstal. Sulz (K.). Gutenberg. Seekirch (M.). M 5. bis A 6.

Agaricophagus Schm.

1. *cephalotes* SCHM. Eltingen, einmal im Kammerforst gesiebt. M 9.

Anisotoma Ill.

1. *humeralis* F. Reutlingen (K.).
2. *axillaris* GYLL. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.).
3. *castanea* HERBST. Eltingen, Kammerforst. Kniebis. M 6., M 9.
4. *glabra* KUG. Reutlingen (K.). Heilbronn (N. S. Sc.).
5. *orbicularis* HERBST. Berkheimer Hof. Rotenacker. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). M 5.

Amphicyllis Er.

1. *globus* F. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). E 9. bis E 7.
a. *ferruginea* STURM. Um Stuttgart häufiger als die Stf. Reutlingen (K.). Baßgeige.
2. *globiformis* SAHLBG. Stuttgart. Schönbuch, s. Einkorn bei Hessental. 5., 7. und i. W.

Agathidium Ill.

1. *nigripenne* F. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Eisenbach. A 9.
2. *atrum* PAYK. Stuttgart. Schönbuch. Münchingen. Unteres Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). E 9. bis A 5.
3. *seminulum* L. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Reutlingen (K.). Urach. 3., 9., 10.
4. *laevigatum* ER. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Baßgeige. Gutenberg. Ulm (O.-A.). M 9. bis A 6.
5. *dentatum* MULS. Schönbuch, s. Unteres Remstal, s. A 6., M 10.
6. *bohemicum* REITT. Heilbronn, i. A. (N. S. Sc.).
7. *badium* ER. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Teinach. Laubach (M.). M 9. bis E 5.
8. *marginatum* STURM. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). A 3.
9. *haemorrhoeum* ER. Stuttgart (Dö.) i. W.
10. *varians* BECK. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.). Laubach (M.).
11. *piceum* ER. Heilbronn, nur 3 Stück (N. S. Sc.).
12. *rotundatum* GYLL. Stuttgart, i. W. Heilbronn (N. S. Sc.).
13. *mandibulare* STURM. Stuttgart. Unteres Remstal, s. Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). A 4. und i. W.
14. *sphaerulum* REITT. Heilbronn, i. A. (N. S. Sc.).
15. *confusum* BRIS. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).
16. *nigrinum* STURM. Rotenacker. Reutlingen (K.). Gutenberg. M 5., A 6.

Clambidae.**Calyptomerus** Redt.

1. *dubius* MARSH. Stuttgart. Heilbronn, i. A. (N. S. Sc.). M 3.

Clambus Fisch.

1. *minutus* STURM. Am Neckar, der Rems und der Enz. A 9. bis A 5.
2. *punctulum* BECK. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Horb. Ulm. Buchau. E 10. bis M 5.
3. *armadillo* DEG. Stuttgart. Schönbuch. Unteres Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). Mergentheim. Seekirch (M.). A 9. bis A 3.
4. *pubescens* REDT. Stuttgart. Unteres Remstal. Münchingen. Besigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). A 4., M 8. und i. W.

Bei Stuttgart fand ich einmal einige Stücke in einem Rattennest. Bei den winterlichen Hochwassern unserer Flüsse ist die eine oder andere Art meist sehr zahlreich.

Scydmaenidae.

Euthia Steph.

1. *Schauami* KIES. Heilbronn i. A. (N. S. Sc.).
2. *scydmenooides* STEPH. Heilbronn i. M. (N. S. Sc.). Cannstatt (Dö.). A 3.

Cephennium Müll.

1. *thoracicum* MÜLL. Stuttgart. Cannstatt (Dö.). Schönbuch. Rotenacker. Calw. Kniebis. Baßgeige. Reutlingen (K.). 6., 7., 10. und i. W. Weit verbreitet, aber doch n. h.

Neuraphes Thoms.

1. *elongatus* MÜLL. Schönbuch (Dö.). Einkorn bei Hessental. Calw. Kniebis. Reutlingen (K.). Laubach (M.). M 7. und i. W.
2. *nigrescens* REITT. Stuttgart, am Neckar. A 3.

Stenichnus Thoms.

1. *Godarti* LATR. Reutlingen (K.).
2. *scutellaris* MÜLL. Stuttgart. Weißenhof. Rotenacker. Heilbronn (N. S. Sc.). Baßgeige. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). M 3. bis A 4.
3. *collaris* MÜLL. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Baßgeige. Gutenberg. Ulm (O.-A.). Buchau. Kißlegg. A 3. bis A 6. und M 7. bis M 10., also wohl das ganze Jahr. In Copula gefunden am 22. 5. Diese Art ist die häufigste der ganzen Familie.
4. *pussillus* MÜLL. Stuttgart und Schönbuch, s. Heilbronn, s. (N. S. Sc.). M 3., E 4.
5. *exilis* ER. Eltingen, Kammerforst. Mittlere Alb, Rauber. E 3., M 4.

Euconnus Thoms.

1. *denticornis* MÜLL. Winnenden. Rotenacker. Baßgeige, s. M bis E 3.
2. *rutilipennis* MÜLL. Oehringen (K.). Ulm (O.-A.).
3. *hirticollis* ILL. Stuttgart. Schönbuch. Köngen. Unteres Remstal. Baßgeige. Ulm (O.-A.). Hohentengen und Laubach (M.). M 10. bis A 6. Nach *Stenichnus collaris* die häufigste Art der Familie.
4. *fimetarius* CHAUD. Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.).
5. *Wetterhali* GYLL. Heilbronn (N. S. Sc.). Eberstal (M.).
6. *nanus* SCHAUM. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).
7. *claviger* MÜLL. Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
8. *Maecklini* MANNH. Heilbronn, s. s. (N. S. Sc.).
9. *pubicollis* MÜLL. Hofen a. N. Schönbuch (Dö.). Heilbronn (N. S. Sc.). Baßgeige. 3. Ein ganz frisch entwickeltes rotgelbes Stück am 30. 3.

Seydmaenus Latr.

1. *rufus* MÜLL. Stuttgart (Dö.).
2. *tarsatus* MÜLL. Stuttgart. Schurwald. Öhringen (K.). Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). Kißlegg. A 4., A 9., A 10. und i. W. A 10. frisch entwickelte Stücke.
3. *Perrisi* REITT. Heilbronn (N. S. Sc.).
4. *Hellwigii* HERBST (F.). Reutlingen (K.).

Orthoperidae.

Sacium Lec.

1. *p u s i l l u m* GYLL. Reutlingen (K.).
2. *b r u n n e u m* BRIS. Heilbronn, 2 Stück (N. S. Sc.).

Sericoderus Steph.

1. *l a t e r a l i s* GYLL. Stuttgart. Schönbuch. Schurwald. Fildern. Markgröningen. Bietigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Mergentheim. Leinstetten (M.). E 3., E 6., A 10. und i. W. Einmal in großer Menge in einem faulenden Unkrauthaufen am Waldrand.
-

Corylophus Steph.

1. *c a s s i d i o i d e s* MARSH. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Leinstetten und Seekirch (M.). A 7. und i. W.

Orthoperus Steph.

1. *a t o m u s* GYLL. Teinach, 1 Stück i. W. det. Dr. FL.
2. *c o r i a c e u s* REY. Schönbuch 2 Stück. Teinach 1 Stück. M 9. und i. W. det. Dr. FL.

Sphaeriidae.

Sphaerius Waltl.

1. *a c a r o i d e s* WALTL. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).

Ptiliidae (Trichopterygidae).

Nossidium Er.

1. *p i l o s e l l u m* MARSH. Stuttgart, i. W.

Ptenidium Er.

1. *f u s c i c o r n e* ER. Stuttgart, z. h. i. W.
2. *m y r m e c o p h i l u m* MOTSCH. Stuttgart, bei *Formica rufa*. E 7.
3. *p u s i l l u m* GYLL. Stuttgart, in einem Rattennest und im Gesiebe. Ulm (O.-A.). A 4. und i. W.
4. *l o n g i c o r n e* FUSS. R. F. G. II. S. 268.
5. *p u n c t a t u m* GYLL. Stuttgart. M 4.
6. *n i t i d u m* HEER. Stuttgart. Schönbuch. Einkorn bei Hessental. Baßgeige. Reichenbach im Täle (M.). 3., A 7., A 10. und i. W. Bei uns die häufigste und verbreitetste Art der Gattung.

P t e n i d i u m p u n c t u l u m STEPH. ist in Ulm O.-A. angegeben. Ganz unmöglich ist der Fund nicht, doch ist eine Verwechslung mit *P t e n i d i u m p u n c t a t u m* GYLL. wahrscheinlich.

Euryptilium Matth.

1. *F l a c h i* REITT. Stuttgart, 1 Stück i. W. in einem Rattennest. Leider besitze ich das Belegexemplar nicht mehr, da es bei der Untersuchung zu grunde ging.

Ptiliolum Flach.

1. *K u n z e i* HEER. Schönbuch. Unteres Remstal. Treherz (M.). A 5., A 6., A 7.
2. *S p e n c e i* ALLIB. Schönbuch, i. W. Treherz (M.).

Nephanes Thoms.

1. *Titan* NEWM. Schönbuch, einmal 1 Stück unter unzähligen anderen Ptiliiden in einem modernden Heuhaufen. A 10.

Ptinella Motsch.

1. *tenella* ER. Reichenbach im Täle (M.).

Pteryx Matth.

1. *suturalis* HEER. Stuttgart. Schönbuch. Reichenbach im Täle (M.). E 3. bis E 4., A 7., A 8., M 9. und i. W.

Smicrus Matth.

1. *filicornis* FAIRM. Stuttgart. Fildern. M 3., M 4.

Acrotrichis Motsch. (*Trichoptery* KIRBY).

1. *grandicollis* MANNH. Stuttgart. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Reichenbach im Täle (M.). A 9. und i. W.

2. *montandoni* ALLIB. Stuttgart. Reichenbach im Täle (M.). M 4. und i. W.

3. *thoracica* WALTL. Schönbuch. Unterer Remstal. Bietigheim. Teinach. A 6., A 10. und i. W.

4. *atomaria* DEG. Stuttgart. Schönbuch. Teinach, h. Ulm (O.-A.). Reichenbach im Täle (M.). E 3., M 4., A 10. und i. W.

5. *intermedia* GILLM. Stuttgart. Schönbuch. Bietigheim. Besigheim. Baßgeige. Gutenberg. Ulm. Wiblingen. Buchau. M 7. bis A 6. Schr häufige Art. Mitte 7. frisch entwickelt. Fand sich auch im Rattenbett.

6. *fascicularis* HERBST. Stuttgart. Schönbuch. Horb. Besigheim. Unterer Remstal. Einkorn bei Hessental. Mergentheim. Teinach. Ulm (O.-A.). Wiblingen. Buchau. Kißlegg. Noch weiter verbreitet und noch häufiger als die vorige Art. Ich fand sie auch bei *Lasius flavus*. Das ganze Jahr.

7. *brevipennis* ER. Reutlingen (K.). Reichenbach im Täle (M.).

8. *sericans* HEER. Stuttgart. Schönbuch. Münchingen. Unterer Remstal. Rotenacker. Wiblingen. Laubach. (M.). Das ganze Jahr.

9. *dispar* MATTH. Stuttgart. Auch im Rattenbett. M. 4. und i. W.

Scaphidiidae.**Scaphium Kirby.**

1. *immaculatum* Ol. Reutlingen (K.) R. F. G. II. S. 276.

Scaphidium Ol.

1. *quadrinaculatum* OL. Winnenden, einige Stücke (Z.). Heilbronn, i. M. (N. S. Sc.). Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). A 10.

Scaphosoma Leach.

1. *agaricinum* L. Überall s. h. in Baumschwämmen. M 8. bis M 5.

2. *subalpinum* REITT. Heilbronn, z. z. (N. S. Sc.).

3. *assimile* ER. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).

4. *boleti* PANZ. Stuttgart. Heilbronn (N. S. Sc.). Urach. Reutlingen (K.). Eberstal (M.). E 9. und i. W. z. s.

Staphylinidae.**Micopeplus Latr.**

1. *fulvus* ER. Stuttgart, beim Neckar-H-W. und in Gärten gesiebt. M 3. und i. W.

2. *p o r c a t u s* F. Stuttgart, am Neckarufer und vom Burgholz, oft. Fildern. Schönbuch. Buoch. Ulm (O.-A.). Buchau. Seekirch (M.). A 4. bis M 7.
3. *c a e l a t u s* ER. Stuttgart, einmal. Gutenberg. E 5.

Phloeocharis Mannh.

1. *s u b t i l i s s i m a* MANNH. Stuttgart, Kräherwald. Fildern. Schönbuch. Eltingen. Ulm (O.-A.). Reichenbach im Täle (M.). Kißlegg. M 7. bis E 3.

Phloeobium Boisd.

1. *c l y p e a t u m* MÜLL. Unteres Remstal und Besigheimer Galgenberg, auf Steppenheideplätzen mehrfach gesiebt, aber s. Heilbronn, i. A. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Eberstal (M.). Im W.

Megarthus Steph.

1. *d e p r e s s u s* PAYK. Stuttgart, einmal 1 Stück in einem Garten am Herdweg gesiebt. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
2. *a f f i n i s* MILL. Stuttgart, Neckarufer, Herdweg, Gablenberg. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Wiblingen bei Ulm. M 10. bis E 3.
3. *s i n u a t o c o l l i s* LAC. (BOISD.). Heilbronn, z. h. (N. S. Sc.). Laubach (M.).
4. *d e n t i c o l l i s* BECK. Stuttgart, Weißenhof, Neckarufer, Herdweg. Cannstatt (Dö.). Schönbuch. Schurwald. Winnenden. Münchingen. Baßgeige. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Unsere häufigste und verbreitetste Art. E 10. bis A 5.
5. *n i t i d u l u s* KR. Stuttgart, beim Neckar-H-W. einmal 1 Stück. Laubach (M.). Im W.
6. *h e m i p t e r u s* ILL. Reutlingen, aber s. unter Rinde. Heilbronn, z. h. (N. S. Sc.). Attenweiler (M.).

Proteinus Latr.

1. *o v a l i s* STEPH. Stuttgart, beim Neckar-H-W. einigemal je 1 Stück. Cannstatt (Dö.). Schönbuch. E 9. bis A 4.
2. *b r a c h y p t e r u s* F. Stuttgart. Münster a. N. Schönbuch. Besigheim. Einkorn bei Hessental. Teinach. Baßgeige. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). Kißlegg. Überall s. h. A 9. bis A 5.
3. *m a c r o p t e r u s* GYLL. Am ganzen Neckarlauf. Besigheim. Ulm (O.-A.). Kißlegg. Ebenfalls h. A 9. bis E 4.
4. *a t o m a r i u s* ER. Stuttgart, einmal 1 Stück im Dürrbachtal gesiebt. Kniebis. Ulm (O.-A.). E 3., M 6.

Anthobium Steph.

1. *a n a l e* ER. Schönbuch. Murrhardt. M 4. bis M 6. Die Art sitzt gern in den Blüten von *Primula elatior*.
2. *l o n g i p e n n e* ER. Stuttgart. Schönbuch. Kniebis. Teck. Randecker Maar. Gutenberg. Ulm (O.-A.). Kißlegg. A 5. bis A 7.
3. *s t r a m i n e u m* KR. Schönbuch (PH. und von mir). Illingen. Buchau. A 6. bis A 7.
4. *p a l l e n s* HEER. Stuttgart, am Neckar. Fildern. Schönbuch. Nicht h. A 5. bis A 6.
5. *o p h t h a l m i c u m* PAYK. Stuttgart, am Neckar. Unteres Remstal. Murrhardt. Ulm (O.-A.). Buchau. Seekirch (M.). Kißlegg.

6. *r h o d o d e n d r i* BAUDI. Reutlingen (K.).
7. *r e c t a n g u l u m* FAUV. Stuttgart. Schönbuch. Randecker Maar. Attenweiler (M.). M 4. bis A 7.
8. *s o r b i* GYLL. Stuttgart. Schönbuch. Unteres Remstal. Gutenberg. Glastal. Ulm (O.-A.). Buchau. Laimnau (M.). A 5. bis M 6.
9. *M a r s h a m i* FAUV. Stuttgart, Weißenhof. Schönbuch. A 5., A 7. Nur einige Mal.
10. *a u c u p a r i a e* KIES. Vor 20 Jahren einmal bei Stuttgart.
11. *t o r q u a t u m* MARSH. Stuttgart, früher auf dem Raichberg bei Gaisburg. Laimnau (M.).
12. *s i g n a t u m* MAERK. Stuttgart. Gutenberg. Glastal. Laubach (M.). M 4. bis M 6.
13. *a b d o m i n a l e* GRAV. Stuttgart (Dö.). Schönbuch. Lorch. Gutenberg. Ulm (O.-A.). Leinstetten (M.). M 4. bis A 6.
Auf der Alb bei Gutenberg kommt eine viel kleinere Rasse vor, nur 2 bis 2,5 mm lang, bei der die Grübchen vor den Ocellen lang gezogen sind. Nach Mitteilung von W. HUBENTHAL kommt bei Gotha eine ähnliche Form vor.
14. *p r i m u l a e* STEPH. Stuttgart, einmal 1 Stück. Münchingen, einmal 1 St., det Dr. FL. Gutenberg, 1 Stück. M 4. und A 6. Von Gutenberg habe ich noch ein anderes Stück, das ich hauptsächlich wegen der starken Bedornung der Schienen hierher stellen möchte, doch ist der Hsch. ganz schwarz und auch die Fld. ganz dunkel.
15. *m i n u t u m* F. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Rotenacker. Kniebis. Randecker Maar. Gutenberg. Ulm (O.-A.). Buchau. Kißlegg. A 10. bis M 7.
16. *n i t i d i c o l l e* BAUDI. Schönbuch, im Reichenbachtal, mehrfach, det. REITT. A 5. und A 6.
17. *r o b u s t u m* HEER. R. F. G. II. S. 196. Wahrscheinlich Zitat aus K. S. 238.
18. *f l o r a l e* PANZ. Fildern. Schönbuch. Lorch. Gutenberg. M 4. bis E 5.
Die Gattung *Anthobium* fehlt merkwürdigerweise ganz in der *Scriba*-Sammlung.

Acrolocha Thoms.

1. *s t r i a t a* GRAV. Stuttgart, Weißenhof und am Neckar. Horb. Heilbronn, h. (N. S. Sc.). Mergentheim. Ich fand die Art nur i. W.
2. *s u l c u l a* STEPH. Stuttgart, i. W. am Neckar, aber s.
3. *a m a b i l i s* HEER. Ganz wenige Stücke (N. S. Sc.).

Phyllodrepa Thoms.

1. *m e l a n o c e p h a l a* F. Heilbronn, i. A. (A. S. Sc.).
2. *p u b e r u l a* BERNH. Stuttgart, einmal im Haus. M 10.
3. *n i g r a* GRAV. Schönbuch. Unteres Remstal. Heilbronn z. h. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). E 4., A 5. und A 9.
4. *f l o r a l i s* PAYK. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Kniebis. M 4., M 6., M 9. und i. W. Oft zahlreich in Blüten, besonders in Schlehenblüten, aber einmal fand ich die Art auch in einem Rattenbett.
5. *j o p t e r a* PAYK. Stuttgart, im Haus. E 3. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
6. *v i l i s* ER. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).

Omalium Grav.

1. *riparium* THOMS. Schönbuch, 2 Stücke aus dem ehemaligen Rotwildpark. Obgleich dieses eine Art des Meerestrands sein soll, kann ich die beiden Stücke doch nur hierauf beziehen.
2. *rivulare* PAYK. Überall gemein. M 8. bis M 6.
3. *oxyacanthalae* GRAV. Stuttgart (Dö.). Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). A 4.
4. *brevicollis* THOMS. (*foraminosum* auct.). Schönbuch (Dö.). M 3.
5. *exiguum* GYLL. Ulm (O.-A.).
6. *ferrugineum* KR. Schönbuch, einmal 1 Stück.
7. *caesum* GRAV. Überall, das ganze Jahr.
v. *apicicornis* SOLSKY. Schönbuch, einmal, A 7. Diese Form ist im C. C. r. p. als Art aufgeführt, mit der Patria-Angabe Ca. und Tk. Ich ziehe es vor, sie hier als Form des *O. caesum* zu behandeln.

Phloeonomus Heer.

1. *planus* PAYK. Heilbronn, i. z. A. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
2. *pussillus* GRAV. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). Eisenbach. 4. und A 9. Einmal i. M. in einem Kiefern-Dürrständler bei *Hylastes palliatus*.

Xylostromus Heer.

1. *depressus* GRAV. Stuttgart (Ph.). Schönbuch (Dö.). Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). Laubach (M.). M 8., M 9.
2. *affinis* GERH. R. F. G. II. S. 189. Heilbronn, i. A. (N. S. Sc.).
3. *concinnus* MARSH. Stuttgart. Gutenberg. Ulm (O.-A.). Attenweiler (M.). A 4., E 5. und i. W. Ich fand einmal 6 Stück in einem Rattenbett.

Orochares Kr.

1. *angustatus* ER. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).

Lathrimaeum Er.

1. *melanoccephalum* ILL. Stuttgart. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). E 3., M 10. n. h.
2. *unicolor* MARSH. Stuttgart. Bietigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Wiblingen bei Ulm. Überall recht s. A 10. bis A 5.
3. *atroccephalum* GYLL. Wohl überall g. Nur vom Oberland habe ich keine Angaben. Ist das ganze Jahr zu finden.

Olophrum Er.

1. *piceum* GYLL. Stuttgart. Schönbuch. Heilbronn (N. S. Sc.). Hirsau. A 3. bis A 4. Mehrfach e. aus Waldgesiebe. Einmal A 4. i. A. im Botnanger Sumpf zwischen Graswurzeln an Grabenrändern. E 3. frisch entwickelt.
2. *assimile* PAYK. Feuerbachtal bei Stuttgart, det. REITZ. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.). Attenweiler (M.). M 3. bis M 4.

Arpedium Er.

1. *quadrum* GRAV. Ulm (O.-A.).

Acidota Mannh.

1. *crenata* F. Reutlingen, einmal (K.). Ulm (O.-A.). Kißlegg, einmal 1 Stück aus Waldmoos gesiebt. M 9. Scheint recht s. zu sein.

Amphichroum Kr.

1. *canaliculatum* ER. Reichenbach im Täle (M.).

Lesteva Latr.

1. *punctata* ER. Besigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). M 4.
2. *Heeri* FAUV. (*sicula* GGLB.). Stuttgart. E 7.
3. *longelytrata* GOEZE. Stuttgart. Fildern. Schönbuch. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). A 5., E 7., A und E 9. Meist e., aber einmal fand ich sie i. M. zwischen den Wurzeln von Grasbüscheln an der Glemsquelle im ehemaligen Rotwildpark.
4. *monticola* KIES. Schönbuch, einmal 1 Stück. A 5. Es stimmt genau überein mit solchen vom Brocken.
5. *pubescens* MANNH. Stuttgart M 9. (Dö.). Am Wasserfall bei Urach (K.).

Geodromicus Redt.

1. *plagiatus* F. a. *nigrata* MÜLL. Ulm (O.-A.).

Anthophagus Grav.

1. *bicornis* BLOCK. Unteres Gleinstal. Gutenberg. Glastal. Ulm (O.-A.). E 5. bis M 6.
2. *alpinus* F. Ulm (O.-A.). Unterstadion (M.).
3. *spectabilis* HEER. Gutenberg. E 5., A 6. h. Leider habe ich die Art beim Sammeln nicht erkannt und nur 4 Stück mitgenommen. Ulm (O.-A.).
4. *alpestris* HEER. Auf dem Kniebis im 6. z. auf Blumen, im 7. z. aus Waldmoos gesiebt. Ulm (O.-A.).
5. *abreviatus* F. Stuttgart. Schönbuch. Münchingen. Unteres Gleinstal. Illingen. Heilbronn (N. S. Sc.). Gutenberg. Glastal. Ulm (O.-A.). Laubach und Laimnau (M.). M 5. bis M 6. h.
6. *omalinus* ZETT. Glastal, einmal 1 Stück.
7. *caraboides* L. Stuttgart. Fildern. Unteres Remstal. Urach (Ph.). Ulm. Kißlegg. Leinstetten (M.). M 3., M 5., M bis E 6., A 9. h.
8. *praecustus* MÜLL. Unteres Remstal A. 8. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).

Eudectus Redt.

1. *Giraudi* REDT. Heilbronn (O.-A.).

Coryphium Steph.

1. *angusticolle* STEPH. Heilbronn, mehrere Stücke (N. S. Sc.). Diese Art ist, wie die vorige, eine große Seltenheit.

Syntomium Curt.

1. *aneum* MÜLL. Ich siebte ein einziges Mal 2 Stück am Waldrand auf der Pfaffenwiese im ehemaligen Rotwildpark, einem Platz, den Dö. und ich oft und eingehend besammelt haben. Die Art muß also bei uns äußerst s. sein. M 10.

Deleaster Er.

1. *dichrous* GRAV. Cannstatt und Gaisburg, am Neckar, früher h., jetzt s. Stuttgart, einmal 1 Stück im Flug (Ph.). Besigheim. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). A 4., M und E 5., A 7., E 8.

Coprophilus Latr.

1. *striatulus* F. Stuttgart. Cannstatt (Dö.). Unteres Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). E 10. bis E 5. Er fand sich auch in einem Rattennest.

Thinobius Kies.

1. *major* KR. Münster a. N. E 4.
2. *longipennis* HEER. Heilbronn, nur 2 Stück (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).

Trogophloeus Mannh.

1. *dilatatus* ER. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
2. *arcuatus* STEPH. Stuttgart. Münster a. N. Besigheim. Heilbronn (N. S. Sc.). Teinach. 4. und i. W. z. h.
3. *opacus* BAUDI. Stuttgart. Schönbuch. M 7. und i. W.
4. *bilineatus* STEPH. Am ganzen Neckarlauf und der Rems. Ulm (O.-A.). A 9. bis M 4. s. h.
5. *rivularis* MOTSCH. Stuttgart. Teinach. Attenweiler (M.). Nicht h., bis jetzt nur i. W. gefunden.
6. *obesus* KIES. (*memnonius* auct.). Heilbronn, einige Stücke (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
7. *fuliginosus* GRAV. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
8. *elongatus* ER. Am Neckar und der Rems z. h. A 9. bis A 5.
9. *impressus* BOISD. Unteres Remstal. Heilbronn i. A. (N. S. Sc.). A 9.
10. *corticinus* GRAV. Überall, das ganze Jahr s. h.
11. *nitidus* BAUDI. Unteres Remstal, einmal 1 Stück. Dies ist eine der seltenen Arten. A 4.
12. *foveolatus* SAHLBG. Stuttgart. Am Tennhof bei Öffingen. Horb. Heilbronn (N. S. Sc.). M 3., M 8. und i. W. Die Art ist bei uns selten.
13. *halophilus* KIES. Münster a. N., einmal i. A. beim H-W. Heilbronn, wenige Stücke. E 4. Ebenfalls eine seltene Art.
14. *pussillus* GRAV. Unteres Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). Buchau. A 9.
15. *gracilis* MANNH. Heilbronn, z. z. (N. S. Sc.).
16. *subtilis* ER. Heilbronn, 2 Stück (N. S. Sc.).
17. *exiguus* ER. Heilbronn, z. z. (N. S. Sc.). Reutlingen (K.).

Aploderus Steph. (Haploderus Kr.).

1. *caelatus* GRAV. Stuttgart. Schönbuch. Unteres Remstal. Heilbronn (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Buchau. Laubach und Attenweiler (M.). M 3., A 6. bis E 7., A 9. und i. W.
2. *caesus* ER. Nur einmal bei Stuttgart.

Oxytelus Grav.

1. *rugosus* F. Überall und das ganze Jahr einer der gemeinsten Käfer.
a. *pulcher* GRAV. z. h. u. d. Stf.
2. *opacus* KR. Stuttgart (Ph.). Heilbronn (N. S. Sc.). 8.
3. *rugifrons* HOCHH. Stuttgart. Cannstatt (Dö.). Deizisau. Unteres Remstal. E 3. bis E 4., A 9.
4. *insecatus* GRAV. Am Neckar und der Rems h. Urlau (M.). A 4. bis A 5., A 7., A 9.
5. *piceus* L. Münchingen, am Aas. Markgröningen (Dö.). Heilbronn (N. S. Se.). Reutlingen (K.). Ulm (O.-A.). 8. Bei uns durchaus nicht h.
6. *sculptus* GRAV. Stuttgart-Gablenberg, s. Schönbuch, s. Heilbronn, n. h. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). Hohentengen (M.). E 3. bis M 4. Die Art ist anderwärts s. h.

7. *i n u s t u s* GRAV. Überall g. E 4. bis A 7., E 9. und i. W.
8. *s c u l p t u r a t u s* GRAV. Überall und das ganze Jahr fast ebenso g. wie *r u g o s u s*.
9. *n i t i d u l u s* GRAV. Ebenfalls überall s. h. M 3. bis A 9.
10. *c o m p l a n a t u s* ER. Stuttgart, nur einmal in einem Gartengesiebe i. W. Heilbronn n. s. h. (N. S. Sc.).
11. *s p e c u l i f r o n s* KR. Einmal ein Stück an der Baßgeige gesiebt. E 3.
12. *c l y p e o n i t e n s* PAND. Stuttgart. Gaisburg. Cannstatt. Bietigheim. Immer e. M 4., E 6., E 7. und i. W.
13. *p u m i l u s* ER. Wildbad, Sommerberg, 1 Stück (N. S. Sc.).
14. *F a i r m a i r e i* PAND. Attenweiler (M.).
15. *S a u l c y i* PAND. R. F. G. II. 172. Heilbronn, h. (N. S. Sc.).
16. *h a m a t u s* FAIRM. Schönbuch, einmal i. A. Cannstatt, bei der unteren Ziegelei, einmal 1 Stück. E 6., A 8.
17. *t e t r a c a r i n a t u s* BLOCK. Überall das ganze Jahr s. g.
18. *t e t r a t o m a* CZWAL. Heilbronn, nur 2 Stück (N. S. Sc.).

Platystethus Mannh.

1. *a r e n a r i u s* FOURC. (GEOFFR.). Stuttgart. Münchingen. Besigheim. Illingen (PH.). Lorch. Ulm (O.-A.). Laubach (M.). A 3. bis M 8.
2. *c o r n u t u s* GRAV. Am Neckar und der Rems. Buoch. Bad Boll. Ulm (O.-A.). Seekirch (M.). A 3. bis A 10.
3. *a l u t a c e u s* THOMS. Fildern. Schönbuch. Ludwigsburg (PH.). Unteres Remstal. Am Bärensee im ehemaligen Rotwildpark zusammen mit *Heterocerus*-Arten im Ufersand. M 5. bis M 9.
4. *c a p i t o* HEER. Heilbronn, einige Stücke (N. S. Sc.).
5. *n o d i f r o n s* SAHLBG. Heilbronn, 1 Stück (N. S. Sc.).
6. *n i t e n s* SAHLBG. Am Neckar und der Rems, n. s. h. 4., E 6., A 9.

Bledius Mannh.

1. *t r i c o r n i s* HERBST. Ulm (O.-A.).
2. *p a l l i p e s* GRAV. Reutlingen (K.).
3. *l o n g u l u s* ER. Manchmal, aber nicht regelmäßig beim H-W von Neckar und Rems. A 5., A 9.
4. *o p a c u s* BLOCK. Beim H-W von Neckar und Rems, etwas häufiger als der vorige. A 4., M 5., A 9. und i. W. Auch von Teinach. Ulm (O.-A.).
5. *n a n u s* ER. Heilbronn, i. A. (N. S. Sc.).
6. *f r a c t i c o r n i s* PAYK. Fildern (PH.). Heilbronn, h. (N. S. Sc.). Reutlingen (K.).
7. *c r a s s i c o l l i s* BOISD. (LAC.). Einmal 2 Stück beim H-W der Rems. A 9.
8. *c r i b r i c o l l i s* HEER. Münster a. N. Heilbronn i. A. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.). A 5.
9. *d i s s i m i l i s* ER. Heilbronn, i. A. (N. S. Sc.). Ulm (O.-A.).
10. *e r r a t i c u s* ER. Ulm (O.-A.).
11. *p y g m a e u s* ER. Heilbronn, wenige Stücke (N. S. Sc.).
12. *s u b t e r r a n e u s* ER. Ulm (O.-A.).
13. *d e b i l i s* ER. Botnang (PH.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [86](#)

Autor(en)/Author(s): Trappen Arthur von der

Artikel/Article: [Die Fauna von Württemberg. Die Käfer 65-94](#)