

federn. Noch näher stehend ist *P. (Coraphites) melanauchen* Cab. (Mus. Hein. I. p. 124). Eine genaue Vergleichung mit einem ♀ der Bremer Sammlung ergibt folgende auffallende Unterschiede: *P. modesta* ist auf der Oberseite und den 2 mittelsten Schwanzfedern lebhaft rostgelbroth, auf Kropf und Brust einfarbig blass rostgelblich, während bei *melanauchen* die oberen Theile fahlbräunlich sind und die Brust eine deutliche braune Schaftstrichelung zeigt. — Bezüglich des Vaterlandes von *P. melanauchen* Cab., als welches nur sehr umfassend Afrika genannt wird, diene die Berichtigung, dass nach v. Heuglin die Art in den Küstentrichen Abyssiniens und dem steinigen Arabien häufig ist. (Siehe v. Heuglin in Cab. Journ. 1862. p. 30.)

Ptilinopus caesarinus,
eine neue Taubenart von den Feejee-Inseln.

Von

Dr. G. Hartlaub.

Supra laete viridis, sub certa luce aureo vel cupreo resplendens; pileo circumscripte et intense purpurascente-roseo; remigibus tertiariis nitidissime viridibus, margine externo flaventibus; occipite et nucha pure et saturate viridibus; subalaribus cinereis; cauda supra viridi, nitore aureo-rubente, infra cinerea; mento et gula media albis; juguli plumis viridibus, apice cano-albidis; pectoris fascia transversa minus distincte purpurea; abdomine sordide flavo, subcaudalibus intensius flavis; rostro et pedibus plumbeo-nigricantibus.

Long. tot. circa $7\frac{1}{2}$ " , rostr. a fr. $4\frac{1}{2}$ " , al. $4\frac{1}{2}$ " , caud. $2\frac{1}{2}$ " , tars. 7" .

Viti Levu: Expedit. Godeffroy (Dr. Gräffe).

Wir müssen diese schöne typische *Ptilinopus*-Art nach sorgfältigster Prüfung und Vergleichung für unbeschrieben halten und erlauben uns für dieselbe den Namen *caesarinus* vorzuschlagen. Möge Herr Cäsar Godeffroy in dieser Benennung und Widmung den Ausdruck der Anerkennung sehen, welche die Wissenschaft seinen ebenso grossartigen als uneigennütigen Bemühungen um die Förderung unserer Kenntniss von der Fauna der oceanischen Inselgruppe zollt.

Das hier beschriebene Exemplar wurde 70 Meilen tief im Innern der zur Gruppe der Fidgis gehörigen Insel Viti-levu gesammelt. Es könnte sich möglicherweise noch vollständiger anfärben, denn der purpurfarbige Brustgürtel erscheint nur schwach und ungleich angedeutet. Das malachitfarbige Grün des Hinterhauptes ist von dem goldig-bräunlichen des Rückens sehr abweichend. Das Gelb des Abdomens ist ein mattes; erst die unteren Schwanzdecken erscheinen rein gelb. Die Iris ist braun. Das Roth des Scheitels zeigt keine Umrandung von irgend welcher Farbe. Nur die beiden mittleren Steuerfedern sind ganz grün; bei den übrigen tragen nur die Aussenfahne und die sehr fein grau-umrandete Spitze diese Farbe; die Innenfahne ist im Uebrigen mattschwarz und zeigt nur vor der grünen Spitze einen kleinen schwach markirten weisslichen Randfleck. Auf der grauen Färbung der Unterseite des Schwanzes lässt sich über die Mitte hin eine dunkle Schattirung erkennen.

Verwandte aber leicht zu unterscheidende Arten sind *Ptilinopus clementinae*, *Ptilinopus apicalis*, *Ptilinopus roseicapillus*.

Eine neue Papageien-Art von Bogota, *Conurus (Gnathosittaca) Heinei*.

Vom

Herausgeber. Cabanis.

Die hier näher zu begründende Art befindet sich in der bekannten Sammlung des Herrn Ober-Amtmann Heine auf St. Burchard vor Halberstadt. Der Vogel wurde vor mehreren Jahren aus einer grossen Sendung von Bogota-Bälgen als Unicum ausgewählt und seitdem als neue Art, und zwar vorläufig als *Conurus Heinei*, in der genannten Sammlung geführt. Weder in irgend einer der mir seitdem vorgekommenen Bogota-Sendungen habe ich diesen Papagei, noch auch in den vielfältigen Veröffentlichungen über Vögel des alten Columbien eine Beschreibung desselben auffinden können. Ich nehme daher keinen Anstand, dieses anscheinend seltene Unicum als neu, und wegen abweichender Eigenthümlichkeiten als eigene Gruppe der *Conurinae* zu beschreiben:

+ *Gnathosittaca Heinei* n. sp.

Notaeo viride, sincipite et regione auriculari luteis; gastraeo, praecipue pectore et ventre pallide virescente-flavis, hypochondriis crissoque virescentioribus; cauda subtus obsolete sanguinea.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [12_1864](#)

Autor(en)/Author(s): Hartlaub Gustav [Carl Johann]

Artikel/Article: [Ptilinopus caesarinus, eine neue Taubenart von den Feejee-Inseln 413-414](#)