© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

ben Brust völlig gefärbt, die unteren Theile zeigen nur vereinzelte rothe Federn, Bürzel und Oberschwanz an der Basis völlig roth. Die Farbe ist aber noch nicht so schön und lebhaft, als die des alten Vogels, sondern heller und matter. Die beiden jungen Pärchen beginnen bereits mit ihren Liebesspielen und auch mit dem Nestbau.

Berlin, im April 1868.

Vorkommen von *Buteo tachardus* und Nisten von *Nucifraga caryocatactes* in der Schweiz.

Von

G. Vogel.

Am 27. November 1867 wurde bei Siebnen, Kanton Schwyz, am Gestade des Zürichsee's ein männlicher *Buteo tachardus* Vieillot geschossen, der nunmehr ausgestopft die Sammlung des hiesigen Polytechnikums ziert.

Anfangs März 1868 ist es mir endlich nach 20jährigen vergeblichen Anstrengungen aller Art (siehe dieses Journal Jahrgang 1861, pag. 34) gelungen, ein schönes Nest mit vier frischen Eiern von *Nucifraga caryocatactes* Briss. von dem solothurn'schen Jura zu erhalten. Nestbau und Eier stimmen mit der Beschreibung überein, welche E. Schütt davon im Journal, Jahrgang 1862, Seite 125 gegeben hat. Den glücklicheren Erfolg verdanke ich wohl hauptsächlich dem Umstand, dass ich nach Schütt den Sammler darauf aufmerksam machen konnte, schon am Anfang des Monats März nach dem Neste zu suchen, wobei die Material zutragenden Vögel alsbald den Nistplatz verriethen. Ende März und fast im ganzen April hatte man in den Bergen noch ziemliche Kälte und starken Schneefall. Es wäre deshalb fast unmöglich gewesen, dass die Jungen in dieser Zeit mit animalischer Kost hätten ernährt werden können, wie es ja bei allen anderen Raben-Arten der Fall ist. Hoffentlich finde ich im nächsten Jahre Gelegenheit, darüber Aufklärung zu verschaffen.

Zürich, im Mai 1868.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Journal für Ornithologie

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: 16_1868

Autor(en)/Author(s): Vogel G.

Artikel/Article: Vorkommen von Buteo tachardus und Nisten von Nucifraga caryocatactes in der Schweiz 329