

Aufzählung

der

Colibris oder Trochilideen

in ihrer wahren natürlichen Verwandtschaft,

nebst

Schlüssel ihrer Synonymik

von

Dr. Ludwig Reichenbach,

K

Director am Königl. zoologischen Museum in Dresden.



Vor der diesjährigen Versammlung der deutschen Ornithologen schrieb ich an den Geschäftsführer derselben, Herrn Ober-Amtmann Heine, daß ich bereit sei, im Fall es die Zeit verstattete, einen Vortrag über Colibris halten zu wollen, und derselbe hatte die Güte, seine schöne Colibrisammlung zur Demonstration des Vortrags mir zur Disposition zu stellen.

Als die Versammlung begonnen hatte, erwies sich, daß so vieles Material vorlag, daß wir kaum die Aussicht hatten, dasselbe ohne Ausnahme besprechen zu können, und da mir der Auftrag zu Theil wurde, nach der nach der ersten Versammlung stattgefundenen Abreise des Herrn Geh. Rath Lichtenstein den Vorsitz zu führen, so durfte ich nun um so weniger daran denken, von der sparsam zugemessenen Zeit für einen Vortrag von mir selbst Etwas in Anspruch nehmen zu wollen und benutze deshalb die hier gebotene Gelegenheit, das Resultat des zu halten beabsichtigten Vortrags noch nachträglich den geehrten Lesern des Berichtes über die Versammlung zu bieten. Die ausführlichere Arbeit erscheint jetzt als besonderer Theil meiner **vollständigsten Naturgeschichte der Vögel**, und dessen Empfänger, sowie Diejenigen, welche auf die Colibris allein subscribiren wollen, erhalten darin zugleich

die Abbildungen aller der in der Aufzählung mit Sternchen bezeichneten 276 Arten, da diese bereits theils gestochen sind, theils zum Stich vorliegen, während welcher Zeit ich von den wenigen mir fehlenden bei der gegenwärtig so wohlwollenden Theilnahme für mein Werk, noch manche zu erhalten hoffe.

Die Colibris sind wie so manche Abtheilung schöner und beliebter Naturkörper mehr in der Weise der angenehmen Liebhaberei, als nach den strengeren Anforderungen der Wissenschaft bearbeitet worden und jene Herausgeber prachtvoller Werke über dieselben sprachen oft von den Systematikern oder Methodisten, wie sie dieselben zu nennen beliebten, als von ganz anderen Leuten wie sie selbst sind, alle denken immer nur an das Einzelne und bewundern das Individuum, das sie beschreiben, von einem Vergleich und einer Zusammenstellung mit dem nahe Verwandten ist bei ihnen oft gar keine Rede. Kommt dazu noch, daß viele Beschreibungen in zum Theil ganz unzugängliche Journale vertheilt sind, so ist es kein Wunder, wenn die Klagen von Vigors über die schlechte und falsche Bestimmung der Colibris in den Sammlungen noch bis heute gültig geblieben. Die Aufzählungen von Lesson und Gray erheben sich rücksichtlich der Eintheilung in Gattungen wenig über die von Brisson, denn ihre größeren Gattungen sind ähnliche Zusammenstellungen der heterogensten Formen. Mit mehr Kritik hat Prinz Bonaparte in seinem „Conspectus“ die Arten unter Gattungen vereint, indessen bedürfen wir für eine Aufklärung des inneren Zusammenhanges dieser schönen Gruppe fester Grundansichten, deren die ausländischen Arbeiten gänzlich ermangeln. Auch bedürfen wir vor Allem, um die Kenntniß der schwierigen Gruppe einleiten zu können, einer berichtigten Synonymik und eines sicheren Schlüssels dazu, was freilich ohne eine sorgfältige und daher höchst mühsame Vergleichung der ganzen alten und neuen Literatur mit den Vögeln selbst, unmöglich bleibt. Solche Vergleichung der Literatur belehrt uns, daß namentlich die erste gute systematische Arbeit von Boie, sowie die Arbeiten der Deutschen fast immer vom Auslande vernachlässigt und falsch verstanden worden sind.

Die wissenschaftliche Bearbeitung eines Gegenstandes gründet sich auf eine durchgreifende Kenntniß desselben und characterisirt sich durch

den inneren Zusammenhang des Einzelnen, welcher eine naturgemäße Anschauung des Ganzen ermöglicht. Die innere Harmonie und das gegenseitige Repräsentiren und Fortschreiten der Typen ist die mathematische Probe für die wissenschaftliche Bedeutung der Arbeit.

So wird es nothwendig, daß wir in einer wissenschaftlichen Arbeit die Entwicklung des Typus immer klarbewußt in ihrer Steigerung verfolgen, daß wir die einzelnen Glieder in ihrer Bedeutung für das Ganze richtig erfassen und daß wir im Stande sind, den Culminationspunkt des Typus und dann wieder seinen Reflex zum Heterogenen, in immer wieder klar vorliegender Wiederholung des Dagewesenen nachweisen zu können. So tritt die wissenschaftliche Arbeit dem Kunstwerk zur Seite, welches nur durch die Harmonie seiner Theile sich selbst zu vollenden vermag. Der Dilettant reiht in leichtem Spiel seine Stücke zusammen und der Eklektiker giebt einzeln, was er eben hat, ohne an den Zusammenhang mit dem Ganzen zu denken.

Freunde dieser Willkühr und der Exposition ihres eignen Individuums in der Natur, durch welche immer so viele Systeme entstehen, als es Naturforscher giebt, mögen daran denken, daß die Darbietung und Begründung von vier Classen von Wirbelthieren in der Natur selbst, in Fische, Amphibien, Vögel und Säugthiere (vergl. das natürliche System Seite 1 his 11) diese Viertheilung, wie schon der geistreiche und für alle Zeiten unsterbliche Oken empfunden, uns als die nothwendige und einzig wahre selbst dictirt hat. Und sollte noch Einer vergessen, daß Himmel und Erde und alle Wissenschaften und Künste, selbst die Musik in ihren Accorden und Stimmweisen viertheilig sind, so wie alles Lebendige viertheilig ist, so würde derselbe doch zugeben müssen, daß diese quaternäre Eintheilung, welche ihren Anklang überall in der Natur zum lebendigen Wiederhall bringt, wenigstens keine willkührliche, unablässig veränderliche oder eine individuell und tumultuarisch confusionäre, sondern eine sich selbst, wie Diejenigen, welche sie sachkundig prüfen, beruhigende genannt werden kann.

i d e a e.

C. Sylphae: Elfen.
 trochilideae genuinae seu typicae:
 appendiculatae: galeatae, cristatae, auri-
 culatae aut perideride patula indutae.

a. Orthorhynchinae,
 Nymphen - Elfen.
 orthorhynchus LACÉPÈDE.
 a. Orthorhynchus LAC. — b. Larichos RCHB.
 c. Cephalopsis LODD. — d. Mulsantia RCHB.
 ophornis LESSON.
 cellatrix BOIE.
 celiactinia RCHB. t. XL.

b. Microrhamphinae,
 Feen - Elfen.
 opelairia RCHB.
 ouldia BONAP.
 hamphomicon BONAP.
 a. Rhamphomicon BP. — b. Parzudakia
 RCHB. — c. Chalcostigma RCHB. — d. Lu-
 machellus RCHB.
 xypogon GOULD.

c. Trochilinae,
 Elfen - Elfen.
 trochilus L.
 a. Trochilus L. — b. Abactoria RCHB. —
 c. Dicotima RCHB. — d. Atthis RCHB.
 calliphlox BOIE.
 a. Calliphlox BOIE. — b. Doricha RCHB. —
 c. Rhodopsis RCHB. — d. Calliperidia RCHB.
 lucifer LESSON.
 a. Lucifer LESSON. — b. Myrtis RCHB. —
 c. Thaumastura BP. — d. Calothorax GRAY.
 elasphorus RICHARDS. et SWAINS.
 a. Selasphorus R. S. — b. Archilochus RCHB.
 c. Heliomaster BP. — d. Lepidothorax RCHB.

d. Petasophorinae,
 Gnomen - Elfen.
 basilinna BOIE.
 a. Basilinna BOIE. — b. Klais RCHB. —
 c. Baucis RCHB. — d. Urosticta G.
 heliothrix BOIE.
 pugastes GOULD.
 petasophora GOULD.
 a. Sebistes GOULD. — b. Telesilla RCHB. —
 c. Praxilla RCHB. — d. Petasophora G. typ.

D. Gnomidae: Gnomen.
 Upupino-Trochilidae: adscitae, magni-
 tudine, forma et vitae ratione desciscentes
 recurvi-, recti- et arcirostres.

a. Docimastinae,
 Nymphen - Gnomen.
 Docimastes GOULD.
 Patagona (LESSON) GRAY.
 Eustephanus RCHB. t. XL.
 Pterophanes GOULD.

b. Phaethorninae,
 Feen - Gnomen.
 Eremita RCHB.
 Phaethornis SWAINSON.
 Pyonornis RCHB.
 Ametornis RCHB.

c. Oreotrochilinae,
 Elfen - Gnomen.
 Thaumaste RCHB.
 Florisuga BONAP.
 Oreotrochilus GOULD.
 Threnetes GOULD.

d. Glaucidinae,
 Gnomen - Gnomen.
 Aphantochroa GOULD.
 Glaucis BOIE.
 Entoxeres RCHB. syst. t. XL.
 Rhamphodon LESS.

Einige Worte zur Kritik der Gattungsnamen mögen vorläufig hier Platz finden.

Tilmatura, Pincettenschwanz, steht für Tryphaena GOULD, welcher Name von Ochsenheimer und Treitschke längst in der Entomologie vergeben ist.

Lesbia LESSON nennen Einige nach Swainson „Cynanthus“, d. h. Hundeblyme. Der richtige Name Cyananthus ist längst von Wallich in der Botanik vergeben.

Sappho hat Gould wieder in Cometes verändert, welches der Name einer sehr alten Linné'schen Pflanzengattung ist.

Eriocnemis mußte anstatt Eriopus gesetzt werden, denn dieser Name ist schon vielfach vergeben.

Hemistephania hatte Bonaparte „Dorifera“ genannt, ein Name, den es nicht in der Wissenschaft geben kann; der richtige Name Doryphora ist bereits in der Botanik vergeben.

Agrytria hatte Bonaparte „Thaumatias“ genannt, ein Name, den es nicht giebt; der richtige Name Thaumantias wird aber bereits seit Eschscholz von einer Meduse geführt.

Hylocharis BOE wird hier für die ursprünglichen Typen hergestellt, während Andere denselben verwechselten.

Prognornis war längst vor Eupetomena gegeben und bezeichnet an sich den Schwalbenhabitus, da der Name der Art nicht wie bei Gould hirundinacea, sondern macroura bleiben muß.

Mulsantia ist an die Stelle des bekannten Pflanzennamen Loddigesia getreten.

Ramphodon muß wieder eintreten, da Fr. Cuvier's Rhamphodon = Gavalis, Grypus aber bereits früher von Germar an einen Curculio vergeben war.

Wenn die erste Anforderung an eine deutsche Arbeit die ist, daß sie sprachrichtig sei, so wird auch der sprachkundige Leser alle Abweichungen von den außer den bisher etwa hier und da gebrauchten Benennungen als notwendig und für die Würde einer wissenschaftlichen Bearbeitung unerläßlich, sich selbst zu deuten vermögen.

Aufzählung der Arten in ihrer natürlichen Verwandtschaft.

A. Nymphae: Nymphen.

a. Mellisuginae.

*Avocettula recurvirostris (Troch. — Sws. 1829.) RCHB. — Peru.

* — euryptera (Ornism. — Loos. 1834.) RCHB. — Cajenne.

— Georginae (Troch. — Bourc. 1847.) RCHB. — N.-Granada.

*Mellisuga minima (Tr. — us L.) GRAY. — St. Domingo. Antill.

Coeligena LESSON.

- * *α. Thalurania* GOULD, furcata (Tr. — us GM. 1788.) GOULD. — Brasil.
- * — Gyrinno RECHB. furcat-*οιδες* GOULO? — Guiana.
- * — columbica (Tr. — us BOURC. Muls. 1843.) GOULD. — Columb.
- * — nigrofasciata (Tr. — us GOULD 1846.) GOULD. — Bras.: Rio Negro.
- * — Whatertoni (Tr. — BOURC. 1847.) GOULD. — Guiana, Essequibo.
- * — Lydia (Tr. Fanny BOURC. 1846. non LESS. 1838.) RECHB. —
N.-Granada: Bonaventura.
- * — glaucopsis (Tr. — GM. 1788.) GOULD. — Bras.
- * — glaucopoides (Tr. — D'ORB. LAFR. 1840 ubi?) —
- * — Eryphile (Ornism. — LESS. 1832.) GOULD. — Bras. N.-Gran. Verag.
- * — viridipectus GOULD 1848. — Columb. Andes.
- * — venusta GOULD 1840. Vulkan Chiriqui: Veragua.
- * — puella GOULD 1853. — Columb. Andes.
- * — refulgens GOULD 1840?
- * — Wagleri (Orn. — LESS. 1829.) GOULD. — Brasil.
- * *β. Damophila* RECHB. Julia (Tr. — BOURC. 1842.) — Columb.
- * — amabilis (Tr. — GOULD 1849?) — N.-Granada.
- * *γ. Coeligena* LESS. typica BONAP. 1850. — Mex. N.-Gran. Vencz.
- * — fulgens (Tr. — SWAINS. 1827.) — Mexico.
- * — Clemenciae (Orn. — LESS. 1829.) Mex. Verag.
- * — tephrocephala (Orn. — LESS. 1829.) — Bras. Guiana fr.
- * — Bouguieri (Tr. — BOURC. 1851.) — Ecuador: Nanagan.
- * *δ. Leadbeatera* BP, 1850, Otero (Tr. — TSCHUDI 1846.) RECHB. — Caracas:
Venez. Columb.
- * — jacula GOULD 1849. — Columb.
- * — sagitta RECHB. — Nord-Peru.
- * — Warszewizii RECHB. — Nord-Peru.
- * — Jamersoni (Tr. — BOURC. 1851.) — Ecuador: Calacoli.
- * *Chlorestes* RECHB. cyanogenys (Tr. — MAX. N.W. 1832.) RECHB. — Brasil.
- * — coerulea (Tr. — us AUD. VIEILL. 1802.) RECHB. — Brasil.
- * — Phaethon (Tr. — BOURC. 1848.) RECHB. — patr.? —
- * — prasina (Orn. — LESS. 1829.) RECHB. — Brasil.
- * — chrysogastra (Tr. — er BOURC. 1843.) — Neu-Granada: Carthagera.
- * — Poortmanni (Tr. — BOURC. 1843.) — Columbia.
- * — Malvina RECHB. 1843. — Brasil.
- * — Haebertlinii (Tr. — LICHTST.) RECHB. — Carthagera.
- * — nitidissima (Tr. — LICHTST.) RECHB. — Bras. N.-Gran.
- * — Pucherani (Tr. — BOURC. Muls. 1848. — Brasil.
- * *β. Smaragdites* viridissima BOIE. (Tr. — us GM. 1788.) BOIE. — Brasil. N.-Gran.
- * — Mariae (Tr. — BOURC. 1846.) — patria?
- * — Alice (Tr. — BOURC. 1848.) — Caracas.
- * — maculicollis RECHB. — N.-Granada.
- * — Esmeralda (Orn. — LESS.) RECHB. — N.-Granada.
- * — Euchloris RECHB. — Peru.
- * *γ. Saucerottia* BP. Atala (Orn. — LESS.) BP. — Brasil.
- * — typica BP. (Tr. Saucerotti BOURC. 1846.) — N.-Granada.
- * — Feliciae (Tr. — BOURC.) RECHB. — Bras.: San José, Veragua.
- * — viridipectus (Tr. Sauc.) RECHB. — Brasil.

- * *γ. Saucerottia erythronota* (Orn. — LESS.) Bp. — Mexico.
- * — *viridiventris* (viridύσσις Bourc. 1843.) N.-Gran.: Fusa gasuga.
- * — *fuscicauda* (Tr. — us FRASER. — Mexico.
- * — *iodura* (Tr. — us SAUC. 1843.) RCHB. — Columbia.
- * — *Edwardsii* (Tr. — BOURC. DELATTRE 1846.) RCHB. — Panama.
- * — *niveiventer* (Tr. niveoventer GOULD 1850.) RCHB. — Veragua.
- * — *cyanifrons* (Tr. — BOURC. 1843.) Bp. — Peru, N.-Gran. Veragua.
- *Sophiae* (Tr. — BOURC. 1848?) —
- *Aglaia* (Tr. — BOURC. 1846.) — patria?
- *caligata* (Tr. — us GOULD.) Bp. — N.-Granada.
- *eximia* (Tr. — us DELATTRE 1853?)
- * *δ. Riccordia* RCHB. *Ramondii* (Orn. Riccordii RAM. DE LA SAGRA 1839.) RCH. — Cuba.
- * — *Canivetii* (Orn. — LESS. 1831.) RCHB. — Mex.: Jalapa, Kakamonka.
- * — *elegans* (Tr. — AUD. VIEILL. 1802.) RCHB. — Brasil.
- * — *iolaimus* (Tr. — NATTER. 1840.) RCHB. — Bras.
- *verticeps* (Tr. — GOULD 1851.)

b. Lesbiinae.

- * *Discura* (Discosura Bp.) RCHB. *longicauda* (Tr. — GM. 1788.) Bp. — Guiana.
- * — *platura* (Tr. — us LATH.) ligonicaudus GOULD. Bp. — Brasilia.
- * *Steganura* RCHB. *Unterwoodii* (Orn. — LESS. 1832.) BRAS.
- * — *spatuligera* RCHB. (♀ Orn. Kieneri LESS.) — Caracas, St. Fé de Bogotz.
- * — *remigera* RCHB. — Nord-Peru.
- * — *peruana* (Spathura — GOULD 1849.) RCHB. — Peru.
- * — *Addae* (Tr. — BOURC. 1846.) RCHB. — Bolivia, La Paz.
- * — *melanauthera* (Tr. — GOULD 1851.) RCHB. — Peru: Quito.
- * *Tilmatura* RCHB. *lepida* (Tr. — us LICHTST. 1830?) — Mex. Guatemala.
- * *Lesbia* Less. *forficata* (Tr. — us L. GM. 1763.) LESS. — Chile, Süd-Peru.
- *Gorgo* RCHB. — St. Fé de Bogota.
- * — *bifurcata* (Tr. — us SWAINS. 1827.) RCHB. — Peru.
- * — *Mocoe* (Tr. — BOURC. 1846.) RCHB. — Bolivia.
- * — *Victoriae* (Tr. — BOURC. MULS. 1846.) RCHB. — N.-Granada.
- * — *Amaryllis* (Tr. — BOURC. 1848.) RCHB. — N.-Granada.
- * — *Gouldii* (Tr. — LODD. 1832.) RCHB. — St. Fé de Bogota.
- * — *gracilis* (Tr. — GOULD 1846.) GOULD. — Peru.
- *Eucharis* (Tr. — BOURC. 1838?) — patria?

c. Metallurinae.

- * *Metallura tyrianthina* (Tr. — us LODD. 1832.) GOULD. — St. Fé de Bog.
- * — *smaragdnicollis* (Tr. — D'ORB. G.) Bp. — Brasil.
- * — *aeneicauda* (Tr. — GOULD 1846.) Bp. — Peru, Bolivia.
- * — *Sabinae* (Tr. — BOURC. 1846. nomen.) RCHB. — Columbia.
- * — *cupreicauda* (Tr. — GOULD 1846.) Bp. — Bolivia.
- * — *castaneiventris* (Tr. — GOULD 1850.) RCHB. — Cordill. Chiriqui.
- * — *phaeopygos* (Tr. — LICHTST. TSCHUDI 1845) RCHB. — Peru.
- *Williami* (Tr. — BOURC. DELATTRE 1847.) Bp. — Columb. Popayan.
- *primulina* (Tr. — us BOURC. 1853.) — ?
- *inornata* (Tr. — GOULD 1846.) RCHB. — Bolivia.
- *floriceps* (Tr. — GOULD 1853.) RCHB. — ?

- * *Chrysura* *Ocnone* (Orn. — LESS, 1832.) Bp. — Trinid. St. Fe. Verag.
- * — *Eliciae* (Tr. — BOURC. Muls. 1846.) Bp. — Brasil.
- * — *chysura* (Orn. — LESS, 1832.) — Brasil.
- *Humdoldtii* (Tr. — BOURC. Muls. 1852?) — ?
- *Josephinae* (Tr. — BOURC. 1846?) — ?
- * *Chrysolampis* *mosquitos* (Tr. — LINN. syst. 1766.) Boie. — Guiana. Cajenne, Antill.
- * — *carbunculus* (Tr. — GM. ? 1788.) RCHB. — N. Gran. Cordill. occ.
- * *Sappho* *sparganura* (Tr. — US SHAW 1811.) RCHB. syst. — Bolivia.
- * — *phaon* (Tr. — GOULD 1847.) RCHB. — Peru.

d. *Heliantheinae*.

Eriocnemis RCHB. syst. t. XL.

- * *α*. *Engyete* *Aline* (Tr. — BOURC. 1842.) RCHB. — St. Fé de Bogota.
- * *β*. *Eriocnemis* *vestita* (Orn. — LESS, 1838.) RCHB. — St. Fé de Bog.
- * — *simplex* (Tr. — GOULD 1849.) GOULD. 1853. — St. Fé de Bog.
- * — *Godini* (Tr. — BOURC. 1851.) RCHB. — Ecuador: Guayubamba.
- * — *Aureliae* (Tr. — BOURC. Muls. 1846.) RCHB. — St. Fé de Bog.
- *nigriventris* (Tr. — BOURC. Muls. 1852?) — ?
- * *γ*. *Threptria* *Mosquera* (Tr. — BOURC. DELATTRE 1846.) RCHB. — N.-Gran.
- * — *Derbyi* (Tr. — BRC. DELATTR. 1846.) RCHB. — Popayan: Vulc. Puracé.
- *lugens* (Tr. — GOULD 1849?) — ?
- * *δ*. *Phemonoë* *Luciani* (Tr. — BOURC. 1847.) RCHB. — Pichincha occid.
- * — *cupriventris* (Tr. — FRAS. 1840.) RCHB. — St. Fé de Bog.
- *Isaacsoni* (Tr. — PARZUD. 1845.) RCHB. — St. Fé de Bog.
- *D'Orbigny* (Tr. — BROUC. 1846.) — patria?

Helianthea GOULD.

- * *α*. *Hemistephania* *Ludoviciae* (Tr. — BOURC. Muls. 1847.) RCHB. — Mex.
- * — *Johannae* (Tr. — BOURC. Muls. 1847.) RCHB. — Peru.
- * *β*. *Helianthea* *typica* (Orn. *Helianthea* LESS, 1838.) Bp. — St. Fé de Bog.
- * — *Lutetiae* (Tr. — BOURC. DELATTRE 1846.) Bp. — Columb. Popayan: Vulc. Puracé.
- *Phoebe* (Orn. — LESS. & DELATTRE 1839.) RCHB. — Andes Peruv.
- *violifera* (Tr. — GOULD 1846.) Bp. — Bolivia.
- * *γ*. *Hypochrysia* *Bonaparti* (Tr. — BOURC. 1842.) Bp. — St. Fé de Bog.
- * — *Eos* (Tr. — GOULD 1853.) Bp. — N.-Granada, Venezuela.
- *Iris* (Tr. — GOULD 1853?) —
- *Aurora* (Tr. — GOULD 1853?) —
- * *δ*. *Aglacactis* *enripennisi* (Tr. — BOURC. Muls. 1843.) GOULD. — Columb. Ecuador: Pichincha, prov. Patto.
- * — *Castelnaudi* (Tr. — BOURC. 1848.) GOULD. — Columbia.
- * — *caumatnotus* (Tr. — GOULD 1848.) GOULD. — Peru.
- * — *Pamela* (Tr. — D'ORRIG. 1836?) GOULD. — Boliv. Curd. la Paz.

Heliodoxa GOULD 1849.

- * *α*. *Phaiolama* *rubinoides* (Tr. — BOURC. 1846.) RCHB. — N.-Granada.
- * *β*. *Heliodoxa* *rubinea* (Tr. — US LATH. 1781.) GOULD. — Brasil. Guiana.
- *Matthewsii* (Tr. — BOURC. 1847.) RCHB. — Peru.
- * *γ*. *Ionolaima* *Schreibersii* (Tr. — LODD. 1847.) RCHB. — Brasil.
- * *δ*. *Lamprolaima* *Rhami* (Orn. — LESS, 1838.) RCHB. — Mexico.
- *Henrica* (Orn. — LESS, 1839.) RCHB. — Mex. Guatepec.

Bourcieria BONAP.

- * *α. Conradinia* Conradi (Tr. — BOUAC. 1847.) Bp. — Merida, Caracas.
- * *β. Homophania* Prunellii (Tr. — BOUAC. Muls. 1843.) Bp. — Columb. N.-Gran.
- * *γ. Lampropygia* Wilsonii (Tr. — BOUAC. DELATTRE 1846.) Bp. — N.-Gran. Juntas.
- * *δ. Bourcieria* torquata (Tr. — BOISSONN. 1840.) Bp. — Peru. N.-Gran.
— Inca (Tr. — GOULD 1853.) GOULD. — Bolivia.

B. Fayae: Feen.**a. Hylocharinae.**

- * *Agyrtia* brevirostris (Orn. — LESS. 1829.) RCHB. — Guiana, Jal. Orizaba.
- * — versicolor (Tr. — OLFERS 1835?) RCHB. — Brasil.
- * — Thanmantias (Tr. — L. GM. 1766.) RCHB. — Guiana.
- * — leucogastra (Tr. — et L. GM. 1766.) RCHB. — Caj. Bras. N.-Gran.
- * — Milleri (Tr. — LODD. 1847.) RCHB. — Bras. Rio Negro.
- * — Thalia (Tr. — GOULD Mus. SAUCEROTTE) RCHB. — patria?
— viridipallens (Tr. — BOUAC. 1846.) — Guatemala, Coban.
- * *β. Uranomitra* Franciae (Tr. — BOUAC. Muls. 1846.) RCHB. — St. Fé de Bog.
- * — quadricolor (Tr. — VIEILL. 1818.) SCHB. — Mexico.
- * — cyanicollis (Tr. — GOULD 1853?) RCHB.
? — cyanocephala (Tr. — us MOLINA 1786.)? — Chili.
- * *γ. Leucochloris* albicollis (Tr. — VIEILL. 1818.) RCHB. — Bras. N.-Gran.
- * *δ. Chalybura* Buffonii (Orn. — LESS. 1832.) RCHB. — Bras. N.-Gran. Verag.
- * — viridis (Tr. — AUD. VIEILL. 1811.) RCHB. — Porto Riro.
- * — cyanea (Tr. — us VIEILL. 1820?) RCHB. —
- * — Goudotii (Tr. — BOUAC. 1844.) RCHB. — N.-Gran.
- * *Hylocharis* sapphirina (Tr. — L. GM. 1766.) BOIE. — Brasil.
- * — latirostris (Tr. — MAX. N.-W. 1832.) RCHB. — Brasil.
- * — cyanea (Tr. — us VIEILL.) BOIE. — Brasil.
- * *β. Cyanophaia* bicolor (Tr. — LINN. 1766.) RCHB. — Guyana.
- * — coerulescens (Tr. — LODD.) RCHB. — Bras. Mogabambo.
- * — lazula (Tr. — us VIEILL. 1822.) RCHB. — Mexico: Chrinatilla.
- * — Dohledayi (Tr. — BOUAC. 1837.) RCHB. — Bras. Rio Negro.
- * — Duchassainii (Tr. — BOUAC. 1851.) RCHB. — Panama.
- * *γ. Eucephala* Grayi (Tr. — BOUAC. DELATTRE 1846.) RCHB. — N.-Gran. Popayan.
- * *δ. Cyanochloris* coeruleiventris (Tr. *coeruleiyáσηρ* GOULD 1847.) RCHB. — N.-Granada.
- * — lactea (Orn. — LESS. 1829.) RCHB. — Brasil.
- * — coeruleigularis (Tr. — GOULD 1850.) RCHB. — Veragua: David, Peru.
- * *Amazilia* latirostris (Tr. — SWAINS. 1827.) Bp. —
- * — Arsinoë (Orn. — LESS. 1832.) Bp. — Mex. Peru.
- * — corallirostris (Tr. — BOUAC. Muls. 1846.) — Guatemala.
- * — Riefferii (Tr. — BOUAC. 1843.) Bp. — N.-Granada.
- * — Dumerilii (Orn. — LESS. 1832.) Bp. — Chili.
- * — Amazilicula (Tr. — SAUC. 1853.) RCHB. — Chili.
- * — leucophaea RCHB. — Süd-Peru, Vulkan Arequipa.
- * — Dubusii (Tr. — BOUAC. 1852?) — patria?
- * — Devillei (Tr. — BOUAC. 1848.) RCHB. — Guatemala.
- * — Norrisii (Tr. — BOUAC. 1847.) Bp. — Peru: Quayaguil.

- * *Leucippus Turneri* (Tr. — BOUAC. 1846.) BP. — Bolivia.
- * — *chionurus* (Tr. — GOULD 1850.) RCHB. — Veragua: Chiriqui.
- * — *chrysobranchos* (Tr. — SHAW 1811.) RCHA. — Trinidad. Guiana.
Brasilia: ad Fl. Belmont.
- * — *fallax* (Tr. — BOUAC. 1843.) BP. — Venezuela, Caracas.

b. *Ochrurae*.

- * *Margarochrysis aurulenta* (Tr. — us LINN. 1766.) RCHB. — St. Domingo, Porto Rico.
- ? — *aurescens* (Tr. — GOULD 1846.) RCHB. — Bras. Rio Negro.
- * *Lafresnaya flavicaudata* (Tr. — us FRAS. 1849.) BP. — St. Fé de Bog.
- * — *Gayi* (Tr. — BOUAC. MULS. 1846.) BP. — Ecuador.
- * — *Saul* (Tr. — BOUAC. 1846.) BP. — Quito, Merida.
- * *Boissonneaua flavescens* (Tr. — LODD. 1832.) RCHB. — St. Fé de Bog.
- * *Platystylopterus rufus* (Tr. — LESS. 1840.) RCHB. — Guatemala.
- * — *hyperythrus* (Campylopt. — CAR. 1848.) RCHB. — Brit. Guiana.

c. *Polytminae*.

- * *Anthraco thorax Mango* (Tr. — L. GM. 1788.) BOIE. — Antill. Bras. Paraguay, Brit. Guiana, Mexico, N.-Granada, Ost-Florida.
- * — *Prevostii* (Tr. — BOUAC. 1843.) RCHB. — Mex., Caracas: Venezuela.
- * *β. Floresia porphyra* (Tr. — us SHAW 1811.) RCHB. — Jamaica.
- * *γ. Sericotes holosericeus* (Tr. — L. 1766.) BOIE. — Antill.
- * — *veraguensis* (Tr. — GOULD) RCHA. — Veragua.
- *chlorolaimus* (Tr. — GOULD) RCHB. — ?
- * *δ. Hypophania dominica* (Tr. — us LINN. 1766.) RCHA. — St. Domingo, Guyana.
- * *Enlamps jugularis* (Tr. — LINN. 1766.) BOIE. — Martinique, Guyana, Caj.
- * *Topaza pella* (Tr. — LINN. 1766.) GRAY. — Guyana.
- * — *pyra* (Tr. — GOULD 1846.) BP. — Bras. Rio Negro.
- * *Polytmus viridans* PATRIK BROWN 1756. — Jamaica.

d. *Campylopterinae*.

- * *Pampa campyloptera* (Orn. — Pampa LESS. 1831.) RCHB. — Paraguay.
- * *Saepiopterus lazulus* (Tr. — VIEILL. 1824?) RCHB. — Jamaica, Neu-Granada, Central-Amerika.
- *cyanipectus* (Tr. — GOULD 1846.) RCHB. — Venezuela.
- * *Campylopterus latipennis* (Tr. — LATH.) RICHDS. SWS. — Ins. Tabago, Guyana.
- * — *ensipennis* (Tr. — SWS.) BP. — Antill. Bras. Venez.
- * — *Delattrei* (Tr. — LESS. 1839.) BP. — Mexico: Xalapa.
- *obscurus* (Tr. — GOULD 1848.) BP. — Bras. fl. Amaz.
- * *Prognornis macroura* (Tr. — us GM. 1788.) RCHB. — Bras. Caj. Brit. Guyana, Jamaica, Cuba.

C. *Sylphae*: Elfen.

a. *Orthorhynchinae*.

- * *Orthorhynchus cristatus* (Tr. — LINN. 1766.) LA CÉPÈDE. — Martinique, Trinid.
- * — *exilis* LATH. GM. 1788.
- β. ? Lepidolophia melanolophos* (Tr. — VIEILL. ENC. 1824?) BP. — patr. ?

- * *γ. Cephalopsis Delalandii* (Tr. Lalandii VIEILL. 1818.) RECH. — Bras.: Rio grande.
- * — *Loddigesii* (Tr. — GOULD 1831.) BP. — Brasilia.
- * *δ. Mulsantia mirabilis* (Tr. — LOOD. 1847.) RECH. — Peru: Chachopoyas.
- * *Lophornis ornata* (Tr. — US GM. 1788.) LESS. — Guyana, Gaj. Bras.
- * — *Delattrei* (Tr. — LESS.) 1839.) BP. — Columbia.
- *Helena* (Tr. — DELATTRE 1843.) — Guatemala, Vera Pax.
- * — *chalybaea* (Tr. — US VIEILL. 1824.) BP. — Brasilia.
- * — *Verreauxii* (Tr. — BOURC. 1853.) VERR. — Peru.
- * *Bellatrix magnifica* (Tr. — US VIEILL. 1817.) BOIE. — Brasilia.
- * — *Reginae* v. SCHREIBERS 1844.) RECH. — Brasilia.
- * — *Gouldii* (Orn. — LESS. 1832.) RECH. — patria?
- * *Heliactinia chrysolopha* (Orn. — LESS. 1831.) RECH. — Brasilia.

b. Microrhamphinae.

- * *Popelairia tricholopha* (Tr. Popelairii DUBUS 1846.) RECH. — Columbia.
- * *Gouldia Langsdorffii* (Tr. — VIEILL. ERG. 1824?) BP. — Brasilia.
- * — *Conversi* (Tr. — BOURC. 1846.) — St. Fé de Bogota.
- *Laetitia* (Tr. — BOURC. 1852?) — patria?
- * *Rhamphomicron microrhynchum* (Orn. — a BOISSON. 1839.) — St. Fé de Bog.
- * *β. Parzudakia dispar* (Orn. Parzudakii LESS. 1840.) RECH. — St. Fé de Bog.
- * — *viola* (Heliotrypha — GOULD 1853.) — Peru.
- * *γ. Chalcostigma heteropogon* (Orn. — BOISSON. 1839.) BP. — St. Fé de Bog.
- * — *Stanleyi* (Tr. — BOURC. 1850.) BP. — Pichincha.
- * — *Herrani* (Tr. — BOURC. & DELATTRE 1846.) GOULD. — Ecuador.
- * — *ruficeps* (Tr. — GOULD 1846.) GOULD. — Bolivia.
- *Vulcani* (Tr. — GOULD 1849.) GOULD. — Bolivia.
- * *δ. Lamprurus Luciahellus* (Orn. — a LESS. 1838.) RECH. — Brasil.: Bahia.
- * *Oxyopogon Guerini* (Orn. — BOISSON. 1840.) GOULD. — St. Fé de Bogota.
- * — *Lindeni* (Orn. — PARZUDAKI 1845.) GOULD. — Venezuela, Merida.

c. Trochilinae.

- * *Trochilus Colobris* LINN. 1766. — Texas bis 57^o.
- * — *Mavors* GOULD 1848. — N.-Granada, Venezuela, Cordill.
- * — *orthurus* (Orn. — a LESS. 1832.) RECH. — Guiana.
- * *β. Anactoria amethysticollis* (Orthorh. — D'ORB. 1842?) — Cordill. or. Yacaré - Cochabamba.
- *Clarissa* (Orn. — LONGUEM. 1842.) RECH. — St. Fé de Bogota.
- * — *Libussa* RECH. — Nord-Peru.
- *Strophiana* (Tr. — US GOULD 1846.) RECH. — patria?
- * *γ. Diotima Spencei* (Tr. — BOURC. 1847.) RECH. — Merida.
- * *δ. Athis Heloisa* (Tr. — DELATTRE 1839.) RECH. — Mexico.
- * — *Costae* (Tr. — BOURC. 1839.) RECH. — California.
- * — *Anna* (Orn. — LESS. 1829.) RECH. — California.
- * *Calliphlox amethystina* (Tr. — GM. 1788.) BOIE. — Brasil. spt. Guiana.
- * — *amethystoides* (Orn. — LESS. 1832.) RECH. — Bras. Cajenne?
- *Caroli* (Tr. — BOURC. 1847.) RECH. — patria?
- * *β. Doricha heneicra* (Tr. enicurus VIEILL. 1818.) RECH. — Centr.-Amer. Guatem.
- * *γ. Rhodopsis vespera* (Orn. vesper LESS. 1829.) RECH. — Chili.
- * *δ. Calliperidia Angelae* (Orn. — LESS. 1833.) RECH. — Bras. Buen. Ayres.

- * *Lucifer cyanopogon* (Orn. — LESS. 1829.) BOIE. — Mexico.
 * β . *Myrtis Fanny* (Orn. — LESS. 1838.) REHB. — Peru: Lima.
 * — *Elisa* (Orn. — LESS. 1839.) REHB. — Mexico.
 * γ . *Thaumastura Cora* (Orn. — LESS. 1829.) BP. — Peru.
 * δ . *Calothorax Heliadori* (Tr. — BOURC. 1842.) GRAY. — St. Fè de Bog., Pamplona.
 * — *Mitchelli* (Tr. — BOURC. 1847.) GRAY. — Zimapan, Venezuela.
 * — *Mulsanti* (Tr. — BOURC. 1848.) GRAY. — Columb. Bolivia.
 * — *Rosae* (Tr. — BOURC.) GRAY. — Caracas.
 * — *Yarrellii* (Tr. — BOURC. 1847.) GRAY. — Arica, ora occ. Amer.
 * — *Jourlani* (Tr. — BOURC. 1839.) GRAY. — Trinidad.
 * — *Calliope* (Tr. — GOULD 1847.) GRAY. — Mexico.
 * — *Tendali* (Tr. — TSCHUDI 1845.) — Peru.
 * — *Evelinae* (Tr. — BOURC. 1847.) GRAY. — New Providence.
 * *Selasphorus ruber* (Tr. — LINN. 1766.) RICHDS. & SWAINS. — Californ. Nootka Sound.
 * — *scintilla* (Tr. — GOULD 1850.) GOULD. — Veragua.
 * — *platycercus* (Tr. — SWAINS. 1827.) BP. — Mexico.
 * β . *Archiloehus Alexandri* (Tr. — BOURC. 1846.) REHB. — Mex.: Sierra Madre.
 * γ . *Heliomaster longirostris* (Tr. — VIEILL. 1802.) BP. — Trinid. Demer. Caracas, Costa Rica, Veragua, Cajenne.
 * — *Constantii* (Tr. — DELATTRE 1843.) GOULD. — Guatemala.
 * — *pinicola* GOULD. — Mexico bor.
 * — *Villaviscensio* (Tr. — BOURC. 1851.) REHB. — Ecuador: Napo.
 * δ . *Lepidolarynx mesoleucus* (Tr. — TEMM. 1830?) REHB. — Brasilia.

d. Petasophorinae.

- * *Basilinna leucotis* (Tr. — VIEILL. 1818?) BOIE. — Brasilia.
 * β . *Klais Guimeti* (Tr. — BOURC. 1443.) REHB. — Columb. Venezuela: Caracas, Veragua.
 * γ . *Baucis Abeillei* (Tr. — DELATTRE & LESS. 1839.) REHB. — Jalapa, Guatemala.
 * δ . *Urosticta Benjamini* (Tr. — BOURC. 1851.) GOULD. — Ecuador: Qualea, Quito.
 * *Heliothrix aurita* (Tr. — US GM. 1788.) BOIE. — Guyana Cajenne.
 * — *auriculata* (Tr. — LICHTST. 1835.) — Brasilia: R. Janeiro.
 * — *Barrotii* (Tr. — BOURC. 1843.) — Carthagera, Columb. Verag. Pichincha.
 * *Augastes superbus* (Tr. — VIEILL. 1822?) GOULD. — Brasil. int.
Petasophora GOULD.
 * α . *Schistes Geoffroyi* (Tr. — BOURC. 1843.) GOULD. — Columb. Andes, Bog.
 * — *albicularis* GOULD 1851. — Quito: Pichincha.
 * β . *Telesiella* REHB. *Delphinae* (Orn. — LESS. 1839.) GOULD. — Trinidad. Caj. Demer. Carac. Columb. Peru.
 * γ . *Praxilla* REHB. *Anais* (Orn. — LESS. 1832.) GOULD. — Columb.: Bog. Peru.
 * — *thalassina* (Tr. — SWAINS. 1827.) GOULD. — Mex.: Tehuiscaltipac. Guatemala, Costa Rica, Veragua, Panama.
 * — *iolata* GOULD 1847. — Bolivia.
 * — *corruscans* GOULD 1847. — patria?
 * — *cyanotus* (Tr. — BOURC. Muls. 1843.) GOULD. — Ecuador, Columbia — Veragua et Costa Rica, Caracas, Peru.
 * δ . *Petasophora chalcotis* (Tr. — LICHTST.) REHB. — Brasilia: Bahia.
 * — *serrirostris* (Tr. — VIEILL. 1822?) GOULD. — Brasilia.

D. Gnomidae: Gnomen.

a. Docimastinae.

- * *Docimastes ensiferus* (Tr. — BOISSONN. 1839.) GOULD. — St. Fé de Bogota, Quito: Pichincha.
- * *Patagona gigas* (Tr. — VIEILL. 1834.) GRAY. — Chile, Süd-Peru: Arequipa, Bolivia.
- * *Eustephanus galeritus* (Tr. — MOLINA 1786.) RCHB. — Patagonia, Terra del Fuego. Chile merid., hieme Peru.
- * — *Fernandensis* (Tr. — KING 1831.) RCHB. — Ins. Juan Fernandez.
- * *Pterophanes Temminckii* (Orn. — BOISSONN. 1839.) GOULD. — N.-Gran., Boliv.

b. Phaethorninae.

- * *Eremita rufigaster* (Tr. — VIEILL. 1807.) RCHB. — Brasil.
- * — *Davidianus* (Tr. — LESS. 1832.) RCHB. — Guiana fr.
- * — *pygmaeus* (Tr. — SPFX.) — Brasilia.
- * — *griseigularis* GOULD 1851. — Peru.
- * *Phaethornis superciliosus* (Tr. — LINN. 1766.) SWAINS. — Bras. Guiana.
- * — *malaris* (Tr. — NORDM. 1842.) BP. — Cajenne.
- * — *melanotis* (Tr. — NORDM. 1842.) BP. — Chile.
- *leucophrys* (Tr. — NORDM. 1842.) BP. — patria?
- * — *syrmatophorus* (Tr. — GOULD 1852.) — Peru or. Quito.
- * — *Pretrei* (Tr. — DELATTRE 1839.) BP. — Bras.
- * — *anthophilus* (Tr. — BOURC. 1843.) BP. — Columb. St. Marha.
- * — *Augusti* (Tr. — BOURC. Muls. 1847.) — Caracas: Venezuela.
- * — *Guy* (Tr. — LESS. 1832.) BP. — Columbia.
- * — *Emiliae* (Tr. — BOURC. Muls. 1843.) BP. — St. Fé de Bogota.
- * — *squalidus* (Tr. — NATT. 1824.) BP. — Brasilia.
- *Yarugui* (Tr. — BOURC. 1851.) BP. — Ecuador, Quito.
- *Longuemari* (Tr. — LESS. 1832.) BP. — Guiana.
- ? — *pavonius* LATH.? (Tr. —
- * *Ptyonornis Eurynome* (Tr. — LESS. 1832.) RCHB. — Bras. Rio Janeiro.
- * — *hispida* (Tr. — us GOULD 1846.) RCHB. — Bolivia.
- * — *intermedia* (Tr. — us LESS. 1832.) RCHB. — Brasil.
- * — *cephalus* (Tr. — BOURC. Muls. 1848.) — Bras. Central-Amer.
- * *Ametronis abnormis* (Tr. — NATT.) RCHB. — Brasil.
- * — *Bourcierii* (Tr. — LESS. 1832.) RCHB. — Cajenne.
- *De Filippi* (Tr. — BOURC. 1847.) — Bolivia.
- *Oseryi* (Tr. — BOURC. 1852.) — patria?

c. Oreotrochilinae.

- * *Thaumaste Stokesii* (Tr. — KING 1831.) RCHB. — Ins. Juan Fernandez.
- * *Florisuga mellivora* (Tr. — us LINN. 1766.) BP. — Trinid. Bras. Guiana, Cajenne, Columbia.
- * — *ferruginiceps* RCHB. — Columbia.
- * — *flabellifera* (Tr. — GOULD 1846.) GOULD. — Tobago, Orinoco.
- *Jardinii* (Tr. — BOURC. 1851.) RCHB. — Nanégan.
- * — *fusca* (Tr. — us VIEILL. 1817.) RCHB. — Bras. or. et merid. N.-Gran.

- * *Oreotrochilus* Estella (Tr. — D'ORB. 1842.) GOULD. — Bolivia: la Paz.
 * — *leucopleurus* (Tr. — GOULD 1847.) GOULD. — Chile.
 * — *Pichincha* (Tr. — BOURC. 1849.) GOULD. — Ecuad.: Pichincha et Cotopaxi.
 * — *Chimborazo* (Tr. — BOURC. 1846.) GOULD. — Chimborazo.
 * — *Adela* (Tr. — D'ORB. 1842.) GOULD. — Bolivia, Chuquisaca.
 * — *melanogaster* (Tr. — GOULD 1847.) GOULD. — patria?
 * *Threnetes* leucurus (Tr. — LINN. 1766.) GOULD. — Bras. Guiana.
 * — *Ruckeri* (Tr. — BOURC. 1847.) REHB. — Central-Amer. Veragua.

d. Glaucidinae.

- * *Aphantochroa cirrochloris* (Tr. — VIEILL. 1822?) GOULD. — Brasilia.
 St. Fè de Bogota.
 * — *Antoniae* (Tr. — BOURC. MULS. 1847.) REHB. — Cajenne.
 * *Glaucis hirsuta* (Tr. — us GM. 1888.) BOIE. — Bras. Brit. Guiana.
 * — *Mazeppa* (Tr. — LESS. 1832.) REHB. — Guiana.
 ? — *Dohrni* (Tr. — BOURC. 1846?) — patria?
 * *Eutoxeres Aquila* (Tr. — BOURC. 1847.) REHB. syst. — St. Fè de Bog.
 * — *Condaminei* (Tr. — BOURC. 1851.) REHB. — Ecuador: Archidona.
 * *Rhamphodon naevius* (Tr. — DUMONT 1818.) LESS. — Bras. merid.
 * — *chrysurus* REHB. 1852. — Mexico.

Specierum synonymica clavis.

(Trochilus, Ornismya, Mellisaga, Polytmus etc.)

- Abeillei* DELATTRE LESS. = *Basilinna* (Baucis).
abnormis NATT. = *Ametrornis*.
Addae BOURC. = *Steganura*.
Adclae D'ORB. = *Oreotrochilus*.
aeneicauda GOULD = *Metallura*.
aeneocauda GOULD corr. = *aeneicauda*.
Aglaia BOURC. = *Saucerottia*.
albicollia VIEILL. = *Agyrtia* (*Leucochloris*).
albigularis GLD. = *Petasophora* (*Schistes*).
 — SPIX = *Agyrtia* (*Leucochloris*) *albicollis*.
albirostris LESS. = *Agyrtia leucogastra*.
albigularis LESS. *Trochil.* pl. 32. *Agyrtia leucogastra*.
 — LESS. Ois. m. pl. 76. = *Agyrtia*.
albigularis GOULD corr. *albigularis*.
albus GM. = *Anthracothonax Mango* juv.
Alexandri BOURC. = *Selasphorus* (*Archilochus*).
Alice BOURC. = *Chlorestes* (*Smaragdites*).
Aline BOURC. = *Eriocnemis* (*Engyete*).
Allardi BOURC. = *Metallura tyrisanthina*.
amabilis G. = *Coelig.* (*Damophila*).
Ameryllis BOURC. MULS. = *Lesbia*.
Amazili LESS. = *Amaz. latirostris*.
Amazilicula SAUC. = *Amazilia*.
amethysticollis D'ORB. = *Trochilus* (*Anactoria*).
amethystinus GM. = *Calliphlox*.
amethystoides LESS. = *Calliphlox*.
Anais JARD. HUMM. B. II. pl. 2. = *Petasophora thalassina*.
 — LESS. Col. 104. *appl.* 18. m. pl. 3. et *Troch.* 148. pl. 56. = *Petasophora thalassina*.
 — LESS. *Troch.* 146. pl. 55. = *Petasophora* (*Praxilla*) *Anais*.
 — LESS. *Troch.* 151. pl. 57. = *Petasophora cyanotus*?
Angela LESS. = *Calliphlox* (*Calliperidia*).
angustipennis FRAS. 1840. 18 = *dubia cujusdam femina*.
Anna LESS. = *Trochilus* (*Atthis*).
anthophilus BOURC. MULS. = *Phaethornis*.
Antonise BOURC. = *Aphantochroa*.
apicalia LCHTET. GRAY = *Phaethornis Guy*.

- aquila BOURC. = *Eutoxeres*.
 Arsennii LESS. = *Basilinna leucotis*.
 Arsinoë LESS. = *Amazilia*.
 arsinoides SAUC. = *Amazilia Riefferii*.
 ater MAX. N.-W. = *Florisuga atra*.
 Atala LESS. = *Saucerottia*.
 atratus LICHTST. = *Florisuga atra*.
 atricapillus VIEILL. AZARA D. 295. = *Anthracothonax* Mango.
 atrigaster SHAW = *Anthracothonax* (Sericotes) holosericeus.
 Andehertii LESS. = *Chlorestes coerulea*.
 Andenetii LESS. = *Lophornis chalybea*.
 Augusti BOURC. = *Phaethornis*.
 aurantius GMEL. = *Nectarinia*.
 auratus GM. = *Eulampis jugularis*.
 — GM. = *Lophornis ornata*.
 aureiventris D'ORB. = *Chlorestes chrysogaster*.
 Aureliae BOURC. MULS. = *Eriocnemis*.
 aureoviridis SHAW = *Agyrtia* (Chalybura) viridis.
 aurescens GOULD = *Margarochrysis*.
 aereus LICHTST. = *Heliodoxa rubinea*.
 auriculatus LICHTST. = *Heliothrix*.
 aurigaster LODD. correct. = *Helianthea Bonapartii*.
 arritus GM. = *Heliothrix*.
 aurogaster LODD = *aurigaster*.
 Aurora GLD = *Helianthea* (Hypochrysis).
 aurentus LATH. = *Margarochrysis margaritaceus*.
 — VIEILL. = *Margarochrysis margaritaceus*.
 Avocetta LESS. = *Avocetula enryptera*.
 Azarae VIEILL. Enc. 549 Az. 297. = species dubia.
 azurea LICHTST. = *Hylocharis cyanea*.
 Bancrofti LATH. = *Eulampis jugularis*.
 Barroti BOURC. = *Heliothrix*.
 Bejamini B. = *Basilinna*.
 benjaminus BP. = *Basilinna Benjamini*.
 bicolor LATH. = *Hylocharis cyanea*.
 — L. GMEL. 60. 261. = *Hylocharis* (Cyanophaia).
 bifurcatus SW. = *Lesbia*.
 bilobus LICHTST. = *Heliactinia chrysolopha*.
 bilophus T. = *Heliactinia chrysolopha*.
 bipartitus LATH. = *Lesbia forficata*.
 Bonapartii BOURC. = *Helianthea* (Hypochrysis).
 Bonguieri B. = *Coeligena*.
 Bourcier LESS. = *Ametornis*.
 brachyrhynchus FRAS. = *Rhamphoceros microrhynchum*.
 brasiliensis GRAY. BRISS. = *Phaethornis squallida*.
 brasiliensis LATH. ? = *Glaucis hirsutus*.
 — T. & M. N.-W. = *Eremita rufigaster*.
 brevicauda SPX = *Agyrtia versicolor* ?
 brevisrostris LESS. = *Agyrtia*.
 bromicolor LESS. = *Anthracothonax* (Floresia) porphyurus.
 Buffoni LESS. = *Agyrtia* (Chalybura).
 caligata GOULD = *Saucerottia*.
 Calliope GOULD = *Lucifer* (Calothorax).
 campestris M. N.-W. = *Calliph. ameth. juv.* ?
 campylopterus GMEL. = *Campylopterus latipeonis*.
 campylostylus LICHTST. = *Aphantochora cirrochloris*.
 candidus BOURC. DEL. = *Agyrtia*.
 Caoiveti LESS. t. 37. = *Chlorestes* (Riccordia).
 — LESS. t. 38. = *Chlorestes Haeblerlinii*.
 capensis LATH. GM. = *Certhiina dubia*.
 carbunculus GM. = *Chrysolampis*.
 Caroli BOURC. = *Calliphlox*.
 castaneiventris (corr.) GOULD = *Metallura*.
 castaneoventris GOULD = *castaneiventris*.
 Castelnaudi BOURC. — *Helianthea* (Hylaeactis).
 Catharinae VERR. mus dubia.
 caumatonotus GOULD = *Helianthea* (Aglaeactis).
 Ceciliae LESS. = *Oreotrochilus Estella*.
 cephalater LESS. = *Polytmus viridans* P. Browne.
 cephalus BOURC. MULS. = *Ptyonornis*.
 chalcotis LICHT. = *Petasophora*.
 chalybeus VIEILL. = *Lophornis*.
 Chimborazo BOURC. = *Oreotrochilus*.
 chionogaster TSCH. Fa. p. 247. 12. = *Leucippus Turneri*.
 chionnra G. = *Leucippus*.
 chlorolaemus GOULD = *Anthracothonax* (Sericotes).
 chloroleucurus SAUC. = *Leucippus chrysobranchos*.
 chlorolophus BONAP. = *Orthorhynchus exilis*.
 chrysobranchos SHAW = *Leucippus*.
 chrysogaster B. = *Chlorestes*.
 — LICHTST. — *Helianthea Eos*.
 chrysolopha LESS. = *Heliactinia*.
 chrysura LESS. = *Chrysouronia*.
 chrysurus CUV. = *Sappho sparganura*.
 cinereicollis VIEILL. Enc. 562. AZARA 294 ?
 cinereus GM. = *Campylopterus latipennis*.
 cinnamomea GERVAIS = *Eustephanus Fernandensis*.
 Circe BOURC. = *Hylocharis* (Encephala).
 cirrbochloris VIEILL. = *Aphaatochroa*.

Clarissa LONGUEM = Trochil. (Anactoria).
 Clemenciae LESS. = Coeligena.
 Cleopatra VERR. mus. dubia.
 coelestis LESS. = Tilmatura lepida.
 coeligena LESS. = Coeligena typica.
 coeruleus VIEILL. = Chlorestes.
 coerulei *ἀσση* GOULD = correct. coeruleiventris.
 coeruleigularis GOULD = Hylocharis (Cyanochloris).
 coeruleiventris REHB. = Hylocharis (Cyanochloris).
 coeruleognaris GOULD = coeruleigularis corr.
 coeruleus Lodd. = Hylocharis (Cyanophaia).
 coeruleus AUD. VIEILL. = Chlorestes coerulea.
 collaris = Selasphorus ruber.
 columbica B. M. = Coeligena (Thalassia) columbica.
 Colubris L. = Trochilus.
 Comte de Paris DELATTRE = Helianthea Lutetiae
 concinna STEPH. = mellisugus L.
 Condaminei BOURC. = Eutoxeres.
 Conradi BOURC. = Bourcieria (Conradina).
 consobrius BRC. = Phaethornis malaris.
 Constantii DEL. = Selasphorus (Heliamaster).
 conurae GRAY = Phaeth. pavoninus.
 Conversi BOURC. = Gouldia.
 Cora LESS. = Lucifer (Thaumastura).
 corallirostris BOURC. MULS. = Amazilia.
 Corinna LESS. = Selasphorus (Heliamaster) longirostris.
 cornutus M. N.-W. = Heliactinia chrys.
 coruscans GLD. = Petasophora (Praxilla).
 corruscus FRAS. & LICHTST. = Rhamphomicon (Chalcostigma) heteropogon.
 corruscana LICHT. = Lucifer cyanopogon.
 coruscus LICHT. = Rhamphomicon heteropogon.
 Costae BOURC. = Trochilus (Atthis).
 crispus SPIX = Petasophora chalcotis.
 cristata major LESS. = Orthorhynchus cristatus.
 — minor LESS. = Orthorhynchus pileatus.
 cristatellus LATH. = Orthorhynchus pileatus.
 cristatus L. = Orthorhynchus.
 cuculliger LICHT. = Basilinna leucotis.
 cupreicauda GOULD = Metallura
 cupreipennis BOURC. MULS. = correct. cupripennis.
 cupreiventris FRAS. = Eriocnemis.
 cupripennis BOURC. MULS. = Helianthea (Aglaeactis).

Cuvieri BOURC. = Aphantochroa.
 cyaneus LATH. = Certhia mex. dubia.
 — VIEILL. = Hylocharis.
 cyanicollis GOULD = Agyrtia (Uranomitra).
 cynnifrons BOURC. = Saucerottia.
 cyanipectus GOULD = Saepiopterus cyanipectus.
 cyanocephala LESS. = quadricolor VIEILL.
 cyanocephalus Mol.?
 cyanogenys MAX. N.-W. = Agyrtia Chlorestes.
 cyanomelas BANCROFT, GM. = Eulampis jugularis.
 cyanopectus GOULD = cyanipectus.
 cyanopogon LESS. = Lucifer.
 cyanopterus Lodd. = Pterophanes Temminckii.
 cyanotus BOURC. MULS. = Petasophora (Praxilla).
 cyanopygos LICHT. = Eriocnemis cupreiventris.
 cyanurus LATH. GM. = Lesbia forficata.
 — VIEILL. = Agyrtia (Chalybura).
 dasypus LICHT. = Eriocnemis Aline.
 Davidianus LESS. = Eremita.
 decorus LICHT. = Bellatrix magnifica.
 De Filippii BOURC. = Ametrornis.
 Delalandei STEPH. = Orthorhynchus (Cephalepis) Lalandei.
 delattre BP. = Campylopterus Delattarii.
 Delattarii LESS. rev. 1839. p. 14 = Campylopterus Delattarii.
 — LESS. rev. 1839. 19. = Lophornis.
 Delphinac LESS. = Petasophora (Telestiella).
 Derbyi BOURC. DELATTRE = Eriocnemis (Threptia).
 Derbyanus FRAS. = Docimastes ensiferus.
 Devillii BOURC. = Amazilia.
 dichrous LICHT. = Chrysura chrysura.
 dilophus VLL. = Heliactinia chrysolopha.
 dispar REHB. = Rhamphomicon (Parzudakia).
 Dohrni BOURC. = Glaucis.
 dominicus LICHT. = Glaucis hirsutia.
 — L. = Anthracothorax (Hypophania).
 Doubledayi BOURC. 60. 264. = Hylocharis.
 Du Busii BOURC. = Amazilia.
 Duchassaingii BOURC. 60. 259. = Hylocharis (Cyanophaia).
 Dumerillii LESS. = Amazilia.
 Dupontii LESS. = Tilmatura lepida.
 Edwardsii BOURC. DEL. = Saucerottia.
 elatus L. = Chrysorhynchus mosquitus.
 elegans AUD. V. = Chloroceryle (Riccordia).
 Eliciae BOURC. MULS. = Chrysura.

- Elisa DEL. = Lucifer (Myrtis).
 Emiliae BOURC. MULS. = Phaethornis.
 enicurus VIEILL. = Calliphlox (Doricha)
 henicuru.
 ensiferus BOISSON. = Docimastes.
 eupennis SW. = Campylopterus.
 Eos GOULD = Helianthea (Hypochrysa).
 Eryphile LESS. = Coelig. Thal.
 erythronota LESS. = Saucerottia.
 erythorhyncha (Amazilia) BP. = delenda
 Esmeralda LESS. = Chlorestes (Sma-
 ragditis).
 Estella D'ORB. = Oreotrochilus.
 Eucharis BOURC. = Lesbia.
 Euchloris REHB. = Chlorestes (Sma-
 ragditis).
 Eurynome LESS. = Ptyonornis.
 euryornis GR. = Ptyonornis Eurynome
 LESS.
 eurypterus LODD. = Avocettula.
 Evelinae BOURC. = Lucifer (Calothorax).
 exilis GM. = Orthorhynchus.
 eximia DEL. = Saucerottia.
 exortis FRAS. BP. dubia.
 falcatus SWS. = Saepiopterus lazulus.
 fallax BOURC. = Leucippus.
 Fandy BOURC. DELATTRE 1846 = Coeli-
 gena (Thalaurania) Lydia.
 — LESS. 1838 = Lucifer (Myrtis).
 fasciatus SHAW = Anthracothorax Mango
 juv.
 Faustine VERR. mus. dubiu.
 Feliciae LESS. = Chlorestes (Saucerottia).
 Fernandezensis KING = Eustephanus.
 ferrugineus M. N.-W. = Glaucis Mazepa.
 ferruginiceps REHB. = Florisuga.
 festivus LICHT. = Lophornis chalybea.
 filicaudus LICHT. = Lucifer (Calothorax)
 Mulsanti.
 fimbriatus L. GM. = Florisuga mellivora ♀.
 flabellifera GOULD = Florisuga.
 flammifrons LVELL = Eustephanus ga-
 leritus.
 flavescens LODD. = Boissonneau.
 flavicaudata FRAS. = Lafresnaya.
 flavifrons LATH. = Chlorestes Poort-
 manni?
 Floresii BOURC. = Anthracothorax (Flo-
 resia) porphyurus.
 floriceps GOULD = Metallura.
 forcipatus LATH. = Prognornis macroura.
 forficatus LINN. = Lesbia.
 forficatus GOULD BEAGLE = Eustepha-
 nus galeritus.
 Franciae BOURC. MULS. = Agyrtia
 (Uranomitra).
 frontalis LATH. = Coeligena (Thalur-
 glaucopis).
 fulgens SWAINS. = Coeligena.
 fulgidus LICHT. = Heliodoxa (Lampro-
 laima) Rhami.
 fulvifrons LATH. = Hylocharis sapphirina.
 fulviventris G. = Leucippus fallax.
 fulvus GMEL. (SENA III, 72. 1.) = Cer-
 thiina dubia.
 furcata GM. = Coeligena (Thalaurania)
 furcata.
 furcatoides GOULD = Coeligena (Tha-
 laurania) Gyrinno.
 fuscicrudus FRAS. = Saucerottia.
 fuscus VIEILL. = Florisuga atra.
 galeritus MOLINA = Eustephanus.
 Gayi BOURC. MULS. = Lafresnaya.
 Geoffroyi BOURC. = Petasophora (Schistes).
 Georgina BOURC. = Avocettula.
 Gibsoni LODD. FRAS. 1840. 17. dubius.
 gigantea D'ORB. = Patagona gigas.
 gigas VIEILL. = Patagona.
 glaucopis GM. 48. 179. = Coeligena
 (Thalaurania).
 glaucopoides D'ORB. LAFR. = Coeli-
 gena (Thalaurania).
 glomata LESS. = Eriocnemis vestita juv.
 Godini BOURC. = Eriocnemis.
 Gorgo REHB. = Lesbia.
 Goudoti BOURC. = Agyrtia (Chalybura).
 gouldi (Petas.) BP. = Petasophora serri-
 rostris.
 Gouldii LESS. = Bellatrix.
 — LODD. = Lesbia.
 gracilis GOULD = Lesbia.
 gramineus GM. = Anthracothorax (Hypo-
 phania) dominicus.
 granatinus LATH. = Eulampis jugularis.
 grata BP. = Coeligena (Leadbeat.) Otero.
 Grayi BOURC. DEL. = Hylocharis (Eu-
 cephala).
 griseigularis GOULD = Eremita.
 griseogularis GOULD = griseigularis.
 Guérini BOISSON. = Oxygogon.
 guianensis GM. = Eulampis mosquitua.
 Guineti BOURC. = Basilinna (Klais).
 gularis LATH. = Anthracothorax (Hypo-
 phania) dominicus.
 Guy LESS. = Phaethornis Guy.
 Haerberlinii LICHT. = Chlorestes Haerber-
 linii.
 haematorhyncha (Amazilia) BP. deletur.
 Helenae DEL. = Lophorhis.
 helianthea LESS. = Helianthea typica.
 helias SPX. = Bellatrix magnifica.
 Heliadori BOURC. = Lucifer (Calothorax).
 Heloise DEL. = Trochilus (Atthis).
 hemileucurus LICHT. = Campylopterus
 Delattrei.

henicura REHB. = Calliphlox.
Henrica LESS. = Heliodoxa (Lampro-
laima).

Herrani BOUAC. DEL. = Rhamphomicon
(Chalcostigma).

heteropogon BOISSON. = Rhamphomicon
(Chalcostigma).

heteropygia LESS. = Calliphlox henicura ♂.
hirsutus GM. = Glaucis.

hirundinacea LESS. = Prognornis macroura.

hirundinaceus SP. = Gouldia Langsdorffii.

hispidus GOULD = Ptyonornis.

holosericens L. = Anthracothorax (Se-
ricotes).

Humboldtii BOUAC. MULS. = Chrysura.

humilis GOSSE = Mellisuga minima.

hyperythrus CAR. = Platystylopterus.

hypoleucus GOULD = Lencippus Turneri.

— LICHT. = Agyrtia (Uranomitra)
Franciae.

hypophaeus LATH. = Margarochrysis
margaritaceus et juvenis
Marg. Prevostii.

Jacobine BUFF. = Florisuga mellivora.

jacula GOULD = Coeligena (Leadb.).

Jamesoni JARD. = Orcotroch. Pichincha.

Jamersoni BOUAC. = Coelig. (Leadb.).

ianthinotus NATT. = Petasophora serri-
rostris.

Jardinii BOUAC. = Florisuga.

icterocephalus NATT. = Troch. (Atthis)
Anna.

Inca GOULD = Bourcieria.

inornata GOULD = Metallura.

insectivorus Tsch. = Bourcieria torquata.

intermedius LESS. = Ptyonornis.

iodura SAUCEROTTE = Sancerottia.

Johannae BOUAC. = Helianthea (Hemi-
stephania).

iolaimus NATT. = Chlorestes (Riccordia).

iolata GOULD = Petasophora (Praxilla).

iolota GOULD proc. corr. = iolata.

Josephinae BOUAC. = Chrysura.

Jourdani BOUAC. = Lucifer (Calothorax).

Iris GOULD = Helianthea (Hypochrysis).

Isaacsoni PARZ. = Eriocnemis (Phemone).

jugularis L. = Eulampis.

Julia BOUAC. = Coeligea (Damo-
phila).

Kiogii LESS. = Lesbia forficata.

— (Orthorhynchus) VIG. — Enste-
phanus galcritis.

Labrador BOUAC. DEL. = Lucifer (Myrtis)
Fanny.

lactea LESS. = Agyrtia (Cyanochloris).

Lactitia BOUAC. = Gouldia.

Lafresnaya = Lafresnaya flavicandata.

Lalandii VIEILL. = Orthorhynchus (Ce-
phalepis).

lamprocephalus LICHT. = Troch. Anna.

lamprogeneias REHB. Mns. Vindob. —
Anthracothorax Prevostii.

Langsdorffii VIEILL. = Gouldia.

largipennis GR. = Campylopterus lati-
pennis.

latipennis LATH. = Campylopterus.

latirostris M. N.-W. = Hylocharis.

— SWS. — Amazilia.

lazulinus LICHT. = Hylocharis latirostris.

lazulus VIEILL. = Saepiopterus.

Leadbeateri BC = Coelig. Leadb. Otero.

leocadia (quid?) BOUAC. MULS. = Selas-
phorus (Helioaster) pinicola.

lepidus LICHT. = Tilmatura lepidus.

Lereboulleti SAUC. Mns. = Doubledayi.

Lessoni (Avocettinus) BP. = Avocettula
euryptera.

— DEL. dubius, cf. Rev. 1839. 15.

leucocrotaphus SHAW = Basilinna leucotis.

— VIEILL. Eoc. 571. = auritus L. ♀.

leucogaster GM. = Agyrtia.

— TSCHUDI = Lencippus Turneri.

leucophaea REHB. = Amazilia.

leucophrys NORDM. = Phaethornis.

leucopleurus GOULD = Oreotrochilus.

leucopygius SPX. = Florisuga atra.

leucotis VIEILL. = Basilinna.

leucurus L. = Threnetes.

ligoniceus GOULD = Discura.

Lindeni PARZ. = Oxygon.

Lodigesii GOULD = Orthorhynchus
(Cephalepis).

longicaudus GM. = Discura.

longirostris NATT. = Selasphorus (Le-
pidothorax) mesoleucus.

— VIEILL. = Selasphorus (Heli-
mastes).

Longuemarus LESS. = Phaethornis.

Luciani BP. = Eriocnemis (Phemone).

lucidus SHAW = Basilinna leucotis.

— SHAW = Heliodoxa rubinea.

Lucifer SWAINS. = Lucifer cyanopogon.

Ludoviciae BOUAC. MULS. = Helianthea
(Hemistephania).

lugens GOULD = Eriocnemis (Threptia).

lugubris LESS. = Florisuga atra

Lumachellus LESS. = Rhamphomicon
(Chalcostigma).

Lutetiae BOUAC. DEL. = Helianthea.

Lydia REHB. = Coeligena (Thaluranina).

macrourus GM. = Prognornis macroura.

maculatum LESS. = Rhamphodon naevius.

maculatus GM. & VIEILL. AZARA N. =
Anthracothorax (Hypophania).

maculicollis REHB. = Chlorestes (Sma-
ragditis).

- magnificus* VIEILL. = *Bellatrix*.
malaris NORDM. = *Phaëthornis*.
Mango L. = *Anthracothonax*.
maniculata LESS. = *Eriocnemis cupriventris*.
margaritaceus GM. = *Margarochrysis*.
Maria B. = *Chlorestes* (Smaragd.).
marmoratus VIEILL. Enc. 567. AZAAA 298.
Mathewsii BOUAC. = *Heliodoxa*.
Maugei LESS. = *Coelig. Thal. Ourissia*.
Maugeus A. V. = *Coeligena Thaluranica Ourissia*.
Mavors GOULD = *Trochilus*.
maxillosus NORDM. = *Phaëthornis malaris*?
maximus LESKE = *dubius, artefactus*?
maynensis PÖPP. mus. Lips. = *Coeligena* (Leadb.) *Otero*.
Mazzeppa LESS. = *Glaucis*.
melananthera G. = *Steganura*.
melanogaster GOULD = *Oreotrochilus*.
 — LIGHT. = *Coeligena fulgens*.
melanolophus VIEILL. Enc. BP. = *Orthorhynchus* (*Lepidolophia*).
melanotis NORDM. = *Phaëthornis*.
 — SWAINS. = *Basilinna leucotis*.
mellisugus L. = *Agyrtia leucogastra*.
mellivora L. = *Florisuga*.
Meriphila LESS. *dubia*.
mesoleucus TEMM. = *Selasphorus* (*Lepidothorax*).
microrhynchus BOISS. = *Rhamphomicon*.
Milleri LOND. = *Agyrtia*.
minimus L. = *Mellisuga*.
 — SW. = *Mellisuga minima*.
mirabilis LOND. = *Orthorhynchus* (*Mulsantia*).
Mitchelli BOUAC. = *Lucifer* (*Calothorax*).
Mocoa BOUAC. = *Lesbia*.
modestus LIGHT. = *Chlorestes coerulea* fem.
montana LESS. = *Selasphorus platycercus*.
moschitus GM. = *Chrysolampis mosquitos*.
Mosquera BOUAC. DEL. = *Eriocnemis* (*Threptia*).
mosquitos L. = *Chrysolampis*.
Mulsanti BOUAC. = *Lucifer* (*Calothorax*).
multicolor LATH. & LESS. *artefactum*.
mystacinus VIEILL. = *Selasphorus* (*Lepidothorax*) *mesoleucus*.
mystax SPX = *Lophornis chalyha*.
naevius DUM. = *Rhamphodon*.
Nattereri LESS. = *Angastes superbus*.
Neera LESS. rev. *dubia*.
niger L. = *Mellisuga minima*.
 — SWAINS. = *Florisuga atra*.
nigricollis VIEILL. = *Anthracothonax Mango*.
nigriventris BOUAC. MULS. = *Eriocnemis*.
nigrofasciatus G. = *Coeligena* (*Thaluranica*) *nigrofasciata*.
nigrotis LESS. = *Heliothrix aurita*.
nitidissimus LIGHT. = *Chlorestes nitidissima*.
niveiventer GOULD corr. = *Saucerottia*.
niveoventer GOULD = *niveiventer*.
Norrisii BOUAC. = *Amazilia*.
Nuna LESS. = *Lesbia bifurcata*.
obscurus GM. = *Heliodoxa rubinea* juv.
 — GOULD = *Campylopterus*.
 — VIEILL. dor. = *Margarochrysis margaritacea*.
ochropygos NATT. = *Phaëthornis Pretrei*.
Oenone LESS. = *Chrysura*.
opacum TSCHUDI 248. 13. = *Metallura cupreicauda*.
opacus LIGHT. = *Metallura cupreicauda*.
opisthocomus LIGHT. = *Orthorhynchus* (*Cephalopsis*) *Loddigesii*.
D'Orbigny BOUAC. = *Eriocnemis* (*Pheomonoe*).
ornatus GM. = *Lophornis*.
orthura LESS. = *Trochilus*.
Oseryi BOUAC. = *Ametornis*.
Otero TSCHUDI = *Leadbeatera*.
Ourissia GM. = *Coeligena* (*Thaluranica*).
Pamela D'ORB. = *Helianthea* (*Aglaeactis*).
pampa LESS. = *Pampa campyloptera*.
paradisea BOISSON. = *Boissonneaua flavescens*.
paradiseus L. = *Topaza pella*.
parvirostris FAAS. = *Oxygogon Guerinii*.
Parzudakii LESS. = *Rhamphomicon* (*Parzudakia*) *dispar*.
Parzudaki LESS. = *Chlorestes* (*Riccordia*) *Ramondii*.
Paulinae BOISSON. = *Metallura tyrianthina*.
pavoninus = *Phaëthornis*.
pectoralis LATH. = *Anthracothonax* (*Hypophania*) *dominicus* jun.
pegasus = *Chrysolampis mosquitos* jun. et fem.
pella L. = *Topaza*.
peruana GOULD = *Steganura*.
petasophorus M. N.-W. = *Petasophora serrirostris*.
phaeopyos LIGHT. TSCH. = *Chlorestes prasina*.
Phaëton BOUAC. MULS. = *Chlorestes*.
Phaon GOULD = *Sappho*.
Phoebe DELATTRE = *Helianthea*.
Pichincha BOUAC. = *Oreotrochilus*.
pileatus LATH. = *Orthorhynchus exilis*.
pinicola GOULD = *Selasphorus* (*Helio-master*).
platurus LATH. = *Discura*.

platurus M. N. W. = *Discura ligonicauda*.
 platycercus SWAINS. = *Selasphorus*.
 Polytmus L. Gm. = *Polytmus viridans*.
 Poortmanni BOURC. = *Chlorestes*.
 Popelairii DU BUS = *Popelairia tricholopha*.
 porphyrogaster LICHT. = *Helianthea typica*.
 porphyrrus SHAW = *Anthracotheorax (Floresia)*.
 Poucheti LESS. = *Heliethrix auriculata*.
 prasina (*Chlorostilbe*) GOULD = *Chlorestes nitidissima*.
 prasinus LESS. = *Chlorestes*.
 Pretrei DELATTRE = *Phaethornis*.
 Prevosti BOUAC, MULS. = *Anthracotheorax*.
 Prevostii LESS. = *Margarochrysis aurulenta* juv.
 primolinus B. = correct. *primulinus*.
 primulinus (corr.) BOURC. = *Metallura*.
 Provostii = *Prevostii*.
 Prunellii BOURC, MULS. = *Bourcieria (Homophania)*.
 Pucherani BOUAC. = *Chlorestes*.
 puella GOULD = *Coeligena Thalur*.
 punctatus VIEILL. = *Anthracotheorax Mango* juv.
 punctulatus Gm. = *Anthracotheorax Mango* juv.
 puniceus Gm, VIEILL. = *Orthorhynchus pileatus* ?
 purpuratus Gm. est *Cinnyria*.
 purpurissus LICHT. = *Selasphorus platycercus*.
 pygmaeus SPix = *Eremita*.
 — Sws. = *Mellisuga minima*
 pyra GOULD = *Topaza*.
 quadricolor VIEILL. = *Anthracotheorax Mango*.
 — VIEILL. = *Agyrtia (Uranomitra)*.
 radiosus T. = *Sappho sparganura*.
 Ramondii RECHB. = *Chlorestes (Riccordia)*.
 recurvirostris Sw. = *Avocettula*.
 Reginae v. SCHREIBERS = *Bellatrix*.
 Rhami LESS. = *Heliodoxa Lamprolaima*.
 Riccardi (Orthorrh.) RAM., DE LA SAGRA = *Chlorestes (Riccordia) Ramondi*.
 Riccardi D'ORB. idem.
 Riefferi BOURC. = *Amazilia*.
 refulgens GOULD = *Coelig. Thalur*.
 regis v. SCHREIB. = *Calliphlox Angelae*.
 regulus (*Lophornis*) Br. del.
 remigera RECHB. = *Steganura*.
 Rivolii LESS. = *Coeligena fulgens*.
 Robinson LESS. = *Fernandensis*.
 Rosae BOURC. = *Lucifer (Calothorax)*.
 ruber L. = *Selasphorus*.
 rubinea LATH. = *Heliodoxa*.
 rubinoides BOURC. = *Heliodoxa (Phaeolaima)*.

Ruckeri BOURC. = *Threnetes*.
 ruficaligata GOULD = *Steganura Addae*.
 ruficaudatus V. = *Heliodoxa rubinea* juv.
 ruficeps GOULD = *Rhamphomicroo (Chalcostigma)*.
 ruficollis LESS. = *Threnetes leucurus*.
 — SPix = *Rhamphodon naevius*.
 rufigaster VIEILL. LESS. = *Eremita*.
 rufocaligata GOULD corr. = *ruficaligata*.
 rufus Gm. = *Selasphorus*.
 — LESS. = *Platystylopterus*.
 Sabioa BOURC. = *Metallura*.
 sagitta RECHB. = *Coelig. (Leadbeater)*.
 sapphirina LESS. pl. 56. = *Hylocharis*.
 sapphirina LESS. pl. 55 et 57 = *Hylocharis latirostris*.
 sapphirianus Gm. = *Hylocharis*.
 — β. Gm. = *Hylocharis lazula*.
 — AUD. VIEILL. t. 57. = *Hylocharis*.
 — VIEILL. t. 35 et 58 = *Hylocharis latirostris*.
 Sappho LESS. = *Sappho sparganura*.
 Sasia LESS. = *Selasphorus ruber*.
 Saucerottii BOURC. DEL. = *Saucerottia typ.*
 Saul BOURC. = *Lafresnaya*.
 Schimperi SAUC. = *Hylocharis lazula*.
 schreibersi Bp. error. = *Schreibersii*.
 Schreibersii BOURC. = *Heliodoxa (Ionolaima)*.
 scintilla GOULD = *Selasphorus*.
 scutatus NATT. TEMM. = *Angastes superb.*
 sephanoides LESS. = *Eustephanus gale-ritus*.
 serrirostris VIEILL. = *Petasophora*.
 simplex GOULD = *Eriocnemis*.
 — LESS. = *Aphantochroa cirrhochloris*.
 sitkensis RATBE = *Selasphorus ruber*.
 smaragdicaudus G. = *Lesbia Mocoa*.
 smaragdinicollis D'ORB. = *Metallura*.
 smaragdosapphirinus SHAW = *Hylocharis bicolor*.
 Sophiae BOURC. = *Saucerottia*.
 Sparganurus SHAW = *Sappho*.
 spatuligera RECHB. = *Steganura*.
 Spencii BOUAC. = *Trochilus (Diotima)*.
 splendidus VIEILL. = *Hylocharis leucotis* ?
 — VIEILL. = *rubineus* ?
 aqualidus NATT. = *Phaethornis*.
 aquamosus LICHT. = *Rhamph. naevius*.
 — TEMM. = *Selasphorus (Lepidothorax) mesoleucus*.
 Stanleyi BOURC. = *Rhamphomicroon (Chalcostigma)*.
 stellatus (*Polytmus*) Bp. delatur.
 Stokesi KING = *Thaumaste*.
 striatus Gm. = *Margarochrysis margaritacea* fem.
 strophianus GLD. = *Trochil. (Anactoria)*.

- strumaria LESS. = *Bellatrix magnifica*.
 superbus SHAW = *Selasphorus* (*Heliomaster*) *longirostris*.
 — VIEILL. = *Augastes*.
 superciliosus L. = *Phaethornis*.
 — AUD. VIEILL. ♀ pl. 28 et LESS. Col. pl. 7. JARD. II. pl. 27. = *Glaucis Ruckeri*.
 surinamensis BRISS. = *Threnet. leucurus*.
 — STEPH. = *Florisuga mellivora*.
 Swainsonii LESS. ♂ = *Chlorestes* (*Riccordia*) *elegans*.
 — LESS. ♀ *Trochil.* pl. 65. = *Calliphlox henicura* fem.
 sylphia LESS. = *Lesbia Gouldii*.
 syrmatophorus GOULD = *Phaethornis*,
 tabagensis LATH. = *Coeligena Thalur. Ourissia*.
 Temminckii BOISSON. = *Pterophanes*.
 — LESS. = *Selasphorus* (*Lepidothorax*) *mesolencus*.
 Tendali TSCH. = *Lucifer* (*Calothorax*).
 Thalia GOULD = *Agyrtia*.
 thalassinus JARD. = *Petasophora Anais*.
 thalassinus SWAINS. = *Petasophora* (*Praxilla*) *thalassina*.
 Thanmantias L. = *Agyrtia*.
 Tobaci GM. = *Coelig. Thal. Ourissia*.
 tobagensis LATH. = *Coeligena* (*Thaluranian*) *ourissia*.
 Tomineo LINN. = *Troch. Colubris* fem.
 torquata BOISSON. = *Bourcieria*.
 tricholopha RECH. = *Popelairia*.
 tricolor LESS. = *Selasphorus platycercus*.
 tristis LESS. = *Patagona gigas*.
 Turneri BOURC. = *Leucippus* BP.
 typica BP. = *Coeligena*.
 — BP. = *Helianthera*.
 — BP. = *Saucerottia*.
 tyrianthinus LODD. = *Metallura*.
 Underwoodii GOULD = *Steganura spatuligera*.
 — LESS. = *Steganura*.
 uropygialis FRAS. = *Eriocnemis vestita*.
 varins GM. = *Certhiina dubia*.
 ventillabrum LATH. = *Steganura Underwoodii*.
 venusta G. = *Coeligena* (*Thaluranian*).
 venustissimus GM. = *Certhiina mex. dubia*.
 veraguensis GOULD = *Anthracothonax* (*Sericotes*).
 Verreauxii BOURC. = *Lophornis*.
 versicolor OLFERS LICHT. = *Agyrtia*.
 — VIEILL. = *Orthorhynchus* (*Cephalepis*) *Lalandii*.
 verticalis LICHT. = *Agyrtia* (*Uranomitra*) *quadricolor*.
 verticeps G. = *Chlorestes* (*Riccordia*).
 Vesper LESS. = *Calliphlox* (*Rhodopsis*) *Vespera*.
 vestiniga VERR. mus. dubia.
 vestita ♀. LONGUEM. = *Eriocnemis cinpreiventris*.
 — LONGUEM. LESS. = *Eriocnemis*.
 Victoriae BOURC. MULS. = *Lesbia*.
 Vicilloti LESS. = *Lophornis chalybea*.
 — SHAW = *Mellisuga minima*.
 — STEPH. = *Petasophora serrirostris*.
 Villavisencio BOURC. = *Selasphorus* (*Heliomaster*).
 viola GOULD = *Rhamphomicron* (*Parzndakia*).
 violaceus GM. = *Topaza pella*.
 — L. = *Eulampis jugularis*.
 violicauda BODD. = *Anthracothon. Mango*.
 violifer GOULD = *Helianthera*.
 violifrons = *Helianthera* (*Hemistephania*) *Johannae*.
 virescens DUM. = *Leucippus chrysobranchos*.
 viridicaudus SAUC. LESS. = *Chlorestes* (*Smaragdites*) *viridissima*.
 viridiyáarpa BOURC. corr. *viridiventris*.
 viridipallens BOURC. = *Agyrtia*.
 viridipectus GOULD = *Coelig.* (*Thalur.*).
 — SAUC. = *Saucerottia*.
 viridis AUD. VIEILL. pl. 15. = *Agyrtia* (*Chal.*)
 — LESS. pl. 33. = *Chlorestes* (*Smaragdites*) *viridissima*.
 — AUD. VIEILL. t. 41. = *Leucippus chrysobranchos*.
 viridissima LESS. Ois. m. pl. 75. = *Agyrtia albiiventris*.
 viridissimus GM. = *Chlorestes* (*Smaragdites*).
 viridiventris RECH. = *Saucerottia*.
 Vulcani GOULD = *Rhamphomicron* (*Chalcostigma*).
 vulgaris M. N.-W. hucusque dubius.
 Wageri LESS. = *Coeligena* (*Thalur.*).
 Warszewitzii RECH. = *Coelig.* (*Leadb.*).
 Watertoni BOURC. = *Coelig.* (*Thalur.*).
 Wiedii LESS. = *Chlorestes* (*cyanogenys*).
 Williams BOURC. DEL. *Metallura*.
 Wilsoni BOURC. DEL. = *Bourcieria* (*Lampropygia*).
 Yarrellii BOURC. = *Lucifer* (*Calothorax*).
 Yaruqui BOURC. = *Phaethornis*.
 Zemes LESS. = *Tilmatura lepida*.

Neue Arten.

Coeligena Warszewizii Rehb. Zimmetfarbig, Stirn und Scheitel goldgrün, gegen das schwarze Hinterhaupt hin rein goldfarbig, Schwingen spitzwärts dunkelbraun; Kehle smaragdgrün, Unterhals grün goldglänzend. — Länge 186 Mill., Schnabelfirste 26 Mill., -spalte 34 Mill., Fittig 80 Mill., Schwanz 55 Mill. — Auffallend bei dieser Färbung durch den ganz flach gedrückten Scheitel und das in die Schnabelwurzel verdünnte Gesicht, in allen Verhältnissen in die Gruppe *Leadbeatera* gehörig und der *L. jacula* und *Jamersonii* zunächst stehend. — Nord-Peru: v. Warszewiz.

Die deutschen Botaniker haben bei der Benennung mehrerer der schönsten vom Herrn v. Warszewiz entdeckten Gewächse durch deren Widmung an seinen Namen ihm ihre dankbare Anerkennung bewiesen und es bleibt nur noch die Pflicht der deutschen Zoologen, auch in ihrer Nomenclatur das Andenken an diesen kühnen und glücklichen Reisenden ebenfalls zu bewahren. Ich habe diese wahrscheinlich schönste von ihm entdeckte Art, von welcher bis jetzt noch kein Name und keine Abbildung oder Beschreibung bekannt ist, in meinem Werke mit dem Namen des liebenswürdigen Mannes bezeichnet, dessen unermüdetem Eifer die Zoologie und Botanik so reichlichen Zuwachs verdankt.

Coeligena sagitta Rehb. Stirn smaragdgrün glänzend, Scheitel länglich umschrieben azurblau, Halsrücken und Halsseiten grünkupferglänzend, Rücken, Bürzel und Mittelschwanzfedern olivengrün erzglänzend, Kehle rostfarbig, Unterkehle, Brust und Bauchfedern smaragdgrün gefleckt, rostbraun gesäumt, Schienendecken weißflaumig, Aftersdecken olivengrün, weißbefranst, Schwingen und Seitenschwanzfedern schwarzvioletbraun. — Länge 130 Mill., Schnabelfirste 24 Mill., -spalte 27 Mill., Fittig 74 Mill., Aufsenschwanzfedern 52 Mill. Jüngerer Vogel: Oberkopf ohne smaragdgrüne Stirn und azurblauen Scheitel, einfach dunkelgrün und kupferglänzend. — Weibchen: kleiner, oberseits wie das jüngere Männchen, unten weißlichrostfarbig, grüngefleckt, Schwanzfedern am Ende weißlich gesäumt. Länge 113 Mill., Schwanz 43 Mill.

Auch diese Art steht der *Leadbeatera jacula* Gould nahe, ihr Scheitel ist eben so flach wie bei voriger Art, also noch mehr als bei *jacula* und viel mehr als bei *Otero* niedergedrückt und das Gesicht ebenso wie bei der vorigen in die Schnabelwurzel verdünnt. Außerdem kommt der Habitus ganz überein. — Nord-Peru: v. Warszewiz.

Chlorestes maculicollis Rehb. Grünglänzend, Kehle und Gurgelgegend weissgefleckt, Schwingen dunkelbraun. — Weibchen wie Männchen, aber die äußersten Schwanzfedern am Ende mit weißem Fleck. — Länge 73 Mill., Schnabelfirste 15 Mill., -spalte 18 Mill., Fittig 58 Mill., Schwanz 24 Mill. — Gehört in die Gruppe *Smaragdites* Boie, d. h. von *viridissima*, welche durch metallgrünen Schwanz charakterisirt ist, und steht wie folgende, *Chl. Esmeralda* zunächst. Santa Fé de Bog.

Chlorestes Euchloris Rehb. Grünglänzend, fast sammetartig, Schienbeindecken weißflaumig, Schnabel schwarz, ziemlich halb so lang als Fittig. — Länge 78 Mill., Schnabelfirste 19 Mill., -spalte 22 Mill., -breite fast 3 Mill., -höhe 2 Mill., Fittig 46 Mill., Schwanz 12 Mill. — Nord-Peru: v. Warszewiz.

Lesbia Gorgo Rehb. ist die der *L. forficata* so ähnliche Art, welche in beiden Geschlechtern nicht das dunkle und intensive Azurblau auf den Schwanzfedern zeigt, welches jener so eigenthümlich ist, sondern aus dem Blau überwiegend in Smaragdgrün spielt und deren Weibchen an der Spitze der Aufsenschwanzfedern einen mehr ausgedehnten weissen Fleck trägt. — Neu-Granada. — Gorgo war bekanntlich Dichterin, eine Nebenbuhlerin der Sappho.

Steganura spatuligera ist die *Unterwoodii* Gould, nicht Lesson's. Letzterer nannte nämlich eine dunkelschwarzgrüne Art aus Brasilien, deren Spateln lanzettlich und noch schmäler sind als die von *platura*, ferner mit sparsamem kurzem, graulichweissem Flaum an den Beinen und mit weisser Binde über den Bürzel: *Ornismya Unterwoodii*. Gould giebt unter diesem Namen den ganz hell goldgrünen Vogel aus Santa Fé de Bogota, welcher keine Spur von Bürzelbinde, dagegen dicke weisse Muffe an den Beinen hat und große breite, ovale Spateln an den Schwanzfedern trägt. Ist Leadbeater's Vogel verloren gegangen oder hat sich gar späterhin diese Art dafür in seiner Sammlung befunden, so kann doch der Name von jenem nicht auf diese ganz verschiedene Art übertragen werden. Sollte aber Mr. Unterwood's Abbildung lingirt sein, so würde es nothwendig, den Namen ganz zu verlassen.

Steganura remigera ist die ähnliche Art aus Nord-Peru, mit Spateln, welche nicht oval, sondern am Ende querabgestutzt sind und deren Schaft etwas breiter ist als bei jener, bevor er in die Spateln eintritt.

Amazilia leucophoea: Oberschnabel roth, Unterschnabel gelblich, beide schwarzgespitzt; Oberkopf grünschimmernd, Halsrücken, Rücken und Schulterdecken lebhafter erzgrünläuzend, Bürzel und Schwanz zimtbraun, Unterbrust und Bauchseiten rostfahl; Schwingen erdbraun, mattschimmernd; Unterseite und Unterschwanzdecken fahlweiss, Kehle und Halsseiten mit großen rundlichen, goldgrün glänzenden Flecken; Beine schwarzbraun. — Länge 57 Mill., Schnabellänge 18 Mill., -spalte 23 Mill., Fittig 65 Mill., Schwanz 36 Mill. — Weibchen: Oberkopf erdbrunn, fast ohne allen Schimmer, Hinterrücken und Bürzel fahlbraun, Schwanzfedern zimtfarbig, spitzwärts ringsum am Rande erzgrün schimmernd, Unterbrust kaum rostfarbig angeflogen, größtentheils weiss. — Länge 90 Mill., Schnabellänge 17 Mill., -spalte 20 Mill., Fittig 55 Mill., Schwanz 34 Mill. Sehr ähnlich der *A. Dumerilii*, aber kleiner, und *A. Amazilicula* Sav., vorzüglich letzterer, auch von derselben Gröfse, aber durch die Farbe des bei dieser erzgrünlichen Schwanzes neben den übrigen Abweichungen leicht unterscheidbar. — Süd-Peru, Vulkan Arequipa: v. Warszewicz.

Das K. Naturalien-Cabinet in Dresden besitzt eine große Anzahl richtig bestimmter Arten zum Abgeben und ist gern erbötig, Freunden dieser angenehmen Gruppe durch Austausch derselben gefällig zu werden, wenn dieselben ein Verzeichniß der Arten, die sie besitzen, nebst Angabe des geographischen Ursprungs und der Zahl der abgebbaren Exemplare einsenden wollen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [1_1853](#)

Autor(en)/Author(s): Reichenbach Ludwig

Artikel/Article: [Aufzählung der Colibris oder Trochilideen in ihrer wahren Verwandtschaft, nebst Schlüssel ihrer Synonymik 1-24](#)