

JOURNAL  
für  
**ORNITHOLOGIE.**  
**Erster Jahrgang.**

Nº 6.

November.

1853.

**Versuch einer synoptischen Ornithologie Westafrica's.**

Von

**Dr. G. Hartlaub.**

Grössere Sendungen präparirter Vogelbälge, welche von verschiedenen Punkten der Westküste Africa's, namentlich aber von Bathurst am Gambia, durch Handelsverbindungen nach Bremen und in unsere Hände gelangten, erweckten zuerst ein specielles Interesse für die Ornithologie dieser Gegenden, und wurden allmählich Veranlassung zu weiteren Studien und Arbeiten über dieselbe. Später vereinigte sich Manches, um diesen Arbeiten neuen Reiz zu verleihen, zur Wiederaufnahme derselben in grösserem Umfange aufzufordern, und schliesslich auch die Veröffentlichung eines Theils derselben in gedrängter Form als wünschenswerth herauszustellen.

Unter dem Titel, „Beitrag zur Ornithologie Westafrica's,“ erschien zuerst i. J. 1850, in dem „Verzeichnisse der öffentlichen und Privatvorlesungen, welche am Hamburgischen akademischen Gymnasium u. s. w. gehalten werden, herausgegeben von Prof. Wiebel“, und später mit colorirten Abbildungen in der zweiten Abtheilung des zweiten Bandes der „Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, herausgegeben von dem naturwissenschaftlichen Vereine zu Hamburg,“ auf Seite 1 — 56 ein Namensverzeichniß sämmtlicher Vogelarten, welche uns damals als Bewohner der westafricanischen Küstengegenden vom Senegal abwärts bis Benguela bekannt geworden waren, mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verbreitung und der Synonymie. Die nächste Veranlassung dazu waren die reichen und interessanten Sammlungen, welche der Reisende Carl Weiss auf den Inseln St. Thomé und do Principe, so wie an verschiedenen Localitäten der Goldküste, zusammengebracht und an das Museum seiner Vaterstadt Hamburg eingeschickt hatte.

Die nachfolgende Arbeit bringt nun zahlreiche Verbesserungen, Berichtigungen und Zusätze zu jenen früheren; und sie unterscheidet

sich überdiess von denselben durch beigefügte kurze Beschreibung des ausgefärbten männlichen Vogels jeder Art. Der synonymische Theil wird nur das Wichtigere und weniger Bekannte geben. In Bezug auf die Fundorte und geographische Verbreitung wünscht Verf. den ganzen Umfang unserer Kenntnisse beizubringen. Sehr viele der Beschreibungen sind nach Originalexemplaren der Bremer und anderer Sammlungen entworfen; bei den übrigen ist Verf. wenigstens nicht unkritisch zu compiliren bemüht gewesen.

Einer besonderen Erwähnung bedarf noch das literarische Material. Es mag als bekannt vorausgesetzt werden, dass die Werke Brisson's, Latham's, Vieillot's, Temminck's, Levaillant's, Lichtenstein's und Swainson's wesentlich zur Vermehrung unserer Kenntnisse von den Vögeln Westafrica's beigetragen haben, freilieb in sehr ungleichem Maasse. Das zweibändige Werken des letzteren, „The Birds of Western Africa,“ ist an Umfang und Gehalt die wichtigste Arbeit unter allen, deren hier zu gedenken wäre. Es behandelt 150 Vogelarten: und zwar in jener anziehenden und geistvollen Art und Weise, wie man sie an sämmtlichen Schriften Swainson's nicht anders kennt. Zum Grunde liegen hier die, im Gambiagebiete veranstalteten Sammlungen des englischen Gouverneurs L. G. Kendall.

Im Uebrigen wurden bei nachstehender Aufzählung verglichen und benutzt:

1. Für Westafrica ausschliesslich:

1. K. Tuekey: Narrative of an Expedition to explore the river Zaire. London 1818, 1 Vol. 4to. Zool. Appendix by John Cranch p. 407. (Congo.)
2. E. Bowditch: Excursions in Madeira and Porto Santo etc. 1 Vol. 4to. London 1825. (Gambia.)
3. Al. v. Nordmann: Verzeichniss von Thieren und Pflanzen, welche auf einer Reise um die Erde gesammelt wurden von Ad. Erman. Vögel. (Senegal und Ilha do Principe.)
4. L. Fraser: Zoologia typica, etc. 1 Vol. 4to. London 1845. (Abbild. der in den Proceed. of the Zool. Society beschriebenen Vögel der Niger-Expedition.)
5. W. Allen und T. R. H. Thomson: A Narrative of the Expedition sent by H. M. Government to the river Niger; 2 Vol. 8vo. London 1848, mit zoolog. Anhange von Dr. Thomson.
6. Sir W. Jardine: Ueber 16 Vögelarten aus der Gegend des Old Calabar und Bonny-river. Ann. and Mag., Vol. 18, p. 85.
7. C. A. Gordon: Notes on the Habits of some Birds collected on the Coast of Western Africa, (Cap Coast) in Jard. Contribut. to Ornith. 1849, p. . . . ?
8. J. et E. Verreaux: Descriptions d'espèces nouvelles, rares ou peu connues d'oiseaux du Gabon; Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 257.
9. H. E. Strickland: Notes on some Birds from the river Gaboon in West Africa. Jard. Contribut. to Ornithol. 1850, p. 131 und 161.
10. Sir W. Jardine: Birds of Western Africa. Collections of L. Fraser: Contrib. 1850, p. 151 und 1852, p. 57.

C. Sundevall: Foglar från Sierra Leone. Öfversigt af Kongl. Vetensk. Acad. Förhandlingar för 1849. (Afzelius.)

2) Für Central- und Nordost-Africa.

ausser den Werken Rüppell's, Ehrenberg's, den älteren Reise-  
werken Salt's, Denham's und Clapperton's u. s. w.:

C. Sundevall: Foglar från Nordöstra Africa. Öfvers. af Kongl. Vet. Acad. Förh 1850, S. 126. (Hedenborg.)

H. E. Strickland: List of Birds procured in Kordofan by Mr. T. Petherick, with notes etc. Ann. and Mag., n. s., Vol. 9, p. 342.

P. L. Sclater: List of a collection of Birds made by James Daubeny Esq. on the coasts of the Red Sea in 1851. Contrib. to Ornith. 1852, p. 123.

Th. Le Févre: Voyage en Abyssinie; Oiseaux par O. Des Murs et Fl. Prevost.

Galinier et Ferret Voyage en Abyssinie; Oiseaux par Guérin-Méneville (Rev. zool.)

Dr. R. Vierthaler: Ornithologischer Tagebuchsbericht von einer Reise auf dem blauen Nil von Chartum durch Sennar nach Rosscires. Naumannia II, S. 28—58.

J. J. Bianconi: Specimina zoologica Mosambicana, quibus vel novae vel minus notae animalium species illustrantur. Bologna 1850. Bis jetzt 5 Hefte.

3) Für Südafrica,

ausser den bekannten älteren Werken Levaillant's, Burchell's u. s. w.:

A. Smith: Report of an Expedition to explore the Interior of Africa. Eine Broschüre von 56 Seiten; 1837.

A. Smith: Illustrations of the Zoology of South-Africa etc. 27 Hefte. Lichtenstein: Verzeichniss einer Sammlung von Säugetieren und Vögeln aus dem Kafferlande. Berlin 1842.

J. E. Alexander: An Expedition of discovery into the Interior of South-Africa; 2 Vol. 8vo., mit zool. Appendix auf S. 259 des zweiten Bandes.

A. Delagorgue: Voyage dans l'Afrique australe; 2 Voll. 8vo. Paris 1847.

C. Sundevall: Foglar från Södra Africa. Öfvers. Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 1850, S. 96. (Wahlberg.)

H. E. Strickland and P. L. Sclater: List of a collection of Birds procured by Mr. C. T. Anderson in the Damara-country in Western Africa. Contrib. to Ornith. 1852, p. 141.

Zahlreiche kleinere Beiträge, Beschreibungen neuer Arten. Nachweisungen über Herkunft und geographische Verbreitung anderer u. s. w. enthalten: Die Proceedings und Transactions der Academic von Philadelphia, der Zoological Society of London; die Revue und das Magasin de Zoologie; Gray's Zoological Miscellanies; die Annals and Magazine of Natural History; Sir W. Jardine's Contributions to Ornithology; die von Gray und Cassin herausgegebenen Cataloge der ornithologischen Sammlungen des britischen Museum's und der academischen

zu Philadelphia; das South African Quarterly Journal und manche andere, ihres Orts zu erwähnende Werke und Zeitschriften.

Gern hätten wir für diese Arbeit die überaus reichen und des Neuen viel enthaltenden Sammlungen untersucht, welche der holländische Reisende Pel an der Goldküste zwischen Cap Tres Puntas und Acrah gesammelt und dem Leidener Museum eingesandt hat. Leider wurde unserer Bitte um eine discrete Benutzung derselben keine Gewähr zu Theil. Einige dieser neuen Arten sind übrigens im Bonaparte's „Conspectus generum avium“ kurz beschrieben.

Herzlichen Dank schliesslich den Freunden Cabanis, Cassin, Strickland und Anderen für so manche wertvolle Auskunft und Mittheilung.

Anmerk. Das am Schlusse der Angaben über die Herkunft mancher Art beigelegte „M“ bedeutet das Vorkommen derselben in Südafrika, ein „O“ dagegen das in Ost- oder Nordostafrika.

## I. ACCIPITRES.

### a. VULTURIDAE.

#### **Neophron** Sav.

1. *pileatus*, (Burch.) Nigricante fuscus; pileo, capitis lateribus gulaque nudis; nucha, collo postico juguloque lanagine pallide fuscescente obtectis; tibiis albido lanuginosis; pedibus pallide virescentibus. Long. 26".

Syn. *Vultur pileatus*, Burch. Trav. II, p. 195. — *Cathartes monachus*, Temm. Pl. col. 222. — *N. niger* Less. Tr., p. 29. — *N. carunculatus*, Smith Afr. Zool., p. 141. — Vierthaler, Naum. II, 1, S. 46.

Hab. Senegal: Less. — Westafr. Catal. Brit. Mus. p. 8. — Ashantee: Cat. Vultur. Mus. Philad. — Cap Coast: Fraser Proc. 1843, p. 51. — M. O.

Sehr gemein an der Goldküste.

#### **Gypohierax** Rüpp.

2. *angolensis* (Gm.) Albus; regione ophthalmica nuda rubida; dorso aliquis brunneo-nigris; cauda nigra, apice alba; pedibus carneis. Inv.: Brunnens, subtus pallidior. Long. circa 20".

Syn. *Falco angolensis*, Gm. L. I, p. 252. — *Polyborus hypoleucus* Benn. Gard. Men. Zool. Soc. II, p. 303. — *Gypoh. angol.* Rüpp. Nene Wirbelth. Vög., S. 45. — *Haliaëtos angol.* Schlegel, Naum. II, 2, p. 24. — Jard. Selb. Illustr. n. s. pl. 13. — Gray Gen. of Birds t. 4, fig. opt.

Hab. Congo: Catal. Brit. Mus. p. 8. — Fernando Po: Fras. Proc. 1843, p. 51. — Rio de Bountry, Guinea: Catal. Vult. Mus. Phil. — Mus. Lugd. — Gambia: Bowd. Excurs. p. 224. (*Aquila*.)

Wir sahen diesen Vogel lebend im zoologischen Garten zu Antwerpen. Er bewohnt, den Nachrichten des holländischen Reisenden Pel zufolge, in Guinea die Ufer der Flüsse. Seine äussere Erscheinung ist durchaus geierartig.

### b. FALCONIDAE.

#### **Polyboroides** Smith.

3. *radiatus* (Scop.) Cinereus, abdomine albo, nigro fasciolato; remig. prim. nigris, sec. cinereis, macula anteapicali nigra notatis; cauda

longa nigra, vitta mediana latissima alba, nigro variegata, apice alba; pedibus flavidis. Foem. Fusca, subtus nigro-maculata. Long. 24 — 26".

Syn. Autour gris à ventre rayé, Sonner. Voy. Ind. IV, p. 153, pl. 103. — *Falco madagascariensis* Daud. — *F. gymnogenys* Temm. Pl. col. 307. — *P. typicus*, Sm. S. Afr. Quart. J. I, p. 107. — Id. S. Afr. Zool. Illustr. t. 81, 82. — *Gymnogenys mad.* Less. Tr. p. 64. — Kaup. Monogr. Isis 1847, S. 261.

Hab. Gambia: Mus. Brem. — Goldküste: A. Smith. — Sennaar: Vierthal. Naum. II, I, S. 47. — A. Brehm in litt. — Kordofan: Strickl. Ann. and Mag. 1852, p. 343. — Schoa: Rüpp. — O. M.

In der sehr reichen ornithologischen Sammlung zu Brüssel steht ein schönes männliches Exemplar dieser Art von Dabocrom in Guineea.

#### **Aquila** Br.

4. *naevioïdes* (Cuv.) Pallide albido-fulvescens; remig. secund. cum tectoribus fuscis; alis obsolete pallide bifasciatis; cauda supra cinereo-brunnecente, apice obsolete fulvescente. Fem. obscure rufa, rem. sec. caudaque obscure cinerasc., irregulariter nigro-fasciatis. Long. circa 28". (Intermedia inter *Aq. naeviam* et *imperiale*.)

Syn. *Falco naevioïdes*, Cuv. Régne An. I, ed. sec., pag. 326. — *F. senegalus*, Cuv. ib. (ad.) — *Aq. albicans*, Rüpp. Neue Wirb. t. 13. — Kaup. Isis 1847, p. 247. — Pucher. Rev. et Mag. II, p. 4. — *F. Belisarius*, Levaill. Exp. Algér., Ois. pl. 2.

Hab. Senegal: Mus. Paris. — S. O.

Die südafricanische *rapax* scheint speciisch verschieden zu sein.\*)

5. *Bonellii* (Temm.) Supra brunnea, subtus dilute ferruginea, striis nigricantibus; cauda rufescente, fascia apicali brunnea; cera et pedibus flavis. Long. 24".

Syn. *Falco Bonellii* Temm. Man. III, p. 19. — *Aquila fasciata* Vieill. — Naum. XIII. t. 341, ♂ ad. et juv. p. 33. — Bonap. Conspl. p. 14.

Hab. Senegal: Zool. Garten in Antwerpen. — S. O.

6. *pennata* (Gm.) Fusca; fronte albido; pileo et nucha fulvo-rufescens; brunneo maculatis; plumis nonnullis niveis ad insert. alae; cauda supra tota fusca; subtus alba, fuscō striata; cera et pedibus flavis. Jun. subtus rufescens, nigro-striata. Long. 17 — 18".

Syn. *Falco pennatus* Gm. Syst. I, p. 272. — Temm. Man. I, p. 44. — Kaup. Isis, p. 244. — Naum. XIII. t. 343. ♂♂.

Hab. Senegal: Mus. Berol. — Marocco: Kjärb. — S. O. (Kordofan: Petherick.)

#### **Circætus** Vieill.

7. *gallicus* (Gm.) Supra dilute brunnens, fronte et periophthalmiis albi-

\*) Der nordost-afrikanische, gewöhnlich (auch in seinen neueren Schriften selbst von Rüppell) mit dem süd-afrikanischen *rapax* Temm. identifizierte Vogel bildet eine bestimmt verschiedene Art. Ich habe mich seit längerer Zeit hiervon überzeugt, und hoffe, später eine kritische Sichtung der einschläglichen Synonymie zu geben. Zu welcher der beiden Arten der Vogel vom Senegal gehört, bleibt mir für jetzt leider noch zweifelhaft; da ich dergleichen westliche Vögel aus eigener Anschauung nicht kenne.

dis; gula pectoreque dilute brunneis plumis scapis nigris; corporis inferioris reliqui plumis albis, brunneo fasciatis; cauda subtus alba, supra brunnea, fasciis transversis tribus, apice pallida. Long. 24".  
Hab. Senegal: Cat. Birds Brit. Mus. pag. 17. — S.

*S. cinereus* (Vieill.) Fuliginoso-rufescens; cauda subfureata, supra brunnea, subtus albescente; cera pedibusque flavis. Long. 22".

Syn. Vieill. Gal. Ois. pl. 12. — Less. Tr. p. 46. — Smith Afr. Zool. p. 147. — *C. funereus*, Rüpp. Neue Wirbelth. T. 14.

Hab. Senegal: Mus. Par. — O.

### **Spizaëtos** Vieill.

*9. bellicosus*. (Daud.) Maximus, pedibus robustissimis. Capite colloque fuscescentibus; subtus albus, macula plumarum anteapicali rotundata nigra; alis obscure cinerascentibus, nigro fasciatis; cauda supra ardesiaca, fasciis 5—6 angustis irregul. nigris, apicali latiore. Long. 33", cap. c. rostro 123 Mm.

Syn. Le Griffard, Vaill. Afr. pl. I. — *F. armiger* Sh. — *Aquila bellicosa* Smith, Afr. Zool. p. 144. — Id. Illustr. S. Afr. Zool. pl. 42. — Kaup Isis, S. 167.

Hab. Sierra Leone: A. Smith. — M.

*10. coronatus* (Lin.) Albus; tibiis crissique plumis lateralibus nigro fasciatis; alis dorsoque brunneo-cinerascentibus, plumis albido marginatis; remig. sec. cinereis, nigro fasciatis alboque limbatis; cauda supra basi nigra, medio dorso concolor, fasciis 2 nigris tertiaque apicali latiore albomarginata. Long. circa 32", cap. c. rostr. 106 Mm.

Syn. Crowued Eagle Edw 224. — *Aquila afric. cristata* Briss. I, 448. — Levail. Afr. t. 3. — Smith Afr. Zool. p. 145. — Id. Illustr. S. Afr. Z. pl. 40, 41. — Kaup, l. c. p. 167.

Hab. Guinea: Barbot etc. — Gambia: Bowd. Excurs. p. 224. (*Harpyja*)

*11. occipitalis* (Daud.) Fusco-niger; plumis nuchae valde elongatis, basi albis; remigibus basi niveis; flexura alae alba; cauda basi alba, apice nigra, medio ardesiaca, irregul. fusco trifasciata. Long. 25 — 26".

Syn. Le Huppard, Vaill. Afr. t. 2. — Daud. II, p. 40. — *Falco senegalensis*, Daud. — Smith. Afr. Zool. p. 148. — Id. S. Afr. Q. T. I, p. 115. — *Lophaëtos occip.* Kaup, l. c. p. 165. — *Morphnus occip.* Cuv.

Hab. Senegal: auct. — Gambia: Bowditch Excurs. p. 224. — O. M.

### **Astur** Lac.

*12. gabar* (Daud.) Dilute cinereus, subtus pallidior; abdomine albo, cinerascente fasciolato; cauda fasciis 3—4 transv. nigricantibus, telectricibus super. et infer. albis; pedibus et rostro basi rubris. Juv. Ferrugineo fuscumque varius. Long. 12".

Syn. Le Gabar, Levaill. Afr. pl. 33. — Temm. Pl. col. 122, 140. — *Accipiter erythrorhynchus* Sw. West. Afr. I, p. 121. — *Sparvius leucorrhous* Vieill. Eucycl., p. 1269. — *Microtus gabar*, Gray. — Kaup, Isis 1847, p. 188. — Sundev. Oefvers. K. V. Ac. Förh. 1850, p. 132. (Var. *niloticus* ex Seunear.)

Hab. Senegambia: Gray List Specim. Br. Mus., p. 76. Swains. Vieill.

Damara-Gegend: Andersson. — M. O. (Kordofan: Petherick.)

13. *niger* (Vieill.) Niger, colli postici nuchaeque plumis basi albis; cauda fasciis 3 interruptis albidis; remigibus primariis albo-cinerascenscentibus, nigro nonnihil variegatis; cera et pedibus aurantiis. Long. 10 — 12".

Syn. *Sparrius niger* Vieill., Encycl. p. 1269. — *Accipiter niger*, Gould Syn. Birds of Aust III, pl. 1. — *gabar* var. Kaup, Gray etc. — *Micronisus niger*, Bonap. Conspl. p. 33. — *F. carbonarius* Licht.

Hab. Senegal: Mus. Paris. — Mus. Berlin. Damara - Gegend: Andersson. Strickl. Contrib. 1852, p. 142. — M. O. Kordofan: Petherick.

14. *monogrammicus* (Temm.) Cinercus; mento gulaque albis, stria mediana nigra; abdomine albo, cinerascente fasciolato; cauda nigra, fascia basali alteraque apicem versus albis; pedibus flavis; cera aurantiaca. Long. 13 — 14".

Syn. Temm. Pl. col. 314. — Swains. Birds West Afr. I, p. 114, t. 4. — Kaup; Isis 1847, p. 189. — *Micronisus monogr.* Gray. — Red-nosed Falcon Lath. Gen. Hist. I, p. 200.

Hab. Senegambia. Von Bathurst in der Bremer Sammlung. — O. Vom oberen weissen Nil: Brun-Rollet (Desfilippi, Rev. zool. XVI. p. 289.)

15. *sphenurus* (Rüpp.) Cinereus, gula albida, stria mediana obsolete fuscescente; subtus albidus, fasciulis numerosis ferragineis ornatus; subcaudalibus albis; cauda 6 — 8 fasciata; ala intus isabellina. Long. 11½"

Syn. Rüpp. Neue Wirbelth., Vög. S. 42. — Id. Syst. Uebers. Vög. N. O. Afr., S. 6, T. 2. — *Accip. brachydactylus* Sw. West. Afr. I, p. 118. — Kaup, Isis 1847, S. 489. — *Astur Rüppellii* K. — Strickl. Ann. Mag. 1852, p. 343. (Deser. juv. ex Kordofan). — Sudev. Oefvers. 1850, p. 132.

Hab. Gambia: Mus. Brem., Swains. — O. M.?

16. *musicus* (Dand.) Dilute ciuereus, genis et humeris saturatius linctis; abdomine albido, graciliter ciuereo fasciolato; cauda nigra, basi marginaeque apicali albis; rectricibus lateral. fasciis nonnullis albis latioribus; ala albido ciuereoque gracillime fasciolata. Long. 20".

Syn. Faucon chanteur Levaill. Afr., pl. 27. — *Falco canorus* Thunb. 1799. — *Nisus canorus* Less. Tr. p. 62. — Smith S. Afr. Q. Journal, I, p. 119. — Id. Afr. Zool. p. 152. — Denh. Clapp. Voy. p. 195. — Kaup, Isis 1847, p. 192: *A. cantans*. — *Melierax musicus* Gray, Bonap.

Hab. Gambia: List. Specim. Birds Br. Mus. pag. 77. — M.

#### **Pernis** Cuv.

17. *apivorus* (Lin.) Supra brunneo-cinerascens; sincipite et regione parotica ciuereis; subtus albidus, maculis lateralibus fuscis; remig. secund. fuscō ciuereoque fasciatiss.; cauda fuscō trifasciata. Long. 24".

Syn. *Accipiter lacertarius* Pall.

Hab. Goldküste: Mus. Lugd., Schleg. F. Japon., Vög. p. 24. — Marocco etc. S.

#### **Aviceda** Sw.

18. *cuculoides* Sw. Supra obscurē ciuereis, dorso medio et scapularibus fuscis; gula pectoraque dilute ciuereis; abdomine fulves-

cente albido, fasciis transv. latoribus fuscis; crasso et subcaudalibus fulvis, immaculatis; cauda aequali cinerea, fascia apicali nigra; subalaribus ferrugineis. Long. 16".

Syn. Swains. West. Afr. I, p. 104, pl. 1. — Sundev. Oefvers. 1850, p. 110.

Hab. Senegambia: Sw.

#### **Milvus** Cuv.

19. *parasitus* (Daud.) Rufo-brunneus; capite, collo et corpore subtus striis scapalibus longis angustis nigris notatis; dorso et alis obscure fuscis; remig. nigris; cauda nigro-fusca, indistincte fasciata; rostro flavo. Long. 20".

Syn. Le Parasite Levaill., Ois. d'Afr. pl. 22. — *Falco aegyptius*, Gm. — Temm. Man. III, p. 31. — Smith. Afr. Zool. pag. 155. — Kaup Isis 1847, S. 118.

Hab. Ins. St. Thomé: Weiss in Mus. Hamb. — Old Calabar-Fl.: Jard. Ann. and Mag. vol. 17, p. 85. — Damara-Gegend: Andersson. — M. S. O.

#### **Nauclerus** Vig.

20. *Riocourii* (Vieill.) Supra coeruleo-cinereus, alis caudaque dilutius tinctis; remig. sec. apice albis; fronte, loris, genis corporaque subtus albis; humeris interne nigris; rostro nigro; pedibus flavis. Long. 13 — 14".

Syn. *Elanoïdes Riocourii* Vieill. Enc. p. 1207. — Galer. des Ois. pl. 16. Pl. eol. 85. — Vig. Zool. Journ. II, 386. — Kaup, Isis 1847, S. 88. — *Chelictinia* (!!) Rioc. Less. — Subg. *Chelidopteryx* Kaup.

Hab. Senegambia: Goree, Vieill. — Kordofan: Strickl. Ann. Mag. 1852, p. 343. (Petherick.)

#### **Elanus** Sav.

21. *melanopterus* (Daud.) Supra cinereus, subtus albus, scapul. et tec-tricibus alar. nigerrimis; remig. tert. pogoно interno albis; cauda alba, rectricibus mediis pallide cinereis; pedibus flavis; subalaribus albis. Long. 12".

Syn. Daud. Orn. II, p. 152. — Le Blac, Levaill. Afr. pl. 36, 37. — *Elanus caesius*, Sav. — Smith Afr. Zool. p. 155. — Naum. Vög. Deutschl. XIII, T. 347. ♂ ad. et juv. — Kaup, Isis 1847, p. 110.

Hab. Gambia: List Spec. Brit. Mus. p. 45. — S. M. O.

#### **Falco** L.

22. *ruficollis* Sw. Supra obscure cinereus, fasciis latoribus nigris undique notatus; pileo laete rufo, nigro striolato; regione parotica nigro circumdata; gula pectoreque albidis, lateraliter rufescens; abdomine albo, striete nigro fasciolato; canda cinerea, nigro fasciata, apice latius nigro, albo marginata; pedibus flavis. Long. 10 — 10 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. Swains. Birds of West. Afr. I, p. 107, pl. 2. — Vierthal. Naum. II, 1, p. 48. — Kaup. Ann. Mag. X, p. 451.

Hab. Senegal: Swains.; Lath. Gen. Hist. I, p. 200. (Tawny-headed Falcon.) — Sennaar: Vierthaler; A. Brehm in litt. — O.

#### **Hypotriocellis** Böte.

23. *ardesiacus* (Vieill.) Saturate cinereus, nigro striolatus; subcauda-

libus unicoloribus; cauda supra indistinctius, subtus distincte albido fasciata; rostro depressinsculo; unguibus validis. Long. 13—14".

Syn. *Falco ardesiacus* Vieill. Encycl. p. 1238. — *F. concolor* Swains. West. Afr. I, p. 112, pl. 3. — Pl. col. 330. — Bonap. Conspect. pag. 26. — Kaup, Isis 1847, p. 60.

Hab. Senegambia. — Ins. Barakan mar. rubri: Rüpp.

**Thinoculus** Vieill.

24. *alaudarius* (Gm.) Cinereo rufescens, subtus multo pallidior; capite colloque nigricante striatis; mento concolore; corpore super. nigricante fasciato, infer. striato; remig. majorum pogoniis externis totis fuseis; subalaribus isabellinis; tectricibus caudae super. in mare dilute griseis. Long. 12—13". (Var. *rufescens* Sw.)

Syn. *Falco rufescens* Sw. West. Afr. I, p. 109. ♂ = *Tinn. alaudarius* var. loc. Bonap., Gray List Specim. p. 58. — Suadev. Oefvers 1850, S. 132. (Sennaar) — Strickl. Ann. und Mag. 1852, p. 343. (Kordofan.)

Hab. Senegambia: Swains. — Senegal: Schleg. Fauna Japon. Av. p. 3. — S. O.

**Circus** Lacep.

25. *Swainsonii* Smith. Supra dilute cinerascens; fronte, superciliis et genis albidis, remigibus secund. non fasciatis; subtus albus, pectore nonnihil cinerascente; cauda supra cinerea, subtus albida; rectric. externis irregulariter sexfasciatis; rostro nigro, pedibus flavis. Long. circa 17".

Syn. Smith Afr. Zool. pag. 162. — Id. Illustr. S. Afr. Z. pl. 43, 44. — *C. superciliaris* Id. S. Afr. Q. J. I, p. 385, juv. — *C. pallidus* Sykes. — *C. dalmatinus* Rüpp. Mus. Senkenb. II. — Naum. Vög. Deutschl. XIII, T. 348. — Kaup Isis 1847, S. 100. — *Falco aequipar* Cuv., Pucher. Rev. et Mag. de Zool. II, p. 14.

Hab. Senegal: Mus. Par. (Pucheran.) — M. O. S.

**Gypogeranus** Illig.

26. *serpentarius* (Lin.) Coerulescente-cinereus, subtus multo pallidior; cera et periophthalmiis nudis flavis; plumis occipitalibus valde elongatis; remig., tectricibus alae major., crasso et tibiis nigris; rectricibus 2 intermediis valde elongatis canis, fascia lata anteapicali nigra, apice albo. Long. 3' 5—7".

Syn. *G. gambensis* Ogilby, Proc. Zool. Soc. 1835, p. 102. — *G. africanus* Smith. Afr. Zool. p. 137.

Hab. Gambia: Rendall. — M. O.

c. **STRIGIDAE.**

**Glaucidium** Boie.

27. *perlatum* (Vieill.) Pileo et nucha pallide rufis, maculis numerosis minutis rotundatis albis, nigricante marginatis; dorso pallide brunneo, similiter maculato; collari subobsoleto rufo, albo nigroque vario; subtus album, maculis magnis longitudinalibus rufis; cauda fusca, guttis binis albis 6—7 fasciata; facie et mento albidis; rostro flavi. Long. 7"

Syn. *Strix perlata* Vieill. N. Dict. VII. p. 26. — *S. occipitalis*

Temm. Pl. col. 34. — Levail. Ois. d'Afr. pl. 244. — Swains. West. Afr. I, p. 130. — Bonap. Conspl. I, p. 37. — Kaup Monogr., Subgen. *Microglauxa*.

Hab. Senegambia: Mus. Brem. etc. — M. O.

**Scotopelia** Bonap.

28. *Peli* (Temm.) „Rufo-cinnamomea, nigro undulata; subtus dilutior, maculis nigris paucis; tarsis digitisque flavis.“ Long. 22".

Syn. Bonap. Conspect. I, p. 44. — Mus. Lugdun. — *Ketupa peli* Kaup Monogr., Jord. Contrib. 52, p. 117.

Hab. Ashantee.

**Scops** Sav.

29. *senegalensis* Sw. Diversus a Sc. *Ephialte*: rostro rubustiore, alis brevioribus; margine parotico postico nigro vix ullo; humeris albidis; remigum pogonii internis fasciis distinctis 6—7, nigricantibus in fundo pallide brunneo.

Syn. Swains. West Afr. I, p. 127. — Kaup Monogr. Jard. Contrib. 1852, part. 5. — *Sc. capensis* Smith. — Bonap. Conspl. p. 48. — *S. Ephialtes* var. Gray, List. Spec. Brit. Mus. p. 95.

Hab. Senegambia: Mus. Brem. Swains. etc. — Gambia: Rendall. Damara-Gegend: Andersss., Strickl. Contrib. 12, p. 142.

30. *leucopsis* (Hartl.) Supra fulvo-rufescens; pilei plumis nigro, albo fuscoque notatis; multis dorsi et colli lateralis simili modo pictis; facie, superciliis et gula albis; remigibus min. nonnullis macula apicali alba, nigro terminata ornatis; ala spuria nigra; corpore infer. albido, pectore brunnescente, nigro marmorato; abdomine pallide rufescente notato maculisque longitud. nigris hinc inde ornato; tarsis rufis; pedibus et rostro flavidis. Long. 8" 2".

Syn. *Athene leucopsis* Hartl. Rev. et Mag. de Zool. 1849, p. 496. — Id. Beitr. zur Ornith. Westafr., S. 48. Deser. compl. — Id. Abhandl. d. naturwiss. Verein's in Hamb. II, 2. T. 1. — *Scops leucopsis* Kaup.

Hab. Insula St. Thomé Afr. occid. Mus. Hamb. Brem.

31. *Hendersonii* (Cassin) Supra cinerascens, collo, dorso et uropygio laete fulvo variegatis; capite et collo nigricante transversim vermiculatis; plumis frontal. albidis, auricul. et facie pallide cinereis, fusco lineolatis; subtus albo brunneoque variegatus, fulvo tintus; abdomine imo et subcaudalibus purius albis; cauda pallide cinerea, fasciis irregul. brunneis. Long. 6 $\frac{1}{2}$ ", al. 5", caud. 2 $\frac{1}{2}$ ". Rostro breviore et debiliore quam in *Sc. senegalensi* et *capensi*.

Syn. *Ephialtes Hendersonii* Cass. Proceed. Ac. Nat. Sc. Philad. 1852, pag. 186.

Hab. Angola: „off Novo Redondo“ Henders.

32. *leucotis* (Temm.) Dilute brunneo-cinerascens, nigricante vermiculatus; facie, fronte et regione parotica albis, hac postice nigro marginata; subtus magis brunnescens, striolis scaporum nigris pulchre notatus; alis maculis nonnullis majoribus albis; tarsis albidis, fusco maculatis; periophthalmiis nigerrimis; rostro pallido. Long. 10".

Syn. *Strix leucotis* Temm., Pl. col. 16. — Swains. West. Afr. I, p. 124. — *Otus leucotis* Cuv. — *Ephialtes leuc.* Bonap. Conspl. p. 45. — Subgen. *Ptilopsis* Kaup. Monogr.

Hab. Senegambia. — O. (Fazogl: Cassin; Kordafan: Petherick; Sennaar: A. Brehm etc.) M. (Castraria: Mus. Berol.) — Damara-Gegend: Andersson.

**Bubo** Cuv.

33. *maculosus* (Vieill.) Supra fuliginoso-nigricans, capite albo maculato; facie cinereo, brunnescente et albido vermiculata, nigro circumdata; tectricibus alae maculis majoribus albis; subtus albidus, fasciis irregular. inaculisque majoribus longit. nigris; rostro nigro; flexura alae alba. Fœm. supra albo maculata. Long. 17".

Syn. *Strix maculosa* Vieill. Galer. pl. 24. — Id. N. Dict. VII. p. 44. — *S. africana* Temm. pl. 50. ♂. — Kaup. Monogr. (*B. africanus*.)

Hab. West. Africa: Capt. Sabine; Gray List. Specim. Brit. Mus. p. 106. — M. O.

34. *lacteus* (Temm.) Cinerascens, brunnescente et albido vermiculatus; subtus pallidior; genis albis, late nigricante cinetis; gula alba; remigibus caudaque fulvescente fasciatis; flexura alae maculis nonnullis magnis albis; tarsis albis, nigro fasciolatis; digitis nudis caeruleis; rostro magno, pallide caerulescente. Long. 24".

Syn. *Strix lactea* Temm. col. pl. 4. — *Bubo lacteus* Cuv. — Kaup Monogr. I. c. — Bonap. Conspl. p. 49.

Hab. Senegal: Temm. — Cass. Catal. Strigid. Mus. Philad. — Sierra Leone: Mus. Lugd.

**Syrnium** Sav.

35. *Woodfordii* (Smith.) Brunneum, nigricante vermiculatum, maculis crebris subtriangularibus albis; faciei plumis albidis, nigro fasciatis; periophthalmis obscuris; alae tectricibus maculis nonnullis major. albis; subtus rufescens, fasciis irregul. albidis, latioribus, fusco marginatis; remigibus caudaque brunneis, pallide rufescente fasciatis. Long. 15".

Syn. *Noctua Woodfordii* Smith, Afr. Zool. p. 168. — Id. Illustr. S. Afr. Zool. t. 71. — Bonap. Conspl. p. 52. — *Syrnium Woodfordii* Cassin Cat. Strig. Mus. Philad.

Hab. Gambia: Kendall. Mus. Brit. — Goldküste: Mus. Lugd. Brem. — M.

**Strix** Lin.

36. *flammea* Lin. Supra cinerascens, gracillime nigricante vermiculata; maculis crebris albis; facie albido-rufescente, corona lacte fulvo marginata, periophthalmis obscurioribus; subtus plus minusve fulvescens, maculis minutis rotundatis nigris; cauda et alis fulvis, fasciis cinereis, nigricante variis. Long. 13".

Syn. *Strix guttata* Brehm.

Hab. Westl. Africa: List Specim. Br. Mus. Birds, pag. 108. — Cass. Catal. Strigid. Mus. Philad. spec. 1.

37. *thomensis* Hartl. Supra nigricante - ardesiaca, punctulis minutis pallidioribus maculisque albis nigro marginatis notata; subtus laete et intense ex aurantiaco rufa, maculis subrotundatis nigricantibus; subcaudalibus tibiisque immaculatis; rectricibus pallide ferrugineis,

obscure variegatis, fasciis 3 latis nigro-fuscis, apicibus omnium latius fuscis albo terminatis. Long.  $14\frac{2}{3}$ ". al. 8" 4". tars. 2"  $2\frac{1}{2}$ ".

Syn. Rev. et Mag. de Zool. 1852, p. 2. Mus. Hamburg. — Kaup. in Jard. Contrib. 1852, p. 118.

Hab. Ins. St. Thomé: Weiss.

38. *poënsis* (Fras.) Supra cervino-flavescens, albo et purpurascens adpersa, plumarum omnium scapis 2—3 guttatis, spatiis intermediis nigris; facie alba; remigibus prim. et secund. subobsolete fasciatis; cauda fulvescente, fusco fasciata rariusque albo guttata; subtus flavescente-alba, guttis triangul. nigrescentibus; tarsis fere ad digitos usque albo lanuginosis. Long. ?

Syn. Fraser Proceed. Zool. Soc. 1842, p. 189. — Allen Exped. Nig. vol. II, p. 488.

Hab. Fernando Po.

## II. PASSERES.

### 1. FISSIROSTRES.

#### a. CAPRIMULGIDAE.

##### **Caprimulgus** L.

39. *concretus* Temm. „Nigricans, abdomine late albido undulatus, spatio gulari magno albo; remigibus fuscis immaculatis; rectricibus extimis utrinque duabus unicoloribus intus apice albis, Foem. rufis.”

Syn. Bonap. Conspect. I, p. 60. Mus. Lugdun.

Hab. Ashantee.

40. *rufigena* Sm. Supra pallide griseo-scens, striis longit. fuscis lineisque undatis gracilioribus nigro-brunneis; tectricibus alae min. fuscis, late albo-rufescente marginatis; gulture albo-bimaculato; genis et torque cervicali ex aurantiaco rufis, nigro brunneoque variegatis; rectricibus 2 mediis griseis, anguste fusco fasciatibus et inter fascias lineis fuscis longitudinalibus maculatis. Long. 9" 4", caud. 5".

Syn. Smith Illustr. of S. Afr. Zool. t. 100, fig. ♂.

Hab. Angola: Henderson. — M.

##### **Scotornis**, Sw.

41. *climacura* (Vieill.) Ferrugineo-brunnea, nigro vermiculata; mento striaque rictali albis; tectric. alae minor. fascia lata apicali alba, major. macula apicali isabellina; remig. 5 primariis nigris, apice griseo variegatis, fascia mediana lata nivea; cauda longa cuneata, rectricis extimae margine externo apiceque albis, proxima albo terminata. Long. 13", caud. 9".

Syn. *Capr. climacurus* Vieill. Gal. pl. 122. — *C. longicaudus*, Drap. Diet. class. VI, p. 169. — Swains. West. Afr. II, p. 66.

Hab. Senegambia: Swains. etc. — Cap Coast: Gordon in Jard. Contrib. to Orn. 1851. — O. (Fazogl: Cass.; Sennaar: Vierthaler, Brehm; Kordofan: Petherick.)

42. *trimaculatus* Sw. Griseo-brunneus, capitis lateribus nuchaque laetius tinctis, hac medio nigro striata; scapul. alae tectricibus fulvo maculatis et striatis; gulae macula striaque rictali albis, remigibus

primar. fuscis, basin versus irregulariter rufo fasciatis, pogonio interno macula mediana magna nivea; canda subaequali, lata; rectricibus binis externis macula alba terminatis; alis longis. Long. 11", al. 8", caud. 6 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. Swains. West. Afr. II, p. 70. — Mus. Philad.

Hab. Senegambia.

#### **Macrodiptryx** Sw.

43. *longipennis* (Shaw.) Remigibus primariis pogonio externo et interno rufo nigroque 9-fasciatis; minoribus nigris, fasciis 4 rufis, apice nigris; rectricibus mediis cimerascentibus, nigro punctulatis, nigrae 6-fasciatis, extimae pogonio externo fulvescente albido, maeulis circa 10 nigris; alis caudae aequalis apicem attingentibus; ♂: pluma inter rem. primar. et secund. orta longissima nutante, (16 — 18") nuda, apice ipso barbato. Long. 8", al. 6 $\frac{3}{4}$ ".

Syn. *Caprimulgus longipennis* Sh. Nat. Misc. pl 265. — *C. macrodipterus* Afzel., Lath. — Sundev. Oefvers. Vetensk. Acad. Förhandl. 1849, S. 156. — Swains. West. Afr. II, p. 62, pl. 5. (*Macrod. africanus*.) — Russegg. Reise II, p. 207.

Hab. Senegambia. Sierra Leone. Bonny-river: Jard. Ann. Mag. 17, p. 85. — Nigermündung und Aboh am Niger: Allen & Thomps. Exped. Nig. I, p. 167, 250. — O. (Fazogl, Sennaar, Abyssinien.)

#### *b. HIRUNDINIDAE.*

##### **Acanthylis** Boie.

44. *Sabinii* Gray. Chalybeo-nigra, subtus obsoletior; caudae rectricibus super. longis, epigastrio, abdomine, crasso et subcaudalibus niveis, his scapis nigris; cauda aequali. Long. 4 $\frac{1}{2}$ ", al. exp. 11".  
Syn. *Chaetura bicolor* J. E. Gray, Zool. Misc. I, p. 6. — *Ac. Sabinii* Id. in Griff. Anim. Kingd. II, p. 70. — *Pallene leucogyna* Boie Isis 1844, S. 168.

Hab. Sierra Leone: Capt. Sabine. — Fernando Po: Fras.; Strickl. Proc. Z. S. 1844, p. 99.

##### **Cypselus** Ill.

45. *abyssinicus* Licht. Fuliginosus, nitore nonnullo metallico; dorso abdomineque obscurius nigricantibus; fascia lata uropygiali, mento gulaque albis; rostro pedibusque nigris; cauda vix emarginata; scapis plumarum uropygii fuscis. Long. 6" 8"; al. 5".

Syn. Streubel Iesis 1848, S. 354. — *C. affinis* Gray, Hardw. Illustr. Ind. Z. t. 35, 2. (?) — Jard. Contr. 1851, p. 157.

Hab. Ins. St. Thomé: Weiss, Hartl. Beitr. z. Orn. Westafr., S. 16. — Anamaboe (Goldküste): Weiss, ib. — Cap Coast: Gordon in Jard. Contrib. — Hartl. Rev. zool. 1852, p. 6. — O.

Die Unterscheidung des westafrikanischen Vogels vom indischen *affinis* ist nicht mit Sicherheit festzustellen, obgleich Verf. solches versuchte: Rev. et Mag. de Zool. 1852, p. 6. Jardine bleibt von der Gleichartigkeit beider überzeugt.

46. *ambrosiacus* (Lin.) Totus murinus, gulture albicante; cauda for-

sicata, rectricibus extimis longissimis. Long. ad apic. rectricis intermed. 4", extim. ultra 6".

Syn. *Cypselus parvus* Licht. Doubl. Berl. Mus., S. 58. — Temm. Pl. col. 460, fig. 2. — *Cypsiurus* (!) *ambr.* Less. Echo du M. S. 1843, p. 134. — *Dendrochelidon ambr.* Bonap. Conspl. p. 67. — *Hirundo riparia senegal.* Briss. Orn. II, 508. — Streubel Isis 1848, S. 351. — Allen Exped. Nig. II, p. 498.

Hab. Senegal: Briss. Adans. — Accra, Goldküste: Fras. Proc. Z. S. 44. p. 99. — Cap Coast: Gordon. — O. M.

#### **Atticora** Boie.

47. *melbina* Verr. Supra brunnea; tergo, alis caudaque longa profunde furcata nigro-caeruleis, brunneo lavatis; subtus alba; tarsis nudis brunneis. Long. 5" 6"".

Syn. Verreaux Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 310. — Strickl., Jard. Contrib. to Ornith. 1851, p. 131.

Hab. Gaboon.

48. *nigrita* (Gray.) Coerulescente-nigra; mento infimo albido; canda emarginata; rectricum 5 externarum pogoniis internis albis, apice nigris. Long. 5 $\frac{1}{2}$ ", alae 4 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. Gray Gen. of Birds, t. 20. — Thoms. in Allen Exped. Nig., vol. II, p. 498.

Hab. „River Nun, as high up as Aboh.“

#### **Hirundo** Lin.

49. *rustica* L. Corpore supra fasciaque pectoris chalybeo-nigris; fronte et gula castaneis; abdomine albido; pogoniis internis rectricum, 2 intermediis exceptis, macula magna alba notatis; extima valde elongata, subsiliformi. Long. 6 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. Lin. I, p. 343. — Naum. Vog. Europ. t. 145, fig. 2.

Hab. Old Calabar: Jard. Ann. and Mag. XVII, p. 85. — Damara-Gegend: Andersson. — M. O.

50. *Smithii* Cranch. Chalybeo-nigra, subtus albida; cauda alisque nigris, illa fascia alba notata; pileo castaneo; rectrice extima valde elongata.

Syn. Tuckey Exped. to the river Zaire, pag. 407.

Hab. „Chisalla-island“ Congo.

51. *cahirica* Lieht. Supra caerulescente-nigra, fronte, gula, abdomine erisoque castaneis; pectoris torque nigro; alis fuscescentibus; rectrice extima valde elongata. Rusticae affinis. Long. 6 $\frac{1}{4}$ ".

Syn. Licht. Doubl. p. 58. — H. *Savignyi* Leach. — Descri. de l'Eg. t. 4, fig. 4. — H. *Riocourii* Aud. — H. *rustica orientalis* Schlegel. — Bonap. Conspl. p. 338.

Hab. Congo: Tuckey Exped. Zaire, p. 407. — O. S.

52. *rufifrons* Shaw., Vieill. Caerulescente-nigra; fronte rufa; ventre albo; gula et jugulo nigris; cauda furcata. Long. 7".

Syn. Levaill. Ois. d'Afr. pl 245, fig. 2. — Vieill. Encycl. p. 124. Hab. Gambia: Mus. Brem.

53. *leucosoma* Sw. Supra caerulescente-nigra; subtus pure alba; nota tectricum al. minorum vittaque pogonii interni rectricum albis; rec-

tricibus 2 extimis acuminatis; cauda furcata; alis longis. Long. 5", al.  $3\frac{9}{10}$ ", caud.  $2\frac{2}{10}$ ".

Syn. Swains. West. Afr. II, pag. 74. — Bonap. Conspl. p. 339.  
Hab. Gambia: Sw. — Accra: Fraser.

54. *senegalensis* L. Supra caerulecente-nigra; torque nuchali, tergo, uropygio et abdomine rufis; gula pectoreque pallidioribus; subalaribus tibialis pure albis; cauda profunde furcata chalybeo-nigra. Long. 8", al.  $5\frac{6}{10}$ ".

Syn. *Hirundo senegalensis* Briss. Ora. II, p. 496. — Pl. enl. 310. — Gould Birds of Eur. t. 55. — Swains. West. Afr. II, p. 72, t. 6. — Bonap. Conspl. p. 339. — Schleg. F. Japon. Vog., S. 33. — Bonap. Rev. crit. p. 49.

Hab. Senegambia: Adans., Swains. etc. — Cap Coast: Gordon. — Bimbia: Thoms. Nig. Exp. II, p. 290.

55. *Gordoni* Jard. Supra splendide chalybeo-nigra; uropygio rufo; alis candaque nigris, hac profunde furcata; pogonii internis rectricum 4 externarum albo notatis; subtus pallide rufescens („sienna“). Long. 8" 8"".

Syn. Jard. Contrib. to Ornith. 1849, part 1. (ex errore: *melanocassis* Rüpp.) — Id. Contrib. 1851, part. 5, Descr.

Hab. Cap-Coast: Gordon. — Abomey, Goldküste: Frazer, Jard. Contr. 1852, part. 3.

56. *abyssinica* Guér. Supra nigro-caerulea; pileo, regione parotica, nucha et uropygio laete ferruginea; alis et cauda umbrino-nigris, rectricibus pungonio interno macula alba; subtus sordide albicans, confertim nigricante striata. Long. 5" 9"", caud. profunde furcatae 2" 6"".

Syn. Guérin Rev. zool. 1843, pag. 322. — *H. striolata* Rupp. System. Uebers. S. 18. T. 6. — *H. puella* Temm. Fauna Japon. Av., p. 33. — Bonap. Conspl. p. 340. — Id. Rev. crit. p. 51.

Hab. Goldküste: Mus. Lugd. — Cap Coast: Gordon, Jard. Contrib. 1849. I. — O.

#### Cotile Boie.

57. *fuligula* (Licht.) Fuliginosa, subtus rufescens, subalaribus fulvis, subcaudalibus nigricantibus; rectricibus, mediis et ultimis exceptis, macula anteapicali obliqua alba notatis. Long. 6".

Syn. *Hirundo fuligula* Licht. Verz. 1842, S. 18. — Lev Ois. d'Afr. t. 246, fig. 1. — Bonap. Conspl. p. 343.

Hab. Angola: Henderson. — M.

#### c. CORACIADAE.

##### Euryxostomus Vieil.

58. *aser* (Lath.) Supra cinnamomeus, subtus lilacino resplendens; remigibus tectricibusque majoribus laete caeruleis, apice nigricantibus; vanda subfurcata; retribus lateralibus thalassinis, apice caeruleis, mediis olivaceo-fuscis; rostro laete flavo. Long.  $9\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Coracias asra* auct. — *E. rubescens* Vieill. Encycl. p. 871. — *E. purpurascens* Daud. — Wagl. Syst. Av., spec. 2: *Colaris purp.* —

Swains. West. Afr. II, p. 112. — Levaill. Ois. Parad. t. 35. — Verr. Rev. et Mag. 1851, p. 270.

Hab. Senegambia, Goldküste, Gaboon. — O.

59. *viridis* (Wagl.) Sordide viridis, ventris crissique plumis caeruleo-centibus; undique fuscescente striatus; rectricibus dilute caeruleo-centibus, fascia nigro-caerulea terminatis, 2 mediis nigricantibus; remigibus caeruleis, apice nigric.; rostro flavo, supra rubicundo. Long. circa  $9\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Colaris viridis* Wagl. Syst. spec. 5. — Bonap. Conspl. p. 168.  
Hab. Senegambia: Mus. Paris.

**Coracias** Lin.

60. *garrulus* Lin. Ferrugineo-viridis; fronte albicante; alae tectricibus min. saturate violaceis; uropygio et remigibus subtus caeruleis, his apice nigris; dorso, scapularibus remigibusque dorso proximis rufis; rectricibus 2 mediis olivaceis, caeteris albo-virescentibus, subtus a basi ultra medium indico-caeruleis, extima hoc colore terminata. Long.  $11\frac{1}{2}$ ".

Syn. Wagl. Syst. Av. Monogr. sp. 1. — Gould Birds of Eur. t. 60.

Hab. Ins. St. Thomé: Weiss. Av. jun. in Mus. Hamb. — S. (Marocco etc.)

61. *caudatus* Lin. Fulvo-olivaceus, uropygio glauco cyaneoque vario; subtus cyaneo-glaucus; jugulo dilute violaceo, albo striolato; remigibus apice cyaneo-nigris; rectricibus lateralibus cyaneis, extima longissima, apiee nigricante. Long. 12" (rectr. ext. except.)

Syn. *Galculus angolensis* Briss. Orn. II, p. 72, pl. 7, fig. 1. — Lin. ed. 12, 1, p. 160. — *C. natalensis* Lichtenst. Verzeichn. südafr. Th., S. 16. — Pucher. Rev. zool. 1845, p. 371. — Desm. Iconogr. Orn. pl. 28. — Reichenb. Spec. t. 432, fig. 3182. — Bonap. Conspl. p. 167.

Hab. Angola: Briss., Maxwell. — Damara-Gegend: Anderss. — Zanzibar: Daubeny. O. M. (Natal.)

62. *abyssinicus* Gm. Dilute thalassino-viridis; interscapulio, dorso, scapular. alaeque tectricibus ferrugineis; humeris, tectric. minoribus, uropygio et supraaudalibus nitide ultramarinis; remigibus caeruleis, basi thalassinis; fronte, superciliis mentoque albidis; rectricibus 4 intermediis obscure virescentibus, extimis valde elongatis, parte angustata nigris. Long. 12", rectr. extim. 10 — 11".

Syn. Gm.-Lin. t, p. 379. — Pl. enl. 626. — Levaill. Roll. pl. 25. — Swains. West. Afr. II, p. 105. — *C. senegalensis* Gm. ? Edw. t. 327, et Pl. enl. 326. ?

Hab. Senegambia. — O.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [1\\_1853](#)

Autor(en)/Author(s): Hartlaub Gustav [Carl Johann]

Artikel/Article: [Versuch einer synoptischen Ornithologie Westafrica's.](#)  
[385-400](#)