

stitien der Steuerfedern dicht braun und weisslich gemischt, bei *Str. Oustaleti* dagegen fahlröthlich und ohne alle Zeichnung. Endlich ist der Spitzentheil der Schwingen 1. Ordn. grob gemischt in Braun und Weisslich bei *Str. nov. Holl.*, einförmig schwärzlich-braun dagegen bei *Str. Oustaleti* etc. etc. Es kann also auch zwischen diesen beiden Arten von einer Verwechslung keine Rede sein.

Das Vorkommen von zwei Arten von Schleiereulen auf einem auch nur annähernd so beschränktem Gebiete wie die Insel Viti-Levu steht durchaus vereinzelt da.

Das hier beschriebene Pärchen von *Strix Oustaleti* zielt das an naturgeschichtlichen und ethnographischen Seltenheiten aller Art so reiche Museum Godeffroy in Hamburg. Soviel uns bekannt, sind diese beiden Vögel bis jetzt die einzigen nach Europa gelangten.

Ueber die Adelsdorfer Colonie von *Larus ridibundus*

bemerkt Herr Neumann in Grossenhain (Sachsen): „Am 8. April war die Colonie vollständig besetzt, d. h. von ca. 2000 Lachmöven. Die Mehrzahl verlässt früh am Tage den Brutplatz und streicht den Tag über in der Umgegend umher; sie setzen sich gern an Wassergräben und an Vertiefungen der Wiesen, wo sich noch schlammige Ueberreste vom Winterwasser befinden, folgen dem Landmann hinter dem Ackerpflug und kehren Abends unter lautem Geschrei zurück. Vom 8. April an begann der Bau des Nestes. Am 17. April wurden die ersten Eier gefunden. Das Sammeln derselben wird vom Jagdpächter alle 3 Tage wiederholt; am 21. April wurden 243 Stück, am 6. Mai die letzten, gegen 400 Stück, gesammelt. In den Nestern, welche 3 Eier enthielten, liess man diese zum Ausbrüten liegen. Als die Vögel Junge hatten, bewiesen sie eine ungemeine Fürsorge und Aengstlichkeit; sie umschwärmten uns, als wir am Teiche standen, mit ängstlichem Geschrei, und verfolgten uns bei unserm Weggange in Schaaren die Hälfte des Weges zur Stadt. Wenn die Jungen flugbar werden, verlassen sie zum grössten Theil die Colonie, und beim Beginn der Entenjagd (1. Juli) gewahrt man sie nur noch einzeln auf dem Teich. Von nun an sieht man sie bloss noch in mehreren Familien beisammen auf den Fluren und Wiesen, bis sie nach und nach verschwinden. Am 2. October wurden die letzten bemerkt“.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [27_1879](#)

Autor(en)/Author(s): Neumann H.

Artikel/Article: [Ueber die Adelsdorfer Colonie von Larus ridibundus
194](#)