© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

JOURNAL
für
ORNITHOLOGIE.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

№ 148. October. 1879.

Uebersicht der von Dr. G. A. Fischer auf einer zweiten Reise durch das ostafricanische Küstenland von Mombassa bis Wito und am Tana-Fluss gesammelten Vögel.

Von
Dr. G. A. Fischer und Dr. Ant. Reichenow.

FAM. *CHARADRIIDAE.*

1. *Charadrius pecuarius* Tem.

227a: ♀. Mambrui 23/6. Iris braun, Schnabel schwarz, Tibia schwärzlich, Tarsus grau, Zehen grauschwarz. Länge 150, Flügel 100, Schwanz 45, Lauf 30, Mundspalte 20 Mm.

2. *Hoplopterus spinosus* (L.).

404: ♂. Tschara 8/12. Iris karminroth, Schnabel und Beine schwarz. Wapokomo-Name: Tirangole. Flügel 195, Schwanz 100, Lauf 68, Mundspalte 30 Mm.

3. *Limnetes crassirostris* (de Fil.).

403: ♀. Tschara 8/12. Iris schmutzig korallenroth, verbreiterte Augenlider korallroth, Basis des Schnabels bis über die Nasenlöcher weinröthlich, Spitzendrittel braunschwarz, Beine purpurroth. Länge 280, Flügel 210, Schwanz 105, Lauf 80, Mundspalte 34 Mm.

4. *Glareola ocularis* Verr.

300: ♂. Ngau 2/9. Iris dunkelbraun, Schnabel braunschwarz, Ränder und Basis lackroth, Beine schwärzlichbraun. Länge 211, Flügel 195, Schwanz 75, Mundspalte 24, Lauf 27 Mm. — 299: ♀. Ngau 2/9. Länge 220, Flügel 190, Schwanz 72, Mundspalte 22 Mm. Nackte Theile wie beim ♂ gefärbt.

5. *Cursorius cinctus* Heugl.

381: ♀. Massa 4/11. Länge 220, Flügel 150, Schwanz 75, Lauf 65, Mundspalte 25 Mm. Iris braun, Oberschnabel und Spitzen-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

drittel des Unterschnabels braunschwarz, Oberschnabel um die Nasenlöcher und Unterschnabel graugrün, Beine blasshornfahl.

6. *Oedicnemus vermiculatus* Cab.

369: ♀. Ualimi 27/10. Iris grüngelb mit schwarzen Punkten und Adern, Schnabel schwarzbraun, Fleck um das Nasenloch und Basis des Unterschnabels gelbgrün, Beine blassgrünlich. Vulgärname (Wapokomo): Keriombe. Länge 364, Flügel 200, Schwanz 110, Lauf 80, Mundspalte 55 Mm.

FAM. *OTIDIDAE.*

7. *Otis maculipennis* Cab.

236: ♀. Gelidja 29/6. Iris gelbbraun, Oberschnabel dunkelbraun, Unterschnabel blasshorngelblich, ebenso breiter Rand des Oberschnabels, Beine gelblichweiss. Länge 600, Flügel 350, Schwanz 125, Lauf 13, Mundspalte 62 Mm.

Von dem Typus im Berliner Museum unterscheidet sich das vorliegende Exemplar durch etwas abweichende Rückenzeichnung, indem die helle Zeichnung auf den Federn lanzenförmige Spitzen bildet, und durch die Schwanzfedern, welche weniger deutliche Querbinden zeigen. Die äussersten Schwanzfedern sind fast ganz schwarzbraun, nur an der Spitze gelbbräunlich gezeichnet.

FAM. *SCOLOPACIDAE.*

8. *Actitis hypoleucus* (L.).

309: ♂. Engatana 12/9. Iris braun, Oberschnabel und Spitzentheil des Unterschnabels braunschwarz, Basis des Unterschnabels fahl, Füsse blass grünlichgrau. Länge 141, Flügel 107, Schwanz 55, Lauf 25, Mundspalte 30 Mm.

FAM. *RALLIDAE.*

9. *Parra africana* Gm.

296: pullus. Tschara 18/8. Oberseite rothbraun, ein Band über den Oberkopf und Nacken schwarzbraun, ebenso ein Strich, der vom Schnabel durch das Auge läuft und sich hinter demselben mit dem Nackenbande vereinigt, Untenseite weiss, Iris braun, Schnabel blaugrau, Basis des Unterschnabels hornfahl, Beine grünlich. Länge 180 Mm.

10. *Ortygometra pygmaea* (Naum.).

340: ♂ jun. Muniuni 2/10. Iris gelblichroth, schmaler Augenlidrand hell lederbraun, Oberschnabel braun, an der Basis und den Rändern mehr grünlichbraun, Unterschnabel grüngrau wie die Beine. Länge 150, Flügel 83, Schwanz 40, Lauf 27, Mundspalte 20 Mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

FAM. *SCOPIDAE.*

11. *Scopus umbretta* L.

368: ♂. Ualimi 24/10. (Scelett).

FAM. *ARDEIDAE.*

12. *Ocniscus atricapillus* (Afzel.).

302: ♂. Ngau 6/9. Iris gelb, über dem schwarzen Zügel ein grüngelber Streif, Oberschnabel und Rand des Unterschnabels schwarz, Unterschnabel gelblichgrün, Beine vorn braun, hinten gelb. Flügel 170, Schwanz 65, Lauf 46, Mundspalte 73 Mm.

FAM. *TETRAONIDAE.*

13. *Turnix lepurana* (Smith.).

207: ♂. Malindi 8/6. Iris hellgelb, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels braun, Rand des Oberschnabels gegen die Basis zu und Unterschnabel blassblaugrau, Beine hornweisslich. Länge 122, Flügel 70, Schwanz 35, Lauf 20, Mundspalte 15 Mm.

14. *Francolinus Granti* Hartl.

272: ♀. Kipini 2/8. Iris braun, Oberschnabel braun, Unterschnabel ebenso, aber Spitze und Basis hornfahl, Beine schmutzig korallroth. Länge 275, Flügel 135, Schwanz 80, Lauf 35, Mundspalte 22 Mm.

15. *Francolinus nudicollis* (Gm.).

247: ♀. Kipini 19/7. Iris braun, Schnabel, nackter Kopf und Halstheile, sowie die Beine korallroth, Schnabelspitze hornfahl, Schnabelfirste an der Basis bräunlichroth. Länge 314, Flügel 180, Schwanz 75, Mundspalte 30 Mm.

FAM. *COLUMBIDAE.*

16. *Chalcopelia afra* (L.).

226: ♂ jun. Mambrui 22/6. Iris braun, Schnabel braunschwarz, Füsse röthlichbraun. Länge 173, Flügel 100, Schwanz 68, Mundspalte 16 Mm.

17. *Treron Wakefieldi* Sh.

308: ♂. Engatana 11/9. Iris seidenweiss, Spitzenhälfte des Schnabels bläulichweiss, Basishälfte bis etwas über die Nasenlöcher zinnoberroth. Länge 240, Flügel 155, Schwanz 87, Mundspalte 23 Mm.

FAM. *FALCONIDAE.*

18. *Falco semitorquatus* Smith.

376: ♀. Massa 2/11. Iris braun, nackte Haut um's Auge und Wachshaut gelblichroth, Schnabel weisslichblau, Spitze blauschwarz, Beine gelbroth, Mageninhalt Eidechsen. Länge 170, Flügel 110, Schwanz 75, Mundspalte 15, Lauf 25 Mm.

19. *Avicida Verreauxi* Lafr.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

323: ♀. Muniuni 21/9. Iris gelb, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels dunkelschwarzbraun, Unterschnabel sonst blassblaugrau, Beine dunkelgelb, Mageninhalt Heuschrecken. Länge 437, Flügel 300, Schwanz 210, Lauf 31, Mundspalte 26 Mm.

FAM. *STRIGIDAE.*

20. *Scotopelia Peli* (Temm.).

406: ♂. Kau. 10/12. Iris tiefbraun, Wachshaut bleifarben, Beine blassgraugelb. Länge 520, Flügel 410, Schwanz 240, Lauf 70, Mundspalte 47 Mm.

21. *Bubo lacteus* (Temm.).

270: ♀. Kipini 29/7. Iris dunkelbraun, Oberaugenlid fleischfarben, das untere bläulich, Schnabel blassblaugrau, Wachshaut bleifarben, Zehen graublau. Länge 530, Flügel 420, Schwanz 230, Lauf 70, Mundspalte 45 Mm.

22. *Syrnium Woodfordi* (Sm.).

342: ♀. Muniuni 4/10. Iris braun, Schnabel, Beine und Wachshaut hellgelb. Länge 320, Flügel 240, Schwanz 160, Mundspalte 27 Mm. — 324: ♂. Muniuni 22/9. Iris braun. Länge 320, Flügel 255, Schwanz 155, Mundspalte 26 Mm.

FAM. *MUSOPHAGIDAE.*

23. *Corythaix Fischeri* Rchw.

329: ♀. Muniuni 25/9. Iris braun, Schnabel dunkelbraunroth, Augenlid korallroth, Beine glänzend braunschwarz. Länge 360, Flügel 170, Schwanz 190, Mundspalte 28 Mm. — 352: ♀ Muniuni 12/10. Länge 380, Flügel 170, Schwanz 190, Mundspalte 27 Mm. — 346: ♂. Muniuni 5/10. Iris braun, Schnabel dunkelbraunroth, Augenlidhaut korallroth, Beine glänzend braunschwarz. Länge 380, Flügel 170, Schwanz 190, Mundspalte 26 Mm.

24. *Schizorhis leucogaster* Rüpp.

380: ♂. Massa 3/11. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 440, Flügel 210, Schwanz 260, Mundspalte 27 Mm. — 379: ♀. Massa 3/11. Iris braun, Schnabel grün, Basis des Unterschnabels graublau, Beine schwarz. Länge 440, Flügel 210, Schwanz 250, Mundspalte 29 Mm.

FAM. *COLIIDAE.*

25. *Colius senegalensis* Gm.

243: ♀. Kipini 13/7. Iris, Basishälfte des Oberschnabels, nackte Haut um's Auge und am Grunde des Unterschnabels lackroth, Schnabel schwarz, Beine schmutzig weinröthlich. Länge 312, Flügel 88, Schwanz 230, Mundspalte 16 Mm. — 227: ♀. Mam-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

brui 23/6. Iris roth, Oberschnabel, Augenlidrand, nackte Haut um's Auge und Basisrand des Unterschnabels lackroth, Spitze des Oberschnabels und Unterschnabels schwarz, Füsse schmutzig weinröthlich. Länge 330, Flügel 88, Schwanz 230, Mundspalte 14 Mm.

26. *Colius leucocephalus* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 114.

362: ♂. Kinakomba 23/10. Iris dunkelbraun, Haut um's Auge grauschwarz, Schnabel blassblau, Spitze des Oberschnabels hornbraun, des Unterschnabels hornfahl, Beine blass rosenroth. Länge 290, Flügel 85, Schwanz 210, Mundspalte 12 Mm.

FAM. *CUCULIDAE.*

27. *Centropus superciliosus* Hempr. Ehr.

186: pullus. (Die Federn noch in Kielen.) Malindi 3/6. Iris dunkelbraun, Oberschnabel dunkelgraublau, Unterschnabel graublau, Beine bleifarben.

28. *Centropus nigrorufus* (Cuv.).

402: ♀. Tschara 5/12. Länge 370, Flügel 165, Schwanz 170, Mundspalte 27 Mm. — 237: ♀. Gelidja 30/6. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz, im Magen Heuschrecken. Länge 390, Flügel 170, Schwanz 180, Mundspalte 28 Mm.

29. *Cuculus validus* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 139.

330: ♀. Muniuni 25/9. Iris braun, Augenlidrand gelb, Oberschnabel und Ränder des Unterschnabels dunkelbraun, Unterschnabel gelbgrau, Beine strohgelb, im Magen Raupen. Länge 336, Flügel 220, Schwanz 200, Mundspalte 29 Mm.

30. *Cuculus leptodetus* Cab.

274: ♂ jun. Kipini 5/8. Iris gelblichgrau, Spitzenhälfte des Oberschnabels und Spitze des Unterschnabels hornbraun, ebenso die Firste an der Basis des ersteren, Schnabel sonst grünlichgelb, am Mundwinkel orange, Augenlidrand und Beine gelb. Länge 320, Flügel 210, Schwanz 180, Mundspalte 30 Mm.

31. *Indicator minor* Steph.

195: ♂. Malindi 6/6. Iris röthlichbraun, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels schwarzbraun, Basis des Unterschnabels fahl, Füsse schmutzig grünlichgrau. Länge 140, Flügel 85, Schwanz 58, Mundspalte 15 Mm.

32. *Indicator Sparmanni* Steph.

358: ♀. Ualimi 19/10. Iris gelbbraun, Schnabel blassbraun, Füsse graubraun. Länge 180, Flügel 103, Schwanz 67, Mundspalte 17 Mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

33. *Indicator variegatus* Less.

366: ♂. Ualimi 24/10. Iris graubraun, Oberschnabel hornbraun.

34. *Chrysococcyx Claasi* (Steph.).

283: ♂. Kau 11/8. Iris gelbbraun, Augenlidrand blassgrünlich, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels braun, Unterschnabel graugrün wie die Füsse. Länge 160, Flügel 95, Schwanz 74, Mundspalte 20 Mm. — 282: ♂. Kau 1/8. Länge 160, Flügel 93, Schwanz 74, Mundspalte 20 Mm.

35. *Chrysococcyx cupreus* (Bodd.).

159: ♂. jun. Sansibar 20/3. Iris graugelb, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels röthlichbraun, Unterschnabel und Augenlidrand blassröthlich, Füsse bleifarben. Länge 175, Flügel 108, Schwanz 83, Mundspalte 18 Mm.

36. *Zanclostomus australis* (Sh.).

257: ♀. Kipini 25/7. Iris bräunlichroth, Schnabel gelb, Firste braun, Beine glänzend braunschwarz, im Magen Heuschrecken. Länge 315, Flügel 120, Schwanz 200, Mundspalte 29 Mm. — 258: ♂. Kipini 25/7. Iris bräunlichroth, Schnabel gelb, an der Firstenbasis braun, Beine glänzend braunschwarz, im Magen Heuschrecken. Länge 310, Flügel 120, Schwanz 175, Mundspalte 28 Mm.

37. *Coccystes pica* (Ehrbg.).

273: ♂. Kipini 5/8. Iris braun, Schnabel schwarz, Füsse bleifarben. Länge 325, Flügel 150, Schwanz 180, Mundspalte 26 Mm.

FAM. *TROGONIDAE.*

Trogon narina Vieill.

317: ♂ jun. Muniuni 18/9. Iris braun, Schnabel grünlichgelb, Firste und Spitze blass grünlichgrau, nackte Haut am Kopfe bläulich, Kehlfleck grau, Beine blass grauröthlich. Länge 290, Flügel 130, Schwanz 190, Mundspalte 23 Mm. — 304: ♀. Engatana 8/9. Iris braun, Schnabel grünlichgelb, Firste bräunlich, Spitze fahlbläulich, nackte Stelle am Kopfe und Kehle graublau, Füsse grauröthlich. Länge 280, Flügel 125, Schwanz 180, Mundspalte 25 Mm.

FAM. *CAPITONIDAE.*

39. *Trachyphonus squamiceps* Heugl.

356: ♂. Kibaradja 18/10. Iris braun, Schnabel fahlgrün, Füsse bleifarben. Länge 170, Flügel 73, Schwanz 80, Mundspalte 23 Mm.

40. *Pogonorhynchus melanopterus* (Ptrs.).

301: ♀. Ngau 3/9. Iris braun, Schnabel fahlbläulich, Beine bleifarben. Länge 180, Flügel 88, Schwanz 68, Mundspalte 27 Mm.

41. *Barbatula affinis* sp. n.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ornith. Centralbl. 1879 p. 114.

260: ♂. Kipini 26/7. Länge 95, Flügel 50, Schwanz 32, Mundspalte 15 Mm. Iris röthlich, Schnabel und Beine schwarz. 173a: ♀. Malindi 31/5. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 90, Flügel 50, Schwanz 30, Mundspalte 15 Mm.

FAM. *PICIDAE.*

42. *Picus nubicus* Gm.

276: ♂. Kau 9/8. Iris blassrosenroth, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels hornbräunlich, Unterschnabel grünlichgrau wie die Beine. Länge 190, Flügel 105, Schwanz 70, Mundspalte 28 Mm.

43. *Picus schoënsis* Rüpp.

332: ♀. Muniuni 26/9. Iris braun, Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel graubraun, Füsse grünlichgrau. Länge 200, Flügel 122, Schwanz 78, Mundspalte 35 Mm. — 331: ♀. Muniuni 26/9. Iris röthlichbraun, Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel graubraun, Füsse grünlichgrau. Länge 190, Flügel 120, Schwanz 70, Mundspalte 32 Mm.

FAM. *BUCEROTIDAE.*

44. *Buceros melanoleucus* Lcht.

231: ♀. Mambrui 26/6. Iris gelb, Schnabel ziegelroth mit schwärzlichen Rändern, Füsse schwarzbraun. Länge 450, Flügel 215, Schwanz 210, Mundspalte 80 Mm.

FAM. *CORACIADAE.*

45. *Coracias garrula* L.

327: ♀. Massa 1/11. Iris braun, Schnabel schwarz, Beine grünlichgrau, Sohlen gelblich. Länge 320, Flügel 200, Schwanz 140, Mundspalte 42 Mm.

46. *Eurystomus afer* (Lath.).

293: ♀. Tschara 15/8. Iris erdbraun, Schnabel gelb, Füsse grünlichbraun, Rachenschleimhaut blassgrün. Länge 220, Flügel 165, Schwanz 98, Mundspalte 30 Mm.

FAM. *ALCEDINIDAE.*

47. *Ceryle maxima* (Pall.).

371: ♀. Massa 31/10. Iris braun, Schnabel schwarz, Basis des Unterschnabels schieferfarben, Fuss grau. Länge 440, Flügel 200, Schwanz 135, Mundspalte 105 Mm.

48. *Halcyon irrorata* Rchb.

183: ♀. Malindi 3/6. Iris braun, Schnabel korallenroth. Länge 200, Flügel 105, Schwanz 70, Mundspalte 53 Mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

49. *Halcyon chelicutensis* (Stanl.).

171: ♀. Malindi 29/5. Iris dunkelbraun, Schnabel braunschwarz, an der Basis des Unterschnabels röthlich, Füsse röthlichbraun. Länge 170, Flügel 73, Schwanz 45, Mundspalte 36 Mm.

FAM. *UPUPIDAE.*

50. *Irrisor cyanomelas* (Vieill.).

217: ♀. Malindi 17/6. Iris braun, Schnabel und Füsse schwarz. Länge 250, Flügel 102, Schwanz 150, Mundspalte 33 Mm.

FAM. *CYPSELIDAE.*

51. *Cypselus stictilaemus* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 114.

360: ♂. Ualimi 22/10. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 135, Flügel 135, Schwanz 50, Mundspalte 16 Mm.

FAM. *CAPRIMULGIDAE.*

52. *Caprimulgus Fossii* Verr.

170: ♀. Sansibar 11/5. Iris braun, Schnabel braunschwarz, Füsse graubraun. Länge 210, Flügel 155, Schwanz 115, Mundspalte 25 Mm.

FAM. *HIRUNDINIDAE.*

53. *Hirundo Monteiri* Hartl.

209: ♀. Malindi 11/6. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz Länge 210, Flügel 135, Schwanz 110, Mundspalte 20 Mm. — 210: ♀. Malindi 12/6. Länge 220, Flügel 140, Schwanz 110, Mundspalte 20 Mm.

54. *Hirundo filifera* Steph.

291: ♂. Tschara 15/8. Iris erdbraun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 150, Flügel 110, Schwanz 78, Mundspalte 15 Mm. — Das Nest gleicht ganz dem unserer *Hirundo rustica.* Ebenso die Eier.

55. *Hirundo puella* Temm.

410: ♂. Mombasa 21/12. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 180, Flügel 100, Schwanz 100, Mundspalte 14 Mm.

56. *Hirundo aethiopica* Blanf.

194: ♂. Malindi 6/6. Iris dunkelbraun, Schnabel schwarz, Füsse schwarzbraun. Länge 140, Flügel 107, Schwanz 65, Mundspalte 15 Mm.

57. *Hirundo albigularis* Strickl.

206: ♂ juv. Malindi 8/6. Iris dunkelbraun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 120 Mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

FAM. *CAMPEPHAGIDAE.*

58. *Campephaga nigra* (Vieill.)

320: ♂ juv. Muniuni 18/9. Iris braun, Schnabel schwarz, Basis des Unterschnabels horngelblich, Haut im Schnabelwinkel gelb, Beine schwarz. Länge 200, Flügel 100, Schwanz 100, Mundspalte 21 Mm. — 255: ♀. Kipini 23/7. Iris graubraun, Schnabel braunschwarz, Beine schwarzbraun, Sohle blassgelbgrau, Mund und Rachenschleimhaut gelb. Länge 190, Flügel 98, Schwanz 98, Mundspalte 20 Mm.

FAM. *MUSCICAPIDAE.*

59. *Muscicapa cinereola* F. et H.

326: ♂. Muniuni 23/9. Iris braun, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels schwarz, Unterschnabel im Uebrigen blassblaugrau, Beine grauschwarz. Länge 130, Flügel 75, Schwanz 58, Mundspalte 17 Mm.

60. *Bradyornis pallida* (v. Müll.)

166: ♂. Bagamojo 26/4. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 155, Flügel 85, Schwanz 68, Mundspalte 18 Mm. — 233: ♂ juv. Gelidja 27/6. Oberseite graubraun mit weissen Tropfenflecken, ebenso die Flügeldecken, Unterseite weiss, Brustfedern mit braunen Säumen, Weichen grauisabell, Unterflügeldecken isabellfarben, Iris praun, Schnabel schwarzbraun, Basis des Unterschnabels fahlgelblich, Beine schmutzig bleifarben. Länge 150, Flügel 78, Schwanz 65, Mundspalte 20 Mm.

61. *Trochocercus bivittatus* n. sp.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 120. 108

319: ♂. Muniuni 18/9. Iris braun, Schnabel blau mit schwarzer Spitze, Beine graublau. Länge 130, Flügel 50, Schwanz 70, Mundspalte 15 Mm.

327: ♀. Muniuni 24/9. Iris dunkelbraun, Schnabel bläulich mit schwarzer Spitze, Beine blaugrau.

62. *Terpsiphone Ferreti* (Guér.)

281: ♂. (im weissen Kleide) Kau 11/8. Iris braun, Augenlidhaut blau, Schnabel blaugrau, Spitze schwärzlich, Beine graublau. Länge 280, Flügel 80, Schwanz 200, kleinere Schwanzfedern 80, Mundsp. 20 Mm.

264: ♂ (im weissen Kleide). Kipini 27/7. Länge 315, Flügel 78, mittlere Schwanzfedern 240, kürzeste Schwanzfedern 80, Mundspalte 20 Mm. — 245: ♂ (braun). Kipini 17/7. Iris braun, Schnabel blaugrau mit schwarzer Spitze, Augenlid blau, Beine

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

dunkelblaugrau. Länge 180, Flügel 77, Schwanz 110, Mundspalte 20 Mm. — 214: ♀. Malindi 16/6. Iris graubraun, Schnabel bläulichschwarz, Füsse bleifarben. Länge 165, Flügel 72, Schwanz 85, Mundspalte 19 Mm. — 284: ♂ (jun.). Kau 11/8. Länge 155, Flügel 70, Schwanz 90, Mundsp. 19 Mm.

63. *Platystira pririt* (Vieill.).

162: ♀. Sansibar 29/3. Iris gelb, am Aussenrande in's Grüne übergehend, Schnabel und Füsse schwarz. Länge 100, Flügel 52, Schwanz 36, Mundspalte 15 Mm.

FAM. *LANIIDAE.*

64. *Nilaus capensis* (Shaw).

363: ♂. Kibaradja 23/10. Iris dunkelbraun, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels schwarzbraun, Unterschnabel blaugrau, Füsse bleifarben. Länge 110, Flügel 72, Schwanz 46, Mundspalte 17 Mm.

65. *Dryoscopus sublacteus* Cass.

203: ♂. Malindi 8/6. Iris braun, Schnabel schwarz, Füsse hellbleifarben. Long. 190; ala 90; cauda 83; rictus 26 Mm. — 280: ♀. Kau 11/8. Long. 180; ala 82; cauda 85; rictus 23 Mm.

66. *Dryoscopus nigerrimus* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 120.

244: ♂. Kipini 15/7. Iris röthlich braun, Beine schwärzlich graublau, Schnabel schwarz. Länge 200, Flügel 86, Schwanz 90, Mundspalte 25 Mm.

67. *Dryoscopus lugubris* Cab.

176: ♂. Malindi 1/6. Iris gelbroth. Schnabel schwarz, Beine bleifarben. Länge 155, Flügel 78, Schwanz 65, Mundspalte 23 Mm.

68. *Laniarius quadricolor* Cass.

190: ♂. Malindi 5/6. 78. Iris schwärzlich, Schnabel schwarz, Füsse hellblaugrau. Long. 180; ala 72; cauda 80; rictus 22 Mm.

69. *Laniarius sulfureipectus* (Less.)

193a: ♀. Malindi 6/6. Iris röthlichbraun, Schnabel schwarz, Füsse bleifarben. Long. 170; ala 85; cauda 85; rictus 17 Mm. — 307a: ♀. Engatana 10/9. Nackte Theile wie vorher. Long. 170; ala 80; cauda 80; rictus 18 Mm.

70. *Meristes olivaceus* (Vieill.)

241: ♀. Kipini 12/7. Iris gelb, Schnabel schwarz, Beine hellblaugrau. Länge 230, Flügel 110, Schwanz 105, Mundspalte 31 Mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

71. *Prionops graculinus* Cab.

312: ♀. Muniuni 16/9. Iris gelb; Schnabel orangeroth, an der Spitze gelb; Augenrand und Füsse lackroth. Long. 190; ala 117; cauda 87; rictus 25 Mm. — 335: ♂. Muniuni 29/9. Long. 200; ala 117; cauda 87; rictus 26 Mm.

72. *Prionops poliocephalus* (Stanl.)

382: ♀. Massa 4/11. Iris und Augenlidrand intensiv gelb, Schnabel braunschwarz, Füsse orange. Länge 180, Flügel 110, Schwanz 90, Mundspalte 25 Mm.

73. *Eurocephalus anguitimens* Smith.

357: ♀. Kibaradja 18/10. Iris braun, Schnabel schwarz, Füsse dunkelgraublau. Länge 210, Flügel 120, Schwanz 105, Mundspalte 24 Mm.

74. *Telephonus erythropterus* (Shaw).

225: ♀. Mambrui 22/6. Iris braun, Schnabel schwarz, Füsse hellbleifarben. Long. 200; ala 80; cauda 90; rictus 20 Mm.

75. *Lanius caudatus* Cab.

409: ♀. Kipini 15/12. Iris braun, Schnabel und Füsse schwarz. Long. 265; ala 110; cauda 160; rictus 25 Mm.

76. *Lanius phoenicuroides* Sev.

408: ♀. Kipini 15/12. Iris braun, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels hornbraun, Rand des Oberschnabels und Unterschnabel hornweisslich, Beine braun. Länge 175, Flügel 90, Schwanz 83, Mundspalte 21 Mm.

FAM. *LIOTRICHIDAE.*

77. *Crateropus rubiginosus* Rüpp.

294: ♂. Kau 15/8. Iris gelb. Schnabel und Beine hornfahlbräunlich. Länge 220, Flügel 85, Schwanz 110, Mundspalte 21 Mm.

78. *Turdirostris leptorhyncha* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 155.

405: ♂. Tschara 9/12. Iris gelbbraun. Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel hornfahl, Beine graubraun. Länge 140, Flügel 60, Schwanz 60, Mundspalte 20 Mm.

FAM. *CINNYRIDAE.*

79. *Cinnyris Longuemarii* Less.

387: ♂. Massa 5/11. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 115, Flügel 64, Schwanz 50, Mundspalte 17 Mm. — 388: ♀. Massa 5/11. Länge 100, Flügel 55, Schwanz 40, Mundspalte 16 Mm.

80. *Cinnyris Jardinei* (Verr.).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

179: ♂. jun. Malindi 2/6. Iris braun. Länge 90, Flügel 50, Schwanz 35, Mundspalte 17 Mm. — 178: ♀. Malindi 1/6. Iris braun. Länge 95, Flügel 53, Schwanz 35, Mundspalte 18 Mm.

81. *Cinnyris Kalckreuthi* Cab.

290: ♂. Tschara 14/8. Iris dunkel. Länge 120, Flügel 61, Schwanz 42, Mundspalte 22 Mm. — 229: Mambrui 23/6. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 115, Flügel 62, Schwanz 43, Mundspalte 24 Mm. — 230: Mambrui 23/6. Länge 102, Flügel 55, Schwanz 38, Mundspalte 22 Mm.

82. *Cinnyris gutturalis* L.

168: ♀. Sansibar 10/5. Iris braun, Schnabel und Füsse schwarz. Länge 110, Flügel 62, Schwanz 40, Mundspalte 22 Mm.

FAM. *DICRURIDAE.*

83. *Dicrurus Ludwigi* Sm.

336: ♀. Muniuni 29/9. Iris roth, Schnabel und Beine schwarz. Länge 165, Flügel 100, Schwanz 85, Mundspalte 24 Mm.

FAM. *BRACHYPODIDAE.*

84. *Andropadus flavescens* Hartl.

189: ♂. Malindi 4/6. Iris gelb, Schnabel und Beine schwarz. Länge 170, Flügel 78, Schwanz 78, Mundspalte 20 Mm. — 181: ♀. Malindi 2/6. Iris gelb. Länge 165, Flügel 83, Schwanz 80, Mundspalte 20 Mm.

85. *Criniger Fischeri* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 139.

322: ♂. Muniuni 20/9. Iris weisslich, Schnabel dunkelbraun, Beine bleifarben. Länge 190, Flügel 79, Schwanz 90, Mundspalte 24 Mm.

86. *Criniger strepitans* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 139.

192: ♂. Malindi 5/6. Iris röthlichbraun, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels dunkelbraun, Basis des Unterschnabels hornfahlbläulich, Beine graublau. Länge 170, Flügel 80, Schwanz 85, Mundspalte 23 Mm. — 191: ♂. Malindi 5/6. Länge 165, Flügel 77, Schwanz 82, Mundspalte 22 Mm.

87. *Criniger flaviventris* (Smith.).

316: ♂. Muniuni 17/9. Iris rothbraun, Oberschnabel und Spitzenhälfte des Unterschnabels hornbraun, Basishälfte des Unterschnabels dunkelblaugrau, Beine dunkelbleifarben. Länge 215, Flügel 106, Schwanz 95, Mundspalte 23 Mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

FAM. *MELIPHAGIDAE.*

88. *Zosterops tenella* Hartl.

269: ♂. Kipini 29/7. Iris hellbräunlichgelb, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels dunkelbraun, Basistheil des Unterschnabels graublau, Beine bleifarben. Länge 100, Flügel 52, Schwanz 38, Mundspalte 12 Mm. — 298: ♂. Tschara 24/8. Iris gelblichbraun, Schnabel dunkelbraun, Basis des Unterschnabels weisslich, Beine bleifarben. Länge 90, Flügel 52, Schwanz 37, Mundspalte 12 Mm.

FAM. *STURNIDAE.*

89. *Speculipastor bicolor* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 120.

238: ♂. Kipini 11/7. Iris orange, Schnabel und Beine schwarz. Länge 204, Flügel 115, Schwanz 85, Mundspalte 21 Mm. — 240: ♀. Kipini 11/7. Iris orange. Länge 185, Flügel 105, Schwanz 75, Mundspalte 21 Mm. — 239: ♀. Kipini 11/7. Länge 180 Mm.

90. *Cosmopsarus regius* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 120.

373: ♂. Massa 2/11. Iris weiss, Schnabel und Beine schwarz, Länge 350, Flügel 130, Schwanz 210, Lauf 30 Mm.

91. *Lamprotornis porphyropterus* Rüpp.

367: ♂. Ualimi 25/10. Iris blassgelb, Schnabel und Beine schwarz. Länge 290, Flügel 155, Schwanz 146, Mundspalte 28 Mm.

92. *Lamprocolius melanogaster* (Sw.).

165: ♂. Bagamoja 25/4. Iris graubraun, Schnabel und Füsse schwarz. Länge 170, Flügel 101, Schwanz 68, Mundspalte 22 Mm. — 268: ♂. Kipini 28/7. Iris intensiv gelb, Schnabel und Füsse schwarz. Länge 190, Flügel 110, Schwanz 83, Mundspalte 20 Mm.

FAM. *ORIOLIDAE.*

93. *Oriolus Rolleti* Salv.

278: ♂. Kau 9/8. Iris carminroth, Schnabel braunroth, Beine bleifarben. Länge 210, Flügel 120, Schwanz 83, Mundspalte 36 Mm.

94. *Oriolus notatus* Pet.

223: ♂. jun. Mambrui 22/6. Iris carminroth, Schnabel röthlichbraun, Füsse bleifarben. Länge 210, Flügel 137, Schwanz 90, Mundspalte 30 Mm.

FAM. *PLOCEIDAE.*

95. *Hyphantornis nigriceps* Lay.

251: ♀. Kipini 21/7. Iris bräunlichgelb, Oberschnabel braun, Unterschnabel fahlbläulich, Beine hornbraun. Länge 150, Flügel

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

80, Schwanz 50, Mundspalte 18 Mm. — 252: ♂ jun. Kipini 21/7. Iris röthlich, Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel fahlbläulich, Beine fahlbräunlich. Länge 150 Mm. — 398: ♂. Mitole 18/11. Iris röthlich, Beine hellhornbraun. Länge 150, Flügel 83, Schwanz 55, Mundspalte 19 Mm.

96. *Hyphantornis Bojeri* Hart. et F.

347: ♂. Muniuni 8/10. Iris gelbroth, Schnabel schwarz, Füsse dunkelfleischfarben. Länge 130, Flügel 78, Schwanz 50, Mundspalte 17 Mm. — 204: ♂. Malindi 8/6. Iris röthlich, Schnabel schwarz, Füsse fahlbräunlich. Länge 140, Flügel 75, Schwanz 55, Mundspalte 16 Mm. — 174: ♂ juv. Malindi 31/5. Iris braun, Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel blassgelblich, Füsse fahl. Länge 130, Flügel 68, Schwanz 54, Mundspalte 16 Mm.

97. *Hyphanturgus ocularius* (Smith).

188: ♀. Malindi 4/6. Iris gelb, Schnabel schwarz, Füsse bleifarben. Länge 145, Flügel 70, Schwanz 59, Mundspalte 18 Mm. — 295; ♀. Tschara 16/8. Iris blassgelb, Schnabel schwarz, Füsse bleifarben. Länge 140, Flügel 67, Schwanz 55, Mundspalte 19 Mm.

98. *Hyphanturgus nigricollis* (Vieill.).

250: ♂. Kipini 21/7. Iris roth, Schnabel schwarz, Füsse hornbräunlich. Länge 140, Flügel 75, Schwanz 55, Mundspalte 19 Mm. — 249: ♂. Kipini 21/7. Iris roth. Länge 140, Flügel 78, Schwanz 58, Mundspalte 17 Mm. — 182: ♀. Malindi 3/6. Iris bräunlichroth, Schnabel schwarz, Füsse fahl. Länge 130, Flügel 70, Schwanz 55, Mundspalte 18 Mm. — 201: ♀. Malindi 7/6. Iris bräunlichroth, Schnabel schwarz, Beine fahlbläulich. Länge 135, Flügel 70, Schwanz 55, Mundspalte 16 Mm. — 248: ♂. Kipini 19/7. Iris roth, Schnabel schwarz, Beine fahlbraun. Länge 145, Flügel 75, Schwanz 56, Mundspalte 17 Mm. — 246: ♀. Kipini 16/7. Iris röthlich, Beine fahlbraun. Länge 140, Flügel 72, Schwanz 55, Mundspalte 17 Mm. Nach den Beobachtungen von Dr. Fischer ist *H. melanoxanthus* Cab. das ♀. von *H. nigricollis*. Vergl. Briefliche Berichte IV. (J. f. O. p. 280).

99. *Sycobrotus Kersteni* Hartl. et F.

307: ♂. Engatana 9/9. Iris braun, Schnabel bläulichweiss, Beine hornfahl. Länge 145, Flügel 87, Schwanz 57, Mundspalte 20 Mm. — 349: ♀. Muniuni 9/10. Iris röthlichbraun, Schnabel bläulichweiss, Beine hornfahl. Länge 145, Flügel 83, Schwanz 55, Mundspalte 20 Mm. — 345: ♀. Muniuni 5/10. Iris braun, Schnabel bläulichweiss, Beine hornfahl. Länge 140, Flügel 85, Schwanz 56,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mundspalte 19 Mm. — 350: ♂. Muniuni 9/10. Iris röthlichbraun, Schnabel bläulichweiss, Füsse hornfahl. Länge 155, Flügel 89, Schwanz 58, Mundspalte 20 Mm. Iris roth, Schnabel blassblau, Schneidenränder heller, Beine blassfleischfarben. Länge 150.

100. *Textor Dinemelli* Horsf.

354: ♂. Ndera 14/10. Iris braun, Schnabel braunschwarz, nackte Haut um's Auge schwarz. Länge 180, Flügel 105, Schwanz 70, Mundspalte 21 Mm. — 353: ♀. Ndera 14/10. Iris braun, Schnabel dunkelbraunschwarz, nackte Haut um's Auge schwarz, Füsse braunschwarz. Länge 175, Flügel 105, Schwanz 75, Mundspalte 21 Mm.

101. *Euplectes flammiceps* (Sw.).

173: ♀. Malindi 30/5. Iris braun, Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel fahlbräunlich, Füsse hornbraun. Länge 120, Flügel 65, Schwanz 35, Mundspalte 15 Mm. — 185: ♀. Malindi 3/6. Flügel 67, Schwanz 43, Mundspalte 16 Mm.

102. *Orynx xanthomelas* (Rüpp.).

164: ♂. Bagamojo 24/4. Iris braun, Oberschnabel schwarz, Unterschnabel weiss, Füsse röthlichschwarz. Länge 120, Flügel 65, Schwanz 53, Mundspalte 15 Mm.

103. *Penthetria axillaris* (Lin.).

289: ♀. Tschara 24/8. Iris dunkelbraun, Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel fahl, Beine braun. Länge 150, Flügel 78, Schwanz 55, Mundspalte 16 Mm. — 334: ♂ juv. Muniuni 27/9. Iris braun, Schnabel bläulichweiss, Beine schwarz. Länge 155 Mm.

306: ♂. Engatana 8/9. Iris braun, Schnabel bläulichweiss, Füsse schwarz. Länge 165, Flügel 90, Schwanz 68, Mundspalte 14 Mm. — 288: ♂. Tschara 14/8. Iris dunkebraun. Länge 155, Flügel 82, Schwanz 65, Mundspalte 14 Mm. — 399: ♂ juv. Mitole 19/11. Iris braun, Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel hornfahl, Füsse bräunlich. Länge 145 Mm.

104. *Vidua principalis* Lin.

228: ♀. Mambrui 23/6. Iris braun, Schnabel bräunlichroth, Füsse braunschwarz. Länge 105, Flügel 63, Schwanz 48, Mundspalte 8 Mm.

105. *Vidua Verreauxi* Cass.

359: ♂. Kibaradja 19/10. Iris braun, Schnabel und Füsse schwarz. Länge 235, Flügel 77, kurze Schwanzfedern 57, lange Schwanzfedern 170, Mundspalte 12 Mm. — 395: ♂. Kibaradja 12/11. Iris braun, Beine graubraun, Schnabel schwarz. Länge 380, mitt-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

lere Schwanzfedern 310, seitliche 52, Flügel 75, Mundspalte 10 Mm.

106. *Vidua splendens* n. sp.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 180.

396: ♂. Kibaradja 12/11. Iris braun, Schnabel blassfleischfarben, Beine bräunlich. Länge 250, Flügel 60, mittlere Schwanzfedern 200, seitliche 40, Mundspalte 10 Mm.

107. *Hyphantica quelea* (Lin.).

397: ♂. Mitole 18/11. Iris braun, Schnabel dunkelcarminroth, Augenlidrand orange, Beine blassfleischfarben. Länge 120, Flügel 65, Schwanz 40, Mundspalte 13 Mm. — 219: ♂ juv. Malindi 7/6. Iris braun, Schnabel dunkelroth, Füsse hellröthlichbraun. Länge 110, Flügel 68, Schwanz 38, Mundspalte 13 Mm.

108. *Hyphantica aethiopica* (Sund.).

389: ♂. Massa 10/11. Iris braun, Augenlidrand orange, Schnabel dunkelcarminroth mit orangefarbener Spitze, Füsse blassröthlichbraun. Länge 110, Flügel 65, Schwanz 40, Mundspalte 13 Mm. — 253: ♂. Kipini 21/7. Iris bräunlichgelb, Augenlidrand korallroth, Schnabel blutroth, Füsse röthlichgelb. Länge 105, Flügel 68, Schwanz 45, Mundspalte 14 Mm.

109. *Hyphantica erythrops* (Hartl.).

370: ♂. Ualimi 27/10. Iris braun, Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel hornfahl, Spitze bräunlich, Beine hornbräunlich. Länge 110, Flügel 62, Schwanz 33, Mundspalte 13 Mm.

FAM. *SPERMESTIDAE.*

110. *Amaurestes fringilloides* (Lafr.).

27: ♂. Sansibar 13/4. 77. Iris bräunlichroth, Oberschnabel dunkelbraunschwarz, Unterschnabel horngraublau mit dunklerem Rande und Spitze, Beine hornschwärzlich.

111. *Pytelia citerior* Strickl.

374: ♂. Massa 2/11. Iris gelblichroth, Schnabel korallroth, Füsse fahlbräunlich. Länge 125, Flügel 58, Schwanz 52, Mundspalte 14 Mm.

112. *Lagonosticta minima* (Vieill.).

175: ♂. Malindi 31/5. Iris röthlichbraun, Schnabel carminröthlich, Ränder und Mittellinie schwarz, Füsse hornbraun. Länge 95, Flügel 45, Schwanz 34, Mundspalte 9 Mm.

113. *Pitylia caniceps* n. sp.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 139.

385: ♂. Massa 5/11. Iris braun, Oberschnabel dunkelschiefer-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

farben, Unterschnabel hellgraublau, Beine braunschwarz. Länge 110, Flügel 55, Schwanz 45, Mundspalte 8 Mm.

114. *Uraeginthus ianthinogaster* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 120.

378: ♂. Massa 3/11. Iris roth, Schnabel korallroth, Augenlidrand hell ledergelb, Beine grauschwarz. Länge 120, Flügel 53, Schwanz 62, Mundspalte 10 Mm. — 377: ♀. Massa 3/11. Iris roth, Augenlidrand hellledergelb, Schnabel blasskorallroth, Beine grauschwarz. Länge 110, Flügel 52, Schwanz 60, Mundspalte 9 Mm.

115. *Pyrenestes unicolor* Fisch. et Rchw.

384: ♀. Massa 5/11. Iris braun, Schnabel grünlichgelb, Firste und Spitze braun, Füsse schwarz. Länge 145, Flügel 80, Mundspalte 15, Schwanz 58 Mm. Von dem Weibchen des südlichen *Pyrenestes albifrons* unterscheidet sich das vorliegende durch ein dunkleres Braun der Oberseite und dunklere, braunschwarze, bei jenem heller braune Strichel der Unterseite.

FAM. *FRINGILLIDAE.*

116. *Crithagra chloropsis* Cab.

158: ♂. Sansibar 20/3. Iris graubraun, Schnabel schwärzlich, Unterschnabel und Basis des Oberschnabels hornfahl, Füsse fahlbläulich. Länge 100, Flügel 65, Schwanz 41, Mundspalte 11 Mm.

117. *Xanthodira pyrgita* Heugl.

392: ♀. Kibaradja 12/11. Iris graubraun, Schnabel bräunlichgrau. Länge 130, Flügel 76, Schwanz 53, Mundspalte 14 Mm.

FAM. *EMBERIZIDAE.*

118. *Polymitra flavigastra* (Rüpp.)

375: ♀. Massa 2/11. Iris braun, Oberschnabel hornbraun, Rand desselben und Unterschnabel hornfahl, Beine hornfahl. Länge 125, Flügel 70, Schwanz 67, Mundspalte 11 Mm.

FAM. *ALAUDIDAE.*

119. *Coraphites leucotis* (Stanl.).

199: ♂. Malindi 7/6. Iris braun, Schnabel fahlbräunlich, Füsse fahl. Länge 120, Flügel 80, Schwanz 17, Mundspalte 14 Mm.

120. *Alauda poecilosterna* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 155.

394: ♂. Kibaradja 12/11. Iris hellgraugelb, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels hornbraun, Unterschnabel weisslichgrau, Füsse hornfahl. Länge 145, Flügel 87, Schwanz 68, Mundspalte 18 Mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

121. *Spilocorydon hypermetrus* n. sp.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 155.

361: ♂. Kibaradja 23/10. Iris hellbraun, Oberschnabel braun, Unterschnabel und Rand des Oberschnabels nicht ganz bis zur Spitze hornweisslich, Spitze des Unterschnabels bräunlich, Füsse fahl. Länge 205, Flügel 110, Schwanz 80, Mundspalte 26 Mm.

FAM. *SYLVIADAE.*

122: *Cisticola haematocephala* Cab.

180: ♂. Malindi 2/6. Iris gelbbraun, Oberschnabel und Rand des Unterschnabels braunschwarz, Unterschnabel hornfahlbläulich, Beine hornfahl. Länge 125, Flügel 54, Schwanz 54, Mundspalte 17 Mm. — 218: ♂. Malindi 17/6. Länge 134, Flügel 55, Schwanz 53, Mundspalte 18 Mm. — 177: ♂. Malindi 1/6. Iris gelbbraun, Flügel 50, Schwanz 58, Mundspalte 17 Mm.

123. *Cisticola tenella* Cab.

259: ♂. Kipini 26/7. Iris hellbräunlichgelb, Schnabel schwarz, Beine hornfahl. Länge 115, Flügel 48, Schwanz 50, Mundspalte 15 Mm.

124. *Apalis chariessa* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 120.

310: ♂. Mitole 13/9. Iris gelbbraun, Schnabel schwarz, Beine blassfleischfarben. Länge 110, Flügel 47, Schwanz 50, Mundspalte 13 Mm. — 400: ♂. Mitole 19/11. Iris gelbbraun, Beine hellgelblichbraun. Länge 125.

125. *Camaroptera brevicaudata* (Rüpp.)

344: ♂. Muniuni 5/10. Iris bräunlich gelb, Schnabel braunschwarz, Basis des Unterschnabels in's Graublaue, Beine hornbräunlich. Länge 95, Flügel 54, Schwanz 29, Mundspalte 16 Mm.

126. *Camaroptera olivacea* Sund.

411: ♂. Sansibar 2/10. Iris hellgelbbraun, schmaler Augenrand hellledergelb, Schnabel braunschwarz, Beine fleischfarben. Länge 110, Flügel 54, Schwanz 41, Mundspalte 17 Mm.

127. *Bradypterus brachypterus* (Vieill.)

287: ♂. Tschara 14/8. Iris gelblichbraun, Oberschnabel dunkelhornbraun, Unterschnabel horngraublau, Beine bräunlich. Länge 140, Flügel 55, Schwanz 60, Mundspalte 18 Mm. — Das Nest hat die Form unserer Schilfsänger-Nester, ist aus Schilfgras fest gebaut, mit sehr tiefer Mulde, in die Innenseite sind einige Federn eingewebt. Die Eier sind auf weissem Grunde ziemlich dicht weiss gefleckt und messen 19 und 14 Mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

128. *Sylviella leucopsis* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 120.

174a: ♂. Malindi 31/5. Iris gelbbraun, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels hornbraun, Unterschnabel hornfahlbräunlich, Beine hornfahl. Länge 90, Flügel 53, Schwanz 27, Mundspalte 15 Mm. — 365: ♂. Kibaradja 23/10. Länge 80 Mm.

129. *Aëdon psammochroa* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 139.

386: ♀. Massa 5/11. Iris braun, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels hornbraun, Unterschnabel blass, Beine hornbräunlich. Länge 145, Flügel 78, Schwanz 64, Mundspalte 20 Mm.

130. *Thamnobia quadrivirgata* sp. n.

Ornith. Centralbl. 1879 p. 170.

263: ♂. Kipini 27/7. Iris braun, Schnabel schwarz, Beine hornweisslich. Länge 155, Flügel 80, Schwanz 70, Mundspalte 18 Mm. — 267: ♂. Kipini 28/7. Iris braun, Schnabel schwarz, Beine blass graublau. Länge 150, Flügel 77, Schwanz 73, Mundspalte 19 Mm.

FAM. *SYLVICOLIDAE.*

131. *Motacilla vidua* Sund.

313: ♂. Muniuni 17/9. Iris braun, Schnabel und Füsse schwarz. Länge 180, Flügel 91, Schwanz 97, Mundspalte 20 Mm.

132. *Anthus Raalteni* Temm.

221: ♀. Mambrui 21/6. Iris braun, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels hornbraun, Unterschnabel und Rand des Oberschnabels fahlgelb. Länge 144, Flügel 80, Schwanz 60 Mm.

133. *Macronyx croceus* (Vieill.)

235: ♂. Gelidja 29/6. Iris braun, Oberschnabel hornbraun, Rand des Oberschnabels und Unterschnabel hornblau, Beine hornfahl. Länge 170, Flügel 85, Schwanz 65, Mundspalte 22 Mm.

134. *Macronyx tenellus* Cab.

364: ♂. Kibaradja 23/10. Iris braun, Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel graublau, Beine gelblichgrau. Länge 135, Flügel 82, Schwanz 54, Mundspalte 18 Mm.

FAM. *RHACNEMIDIDAE.*

135. *Petrocincla saxatilis* (L.)

412: ♂. Bagamojo 20/11. Iris braun, Schnabel braunschwarz, Basishälfte des Unterschnabels grau, Beine grün. Länge 175, Flügel 120, Schwanz 65, Mundspalte 25 Mm.

136. *Campicola pileata* Gm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

163: ♂. Bagamojo 23/4. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 140, Flügel 90, Schwanz 60, Mundspalte 22 Mm.

137. *Saxicola isabellina* Rüpp.

407: ♂. Kipini 15/12. Iris braun, Schnabel und Beine schwarz. Länge 145, Flügel 102, Schwanz 60, Mundspalte 21 Mm.

138. *Cichladusa guttata* (Heugl.)

285: ♀. Kau 11/8. Iris braun, Schnabel und Beine hornbraun. Länge 150, Flügel 74, Schwanz 73, Mundspalte 20 Mm. — 200: ♀. Malindi 7/6. Länge 150 Mm.

139. *Bessornis Heuglini* (Hartl.)

262: ♂. Kipini 26/7. Iris braun, Schnabel schwarz, Beine hornbraun. Länge 180, Flügel 88, Schwanz 80, Mundspalte 21 Mm.

140. *Bessornis natalensis* (Smith.)

198: ♀. Malindi 7/6. Iris braun, Schnabel schwarz, Beine hornbräunlich. Länge 160, Flügel 88, Schwanz 73, Mundspalte 22 Mm. — 213: ♀. Malindi 16/6. Länge 150, Flügel 87, Schwanz 72, Mundspalte 21 Mm. — 216: ♂. Malindi 17/6. Länge 155, Flügel 93, Schwanz 76, Mundspalte 21 Mm. — 193: ♀. Malindi 5/6. Länge 155, Flügel 87, Schwanz 68, Mundspalte 21 Mm.

141: *Turdus guttatus* Vig.

266: ♂. Kipini 28/7. Iris braun, Oberschnabel und Spitze des Unterschnabels hornbraun, Unterschnabel hornweisslich, Beine fahl. Länge 190, Flügel 110, Schwanz 85, Mundspalte 28 Mm. 265: ♀. Kipini 28/5. Iris braun, Oberschnabel und Spitzentheil des Unterschnabels hornbraun, Basistheil des letzteren hornweisslich wie die Beine. Länge 183, Flügel 108, Schwanz 80, Mundspalte 25 Mm.

┼ Nest und Ei von *Rhynchocyclus cinereiceps* Sclat.

Vor Kurzem erhielt ich unter einer Sendung Eier und Nester aus Chiriqui (Centralamerika) auch eins mit einem Ei und Vogelfragmenten, die Herr Professor Cabanis als obiger Species zugehörig bestimmte.

Das beutelförmige Nest hängt an der Spitze eines Zweiges (wie ich errathe einer Magnolia) und ist so fest geflochten, dass der Zweig, an dem noch die schönen grossen Blätter sitzen, nur mit Gewalt losgerissen werden könnte. Es besteht aus einer hohlen Kugel und einer ansitzenden Flugröhre, durch die man indess in

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1. 2 Uraeginthus ianthinogaster . 3. Pitylia caniceps
4. Euplectes diadematus.

Gez. von A. Metzel Kunstanstalt v. Böhm Berlin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Journal für Ornithologie

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: 27_1879

Autor(en)/Author(s): Fischer Gustav Adolf, Reichenow Anton

Artikel/Article: Uebersicht der von Dr. G. A. Fischer auf einer zweiten Reise durch das ostafricanische Küstenland von Mombassa bis Wito und am Tana-Fluss gesammelten Vögel. 337-356