

JOURNAL
für
ORNITHOLOGIE.
Zweiter Jahrgang.

Nº 7.

Januar.

1854.

Versuch einer synoptischen Ornithologie Westafrica's.

Von

Dr. G. Hartlaub.

(Fortsetzung von Jahrgang I. S. 385 — 400.)

Coracias Lin. (Fortsetz.)

63. *pilosus* Lath. Supra olivaceus, pileo colloque postico vinaceis; fronte superciliis, nuchaeque macula transversa albis; alae tectricibus vinaceis, flexura potius laete lilacina, ala spuria remigibusque ultramarinis; uropygio corporeaque subtus vinaceis, hoc albo striato; tectric. caudae super., rectricibusque lateralibus saturate ultramarinis, 2 intermediis olivaceis. Long. 13".

Syn. *C. crinita* Shaw. — *C. nuchalis* Swains. West Afr. II., p. 110. — *C. Levaillantii* Rüpp. — Levaill. Roll. pl. 28, 29. — Alex Exped. of discov. II., p. 264, c fig. — Reichenb. t. 433.

Hab. Senegambia. — Angola: Andersson. — O. M.

64. *cyanogaster* Cuv. Saturate et pulchre coeruleus; capite, collo pectoraque pallide isabellinis; remigum dimidio basali caudaque profunde tureata thalassiniis; rectric. 2 extimis valde elongatis et angustatis; interscapulio nigro. Long. 13".

Syn. Rollier à ventre bleu Lev. Roll. t. 26. — *Galgulus cyanog.* Vieill. N. D. 29, p. 436 — Wagl. Syst. Av. Corac. sp. 6. — Jard. Selb. Illustr. t. 123. — Swains. West. Afr. II., p. 108, pl. 13. — Reichenb. Tab. 432, Fig. 3183—84.

Hab. Gambia: Mus. Brem. etc.

d. **ALCEDINIDAE.**

Haleyon Sw.

65. *striolata* (Ill.) Supra griseo-brunneosens, insco striolata, torque ab oculis circa nucham ducta nigricante, subtus albido marginata; uropygio et tergo thalassiniis; alis et cauda coerulecentibus; subtus

alba, pectore fusco striolato; rostro rubro, maxilla nigricante. Long. $6\frac{1}{2}$ ".

Syn. Licht. Doubl. Verz. p. 12. — *H. variegata* Vieill. Encycl. p. 397. — Libyan Kingsfisher Lath. Gen. Hist. IV. p. 32. — Jard. Contrib. 1852, part. 3. — *Chelicutia striolata* Reichenb. Alced. p. 39.

Hab. Senegambia. — Abomey (Gold-Küste): Fras. — M. (Natal: Verr.)

66. *cyanoleuca* (Vieill.) Capite, collo, dorso cauda et alis virescentes cyaneis; stria ad oris angulum orta infraoculari nigra; tectricibus alarum minoribus et mediis nigerrimis; gula, collo laterali, pectore ventreque albis, vix conspicue vermiculatis; maxilla rubra, mandibula nigra. Long. 9".

Syn. Martin pêcheur à ventre sablé, Temm. Catal. system. 1817, pag. 215. — Vieill. Encyclop. p. 401. — Id. N. Dict. vol. 19, p. 401. Hab. Angola.

67. *cinereifrons* (Vieill.) Pileo circumscripte cinerascente; pectore, collo postico, interscapulio uropygio candaque supra unicolora laete cyaneo-virescentibus; area per oculos, dorso medio, alis ex parte candaque subtus nigris; subtus alba; maxilla rubra, mandibula nigra. Long. $10-11\frac{1}{2}$ ".

Syn. Vieill. Encycl. p. 395. — *H. torquata* Swains. West. Afr. II. p. 99. — *Alc. malimbica* Shaw. — Black-winged Kingsfisher, Lath. G. H. IV., p. 20. — Verr. Rev. et Mag. 1851, p. 265. — Hartl. Beitr. z. Ornith. Westafr. p. 45. (descript. ♂) — *Halc. malimb.* Cassin Catal. Halcyonid. Mus. Philad. — Sundev. Oefvers. 1849, S. 162.

Hab. Gambia: Sw., Mus. Brem. etc. — Bonny-river: Jard. — Malimbe: Perrein. — Sierra Leone: Afzel. — Gaboon: Vrr. — Rio de Bontry: Mus. Philad. — Fernando Po: Fras. — M. (eNatal: Mus. Philad.)

68. *Dryas* Hartl. Simillima praecedenti; differt: rostro toto rubro, mandibula obscuriore; pileo magis fuscescente, collum posticum versus sensim viridiore; area nigra per oculum latiore; torque pectorali intensius tincto, plumarum dimidio basali cinereo-nigricante; abdomine sordide cinerascente lavato, cyaneo-virescente mixto, subcaudalibus distincte cyanescensibus; rectricibus apice et margine interno late et distincte nigris, extima fere tota nigra, scapis latius et distinctius nigris. Long. $11\frac{1}{2}$ ".

Syn. Hartl. Cab. Journ. für Ornith. II. Jahrg., p.

Hab. Ilha do Príncipe; St. Thomé: Weiss in Mus. Hamburg.

69. *senegalensis* (Lin.) Supra dilute cyanea, pileo cinerascente; macula inter rostrum et oculum nigra; tectricibus alar. remigumque parte apicali nigris; subtus alba, pectore, colli lateribus et hypochondriis minutissime cinerascente punctulatis et lineolatis; maxilla rubra, mandib. nigra. Long. 8 $8\frac{1}{2}$ ".

Syn. L. I. 180. — *Ispida senegal. major* Briss IV., 144. t. 40, fig. 1. — Enl. 594. — Swains. Zool. Illustr. t. 27. — Sw. West. Afr. II., p. 97. — Verr. Rev. et Mg. 51, p. 266. — Jard. Ann. Mag. 17, p. 85 — Bowd. Exc. p. 228.

Hab. Senegambia. — Bonny-river: Jard. — Niger: Thoms. All. Exp. I., p. 167. — Gaboon: Verr.

70. cancrophaga (Lath.) Supra thalassino-cyanæa, pileo obscure cinerascente; macula inter rictum et oculum nigra; subtus ex toto pallide rufescens: maxilla rubra; remigum apicibus tectricibusque alarum nigris. Long. 12".

Syn. Lath. Ind. O. I., 249. — Pl. ent. 334. — *H. senegal. var. a* Vieill. Enc. p. 283. — Rehb. tab. 402, fig. 3036. — Hab. Senegal.

71. badia Verr. Supra rufo-badia; uropygio nitide azureo; subtus alba, hypochondriis rufis; cauda supra caerulea, nigro terminata: remigibus nigris; speculo alarum azureo; rostro rubro. Long. 7" 5".

Syn. Verr. Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 264. — Strickl., Jard. Contrib. 1851. Descript. p. 134.

Hab. Gaboon.

72. ruficenter Swains. Supra dilute caerulea; alae tectricibus, interscapulio, remig. tertiaris et primariarum apicibus nigris; subtus alba, abdomine imo, hypochondriis et subalaribus rufis; pileo et capitis lateribus pallide griseoscentibus; rostro pedibusque rubris. Long. 8³/₄".

Syn. Swains. West. Afr. II., p. 101, pl. 12. — *H. Actaeon* Less. Tr. p. 247? — Pl. ent. 356. *A. senegalensis*, var. ♂ Gm. — *A. erythrogaster* Temm. Tabl. méth. p. 75. — Black-backed Kingfisher, Lath. G. II. IV. p. 32. — *H. erythrorhyncha* Gould, Zool. Beagle, Birds p. 41. — *A. cancrophaga* Forst. Descr. p. 4.

Hab. Gambia: Sw., Senegal, Goree: Mus. Brit. — Sierra Leone: Mus. Bremi. — Angola: Henderson in Mus. Philad. — Ins. St. Jago: Forst., Darwin, etc. — O. (Fazogl: Mus. Phil.)

Alcedo L.

73. quadribrachys Temm. Corpore supra, genis et colli lateribus saturate caeruleis; pileo nigro fasciolato: loris, macula parotica et gula pallide fulvis; subtus ferruginea; rostro nigro, pedibus rubris. Long. 6" 5". Jun. pectora caeruleente tincto.

Syn. Bonap. Conspl. p. 158. — Strickl. Contrib. 1851 pl. 79, fig. opt. — Verr. Rev. et Mag. 1851, p. 267.

Hab. Guinea: Mus. Lugd. — Gaboon: Verr.

74. senegalensis (Briss.) Supra caeruleo-beryllina, fusco in dorso admixto; inferne fulva; capite et collo superiore obseure viridibus, viridi splendidiore punctulatis; dupliei utrinque macula in capite fulva; tectric. alar. superior obscure viridibus, viridi-heryllino punctatis; cauda subtus fusca, supra viridi-caerulea; rostro fusco; pedibus rubescentibus. Long. 6¹/₂".

Syn. *Ispida senegalensis* Briss. Ornith IV. p. 485, tab 39, fig. 4. Hab. Senegal: Adanson.

75. semitorquata Sw. Pileo etucha nigris, cyaneo fasciatis; dorso et alis viridi-caeruleis; gula et macula utrinque collari albidis; lateribus colli et pectoris nigro-caeruleoscentibus; uropygio cyaneo: cauda nigra, supra parellina; subtus ferruginea; rostro nigro, pedibus rubellis. Long. 7" 6".

- Syn. Swains. Zool. Illustr. pl. 151. — Rüpp. System. Uebers. Vög. t. 7. p. 20. — Reichenb. t. 395, fig. 3054 — 55.
- Hab. Westl. Africa: Capt. Sabine in Mus. Britann. Gray List Spec. II, p. 63. — M. O.
- 76. leucogastra* Fras. Pileo nigro et coeruleo fasciato; superciliis, capitis colli et corporis lateribus rufis; dorso splendide caeruleo; tectricibus alae caeruleo marginatis, alis et cauda lavatis; gula pectore abdomeque mediis albis; rostro pedibusque rubris. — Long. $5\frac{1}{2}$ ".
- Syn. Fraser Proceed. 1843, p. 4. — Id. Zool. typica, pl. 1. — Verr. Rev. et Mag. 1851, p. 268. — Allen, Thoms. Exped. Nig II, p. 503 — Kaup Famul. der Eisv. p. 15. — Reichenb. t. 395, fig. 3056.
- Hab. Fernando Po: Fraser. — Gaboon: Verr.
- 77. cyanotis* Swains. Pileo et nucha nigris, maculis cyaneis fasciatim notatis; capitis lateribus, regione parotica colloque lateralii et postico rufis, violaceo resplendentibus; dorso, scapularibus et supra-candalibus cyaneis; alis caudaque nigris, nitore nonnullo cyaneo; mento gulaque albis; pectore et abdome aurantiaco-rufis; rostro pedibusque rubris. Long. $4\frac{1}{2}$ ".
- Syn. Todier de Juida, Buff. Pl. ent. 783, fig. 1. — *Todus coeruleus*, auct. — *T. pictus* Bodd etc. — Swains. West. Afr. II, p. 103. — Bonap. Conspl. p. 159. — *Ispidina picta* (Kaup) Famul. der Eisv. p. 12. — Gray Gen. of Birds, t. 28 — *Aleyone coronata* Smith.
- Hab. Malimbe: Perrein. — Old Calabarfl.: Jard. Ann. Mag. 17, p. 85. — Elmina: Mus. Hamb. — Niger: Thoms. Exped. I, p. 203. — M. O. (Fazogl: Mus. Philad.) — Natal: Mus. Phil.
- 78. nitida* Kaup. Scapularibus dorsoque ultramarinis, plumarum marginibus nigris; remigibus fuliginosis, nigro limbatis; pectore ventreque dilute ferrugineis; alae tectricibus apice caeruleis, nigro terminatis; rostro nigro. Minima. Long. rostr. 23 — 26 Mm., al. 53 Mm., caud. 24 — 25 Mm.
- Syn. Kaup Famul. der Eisv. p. 12. — Reichenb. Alcedin. p. 6. — Bowdich Exc. Porto Santo etc. p. 228: *Alcedo* Nr. 4?
- Hab. West-Africa.
- 79. coeruleocephala* Gm. Cristae plumis 5 — 6" longis nigris, maculis nonnullis fasciaque anteapicali laete ultramarinis; dorso, alarum et caudae tectricibus cyaneis; scapularibus maculis apicalibus cyaneis, nigro marginatis; gula et macula ad colli latera albis, genis corporeque subtus ferrugineis; rostro pedibusque rubris. Long. 4" 10".
- Syn. Pl. ent 316, fig. 1. — Subgen. *Corythornis* Kaup, Famul. Eisv. p. 13. — Reichenb. Alcedin. p. 18, t. 397, fig. 3063. t. 303 b. fig. 3387. — *Alcedo cyanostigma* Rüpp. Av. jan.?
- Hab. Guinea. — Ins. St. Thomé: Weiss. Mus. Brem. Hamb. — O. (Fazogl: Mus. Philad.)
- 80. cristata* L. Supra in fundo nigricante cyaneo tincta; cristae plumis malachitaceo guttatis et fasciatis, 9 — 10" longis; gula maculaque ad colli latera albis; genis corporeque subtus fulvo-rufescentibus, rostro pedibusque rubris.

Syn. *Ispida philipp. cristata* Briss. Orn. IV 483. — L. I. 178. — Edw. pl. 336. — Eul. 756, fig. 1. — Kittl. Kupfert. 29, fig. 3. — Reichenb. Alcedin. p. 18, pl. 403, fig. 3176 — 77.

Hab. Gambia et „Saltpond near Cap Coast“: Bowd. Excurs. p. 228. (*Alcedo* Nr. 2). — Bonny-river: Jard. Ann. Mag. 17. p. 85. — M.

Ceryle Boie.

81. *rudis* (Lin.) Cristata; supra nigro alboque variegata; subtus alba; pectore in ♂ bicineto, in ♀ unicineto; collari nuchae albo. Long. 10 — 10 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. Briss. Orn. IV, 520. — L. I, 181. — Edw. pl. 9. — Eul. 716 ad. 62 jun. — *Ispida bicincta* Sw. West. Afr. II, p. 95. — Sundev. Oefvers. 1849, p. 161. — Allen Exped. Nig. 1, p. 203.

Hab. Gambia: Swains. Mus., Brem. etc. — Sierra Leone, Afzel. — Bonny-river: Jard. — Fernando Po; Niger: Thoms. Fras. Proc. 1843, p. 51. — Cap Coast: Gord. — M. O.

82. *tricolor* (Vieill.) Supra nigra; subtus alba; collo antico pectoreque fuscis; rostro atro. Long. 10".

Syn. *Alcedo tricolor* Vieill. Encyclop. 1, p. 398.

Hab. Senegal: Collect. Riocour. n. v.

83. *maxima* (Pall.) Cristata; supra schistaceo-nigricans, albo maculata; maculis interscapulii et dorsi parvis, rotundatis, uropygii et caudae transversis, majoribus; macula anteoculari, gula et colli lateribus albis; stria utrinque a rictu decurrente fasciaque pectorali e maculis rotundatis formata nigris; abdomine, hypochondriis et subcaudalibus rufis; rostro pedibusque nigris. Long. 1' 6", culmin. 2"⁹, gonyd. 1" 11", al. 7" 3", caud. 4" 5".

Syn. *Alcedo maxima* Pall., Gm., Lath., Spicil. VI, p. 15. — *A. afra* Shaw. — *A. guttata* Bodd. Reichenb. Alced. pag. 23, t. 409, fig. 3101 — 2.

Hab. Congo.

84. *gigantea* (Swains.) Diversa a praecedente: statura minore, coloribus omnino obscurioribus, maculis minoribus, sparsis, in pileo et interscapulio vix ells. Long. 1' 3" 6", culm. 3", gonyd. 2" 1", al. 7" 6", caud. 4" 6".

Syn. Eul. 679, p. 65. — *A. maxima* var. β Gm. — *Ispida gigantea* Swains. West. Afr. II, pl. 11, p. 93. (fig. av. jun.) — Reichenb. l. c. p. 23, t. 409, fig. 3103, t. 4096, fig. 3186.

Hab. Senegal: Verr. — Gambia: Mus. Brem.

e. MEROPIDAE.

Merops L.

85. *apiaster* L. Occipite nucha collo postico dorso alarumque tectricibus majoribus rufis; fronte albicans; uropygio fulvo; gula flava, nigro marginata; taenia oculari nigra; cauda olivascente-viridi, rectricibus 2 intermediis reliquis 1" longioribus; subtus laete viridicaerulezens; rostro nigro. Long. 10".

Syn. Levaill. Guép. pl. t. 2. — Expéd. Eg. Ois t. 4. 3. — Gould Birds of Eur. t. 59. — Rönnap Conspl. p. 160. — Reichenb. Merop. p. 61. — Swains. West. Afr. II, p. 76.

Hab. Senegambia: Swains. — Mus. Brem.: Bathurst. — S. O. (Moses-Brunnen bei Suez: Daubeny).

86. *Savignyi* Swains. Supra laete viridis, nitore flavescente; fronte albido, postice caerulescente, superciliis dilute cyaneis; taenia per oculos nigra, infra cyaneo marginata; mento flavo, gula saturate rufa; subtus laete caerulescente-viridis; alis caudaeque fulvo resplendentibus, rectricibus 2 mediis reliquis $2\frac{1}{4}$ " longioribus, apice nigricantibus. Long. $10\frac{1}{2}$ ".

Syn. Guépier Savigny, Levaill. pl. 6 bis. — Swains West. Afr. II, p. 77, pl. 7. — Bonap. Conspl. p. 161. — Reichenb. l. c. p. 65, pl. 444.

— *M. longicauda* Vieill. Encycl. p. 393. (Artef.)

Hab. Senegambia, Swains. Vaill. etc. — Malimbe, Perr.

87. *albicollis* Vieill. Supra viridis, nropygio, alis caudaeque caerulescentibus; vertice taenia oculari juguloque atris; fronte, superciliis gula ventreque albis; rectricibus 2 intermediis reliquis duplo longioribus, angustatis, apice nigris. Long. 10".

Syn. Le Guépier Cuvier, Vaill. pl. 9. — *M. superciliosus* var.

C. Lath. Gen. Hist. IV, 228. — *M. Savignyi* Swains. Zool. Illustr. ser. I, pl. 76. — *M. Cuvieri* Licht. Doubl. p. 13. — Sw. West. Afr. II, p. 85. — Vieill. Encycl. p. 393. — Bon. Conspl. p. 161. — Reichenb. l. c. p. 76, t. 449, fig. 3246 — 47.

Hab. Senegambia; Sierra Leone Old-Calabarfl. Jard. — Wineba: Mus. Hamb. — Angola: Henderson. — O. (Massowa: Daubeny; Sennaar: A. Brehm; Kordofan: Petherick etc.)

88. *Adansonii* (Lev.) Corpore supra cum alis et cauda castaneo; fronte, genis, colli lateribus corporeque inferiore toto beryllino-azureis; rectricibus 2 mediis caeleris duplo longioribus, angustatis, apice nigricantibus. Long. circa 10".

Syn. Guépier Adanson Levaill. pl. 13. — Pl. enl. 314. — *M. senegaleensis* Shaw. — Reichenb. l. c. p. 75, tab. 448, fig. 3243.

Hab. Senegal: Adanson.

89. *rariegatus* Vieill. Supra laete viridis; palpebra superiore cyanea; taenia per oculos nigra; gula flavissima, pulcherrime et late cyaneo infra marginata, pectore castaneo, corpore inferiore reliquo fulvescente; rectricibus lateralibus dilute cinnamomeis, fascia anteapicali lata nigra, ipso apice albido; mediis viridibus; cauda emarginata. Long. 6".

Syn. Vieill. Encycl. p. 390. — *M. cyanipectus* Verr. Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 269. — Strickl. Contrib. 1852, part. 6. — Reichenb. Merop. p. 71, pl. 446 b, fig. 3392 — 93. — Guépier Sonnini Levaill. t. 7 ?

Hab. Malimbe: Perr. — Gaboon: Verr.

90. *collaris* Vieill. „Supra brunnescente-viridis, gula laete citrina, torque lato nigro infra marginata; macula per oculos caudaeque taenia apicali nigris; subtus brunneo-olivaceus; remigibus et rectricibus basi pallide rufis; 6 (?) intermediis viridibus.“ Long. 5". Variegato simillimus sed multo minor.

Syn. Vieill. Encyclop. p. 393. — Kittl. Kupfert. 7, fig. 2. — Reichenb. l. c. p. 72.

Hab. Senegal: Vieill. — Kordofan: v. Kittl.

91. *hirundinaceus* Vieill. Laete viridis, abdomen imo, crisso, tectricibusque caudae super. et infer. caeruleis; gula flavissima, fascia laete cyanea marginata; taenia per oculos nigra; fronte caerulescente; remigibus cinnamomeis, apice nigris; cauda profunde furcata; rectricibus obscure viridibus, fascia anteapicali nigra, apice albicante. Long. 8" — 8½".

Syn. Vieill. Encycl. p. 392. — Le Vaill. Guép. pl. 8. — *M. tawa* Cuv. — *M. chrysolaimus* Jard. Selb Illustr. pl. 99. — Swains. West. Afr. II, p. 91, pl. 10. — *M. azuror* Less. Tr. p. 239. — *Mer. furcatus* Stanley, in Salt Trav. app., Nr. 18. — Bonap. Conspl. p. 163. — Reichenb. Merop. p. 69, t. 446, fig. 3235 — 36.

Hab. Senegal: Sw. — Gambia, Sierra Leone: Fergusson. Mus. Brem. — Damara-Gegend: Anderson. M. O.

92. *erythropterus* Gm. Supra viridis, nitore flavescente; taenia oculari nigra; gula flava, torque jugulari nigerrimo, pectore castaneo, abdome fulvo-virescente; remigibus prim. et secund. ferrugineis, apice nigris; rectricibus lateralibus simili modo pictis; cauda emarginata. Long. vix 6".

Syn. Buff. Enl. 318. — Levaill. Guép. pl. 17. — Lath. Gen. Hist. IV, pl. 70. — *M. minutus* Cav. Vieill. Encycl. p. 392. — Gen. *Melittophagus* Boie. — Bon. Conspl. p. 163. — Reichenb. Merop. p. 73, t. 447, fig. 3240 — 41. — Temm. Catal. méth. 1817, p. 216. — Swains. West. Afr. II, p. 88.

Hab. Senegambia: Adans. etc. — Elmina: Mus. Hamb. — O. (Mozambique: Bianc. Spec. Zool. Mos. fasc. IV, p. 50. Kordofan: Pe-therick.)

93. *viridissimus* Swains. Totus laete viridis, nitore ut in congeneribus fulvo; taenia oculari nigra, margine vix caerulescente; fascia juguli transversa angusta nigra; remigibus magis fulvescentibus; rectricibus 2 mediis valde elongatis et angustatis. Long. 6¾ — 7".

Syn. Swains. West. Afr. II, pag. 82. — Kittl. Kuplert. 7, fig. 1. — Bonap. Conspl. p. 162. (exclus. synon. Brissoni). — Reichenb. Merop. p. 66, pl. 445, fig. 3229 — 30. (exclus. synonym., Brissonii *Apiaster madag. torquatus* est species gutture "ad coeruleo-berylinum inclinante" et aliis plane diversa).

Hab. Senegal, Sw. Mus. Brem. — O. (Kordofan: Strickl. Nubia: Licht. p. 13: „*M. aegyptius* Forsk.“)

94. *bicolor* Daud. Supra schistaceo-cinerascens, canda magis brunnecente; taenia oculari nigerrima, infra albo marginata; mento albo; subtus intense roseus; remigibus nigris; rectricibus 2 intermeditis elongatis; rostro nigro, pedibus pallidis. Long. 8".

Syn. Daud. Ann. du Mus. II, 440, pl. 62, fig. 1. — *M. malimbicus* Shaw., Nat. Misc. pl. 701. — Vieill. Galer. pl. 186. — Lev. Guép. pl. 5. — Encycl. p. 390. — Reichenb. I. c. p. 79, t. 452, fig. 3256 — 57. — Verr. Rev. et Mus. de Zool. 1851, p. 268.

Hab. Malimbe: Perrein. — Elmina: Weiss in Mus. Hamb. — Gaboon: Verr.

95. *nubicus* Gm. Supra e roseo lateritus, subtus pallidior, obsolete roseus; capite uropygio et tectricibus caudae superioribus beryllino-caeruleis; his laetius tinctis; fascia oculari nigra; rectricibus 2 mediis valde elongatis, apice nigricantibus. Long. 13".

Syn. Enl. 649. — *M. caeruleocephalus* Lath. — Levail Guèp. pl. 3. — Swains. West. Afr. II, p. 78, pl. 9. — Bon. Conspl. p. 161. — Reichenb. Merop. p. 79, t. 451, fig. 3254—55. — Ainsworth Research. in Assyr. p. 42.

Hab. Senegambia: Rend. — O. (Sennaar, Kordofan, Abyssinia, Fazogl. etc.)

96. *Bullockii* Vieill. Viridis supra; taenia oculari angusta nigra; cer-
vice, colli lateribus, pectore ventreque dilute cinnamomeis; menlo
nigricante, gula pulcherrime scarlatina; abdomine imo, crasso et
subcaudalibus laete azureis; canda aequali. Long. 7".

Syn. Levail. pl. 20. — Donov. Nat. Rep. t. 45. — Swains. West. Afr. II, p. 80, pl. 8: *M. cyanogaster*. — Bonap. Conspl. p. 80. — Reichenb. Merop. p. 78, tab. 450, fig. 3250—51. — Scarlet-throated Bee-eater, Lath. Gen. Hist. IV, 138.

Hab. Senegambia: Swains. Mus. Brem. — O. (Sennaar, Fazogl., Kordofan, Abyssinien.)

***Meropiscus* Sund.**

97. *gularis* (Shaw.) Niger; fronte, superciliis, uropygio crisoque vi-
ridi-cyanis, gula intense rubra; pectore et epigastrio maculis lon-
gitudinalibus beryllinis vario; remigum majorum marginibus externis
ferrugineis; rostro nigro. Long. 7"—7½".

Syn. *Merops gularis* Shaw Natur. Misc. t. 337. — Gray Gen. of Birds t. 30. — Sundev. Oefvers. Vet. Ac. Förhandl. 1849, p. 162. — Less. Descript. Mammit. Ois. p. 268. — Reichenb. Merop. p. 80, t. 452, fig. 3258—59. — *Nyctiornis gularis* Bon. Conspl. p. 164.

Hab. Sierra Leone: Afzel. — „Grand Bassa 440 lieues au sud du Senegal“ Less. — Goldküste: Mus. Lugd. Brem.

II. TENUIROSTRES.

a. UPUPIDAE.

***Upupa* L.**

98. *senegalensis* Swains. Pallide isabellino-rufescens, cristae plumis
laete cinnamomeis, apice nigris; (absque interstitiis albis)
statuta minore quam in *U. epope*, rostro aequali longitudine. Long.
9½"; rostr. 1¾".

Syn. *U. epops* var. *seneg.* Swains. Western Afr. II, p. 114.

Hab. Senegambia: Sw. — Congo: Perr. Wenn Lagart und Ke-
laart ganz neuerlich diese Art als auf Ceylon vorkommend anführen,
so beruht diess auf einem Irrthum. Die indische *Upupa* ist von der
africanischen specilisch verschieden.

b. PROMEROPIDAE.

***Irrisor* Less.**

99. *senegalensis* (Vieill.) Niger, nitore virescente-caeruleo, mento,
gula, collo superiore et alae tectricibus purpurascente-chalybeo

resplendentibus; uropygio crasso et subcaudalibus nigerrimis; ala spuria, remigibus prim. et secund. rectricibusque 4 lateralibus macula alba (majore quam in erythrorrhyncho) notatis; rostro in adulto toto rubro, in junioribus nigro, minus curvato et robustiore quam in erythr.; pedibus robustioribus. Long. 16"; rostri a fr. $2\frac{1}{10}$ ", caud. a basi $9\frac{3}{4}$ ".

Syn. *Falcinellus senegalensis* Vieill. Enc. p. 580. — *Nectarinia melanorhyncha* Licht. Doubl. p. 15. — *Epimachus mel.* Wagl. Syst. Av. — Levaill. Prom. t. 4. — Gray Mitch. Genera of Birds, pl. 31. — Strickl. Ann. Mag. 1852, p. 344. — Swains. West. Afr. II, p. 117. — Jard. Contrib. Orn. 1852, part. 3. (NB.) und ib. p. 154.

Hab. Senegambia: Licht. Swains. — Sierra Leone: Jard. etc. — Abomey: Fras. — O. (Kordofan: Strickl. etc.)

100. pusillus (Swains.) Niger; capite, collo pectore et dorso nitore purpurascente-caeruleo; alis et cauda minus resplendentibus; remigibus prim. macula alba transversa prope basin notatis, externis quinque ante apicem fuscescens albido adumbratis; rostro valde compresso pedibusque corneis; cauda subrotundata immaculata. Long. 9".

Syn. Swains. West. Afr. II, p. 120. — *Promerops aterrimus* Steph. — Lesser Black Promerops Lath. Gen. Hist. IV, p. 111. — *Rhinopomastes pusillus* Bon. Conspl. p. 411.

Hab. Senegambia: Swains.

Nectarinia Illig.

101. pulchella (Lin.) Supra et subtus aurato-viridis; pectoris macula transversa scarlatina, flavo marginata; rectricibus 2 intermediis valde elongatis et angustatis nigris, gracillime viridi limbatis; rostro pedibusque nigris. Long. $4\frac{6}{10}$ " retr. 2 interm. $3\frac{3}{4}$ ".

Syn. L. I., 187. — Levaill. Afr. pl. 293, fig. 1. — Vieill. Ois. dor. pl. 41. — Swains. West. Afr. II, p. 123, pl. 14. — Jard. Monogr. p. 207, pl. 18. — *C. longicauda senegal.* Briss. III, 645. — *Cinnyris candalus* Vieill. Enc. p. 595.

Hab. Senegambia: Adans. Swains. etc. — Sierra Leone: Dr. W. Fergusson. O. M.

102. melampogon Lichtenst. Laete vijadi-aenea, versus caudam chalybea; gula holosericea; pectore medio coccineo, ad latera flavicante; alis et cauda nigris; rectricibus 2 intermediis valde elongatis. Long. $6\frac{1}{2}$ ", ad apic. retr. later. $4\frac{1}{4}$ ".

Syn. Lichtenst. Doubl. p. 15.

Hab. Senegal: Mus. Berol.

103. platura (Vieill.) Aurato-viridis; uropygio tectricibusque caudae superioribus violaceo-chalybaeis; pectore abdomineque saturate flavis; remigibus rectricibusque fuscis, 2 intermediis caeteris 2" longioribus, splendide purpurascensibus. Long. 6", ad apic. retr. later. $3\frac{3}{4}$ ".

Syn. Sucier signier Levaill. Afr. pl. 293, fig. 2. — *Cinnyris platurus* V. Enc. p. 589. — *C. sicorum* Voigt in Cuv. Thiere. — *N. cyanopygus* Licht. Doubl. p. 15. — *N. sylviella* Temm Pl. col. Ind. — Jard. Monogr. p. 209 u. 260, pl. 19.

Hab. Sierra Leone: Dr. Fergusson. — Senegal: Lichtenst. — M.

104. *Adalberti* (Gerv.) Supra umbrina, sincipite splendide aurato-viridi; mento nigro, lateraliter viridi marginato; gula, collo antico pectoreque superiore stramineo-albidis, iufra fusco marginatis; corpore inferiore reliquo pallide castaneo. Long. $4^{\frac{8}{10}}\text{''}$.

Syn. *Cinnyris Adalberti* Gerv. Mag. de Zool. Ois. pl. 19. — Less. Compl. 9, p. 157. — Jard. Selb. Illustr. Orn. n. s. pl. 49. — Jard. Monogr. p. 244 n. 257, pl. 30. — *N. eboensis* Thoms. MSS. — Allen Exped. Nig. II, p. 502.

Hab. Senegal: Gerv. — Eboe am Niger: Thoms.

105. *Stangerii* Jard. Supra saturate umbrina, subtus obscure umbrino-fusca, nitore nonnullo purpurascente; macula sincipitali saturate viridi, postice violaceo marginata, loris mentoque nigerrimis; gula splendide aurato-viridi, fascia angusta chalybea limboque strictissimo scarlatino marginata. Long. 5''.

Syn. Jard. Ann. and Mag. X, p. 187. — Id. Monogr. p. 198, 257, pl. 15. — Id. Illustr. of Orn. n. s. pl. 48. — Allen Exped. Nig. II, p. 501. — Verr. Rev. et Mag. 1851, p. 313. — Num *Cinnyris angolensis* Less Tr. p. 295?

Hab. Fernando Po: Thoms. — Gaboon: Verr.

106. *fuliginosa* (Vieill.) Velutino-fuliginosa; loris nigris, fronte gula tetricibusque alae minoribus splendide violaceis; fasciculo plumarum infraaxillarium flavo; alis caudaque fuscis. Long. $4^{\frac{1}{2}}\text{''}$.

Syn. Soui-manga carmelite Vieill. Ois. dor. pl. 20. — *Cinn. fuliginosus* V. Enc. p. 584. — Less. Man. II, p. 23. — Jard. Mon. p. 197, 256, pl. 14. — Less. Descript. Mammif. Ois. p. 271. — Verr. Rev. et Mag. 51, p. 315. — Strickl. Contrib. 1851.

Hab. Congo: Perrein. — Gaboon: Verr.

107. *amethystina* (Shaw.) Nigerrima, holosericea; alis caudaque fuscescentibus: fronte splendide aurato-viridi; mento gulaque media, tetricum caudae super. apicibus maculaque scapulari nitide amethystino-purpureis. Long. 6''.

Syn. Sucier velours Lev. Afr. pl. 294, fig. 2. — S. M. à front doré Vieill. Ois. dor. pl. 5, 6. — *Cinnyris auratifrons* Vieill. Enc. 590. — *Certhia aurifrontalis* Bechst. 1811. — *N. aurifrons* Licht. Doubl. 15. — Swains. West. Afr. II, p. 134. — Jard. Monogr. p. 195, 256, pl. 13.

Hab. Senegal: Swains. — M.

108. *rubescens* Vieill. Supra nigra, holosericea, nitore rubescente; capistro lorisque nigerrimis; fronte, gula colloque antico aurato-viridibus, hoc infra magis caerulescente; corpore infer. reliquo nigerrimo; vertice nitore chalybeo; alis caudaque nigris. Long. $4^{\frac{1}{2}}\text{''}$.

Syn. *Cinnyris rubescens* V. Enc. p. 593. — Less. Man. II, p. 61. — Jard. Monogr. p. 274.

Hab. Congo: Perrein.

109. *senegalensis* (Lin.) Supra fusco-nigricans, holosericea; alis caudaque dilute brunneis; pileo mento gulaque media splendide aurato-viridibus, macula maxillari utrinque smaragdina; collo antico pectoreque scarlatinis, caeruleo transversim lineolatis; abdomine nigro. Long. $4^{\frac{1}{2}}\text{''}$.

Syn. Lin. I, 186. — *Certhia seneg. violacea* Briss. III, 660. — Vieill. Ois. dor. pl. 8, 9. — *Cinn. discolor* Vieill. Enc. p. 589. — Kittl. Kupfert. 28, fig. 2. — Swains. West. Afr. II, p. 127. — Jard. Monogr. p. 191, 255, pl. 11.

Hab. Senegambia. — Ilha do Príncipe: Erm. Nordm. Atl. p. 6. — Goldküste: Mus. Brem. — Damara-Gegend: Andersson.

110. cuprea (Shaw.) Capite. collo pectoreque splendide cupreo-purpu-rascentibus; corpore superiore reliquo magis violascente-cupreo; tectricibus caudae super. violaceo-purpureis; corpore infer. reliquo nigerrimo; alis caudaque nigris. Long. $4\frac{3}{4}$ ".

Syn. Souimanga rouge-doré Vieill. Ois. dor. pl. 27. — *Certhia rubro-fusca* Sh. — *Cinnyris nibarus* Vieill. Enc. 597. — *C. tricolor* V. ib. 588. — Id. Ois. dor. pl. 23. — *C. erythronotos* Sw. West. Afr. II, p. 30, pl. 15. — Jard. Monogr. p. 187, 254.

Hab. Senegal: Sw. — Cape Coast, Accra: L. Fraser. — Malimbe: Perrein. — Gambia: Mus. Brem.

111. cyanocephala (Vieill.) Capite colloque totis cum pectore superiore splendide caeruleo-viridibus; corpore supra cum alis et cauda olivaceis; fasciculo plumarum infraaxillarium flavo; corpore inferiore reliquo saturate plumbeo. Long. 5".

Syn. S. M. à tête bleue Vieill. Ois. dor. II, pl. 7. — S. M. vert et gris, 16, pl. 25 ♂. — Enc. p. 587. — *Cinnyris chloronotus* Sw. West. Afr. II, p. 136, pl. 16. — Jard. Ann. Mag. X, p. 187. — Id. Monogr. p. 189, 214, pl. 10. — Allen Exped. Nig. II, p. 221.

Hab. Malimbe: Vieill. Perr. — Congo: Mus. Berol. — Sierra Leone: Dr. Fergusson. — Angola: Henderson. — Gambia: Mus. Brem. — Bowd. Excurs. p. 227, Nectar. Nr. 2. — Cap. Coast: Gordon. — Elmina: Mus. Hamb. — Fernando Po: Thoms.

112. obscura Jard. Supra flavescente-olivacea, pileo obscuriore; alis caudaque umbrinis; subtus „vinaceo-flava“ fasciculo plumarum infraaxill. flavissimo. Long. $5\frac{2}{10}$ ".

Syn. Jard. Monogr. p. 253.

Hab. Fernando Po: L. Fraser.

113. venusta (Shaw.) Supra aeneo-viridis; fronte fasciaque pectoris violaceo-chalybeis; mento nigro; collo antico viridi; pectoris fascia altera inferiore medio angusta utrinque dilatata nigra, tectricibus caudae super. chalybeis; abdomine flavo, fasciculo axillari aurantiaco-igneo. Long. $3\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Certhia venusta* Shaw. — Le Quinticolor Vieill. Ois. dor. pl. 79. — *Cinn. venustus* Vieill. Enc. 597. — *C. quinticolor* Less. — Leone Creeper, Lath. Gen. Hist. IV, 234. — *C. pusillus* Sw. West. Afr. II, p. 138. — *N. parvula* Jard. Monogr. p. 181, pl. 7. — *C. flavocenter* Less. Rev. III, p. 352.

Hab. Senegambia: Sw. Mus. Brem. — Sierra Leone: Sh. Lath. etc.

114. cyanolaemus Jard. Supra obscure cinerascente-niger; pileo metallico indigoticō; subtus brunneo-cinerascens, crasso et subcaudalibus pallidioribus; mento et gula indigoticis, nitore metallico; fasciculis axillaribus pallide flavis. Long. 5" 5".

Syn. Jard. Contribut. 1851, part 6. Descript.

Hab. Fernando Po: Fraser.

115. *hypodilus* Jard. Supra splendide caeruleo-scapularis - viridis, uropygio flavidore; alis umbrinis, viridi-flavo marginatis; cauda chalybeo-nigra; mento, gula pectoreque superiore caeruleo-scapularis - viridis, fascia angusta caerulea violaceo resplendente marginatis; corpore infer. reliquo flavo; fasciculis axillaribus laete flavis, conspicuis. Long. 3" 8" — 4".

Syn. Jard. Contrib. to Ornith. 1851, part 6. Descr.

Hab. Fernando Po: Fras.

116. *tephrolaemus* Jard. Supra metallice caeruleo-scapularis - viridis, uropygio et tectricibus caudae super. obsolete flavescente-viridis; alis et cauda saturate fuscis, flavescente-viridi marginatis; subtus: mento griseo, gula et pectore superiore laete et metallice viridis, fascia pectorali aurantiaca infra terminatis; abdomine cinereo, hypochondriis, crasso et subcaudalibus viridi-flavescentibus. Long. 4" 2".

Syn. Jard. Contrib. 1851, part 6.

Hab. Fernando Po: Fraser.

117. *Perreini* (Vieill.) Supra splendide auralo-viridis; subtus holosericeo-nigra; rostro pedibusque nigris. Long. 5 $\frac{1}{3}$ ".

Syn. *Cinnyris Perreini* Vieill. Encyclop. p 595. — Id. Nouv. Dict. vol. 31, p. 508. — Less. Man II, p. 52.

Hab. Congo: Perrein.

118. *bifasciata* (Shaw.) Aeneo-viridis; uropygio magis smaragdino; mento nigro; fascia pectoris angusta chalybea alteraque inferiore obsolete rubra; abdomine toto atro; subcaudalibus nitore caeruleo; alis caudae nigricantibus, nitore virescente. Long. 5 $\frac{3}{10}$ ".

Syn. Soui-manga vert et brun, Vieill. Ois. dor. II, pl. 24. — *Cinnyris nitens* Vieill. Enc. p. 588. — Violet-breasted Creeper, Lath. G. H. IV, 248. — Jard. Mon. p. 174, 250, pl. 4.

Hab. Congo: Perrein. — Damara-Gegend: Andersson. — M.

119. *fasciata* Jard. Supra aeneo-viridis; mento et gula splendide viridis; collo antico pectoreque superiore nitide violaceis, inferiore lateribusque abdominis obsolete rubris; abdomine imo medio et subcaudalibus nigris; fasciculis axillaribus pallide flavis. Long. 5" 8".

Syn. Jard. Contrib. to Ornith. 1852, part 3.

Hab. Abomey: Fraser.

120. *chalybea* (Lin.) Aurato-viridis, tectricibus caudae super. violaceo-chalybeis; pectoris fascia transversa angusta cyanea alteraque inferiore latiore coecinea; fasciculis axillaribus flavis; abdomine pallide fuliginoso; alis fuscis. Long. 4 $\frac{3}{4}$ — 5".

Syn. *Certhia chalybea* L. I, 186. — Vieill. Ois. dor. pl. 13, 14, 80. — Briss. III, 643. — *Cinn. pectoralis* Vieill. Enc. p. 584. — Swains. West. Afr. II, p. 132. — Id. Zool. Illustr. pl. 95. — Jard. Monogr. p. 166, 248, pl. 1.

Hab. Senegambia. Elmina: Mus. Hamb. — O. M.

121. *chloropygia* Jard. Simillima praecedenti; differt: statura minore, torque cyaneo vix ullo, abdomine pallide olivaceo-virente, tectri-

cibus caudae superioribus dorso concoloribus, splendide viridibus.
Long. $4\frac{1}{10}$ ".

Syn. Jard. Ann. Mag. N. II. X, p. 188. — Id. Illustr. of Ornith. n. s. pl. 50. — Id. Monogr. p. 171, 249, pl. 17. — Allen Exped. Nig. II, p. 303. — Verr. Rev. et Magaz. 1851, p. 315.

Hab. Fernando Po: L. Fraser. — Gaboon: Verr. — Senegal: Mus. Berol. (Cab.)

122. *superba* (Vieill.) Supra aurato-viridis; pileo splendide virescente-cyaneo, mento gula juguloque nitidissime purpureo-amethystinis (fasciola stricta aurato-viridi infra marginatis?); abdomine et epigastrio obscure sanguineis; alis, cauda, hypochondriis crisoque nigris; rostro longo, curvato, nigro. Long. $5\frac{3}{4}$ ".

Syn. Soui-manga sougnimbindou: Vieill. Ois. dor. II, p. 34. — *Cinnyris superbus* V. Enc. 597 — *C. sognimbindus* Less. Man. II, p. 48. — *C. sanguineus* Less. Tr. p. 296. — Verr. Rev. et Mag. 1851, p. 316. — Strickl. Contrib. 1851. part 6.

Hab. Congo: Perrein. — Gaboon: Verr.

123. *Johannae* (Verr.) Supra aurato-viridis, mento et gula concoloribus; jugulo pectoreque superiore splendide violaceis; inferiore et abdomine sanguineis; fasciculis axillaribus laete flavis; hypochondriis, alis, cauda et criso nigricantibus; rostro elongato, valde curvato. Long. $5\frac{3}{4}$ ".

Syn. *Cinnyris Johannae* Verr. Rev. et Mag. 1851. p. 314. — Strickl. l. c.

Hab. Gaboon: Verr.

124. *erythrothorax* (Vieill.) Pileo aurato-viridi, fascia occipitali indistincta magis flavescente; collo postico, scapularibus tectricibusque alae minor. holosericeo-nigris, dorso, uropygio, gula colloque antico splendide violaceis; pectore ventreque obsolete rubris; criso griseo; rectricibus nigro-fuscis, extus violaceo marginatis. Long. ?

Syn. *Cinnyris erythrothorax* Vieill. Encycl. p. 594. — Id. N. Dict. vol. 31, p. 507. — Less. Man. II, p. 51. — *C. ruber* Less. Tr. d'Orn. p. 296.

Hab. Congo: Perrein.

125. *splendida* (Sh.) Supra splendide caerulescente-viridis, capite colloque chalybeo-purpurascens, pectore scarlatino transversim notato; subtus nigra, subcaudalibus dorso concoloribus; cauda caeruleo-nigra; fasciculis axillaribus flavis. Long. $5\frac{1}{2}$ ".

Syn. Suerier éblouissant: Vaill. Afr. pl. 295, fig. 1. — l'Eclatant, Vieill. Ois. dor. pl. 2. — *Cinnyrus splendidus* Vieill. Enc. p. 587. — *C. lucidus* Less. Tr. p. 295. — *Certhia coccinigaster* Lath. — Swains. West. Afr. II, p. 125. — Jard. Monogr. p. 176, 250, pl. 5.

Hab. Gambia: Mus. Brem. — Goldküste: Mus. Hamb. etc. — Ilha do Príncipe: Erm. Nordm. Atl. p. 6. — Cap Coast: Gordon. — Congo: Mus. Berol. — Sierra Leone: Fergusson. — M.

Anthreptes Sw.

126. *Longuemarii* (Less.) Supra splendide violaceo-caerulescens, mento concolore; uropygio thalassino; alis fuscis; subtus nivea; fasci-

culis axillaribus flavis; cauda nigra, nitore purpurecente. Long. $5\frac{1}{2}''$.

Syn. *Cimyris Longuemarii* Less. Illustr. de Zool. pl. 23. — *A. leucosoma* Swains. West. Afr. II, p. 146, pl. 17. — *Cinnyricinclus(?) leucosoma* Less. Rev. zool. III, p. 272. — Bullet. des Sc. nat. XXV, p. 243. — Allen Exped. Nig. I, p. 250.

Hab. Senegambia: Sw. — Aboh am Niger.

127. *melasoma* (Less.) Supra sordide griseo-brunnescens, uropygio nigro; subtus splendide caerulescente-nigra; crasso et subcaudalibus cinnamomeis; cauda caeruleo-nigra, alis sordide brunneis, speculo albo medio notatis; rostro pedibusque nigris. Long. 6''.

Syn. *Cinnyricinclus(?) melasoma* Less. Rev. zool. III, p. 272.

Hab. Senegambia: Less.

128. *Fraseri* Jard. Supra olivacea, alis candaque brunneis; rectricibus remigibusque virescente-flavo marginatis; subtus viridi-flavescens; fasciculis axillaribus rubro-aurantiacis. Long. $5\frac{8}{10}''$.

Syn. Jardine Illustrat. of Ornith. n. s. pl. 52.

Hab. Fernando Po: Fraser.

129. *aurantium* Verr. Supra splendide aurato-viridis, tergo uropygioque aeneo-amethystinis; capitis lateribus mentoque amethystinis; subtus albida, pectore hinc inde fulvo lavato; fasciculis axillaribus laete aurantiacis; cauda violaceo-chalybea; alis nigricantibus. Long. 3'' 8'''.

Syn. Verr. Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 417. — Strickl. Contrib. 1851, part 6.

Hab. Gaboon: Verr.

Kaum specifisch zu trennen von dieser Art ist Strickland's *Nectarinia albiventris*: Jard. Contrib. 1852, p. 42, pl. 86 von Ras Hassoun an der Ostküste Africa's.

III. DENTIROSTRES.

a. LUSCINIADAE.

Drymoea Sw.

130. *lateralis* Fras. Supra fusca, lateribus cinerascentibus; subtus alba, femoribus rufis; rectricibus subtus saturate cinereis, gutta anteapicali nigra notatis, apice albis. Long. $5\frac{1}{2}''$ caud. 2''.

Syn. Fraser Proceed. Zool. Soc. 1843, p. 16. — Ann. Mag. N. H. vol. 12, p. 479. — Allen Exped. II, p. 490.

Hab. Cap Palmas: Fras.

131. *Strangei* Fras. Supra fusca, superciliis et corpore subtus albis; rectricibus subtus saturate cinereis, gutta anteapicali nigra, apicibus albis; cauda minus gradata quam in *D. lateralisi*, colore albo apicali minus circumscripto minusque obscurio. Long. $5\frac{1}{4}''$, caud. 2''.

Syn. Fraser, Progr. Z. S. 1843, p. 16. — Id. Ann. Mag. XII, p. 479. — Allen Exped. Nig. II, p. 490.

Hab. Accra (Goldküste): Fras.

132. *mentalis* Fras. Supra fusca, uropygio rufescente, remigibus pri-

inariis margine pallidioribus; subtus rufescens; fronte genisque rufo-castaneis; gula et linea angusta superciliari albis; lineola nigra inter gulam albam et genas castaneas; cauda fusca, gradata; mandibula cornea; tarsis flavis. Long. 8", al. $2\frac{3}{4}$ ", tars. 1".

Syn. Fraser Proc. Z. S. 1843, p. 16. — Id. Ann. Mag. XII, 478. Allen Exped. Nig. II, p. 490. — Jard. Contrib. to Ornith. 1849, part 1, fig.

Hab. Accra, Fras. — Cap Coast: Gordon.

133. *ruficapilla* Fras. Supra saturate fusca, subtus alba; vertice rufo (σ); femorum dimidio inferiore rufi; cauda ut in D. laterali picta, at magis gradata; rostro nigro. Long. $6\frac{3}{4}$ ", caud. $2\frac{1}{2}$ ".

Syn. Fras. Proceed. Z. S. 43, p. 16. — Id. Ann. Mag. XII, p. 479. — Allen Exped. Nig. II, p. 490.

Hab. Ad fl. Nun. — St. Thomé: Weiss in Mus. Hamb.

134. *rufa* Fras. Supra rufa, subtus sordide flava; rostro tarsisque flavis. Long.

Syn. Fraser, Proc. Z. S. 1843, p. 17. — Id. Ann. Mag. XII, p. 479. — Allen Exped. Nig. II, p. 491. — Fras. Zool. typica, III, pl. 1.

Hab. Ad fl. Quorra.

135. *rufogularis* Fras. σ . Supra fuliginoso-fusca, leviter viridi tincta; gula pectoreque rufescentibus; abdomine, subalaribus rectricibusque ibribus externis albis; rostro supra nigro, subtus flavo; tarsis carneis. Long. $3\frac{3}{4}$ ".

Syn. Fraser Proceed. Z. S. 1843, p. 17. — Id. Ann. Mag. XII, p. 479. — Allea Exp. Nig. II, p. 491. — Fras. Zool. typica, III, fig.

Hab. Fernando Po: Fras.

136. *uropygialis* Fras. Supra fusca, singulis plumis pallidiore marginatis; superciliis corporeaque subtus albis; lateribus et femoribus leviter rufo lavatis; uropygio subrufo; canda saturate fusca, fascia pallide rufa alteraque nigra, apice alba; rostro fusco; tarsis flavis. Long. 4", caud. $1\frac{1}{2}$ ".

Syn. Fras. Proc. Zool. Soc. 1843, p. 17. — Id. Ann. Mag. XII, p. 479. — Allen Exped. Nig. II, p. 491. — Fras. Zool. typ. III, pl. 1.

Hab. Accra: Fras.

137. *superciliosa* Sw. Dilute brunnea, immaculata; superciliis corporeaque subtus albis; hypochondriis crasso tibiisque rufescentibus; rectricibus lateralibus ante apicem album fascia nigra notatis; rostro nigro, pedibus pallidis. Long. $4\frac{1}{4}$ ".

Syn. Swains Birds of West. Afr. II, p. 40, pl. 2.

Hab. Gambia: Sw.

138. *erythroptera* Jard. Supra pallide rufescente cinerea; tectricibus, remigum prim. et secund. marginibus externis, uropygio et supra-canthalibus dilute castaneo-rufis; cauda umbrina, apice alba, fascia anteapicali nigra, valde gradata. gracili; subtus alba, subcanthales versus magis magisque fulvescens; rostro robusto nigro, maxilla basi lata; pedibus brunnescentibus. Long. 5" 3", caud. 2" 1".

Syn. Jard. Contrib. 1849, c. fig.

Hab. Cap Coast: Gordon.

139. *melanorhyncha* Jard. Supra pallide griseo-brunnescens, stria lata inter nares et oculum alba; rostro nigerrimo; cauda fascia apicali obscura; rectricibus, 2 mediis exceptis, apice albido limbatis; subtus alba, pallide brunnescente tineta, crrosso et subcaudalibus conspicue brunnescentibus. Long. 4" 2".

Syn. Jardine Contrib. to Ornithol. 1852, part. 3. Descr.

Hab. Abomey: Fras.

140. *fortirostris* Jard. Supra umbrina, plumis medio obscurioribus; spatio inter nares et oculum pallide flavescente-brunneo; cauda fascia antea apicali obscura, apice pallida; subtus alba, pallide brunnescente tineta, crrosso et hypochondriis magis brunnescentibus; rostro nigricante-fusco, robusto, curvato, setis rictalibus. Long. 5" 3" 7", al. 2" 7".

Syn. Jardine Contrib. to Ornith. 1852, part 3. Descr.

Hab. Abomey: Fraser.

141. *mystacea* Rüpp. ? Supra cinereo-olivascens; flexura alae alba; remigibus extus rufescente limbatis; corpore subtus albo-flavicante, crrosso et tibiis subrufescentibus; cauda dilute cinereo-rufescente, fascia antea apicali fusca, apice alba; rostro nigro; pedibus corneis; vibrissis 2 rigidiusculis. Long. 5". (vertice nonnihil „sienna“ tineto: Jard.)

Syn. *Prinia mystacea* Rüpp. Neue Wirbelth. p. 110. — Id. System. Uehers. p. 31, t. 10. — Jard. Contrib. 1852, part 3.

Hab. Abomey: Fras. — O.

142. *gracilis* Rüpp. Supra cinereo-olivascens, subtus albescens; pilei nuchae dorsique plumis maculis oblongis fuliginosis; caudae fascia antea apicali obsoleta, apice albo. Long. 4".

Syn. *Malurus gracilis* Rüpp. Att. pt. 2, fig. 6. — Temm. Pl. col. 466, 1. — Sav. Ois. d' Eg. V, lig. 4. — *Prinia gracilis* Rüpp. N. Wirbelth. p. 113. — *Curruca gracilis* Ehrenb. Symb. Phys. in coroll. — Caban. Museum Heineanum I, p. 44.

Hab. Senegal: Cab. — O.

143. *undata* (auct.) Supra nigricans, plumarum margine rufo; uropygio rufo; subtus alba, cauda valde cuneata; remigibus brunneis, rectricibusque rufescente-albido marginatis; rostro nigro. Long. 4", caud. 2".

Syn. *Sylvia undata* Lath. — Figuier tacheté du Senegal Buff. Pl. enl. 582, fig. 1. — *Malurus undatus* Temm. Tabl. méthod. p. 28. — *S. rufogastra* Vieill. Enc. 440 (excl. synon.)

Hab. Senegal: Buff. n. v.

144. *badiceps* (Fras.) Vertice cinnamomeo; plumis auricularibus et corpore supra cinereis, alis caudaque e cinereo fuscis; genis gula et subalaribus albis; fascia pectorali nigra; corpore inferiore cinereo, medio pallidiore; tarsis flavis. Long. $3\frac{10}{12}$ "; caudae breviusculae $1\frac{6}{12}$.

Syn. *Sylvia badiceps* Fraser Proceed. Z. S. 1842, p. 144. — Allen Exped. Nig II, p. 495. — *Comaroptera* sp. G. R. Gray in Mus. Brit. Hab. Fernando Po.

Der ausgezeichnete englische Ornitholog, Herr P. H. Scaler, hatte die Gefälligkeit, das Originalexemplar dieses Vogels im britischen Museum, zugleich das einzige bekannte, für uns zu untersuchen. Derselbe scheint danach zunächst bei der Gattung *Drymoeca* belassen werden zu müssen.

Chloropeta Smith.

145. *olivacea* (Strickl.) *Supra viridi-olivacea, remigibus fuscis, olivaceo limbatis; cauda cuneata, rectricibus 2 intermediis fuscis, lateribus albis, extus fusco marginatis, extima tota alba; corpore inferiore toto albido, pallide flavo lavato; rostro depresso usque pedibusque fuscocrescentibus.* Long. $4\frac{1}{2}$ ", al. $1\frac{3}{4}$ ", caud. $1'' 10''$.
Syn. Prinia olivacea Strickl Proc. Z. Soc. 1844, pag. 99. — Allen Exped. Nig. II, p. 494.

Hab. Fernando Po: Fras.

146. *icterica* (Strickl.) *Supra flavo-olivacea, loris, superciliis, genis, margine alarum, tibiis et subcaudalibus laete flavis; mento, gula, pectore et abdomine albidis, pallide isabellino lavatis, hypochondriis flavo-olivaceis; rostro nigro depresso; pedibus rubidis.* Long. $3\frac{3}{4}$ ".
Syn. Prinia icterica Strickl Proc. Z. Soc. 1843, p. 100 — Allen Exp. Nig. II, p. 495. — *Sylvicola superciliaris* Fras. Ann. Mag. XII, p. 440. — Allen Exped. II, p. 493.

Hab. Fernando Po: Fras.

Hypolais Brehm.

147. *opaca* (Licht.) *Supra cinerea, olivascente lavata; alis et cauda brunnescente-cinereis, rectrice extima albo marginata; mento, gula et pectore albis, lateribus dilute cinerascente lavatis; elaeiae similis, differt: rostro depresso, cauda longiore.* Long. $6\frac{3}{4}$ ", caud. $2\frac{1}{2}$ ".
Syn. H. opaca (Licht.) Cab. Museum Heinean., p. 36.

Hab. Senegal: Mus. Berol.

Phyllopusnste Meyer.

148. *Bonellii* (Vieill.) *Pileo et nucha brunneo-cinerascentibus, dorso et alae tectricibus minor, magis olivascentibus; superciliis pure albis, corpore subtus nitide albo; remigibus et rectricibus nigricantibus; dilute virescente marginatis; maxilla dilute brunnea, mandibula albida.* Long. 4" 2".
Syn. Sylvia Bonellii Vieill. Faune Fr. p. 216, pl. 97, fig. 3. — *S. Nattereri* Temm. Man. I, p. 228. — Bonap. Fauna Ital. t. 27, 4. — *S. prasinopyga* Licht.

Hab. Senegal: Mus. Berol. — S.

Syncopta Cab.

149. *brericaudata* (Kretschm.) *Supra olivacea, nucha tibiis et tectricibus alarum laete virescentibus; subtus sordide albida; remigibus et rectricibus fuscocrescentibus, his limbo apicali albido; rostro nigro, mandibula basi flavida; pedibus brunneis; cauda brevi, rotundata.* Long. 4" 2".
Syn. Sylvia breric. Kretsch. Rüpp. Atl. t. 35, lig. 6. — *Ficedula*

brevic. Id. Syst. Uebers. S. 57. — *Sylvia chrysocnema* Licht. in Mus. Berol. — gen. *Syncopta* Cab. Journ. für Ornith. I. Jahrg., 1853, p. 110. Hab. Senegal: Mus. Berol. — O.

Sylvieta Lafren.

150. *micrura* (Rüpp.) Supra tota pallide rufescente-cinerascens, fronte et superciliis pallide rufescens; cauda brevissima, alis inflexis breviore; subtus tota rufescens, mento medioque abdomine albescens; tarsis elongatis rubentibus, unguibus valde curvatis. Long. $3\frac{1}{4}$ ".

Syn. *Troglodytes micrurus* Rüpp. Neue Wirb. Abyss. Vög. t. 41, fig. 2. — *Sylvieta brachyura* Lafren. Rev. zool. II, p. 258. — *Oligura micrura* Rüpp. Syst. Uebers. p. 56. — *Oligocercus micrurus* Cab. Journ. für Ornith. I. Jahrg., 1853, p. 109. — Lefèvre Voy. Abyssin. Ois. p. 89, pt. 6.

Hab. Senegambia: Lafr. — O. M. (Damara-Gegend: Andersson.) Angola: Henderson.

151. *lutescens* Less. Supra viridi-flavescens, subtus flava; remigibus et rectricibus brunneis, flavo marginalis; rostro corneo, tarsis brunneis, unguibus albidis. Long. $3\frac{1}{2}$ ".

Syn. Less. Echo du Monde Savant, 1844, p. 233. — Id. Descript. Mammil. et Ois. p. 298.

Hab. Senegambia: Less.

Thamnobia Sw.

152. *frontalis* (Sw.) Tota atra; macula frontali nivea; cauda aequali, rectricibus apice truncatis. Long. $5\frac{1}{2}$ ". ♂ macula frontali nulla.

Syn. *Saxicola frontalis* Swains. West. Afr. II, p. 46. — Rüpp. System. Uebers. Vög. N. O. Africa's, t. 17, p. 40; *S. albifrons* R. — Id. Neue Wirbelth. Vög. p. 78 — Gen. *Penthalaea* Cab. Hein., p. 40.

Hab. Gambia: Sw. Mus. Brem. ♂♂. — O.

Myrmecocichla Cab.

153. *aethiops* (Licht.) Unicolor fusco-nigricans, plumis frontis, menti, gulae et pectoris livide marginatis; remigum pogoniis internis ex parte albis. Jun: absque marginibus pallidis. *M. formicivora* parum major, canda longiore.

Syn. *Turdus aethiops* Licht. Mus. Berol. — *M. aethiops* Cab. Catal. Heine, p. 8. — Bon. Conspect. p. 302.

Hab. Senegal: Mus. Berol.

Dromolaea Cab.

154. *leucura* (Gm.) Nigra, alis fuscouscentibus; uropygio, caudae tectricibus sup. et infer., caudaque ipsa pro maxima parte albis, rectricibus 2 intermediis nigris, basi albis, reliquis fascia anteapicali nigra; rostro pedibusque nigris. Mas ad: pileo albo. Long. 7".

Syn. *Turdus leucurus* Gm. — *Saxicola cachinnans* Temm. Man. I, p. 236. — Descr. d'Eg. Ois. t. 5, fig. 1. — Gould Birds of Eur. t. 88. — *D. leucura* Cab. — Bonap. Conspl. p. 303. — Sundev. Oefvers. K. V. Ac. Förh. 49, p. 158.

Hab. Sierra Leone: Afzel., Sundev. — S.

Saxicola Bechst.

155. leucorrhœa (Gm.) Supra obscure rufa, subtus albido-rufescens; fronte superciliis et mento albis; spatio inter rostrum et oculum nigro; pectore rubescente; uropygio rectricumque parte majore albis, apicali nigra; rostro pedibusque nigris. Long. 7".

Syn. Cul-blanc du Sénégâl: Buff. Ent. 583, fig. 2. — *Motacilla leucorrhœa* Gm. I, 966. — Encyclop. p. 486. — Less. Tr. d'Orn. p. 413. — Num *S. isabellina* Rupp.? Strickl. Ann. Mag. 52, p. 344.

Hab. Sénégâl: Buff.

156. aurita Temm. Regione ophthalmica et parotica, alis et rectricibus 2 mediis nigris; capite, gula, corpore subtus et uropygio pure albis; dorso rufescens-albido; cauda alba, apice nigra, rectrice extima fere tota nigra. Long. 5 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. Temm. Man. I, p. 241. — Pl. col. 275, 1. — Edw. t. 31. — *S. albicollis* Vieill. — *Vitisflora rufescens* Briss. Orn. III, p. 457, t. 25, fig. 4.

Hab. Sénégâl: Mus. Berol. (Cab.) — S. (Maroc: Kjärbölling.)

Pratincola Koch.

157. rubicola (Lin.) Capite, gula, dorso tectricibusque alae minoribus nigris, singulis plumis gracillime rufo marginatis; macula ad colli latera, altera alari, uropygioque albis; pectore saturate rufo; corpore inferiore reliquo pallide rufescens; cauda basi alba. Long. 4 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. L. I, 332 — Naum. t. 90. — Swains. West. Afr. II, p. 45. — Hab. Sénégâl: Swains — S. O.

158. rubetra (Lin.) Supra fusca, plumarum margine rufescens; gula et colli lateribus, macula magna alari et cauda albis, rectricum scapis et apicibus duabusque intermediis totis fusco-nigris; collo antico et pectore laete rufis. Long. 4 $\frac{3}{4}$ ".

Syn. Temm. Man. I, p. 244. — Gould Birds of Eur. t. 93. — Naum. t. 89, fig. 3, 4.

Hab. Sénégâl: Mus. Berol. (Cab.) — S. (Maroc: Kjärb.)

159. ferrida (Gm.) Supra saturate brunnea, plumis rufo marginatis, subtus pallide fulvescens, pectore rufescens; alis albo bimaculatis; remigibus primariis albo, secundariis rufo extus marginatis; cauda nigricante; rostro pedibusque nigris. Long. 5".

Syn. *Motacilla ferrida* Gm. I, 968. — Traquet du Sénégâl: Buff. Ent. 583, fig. 1. — Eue. p. 493.

Hab. Sénégâl: Büff.

160. salax Verr. Nigerrima, collo lateralî, abdome inno, hypochoondriis, crasso uropygio tectricibusque sup. et infer. albis; rectricibus nigris, apice albo limbatis; pectore laete rufo; scapularibus tectricibusque min. nigris, mediis albis; remigibus nigris, albo marginatis; rostro pedibusque nigris. Long. 4 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. J. et E. Verreaux Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 307. — Strickl. Contrib. to Ornith. 1852. part. 5.

Hab. Gabon: Verr.

161. senegalensis (Briss.) Saturate fusca; tectricibus alae super. et infer. concoloribus; remigibus pagonio externo et apice fuscis, interno rufis; rectricibus 2 intermediis nigris, reliquis nigris, apice albis; rostro pedibusque brunneis. Long. 5" 3".

Syn. Le Traquet du Senegal (*Rubetra senegalensis*) Briss. Ornith. III, p. 441, t. 20, fig. 3. — *Motacilla senegalensis* Lio.

Hab. Senegal: Adanson.

Parus Lin.

162. leucopterus Sw. Totus nigerrimus, nitore nonnullo coerulecente; tectricibus alae major. et minor. remigumque omnium marginibus externis albis. Long. 5³/₄".

Syn. Swaios. West. Afr. II, p. 42. — Lafren. Rev. zool. 1839 pag. 70.

Hab. Senegambia. Mus. Brem.

Zosterops Vig.

163. senegalensis Bp. Supra laete virescente-flava, subtus pure flava, remigibus et rectricibus nigricantibus, flavo marginatis; annulo periophthalmico niveo; lineola nigra inter oculum et rictum; rostro pedibusque nigricantibus. Long. 4¹/₄".

Syn. *Z. flava* Swains., West. Afr. II, p. 43, pl. 3. — *Z. citrina* Hartl., Beitr. Ornith. Westafr., S. 22. — Bonap. Conspl. p. 399. — Reichenb. Merop. p. 90, t. 460, fig. 3288.

Hab. Senegal: Swains.

164. lugubris Hartl. Supra olivaceus, pileo nigricante; plumulis periophthalmicis fasciolaque inter nares et oculum albidis; subalaribus et flexura alae pure albis; gula colloque antico pallide cinerascentibus; pectore et abdomine dilute brunnescente-olivaceis; pedibus carneis; rostro brunneo. Long. 5" 1¹/₂".

Syn. Hartl. Beitr. Ornith. Westafr. S. 49. — Id. Abhand. naturh. Verein's Ilamb. II, t. 9, fig. med. — Id. Rev. zool. 1848, pag. 108. — Reichenb. Merop. p. 93, t. 462, fig. 3306.

Hab. Ins. St. Thomé: Weiss in Mus. Hamburg.

Motacilla Lin.

165. gularis Sw. Supra cinerea, uropygio et tectricibus caudae superioribus nigris; fronte, capitis lateribus et corpore subtus albis; mento, gula et pectore nigerrimis; cauda nigra, rectricibus 2 extimus albis, margine obliquo nigro in pagonio interno. Long. 6¹/₂".

Syn. Swains. West. Afr. II, p. 38. — Allen Exped. Nig. I, p. 310.

Hab. Senegal: Swains. — Iddah am Niger: Thoins.

Budytes Cuv.

166. Rayi Bp. Supra olivacea, superciliis pure flavis; subtus laete flava; alis et rectricibus mediis nigricantibus, albido-flavescente marginatis; 2 lateralibus pagonio externo albis. Long. 6" 3".

Syn. Temm. Man. I, p. 261. — Naum t. 39, fig. 88. — Bonap. F. Ital. t. 32, 1. — Gordon Jard. Contrib. 1849, Notes etc. p. 7.

Hab. Gambia: Mus. Brem. — Goldküste: Mus. Hamburg. — Cap Coast: Gord.

Anthus Becht.

167. *Gouldii* Fraser. Supra fuscus, subtus pallidior, ferrugineo tinctus; gula alba; remigibus et tectricibus alarum ferrugineo marginatis; cauda corpore intensius tincta; rectrice externa ferruginea; rostro pedibusque flavis. Long. 7".

Syn. Fraser Proceed. Z. Soc. 1843, p. 27. — Allen Exped. Nig. II, p. 493.

Hab. Fernando Po: Fras.

Macronyx Sw.

168. *croceus* (Vieill.) Supra dilute brunneus, plumis singulis medio nigricantibus; rectricibus nigricantibus, 4 lateralibus albo terminatis; subtus laete flavus, torque lato nigerrimo; rostro curvo emarginato pedibusque pallidis. Long. 7 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Alauda crocea* Vieill. Encycl. p. 323, pl. 232, fig. 2. — Id. Dict. I, 573. — *M. flavigaster* Swains. West. Afr. I, p. 215. — Jard. Selby Illustr. of Ornithol., n. s. pl. 22, fig. opt.

Hab. Senegambia, Sw. Mus. Brem. — Galam, Goldküste, Sierra Leone.

b. TURRIDAE.***Pitta*** Temm.

169. *pulchra* Fraser. Supra viridis, nitore nonnullo metallico; fascia verticali media nigra, utrinque late cervino marginata; regione parotica et colli lateribus nigris; tectricibus alae minoribus tectricibusque caudae super. cyaneis; remigibus prim. et sec. nigris, 3—6 fascia alba medio notatis; cauda nigra; gula fere alba; corpore subtus fuscescente-aurantiaco, abdomine imo leviter rubido tincto; rostro pedibusque brunneo-rubris. Long. 6 $\frac{1}{4}$ ".

Syn. Fraser Proceed. Z. Soc. X, p. 190. — Id. Allen Exped. Nig. II, p. 495.

Hab. Sierra Leone „ad pagum Port Lokkoh dictum“: Fras. — Timneh: Thoms.

170. *angolensis* Vieill. Praecedenti similis: sed gula pallide fulvescente-rosea, dilute flavo et inferius saturate flavo marginata; pectore et epigastrio fulvescente-viridibus; abdomine imo, crasso, tibiis et subcaudalibus conspicue rubris; rostro nigro, pedibus albido-griseis. Long. 6 $\frac{1}{4}$ ".

Syn. Vieill. N. Dict. IV, p. 356. — Id. Encyclop. p. 685. — Desm. Iconogr. t. 46.

Hab. Angola: Perrein; Mus. Paris.

Die specifische Verschiedenheit dieser Art von der vorigen bedarf noch weiterer Bestätigung.

Cercotrichas Boie.

171. *erythroptera* (Gm.) Nigra, nitore vix ullo; rectricibus, 4 intermediis exceptis, apice albis; remigibus basi occulta cinnamomels; rostro nigro. Long. 8 $\frac{1}{2}$ ", caud. 4 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. Le Podobé du Senegal: Buff. Enl. 354. — *Turdus erythropyterus* Gm. L. I, 835. — *Sphenura erythr.* Licht. Doubl. S. 41. — Boie, Isis 1831, S. 542. — *Argya erythr.* Laf. d'Orb. Dict. II, p. 126.

Hab. Senegambia. — O.

172. *luctuosa* (Lafr.) Simillima praecedenti, sed remigibus basi occulta nigris. Long. $8\frac{1}{2}$ ".

Syn. Caban. Heine's Catal. I, p. 41. — *Sph. erythroptera* var. *arabica* Ehrenb. Symb. Physic., Av. dec. I, in coroll.

Hab. Senegambia: Less. — O.

Cossypha Vig.

173. *vociferans* Sw. Supra obscure cinerea, capitis lateribus nigris; subtus laete et dilute ferrugineo-flavescens; uropygio rectricibusque lateralibus concoloribus, 2 intermediis nigris; rostro nigro. Long. $7\frac{1}{2}$ ".

Syn. Le Reclameur, Levaill. Afr. pl. 104, av. jun. — *Turdus reclamator* Vieill. Dict. vol. 20, p. 280. — *T. vociferans* Swains. Zool. Illustr. III, pl. 180. — Gen. *Bessonornis* Smith 1836. — *T. revocator* Temm. Tabl. method. p. 14. — Pl. ent. 221. — *T. chrysogaster* Vieill. Enc. 668. — *Muscicapa bicolor* Sparrm., Mus. Carls. t. 46. — Sundev. Oefvers. K. V. Acad. Förhandl. 1849, S. 158.

Hab. Sierra Leone: Afzel. — M.

174. *albicapilla* (Vieill.) Supra saturate fusca, pileo et nucha albis, plumis vix conspicue nigricante marginatis; corpore subtus, uropygio, supracaudalibus et rectricibus lateralibus laete aurantiaco-rufis; rostro nigro, pedibus pallidis. Long. $9\frac{3}{4}$ ".

Syn. *Turdus albic.* Vieill. N. D. 20, p. 254. Id. Enc. p. 655. — White crowned Thrush. Lath. G. H. V, p. 101. — *Petrocincla leucoceps* Swains. West. Afr. I, p. 282. — *T. albiceps* Cuv., Less. Tr. p. 408.

Hab. Senegambia: Sw. Mus. Brem. etc. Sierra Leone: Afzel. — Cap. Coast: Gordon.

175. *verticalis* Hartl. Supra saturate cinerea; nucha uropygio, corpore subtus et rectricibus lateralibus laete aurantiaco-rufis; capitis lateribus nigris; fascia lata longitudinali verticis nivea. Long. $7\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Petrocincla albicapilla* Sw. West. Afr. I, p. 284, pl. 32. — Hartl. Beitr. Ornith. Westafr. p. 23. — *Bessonornis Strainsonii* Bonap. Conspl. p. 301.

Hab. Gambia: Sw. Mus. Brem. — Sierra Leone: Afzel. — Elmina: Mus. Hamb. — O. (Sennaar: Vierthal. Naum. II, S. 52.)

176. *poënsis* Fras. Supra chalybeo-nigricans, subtus rufa; remigibus fuscis, basin versus rufis; rectricibus fuscis, 3 externis albo terminatis; gula obscure cinerascente; rostro atro, pedibus flavescentibus. Long. $7\frac{3}{4}$ ".

Syn. Strickl. Proc. Zool. Soc. 1844, p. 100. — Allen Exped. Nig. II, p. 496. — *Bessonornis poënsis* Bonap. Conspl. p. 301.

177. *diademata* (Temm.) Fusco-olivacea; subtus alba, genis et colli lateribus plumbeis; vertice rufo-aurantio; remigibus fuscis unicoloribus, rectricibus nigricantibus, lateralibus apice albis. Juv. tectricibus alarum remigibusque secundariis macula apicali fulva. Long.—?

Syn. *Turdus diadematus* Temm. in Mus. Lugd. — *Bessonornis diad.* Bonap. Conspl. 302.

Hab. Guinea: Mus. Lugd.

Turdus Lin.

178. *simensis* Rüpp.? Jun. striolis tectricum fulvis, apice dilatatis. Griseus, gastraeo albo, guttis thoracis magnis, crebris, subtriangularibus, fusco-griseis; alis subtus pallide rufis; subalaribus totis rufescentibus; remigum limbo interno concolore, lato, indeterminato; Similis *T. musico*, sed minor, rostro majore etc. Long. *T. iliaci*. Syn. Sundev. Oefvers. K. Vetensk. Ac. Förhandl. 1849, S. 157.
Hab. Sierra Leone: Afzel.
179. *olivaceofuscus* Hartl. Supra olivaceo-fuscus, mento, gula colloque antico pallidioribus, albido variis; corpore infer. reliquo albido, maculis irregularibus fuscescentibus transversim notato; hypochondriis et pectore saturatius fuscescentibus; subalaribus pallide ferrugineis; rostro et pedibus brunneis. Long. 9" 4". (av. jun.?)
Syn. Hartl. Beitr. zur Ornith. Westafrica's, S. 50. — Id. Abhandl. des nat. Ver. in Hamb. II, t. 3, fig. bon.
Hab. Ins. St. Thomé: Weiss in Mus. Hamburg.

Crateropus Sw.

180. *Reinwardtii* Sw. Supra pallide fusco-cinerascens; subtus multo pallidior; alis caudaque umbrinis; pileo nuchaque nigris; mento gulaque superiore albis; pectoris gutturisque plumis medio obscurioribus; rostro nigro, pedibus pallidis. Long. 10 $\frac{1}{2}$ ".
Syn. Swains. Zool. Illustr. II, pl. 80. — Id. West. Afr. I, p. 276.
Hab. Senegambia: Swains., Mus. Brem. etc.
181. *platycercus* Sw. Brunneus, subtus pallidior; uropygio et abdomine pallide cinerascentibus; cauda fusco-nigricante, lata; mento, loris et regione parotica canis; plumis capitis, colli gutturisque margine pallidioribus; hypochondriis et subcaudalibus pallide fulvescente tintis. Long. 9 $\frac{1}{2}$ ".
Syn. Swains. West. Afr. I, p. 274.
Hab. Senegambia: Swains. — Accra: Weiss in Mus. Hamburg.
182. *atripennis* Sw. Saturate castaneus; alis, cauda et interscapuliis nigricante-fuscis; capite colloque totis cinerascente-albidis, nigro marginatis; spatio inter rostrum et oculum nigro; rostro flavo, pedibus fuscis. Long. 8 $\frac{1}{2}$ ".
Syn. Swains. Birds of West. Afr. I, p. 278. — Less. Descript. Mammif. Ois. p. 303. fig. nulla. — *Phyllanthus capucinus* Less., Echo du M. S. 1844, p. 1165.
Hab. Gambia: Sw. Less. — Sierra Leone: Afzel. (Sundev.)

Hypochoereus Cab.

183. *orioides* (Sw.) Corpore supra, alis, cauda, hypocondriis crisoque olivaceo-viridibus; subtus laete flavus, capite colloque totis nigris, plumis singulis albo marginatis; rostro nigro, pedibus pallidis. Long. 8 $\frac{1}{2}$ ", caud. 4".
Syn. *Moho atriceps* Less. Tr. d'Ornith. p. 646. — *Crateropus orioides*, Swains. West. Afr. I, p. 280, pl. 31. — Allen Exped. Nig. I, p. 142. — *Hypochoereus atriceps* Cab. Museum Heineanum I, p. 85.
Hab. Gambia: Mus. Brem. — Cap. Coast: Thomson. — M. (Jard.)

Oriolus Lin.

184. auratus Vieill. Luteus; vitta per oculum ad occiput ducta nigerrima; remigibus atris, secundariis et tectricibus maj. extus luteo limbatis; rectricibus 2 mediis fere totis nigris, reliquis gradatim latius luteo terminatis; rostro et pedibus fusco-rubentibus. Long. 9".

Syn. Loriot d'or, Levailt. Afr. t. 260. — Vieill. N. Dict. 18, p. 194.

— Licht. Doubl. S. 20. — Swains. West. Afr. II., p. 33, pl. 1. — Vieill. Galer. pl. 83. — *O. bicolor* Temm. Catal. syst. 1807, p. 202. — Bonap. Conspl. 348.

Hab. Senegambia, Guinea, Angola. — Aboli ad fl. Niger: Thoms.

— M. O.

185. larvatus Licht. Capite toto et collo antico nigerrimis; corpore subtus et collo postico ranunculaceo-flavis; supra olivaceo-virescens, tectricibus alae major. nigris, albo terminatis; rectricibus 4 mediis olivascentibus, ante apicem flavum nigricantibus; lateralibus intus ex parte nigris, caeterum flavis, nigredine versus intermedias crescente; rostro pedibusque rubrofuscis. Long. $9\frac{1}{4}$ ", rostri a fr. $\frac{9}{10}$, a rictu $1\frac{3}{10}$ ".

Syn. Loriot Coudougnan, Levailt. Afr. t. 261. — Licht. Doubl. S. 20. —

O. melanocephalus var. Vieill. Enc. p. 696. — *O. coudougnan* Temm. Pl. col. text. — *O. chloris* Cuv. — *O. capensis* Sw. West. Afr. II., p. 31. — *O. monachus* Wagl. Syst. Av. sp. 7. — Bonap. Conspl. p. 347.

Hab. Senegambia: Mus. Brem. etc. — M. O. (Oberer weisser Nil: Brun Rollet.)

186. brachyrhynchus Sw. Simillimus praecedenti; differt: statura minore, rostro breviore, magis curvato, rectricibus 4 intermediis olivaceo-viridibus, duabus apice vix conspicue flavanticibus. Long. $8\frac{3}{4}$ ", rostri a fr. $\frac{7}{10}$ ", a rictu 1".

Syn. Swains. Birds of West. Afr. II., p. 37. — Bonap. Conspl. p. 347.

Hab. Sierra Leone: Swains.

187. Baruffii Bonap. „Flavo-viridis; cervice corporeaque subtus flavis; capite nuchaque nigerrimis; alis caudaque nigris; speculo alari albo parvo; rectricibus lateralibus apice eo flaviore, quo sunt remotiores"; intermediis pro majore parte olivaceo-viridibus, ante apicem flavum conspicue et late nigris. Long. circa $8\frac{3}{4}$ ".

Syn. Bonap. Conspl. Av. p. 347. — *O. intermedius* (Mus. Lugd.)

Hartl. Beitr. z. Ornith. Westafr. p. 46.

Hab. Ashantee: Mus. Lugd.

Trichophorus Temm.

188. barbatus Temm. Olivaceus; mento gulaque dilute flavis, plumis medio albidis; pectore ventreque dorso concoloribus, plumis medio griseis, scapis pallide griseis; subcaudalibus pallidioribus, nonnihil fulvescentibus; rectricum apicibus pallide fulvescentibus; pileo nuchaque obscure fuscescentibus. Long. $8\frac{1}{2}$ ".

Syn. Temm. Pl. col. 88. — Schinz Vög. t. 28. — Less. Complém.

VI, p. 98. — *Tr. strigilatus* Swains. West. Afr. I, p. 267.

Hab. Sierra Leone: Temm.

189. olivaceus Sw. Olivaceus, mento gulaque media stramineo-flavis;

subtus magis flavescente-olivaceus; cauda nonnihil rufescente tincta.
Long. 7".

Syn. Swains. West. Afr. I, p. 264. — *Tr. mentalis* Temm. in
Mus. Lugd.

Hab. Senegambia: Sw.

190. *icterinus* Temm. Olivaceo viridis; gula flavissima; cauda rufescente-brunnea. Long. 6".

Syn. Bonap. Conspl. Av. p. 262.

Hab. Guinea: Mus. Lugd.

191. *gularis* Sw. Supra olivaceus, pileo saturate fusco, regione parotica cinerascente; mento gulaque pure albis, pectore ventreque mediis pallide flavis; rectricibus lateribus apice margineque interno pallide flavicantibus. Long. 8".

Syn. Swains. West. Afr. II, p. 266. — *Tr. tephrogenys* Jard.
Selb. Illustr. pl. 127, fig. medicocr.

Hab. Gambia, Sierra Leone: Jard.

192. *poliocephalus* Temm. Medius; supra obscure cinnamomeus, subtus pallide fulvescente-albidus, pileo, genis caudaque plumbeis; rostro nigro. Long. circa 7".

Syn. Bonap. Conspect. gen. av. p. 262.

Hab. Guinea: Mus. Lugd.

193. *canicapillus* Hartl. Corpore supra cum alis et cauda olivaceo-viridi; pileo nucha et capitinis lateribus cinereis; subtus laete flavus; pectore et hypochondriis olivaceo lavatis; subalaribus et remigum marginibus internis flavis; rectricibus lateralibus brevioribus apice flavicantibus; rostro plumbeo, tomis pallidioribus; vibrissis valde elongatis. Long. $7\frac{3}{4}$ ".

Syn. Hartl. Beitr. zur Ornith. Westafr. S. 24. — Brimstone bellied Thrush, Lath. Gen. Hist. V, 103.

Hab. Sierra Leone: Lath. — Gambia: Mus. Brem.

194. *chloris* (Valenc.) Laete olivaceo-viridis; ventre unicoloce cinereo; alis et cauda olivaceis; rostro longo, recto, apice deflexo. Long. 8".

Syn. *Lanius chloris* Valenc. Dict. des Sc. nat. vol. 40, p. 226. — Less. Compl. VIII, p. 432.

Hab. Galam: Mus. Paris.

195. *syndactylus* (Sw.) Supra olivaceo-brunneus, alis ferrugineo tinctis; cauda et tectricibus ejus superioribus laete rufis; regione parotica et pileo concoloribus; subtus stramineus, pectoris lateribus et hypochondriis olivaceo tinctis; rostro corneo, mandibula pallida; setis nuchalibus nullis; rostro ut in genere Dasycephala formato, sed compresso. Long. $9\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Dasycephala syndactyla* Sw. West. Afr. I, p. 261.

Hab. Sierra Leone: Sw.

Ixos Temm.

196. *ashanteus* Bonap. Supra fuscus, subtus pallidior, pileo obscuriore; abdome crisoque albidis, hoc flavicante; rostro nigro, pedibus nigris. Long. circa 7".

Syn. Bonap. Conspect. p. 266. — Verr. Rev. et Mag. 1851, p. 271. — Strickl. Contrib. 1851. p. 132.

Hab. Ashantee: Mus. Lugd. — Gaboon: Verr.

197. *inornatus* Fras. Fuscus, capitis et caudae colore intensiore; corpore subtus sordide albescente-fusco; rostro pedibusque nigris. Long. 8".

Syn. Fraser Proceed. Zool. Soc. 1843, p. 27. — Alleu Expedit. Nig. II, p. 496. — *I. obscurus* Temm. Man. IV, p. 608. — Num *Arsinoë* Licht. ? *barbatus* Desfont. etc. ? Strickl. I. c. p. 132.

Hab. Cap Coast: Fraser. — Angola: Henderson. — Senegal: Mus. Berol.

198. *flavicollis* Sw. Supra obscure olivaceo-brunneus, subtus pallidior, pilei, regionis paroticae et colli lateralis plumis griseo marginatis; remigum marginibus externis et subcaudalibus fulvescentibus; gula pallide stramineo-flava; pectore fulvo-brunnescente. Long. 10".

Syn. Swains. West. Afr. I, p. 259. — Bonap. Conspl. p. 266.
Hab. Senegambia, Sw.

Ixonotus Verr.

199. *guttatus* Verr. Supra brunneo-olivaceus, subtus totus candidus; tectricum remigumque secundariarum apicibus late albis; rectricibus lateralibus candidis; fronte cinerascente, superciliis albidis; pileo obscure cinereo; regione parotica brunnea, albo striata, ophthalmica alba; genis albis; rostro fusco, setis rictalibus nonnullis rigidis; uropygii plumis rhachide robusta, spinosa. Long.

Syn. I. et E. Verreaux Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 306. — Strickl. Contr. to Ornith. 1851, p. 132, 163.

Hab. Gaboon: Verr.

Phyllostrophus Sw.

200. *lugubris* (Bodd.) Supra griseo-fuscus, abdomine crisco et subcaudalibus sordide albis; remigibus rectricibusque fuscis; rostro pedibusque nigris. Long. 8".

Syn. *Merula senegalensis* Briss. Orn. II, p. 261, t. 22, fig. 2. — Gm. L. I, 823. — Merle brun du Senegal Buff. Pl. enl. 563, fig. 2. — Encycl. p. 654. — *Ph. senegalensis* Less. Rev. zool. 1840, p. 135.

Hab. Senegal: Adanson.

201. *scandens* Sw. Supra dilute olivaceus; pileo nuchaque cinereis; tergo, uropygio caudaque dilute cinnamomeis; gula albida, corpore inferiore reliquo fulvescente-albido; hypochondriis crisoque magis rufescentibus; alis olivascente-brunneis; rostro pallido; plumulis frontalibus brevibus, rigidiusculis, rostro incumbentibus. Long. 9 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. Swains. West. Afr. I, p. 270, pl. 30.

Hab. Senegambia: Swains. — Gambia: Mus. Brem.

Andropadus Sw.

202. *latirostris* Strickl. Supra olivaceus, remigibus fuscis, extus viridiolivascente, intus albido marginatis; rectricibus fusco-brunneis, olivaceo limbatis; subtus olivascens; lateribus menti, subalaribus et abdomine medio stramineis; rostro corneo, tomiis pallidis; pedibus pallescentibus. Long. 6 $\frac{3}{4}$ ". Rostrum depresso, 6—7 serrato-dentatum.

Syn. Strickl. Proc. Zool. Soc. 1844, p. 100. — Allen Exped. Nig. II, p. 496.

Hab. Fernando Po: Fraser.

203. *gracilirostris* Strickl. Supra olivaceus, remigibus primariis fuscis, extus olivascente, intus pallide ochraceo limbatis; subtus pallide olivaceo-cinerascens, mento gulaque albidis; abdomine medio crissaque pallide flavescentibus; subalaribus pallide ochraceis; rostro graciliore angustiore pedibusque corneo-fuscis. Long. 7". Rosnrum 2—3 dentatum.

Syn. Strickl. Proceed. Soc. 1844, p. 100. — Allen Exped. Nig. II, p. 497.

Hab. Fernando Po.

c. MUSCICAPIDAE.

Platystira Jard.

204. *melanoptera* (Gm.) Supra nilide chalybeo-nigra, fascia alarum alba; subtus alba, fascia pectorali lata nigra; rectricis extimae pagonio externo albo; caruncula supraoculari erecta rubra. Foem. supra cinerea, mento albo, gutture castaneo. Long. 4 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Muscicapa collaris* Lath. — *M. senegalensis torquata* Briss. Orn. II, p. 370, t. 36, fig. 1. — Pl. ent. 567, fig. 3. ♂. — *Platyrhynchus collaris* Vieill. Enc. 836. — *P. melanoleucus* V. ib. p. 835. — *P. Desmarestii* Jard. Illustr. pl. 9, fig. 2. ♂; fig. 1. ♂. — *P. lobata* Sw. West. Afr. II, p. 49. — Id. Flycatch. p. 187, pl. 22.

Hab. Senegambia: Adans. etc. — Elmina: Weiss in Mus. Hamb. — Cap Coast: Gordon.

205. *senegalensis* (Lin.) Supra nigricante-ardesiaca, interscapulio magis cinereo, pileo caerulescente-cinereo; superciliis maculaque colli postici albis; fascia per oculum nigra; rectricibus nigris, extimus albo-marginatis, reliquis apice albis; subtus alba, pectoris macula transversa nigra; rostro et pedibus nigris. ♂ gula et pectore pallide rufis. Long. 4 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. L. I., 327. — Briss. Orn. II, p. 374, t. 37, fig. 2. 3. — Ent. 127, f. 1 ♂, 2 ♀. — *Platyrhynchus velatus* V. ib. p. 835. — *Muscyrlia* (?) *seneg.* Less. Compl. VIII, p. 386.

Hab. Senegal: Adans. — O. (Abyssin.)

206. *leucopygialis* Fras. Chalybea-nigra; uropygio, gula et abdomen albis; caruncula ophthalmica rubra; rostro nigro. Foem. Castanea, vertice genisque cinereis; mento albo; abdomine albo. Long. 4".

Syn. ♂ Fraser Proceed. 1842, p. 142. — Allen Expedit. Nig. II, p. 499. — Verr. Ilev. et Mag. 1851, p. 309. — *Pl. castanea* Fr. I. c. p. 141, ♀. — Allen Exped. Nig. II, p. 498. — Strickl. Contrib. 1851, p. 163. — Fras. Zool. typic. part 5, fig.

Hab. Fernando Po: Fras. — Gaboon: Verr.

Blas Less.

207. *musicus* (Vieill.) Cristatus, cristae plumis circa 1" longis; niger, nitore aeneo; ventre, crasso, tibiis et subcaudalibus albis; speculo alari albo; rostro nigro; pedibus brevissimis et iride citrinis. Long. 5 $\frac{1}{2}$ ". Alae longae. Rnstrum longum, depresso.

Syn. *Platyrhynchus musicus* Vieill. Diet. d'hist. nat. vol. 27, p. 15. —

Id. Encycl. p. 845. — Moucherolle noir et blanc, Less. Tr. d'Ornith.
p. 385. — *Myiagra flavipes* Swains. Mon. Flycatch. p. 255, 208.
Hab. Congo: Perrein, Mus. Paris.

Muscipeta Cuv.

208. *cristata* (Gm.) Supra badia, subitus cinerea; capite cristato gulaque chalybeo-nigris; cauda cuneata rufa; subcaudalibus sordide albidis; alis rufis, remigum apicibus fuscis; membrana periorphthalmita nuda caerulea; rostro et pedibus nigris. Long. $8\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Muscicapa seneg. cristata* Briss. Orn. II, p. 422, t. 39, fig. 2. — Buff. Ent. 573, fig. 2. — *Platyrhynchus cristatus* Vieill. Enc. p. 842. — Le Tchitrec Levaill. Afr. pl. 142, 143. — *Tchitre crist.* Less. — *M. perspicillata* Sw. West. Afr. II, p. 59, 60.

Hab. Senegal: Adanson. — O. (Oberer weisser Nil: Brun-Rollet).
209. *rufiventris* Swains. Rufa, subtus pallidior; capite cristato cum gula chalybeo-nigro; remigibus secund. albo marginatis, ultimis rufis; tectricibus ex parte albis; cauda cuneata, rectricibus 4 intermedii elongatis. Long. corp. 4" retr. interm. 11".

Syn. Swains. West. Afr. II, p. 53, pl. 5. — *Tchitre Casaman-sae* Less., Rev. zool. p. 277, ♂ ad. — Id. Descript. de Mammif. Ois. p. 223. — Annal. des Sc. nat. IX, p. 173. — Allen Exped. Nig. I, p. 245.

Hab. Senegambia: Sw., Less., Mus. Brem. (Bathurst.) — Ahoh ad fl. Niger: Thoms.

210. *melanogastra* Sw. Capite cristato colloque totis, gula et pectore chalybeo-nigris; abdomine in adultis nigro, in junioribus nigricante-cinereo; subcaudalibus, dorso, alis et cauda laete rufis; remigibus major. nigris; linea alae longitudinali alba; cauda longa gradata, rectricibus 2 mediis valde elongatis. Long. 8".

Syn. Swains. West. Afr. II, p. 55. — Verr. Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 310.

Hab. Senegambia: Sw. — Bathurst: Mus. Brem. — Gaboon: Verr. 211. *senegalensis* (Less.) Capite non cristato, collo toto et thorace chalybeo-nigris; dorso, alis caudaeque tectricibus castaneis, hac ciunamomea, cuneata; remigibus primar. aterriinis, secund. nigris, niveo marginatis, ultimis rufis; tectricibus minoribus albis; abdome crisoque brunneo-ardesiacis. Long. corp. $4\frac{1}{2}$ ", caud. 4".

Syn. Less. Rev. zool. 1838, p. 279. — Less. Ann. des Sc. nat. IX, p. 173.

Hab. Senegal: Less. — Goldküste: Mus. Brem.
212. *tricolor* Fraser. Corpore supra cinereo, infra rufo; crista et mento nitide nigris; rostro pedibusque pallide caeruleis. Cauda — ? Long. al. $3\frac{1}{4}$ ", tars. $5/8$ ".

Syn. Fraser Anu. and. Mag. vol. XII, p. 441. — Id. Proceed. Z. S. 1843, p. 3. — Allen Exped. Nig. II, p. 492.

Hab. Fernando Po: Fras.
213. *Smithii* Fras. Corpore pallide rufo, abdomine laetius et saturatus tineto; cauda subgradata et alis nigrescentibus, cinereo lavatis; capite, collo, rostro robusto pedibusque nigris. Long. $7\frac{3}{4}$ "; caud. 3" 4".

Syn. Fraser Proceed. Zool. Soc. 1843, p. 34. — Allen Exped. Nig. II, p. 492.

Hab. Africa occident.: Fras.

214. *atrocalybea* Thoms. Splendide chalybeo-nigra, basi plumarum atra; remigibus caudaque nigris; marginibus remigum externis dorso concoloribus. Long. $9\frac{1}{2}$ ", rectr. interm. $5\frac{3}{4}$ ".

Syn. Thomson Ann. and Magaz. X, p. 104. — Allen Nig. Exped. II, p. 494. — Hartl. Beitr. Ornith. Westafr. p. 46, ♂.

Hab. Fernando Po: Thoms. — St. Thomé: Weiss in Mus. Hamb.

215. *coerulea* Hartl. Tota dilute coerulea, subtus pallidior, nonnihil cinerascente tincta; cauda valde gradata; remigum et rectricum partibus internis nigricantibus; rostro et pedibus nigricantibus; setis rictalibus longis. Long. 7".

Syn. *Myiagra longicauda* Swains. Monogr. Flycatch. p. 210, pl. 25. — Guinea Tody Lath. Gen. Hist. IV, p. 90.

Hab. Sierra Leone: Mus. Brem. — Elmina: Mus. Hamb.

Muscicapa L.

216. *Fraseri* Strickl. Capite, dorso alisque fuscis, ferrugineo tinctis, remigibus fuscis, primar. extus basin versus obscure ferrugineis, omnibus (1 et 2 exceptis) pogoniis internis ad basin pallide rufis; urupygio, caudae tectricibus corporeque subtus rufo-ferrugineis, gula pallidiore; rectricibus fuscis, 6 intermediis strictissime, lateraliibus late rufo terminatis; rostro lato nigro, pedibus pallide brunneis. Long. $7\frac{1}{4}$ ". Cauda rutundata.

Syn. Strickl. Proceed. Z. Soc. 1843, p. 102. — Allen Exped. Nig. II, p. 491.

Hab. Fernando Po: Fraser.

217. *grisola* L. (?) Supra cinerascente-grisea, fronte albicante, subtus albida; pectore et colli lateribus fusco striolatis; cauda emarginata; rostro nigro. Long. $5\frac{1}{2}$ ".

Syn. Temm. Man. I, p. 152. — Swains. West. Afr. II, p. 52.

Hab. Africa occid. Swains. — S. M.

218. *picata* Swains. Supra grisea, subtus alba, pectore griseo tincto; fasciola frontali, alis cum tectricibus caudaque emarginata nigermis; fascia alae ad basin remigum alteraque marginibus remigum tertiar. formata albis; fronte albicante; remige 2 sextam multo superante. Long. $5\frac{1}{4}$ ".

Syn. Swains. Monogr. of the Flycatch. pag. 254.

Hab. Africa occid. Swains.

Hyloota Swains.

219. *flavigastera* Swains. Supra chalybeo-nigra, remigibus fuscescentibus, pallidioribus, margine externo dorso concoloribus; uropygio alaque tectricibus totis albis; subtus fulvescente-flava, pectore intensius tincto; rostru pedibusque nigris. ♀: obscure cinerea, subtus pallide flavescentes. Long. 5".

Syn. Swains. West. Afr. II, p. 47. — Id. Flycatch. p. 28.

Hab. Senegambia: Swains. Im Brüsseler Museo.

220. *riolacea* Verr. Supra chalybeo-nigra, nonnihil purpurascens;

tetricibus alae 3 vel 4 dorso proximis albis; subtus pallide fulvescens; tibiis nigris; rostro latiore pedibusque fuscis. Long. 5".

Syn. J. & E. Verreaux Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 308. — Strickl. Contrib. to Ornith. 1851, p. 132.

Hab. Gaboon: Verr.

d. AMPELIDAE.

Melaenornis Gray.

221. *edolioïdes* (Swains.) Unicolor nigra, absque nitore; rostro pedibusque nigris. Long. $8\frac{3}{4}$ ", caud. $4\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Melasoma edolioïdes* Swains. West. Afr. I, p. 258, pl. 29. — Allen Exped. Nig. II, p. 41. — *Argya edolioïdes* Lafren.

Hab. Gambia: Sw., Mus. Brem. — Ilha das Rollas: Thoms. — O.

Dicerourus Vieill.

222. *musicus* Vieill. Niger, nitore chalybeo, remig. primar. apice fuscescentibus; rostro pedibusque nigris; cauda vix furcata. Long. 9—10".

Syn. Vieill. N. Dict. IX, p. 586. — Id. Enc. p. 752. — Drongo Drongear Levaill. Afr. t. 167.

Hab. Senegal: Vieill. — M.

223. *canipennis* Swains. Splendide chalybeo-niger, cauda furcata; remigum primariarum pogoniis internis pallidissime brunneis, apicem versus obscurioribus, subtus canescente-albidis. Long. $9\frac{1}{2}$ ".

Syn. Swains. West. Afr. I, p. 254. — *D. lugubris* Ehrenb. Sym. Physic. Av. Dec. I?

Hab. Senegambia: Swains. — O?

224. *atripennis* Swains. Totus splendide chalybeo-niger; remigum pogoniis internis nigerrimiis; cauda subaequali, rectricibus apice truncatis, scapo in setam tenuissimam excurrente, versus basin angustatis, versus apicem dilatatis; subalaribus splendidis. Long. 9".

Syn. Swains. West. Afr. I, p. 256.

Hab. Sicra Leone: Swains.

225. *modestus* Hartl. Niger, nitore nonnullo chalybeo; remigibus primar. et secund. atris; subalaribus dorso concoloribus; subcaudalibus albo variegatis; cauda furcata; iride rubra. Long. 10" 4"".

Syn. Hartl. Rev. et Mag. de Zool. 1849, p. 495. — Id. Beitr. z. Ornith. Westafr. p. 50, t. 4.

Hab. Ins. do Principe: Weiss in Mus. Hamb.

226. *coracinus* Verr. Holosericeo-niger; alis et cauda chalybeo splendentibus; plumis frontalibus antrorsum incumbentibus, holosericeis; cauda furcata. *D. musicus* similis, sed minor. Long. $8\frac{1}{2}$ ".

Syn. Verr. Rev. et Magaz. de Zool. 1851, p. 311. — Strickl. Contrib. 1851, p. 132.

Hab. Gaboon: Verr.

227. *divaricatus* (Licht.) Niger, cauda leviter emarginata, corpore breviore, divaricata. Long. tot. 9", caud. $4\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Muscicapa diraricata* Licht. Doubl. p. 52. — Drongo à moustaches Le Vaill. Afr. t. 169? (*D. mystaceus* Vieill.)

Hab. Senegal: Mus. Berol. — Damara-Gegend: Anderss. — Kordofan: Petherick.

Campephaga Vieill.

228. *phoenicea* (Lath.) Nitide chalybeo-nigra; scapularibus tectricibusque alae minoribus laete coccineis, rostro pedibusque nigris. ♂: supra brunnea, plumis nigro marginatis; remigibus nigricantibus, flavo marginatis; rectrice extima pagonio externo et apice flava; subtus alba, maculis nigris lunulatis notata. Long. 8".

Syn. *Ampelis phoenicea* Auct. — *Turdus phoenicopterus* Temm. Pl. col. 71. — *Campephaga phoenicea* Sw. West. Afr. I, p. 212, pl. 27, 28. — Lep. Tr. p. 369 (deser. var. scap. flavis). — Isid. Geoffr. St. Hilaire in Guér. Mag. de Zool. ser. 1, Ois. pl. 9, ♂ jun. — Rüpp. Monogr. spec. 2, p. 22. — *Ixos phoenicopterus* Temm. Tabl. méth. p. 15.

Hab. Senegambia. Elmiua: Weiss in Mus. Hamb.

229. *xanthornoides* (Less.) Nitide niger, aeneo resplendens; macula scapulari longiuscula laetissime flava; remigibus sericeo-nigris; rostro pedibusque nigris; rictu labroso flavo; ptilosi molli, sericea. Long. 7 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Lanicteris xanthornoides* Less. Ann. des Sc. nat. 1838, p. 169. — *Campephaga xanth.* Caban. Catal. Mus. Heine, p. 61

Hab. Gambia: Less., Mus. Heine.

Celtepyris Cuv.

230. *pectoralis* Swains. Supra dilute cinerea, remigibus nigris, margine cinereis; gula, collo antico et lateralii, regione parotica et pectore saturatiis cinereis, hoc marginem inferiorem versus nigricante; corpore inferiore reliquo albo; ♂: pectore dorso concolore, gula alba. Long. 10".

Syn. *Graucalus pectoralis* Jard. Selb. Illustr. of Ornith. pl. 57. — Swains. West Afr. I, p. 249. — *Pycnonotus niveoventer* Less. Rev. zool. 1840, p. 226. — *Ceblep. cinerascens* Tem., Bp. Conspl. p. 353?

Hab. Gambia: ♂ et ♀ in Mus. Brem. — Sierra Leone: Jard. — Guinea: Mus. Lugd.

231. *azurea* (Cass.) Dilute coerulescens; fronte ad oculos usque, remigibus et cauda nigris; tertianiis irregulariter albo nigroque terminatis; rostro pedibusque nigris. Long. 7 $\frac{1}{2}$ ", al. 4 $\frac{1}{2}$ ".

Syn. *Graucalus azureus* Cass. Proceed. Ac. Philad. 1851, p. 348.

Hab. Sierra Leone: R. Mac Dowell.

Lobotos Reichenb.

232. *Temminckii* nob. Capite, nucha gula colloque metallice virescente-nigris, dorso, alae tectricibus rectricibusque 2 mediis flavescente-viridibus, lateralibus nigris, macula magna flava terminatis; lobulo carneo a rictu dependente cinnabarinus; pectore a domine et uropygio scarlatinis; crasso et subcaudalibus flavis; remigibus nigris, albido limbatis. ♂ pectore et abdomine flavis. Long. 7" 2".

Syn. *Ceblep. lobatus* Temm. Pl. col. 279, 280. — Less. Compl. VIII, p. 390. — Schinz Abbild. Vog. t. 31. Rüpp. — Mon. sp. 3. — *Lanicteris lobatus* Less. Rev. zool. 1839, p. 197. — Bonap. Conspl. p. 356. — Reichenb. Av. Syst. natur. t.

Hab. Guinea: Mus. Lugd.

e. LANIIDAE.

Tephrodornis Swains.

233. *ocreatus* Strickl. Capite supra genisque fusco-atris: dorso toto alisque obscure fusco-plumbeis; remigibus rectricibusque fusco-atris, extus plumbeo limbatis; corpore inferiore toto albo; guttulis pectorisque plumis stricte cinereo marginatis; subalaribus cinereis, albo marginatis. Long. $6\frac{3}{4}$ ". Acrotarsia integra; cauda parum rotundata.

Syn. Strickl. Proceed. Z. Soc. 1844, p. 102. — Allen Exped. Nig. II, p. 489.

Hab. Fernando Po: Fraser.

Prionops Vieill.

234. *plumatus* (Shaw.) Supra nitide niger, chalybeo resplendens; subtus albus; capite cristato colloque albis; fascia nuchali cinerea; ala albo bifasciata; remigibus primar. intus fascia alba notatis, omnibus albo terminatis; cauda nigra, rectrice extima tota alba, reliquis apice albis; verrucis periophthalmicis flavis; rostro nigro, pedibus flavis. Long. 9".

Syn. Le Geoffroy Vail. Afr. pl. 80, 81. — *Pr. Geoffroyi* Vieill. Encycl. 754. — *Lanius plumatus* Shaw. — Sw. West. Afr. I, p. 246, t. 26.

Hab. Senegambia. Guinea.

Laniarius Vieill.

235. *barbarus* (Lin.) Supra nitide niger; subtus laete coccineus; pileo sordide flavo; crasso, tibiis et subcaudalibus dilute fulvis; rostro pedibusque nigris. Long. 9".

Syn. *Lanius barbarus* L. I, 137. — *L. senegalensis ruber* Briss. Orn. II, 185, t. 17, fig. 2. — Levaill. Ois. d'Afr. t. 64. — *Malacorhynchus barbarus* Sw. Zool. Ill. sec. ser. t. 71. — Id. West. Afr. I, pl. 24.

Hab. Senegambia: Adanson etc. — Cap Coast: Gordon. — Goldküste: Weiss in Mus. Hamb. — M.

236. *chrysogaster* (Sw.) Supra dilute cinereus; tergo, uropygio alis caudaque olivaceo-viridibus; fronte, superciliis corporeaque subtus laete flavis, pectore medio pulchre aurantiaco, remigum, tectricum majorum rectricumque lateralium apicibus flavo-albidis. Long. $7\frac{1}{2}$ ".

Syn. Swains. West. Afr. I, p. 244, pl. 25. ♂ — *Malacorhynchus aurantiopectus* Less. Rev. zool. 1839, p. 101. — *M. affinis* Less. Echo du M. S. 1844, p. 1164. — Id. Descri. Mammif. Ois. p. 330. — *M. similis* Smith Rep. of an Exped. app. p. 44. — Id. Illustr. of S. Afr. Zool. Av. t. 46. ♀ — Rüpp. Syst. Uebers. t. 24, fig. boa. — Gordon in Jard. Contrib. Notes etc. p. 8. — Allen expedit. Nig. X, p. 41, 221. — Varied Shrike Lath. Gen. Hist. II, p. 53.

Hab. Gambia: Mus. Brem. etc. — Cap Coast: Gordon. — Ilha das Rollas: Thoms. — Fernando Po: Fras. — M. O. (Natal: Mus. Heine).

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [2_1854](#)

Autor(en)/Author(s): Hartlaub Gustav [Carl Johann]

Artikel/Article: [Versuch einer synoptischen Ornithologie Westafrica's.](#)
[1-32](#)