

Arbeit dem „Extrahefte“ zum vorigen Jahrgange unseres „Journals“ als besondere Beilage einverleibt. Gewiss ein höchst dankenswerthes Opfer zur Förderung der Wissenschaft.

Berlin, im Juli 1854.

Der Herausgeber.

Baron J. W. v. Müller's „Beiträge zur Ornithologie Afrika's“; III. und IV. Lieferung. 1854.

Seit Abfassung des ersten Berichtes über dieses, in aner kennenswerther Weise ausgestattete Werk (Journ. Nr. 10, S. 349–352) sind wiederum 2 Lieferungen desselben ausgegeben worden. Unter dem Titel: „Description des oiseaux d'Afrique nouvellement découverts et dessinés d'après nature,“ und mit französischem Texte, erscheint das Werk gleichzeitig in einer zweiten, vorzugsweise für das gesammte Ausland bestimmten Ausgabe. Die bereits erwähnte Absicht des Verfassers, auch anderweitig entdeckte neue afrikanische Vögel in diese Beiträge aufzunehmen, ist in diesen beiden Lieferungen schon theilweise in Erfüllung gegangen. Wir finden in denselben z. B. einige neue von Dr. Hartlaub benannte Arten des Bremer und Hamburger Museums dargestellt. Für Andere, welche ein Gleiches beabsichtigen möchten, diene zur Nachricht: dass Baron v. Müller dergleichen Vögel, wenn sie an ihn nach Stuttgart, mit oder ohne beschreibenden Text, in natura eingesandt werden, im Namen des Zusenders und mit der von diesem eingesandten Benennung und Beschreibung abbildet, und die Exemplare dann zurücksendet; ausser, wenn der Einsender ihm dieselben etwa für seine Sammlung ablassen will und kann.

Die III. Lieferung enthält:

Taf. 9, Fig. 1. *Catamoherpe macrorhyncha* v. Müll. „Naumannia,“ 1851, Bd. I, Heft IV, S. 27. — „Alis rotundatis, rostro cranii longitudine, basi depresso ac compresso; pedibus atro-fuscis.“ In Unter-Aegypten. Der *C. turdoides* sehr ähnlich, von derselben besonders verschieden durch Folgendes: Schnabel an den Nasenlöchern höher als breit, äusserst schlank und gestreckt; die 1. Schwinge nicht über die grössten unteren Flügeldeckfedern hinausreichend; 2. Schwinge länger als die 5; die 4. um 3 Mm. kürzer als die 3. [Der unter Fig. 2 besonders dargestellte Kopf wird ohne Zweifel der, zur Vergleichung beige-fügte von *C. turdoides* sein; im Texte fehlt aber die Angabe hiervon.]

[Diese *C. macrorhyncha* ist übrigens einerlei mit der, von den früheren Reisenden Hemprich und Ehrenberg in Unter-Aegypten und Arabien entdeckten, und in Ehrenberg's „Symbolae Physicae“ beschriebenen *Curruca Stentorea*. Demnach wird ihr der Name *Acrocephalus Stentoreus* gebühren. Von dem indischen *A. brunnescens*, mit welchem sie früher von mir irrthümlich zusammengestellt wurde, (Mus. Heinean. I, S. 37,) ist sie specifisch verschieden.]

Taf. 10. *Carpospiza longipennis* v. Müll. *Pyrenestes lacteus* v. Müll. „Naumannia,“ 1851, Bd. I, Heft IV, p. 28. — „C. isabellinogrisca; remigibus atro-castaneis; rectricibus, duabus intermediis exceptis, apice albo maculatis; alae longissimae, caudam paulo superantes.“ Abyssinien. Ganze Länge 5“; Flügel $3\frac{1}{2}$ “.

[Steht im Berliner Museum bei der Unterabtheilung *Petronia*, als

Fringilla brachydactyla Ehrb. aus Arabien, (Gumfudde;) von dort ist dieselbe, als *Petronia brachydactyla*, in Bonaparte's Conspectus (p. 510) übergegangen. Ob sie von Hr. Prof. Ehrenberg vielleicht auch schon früher anderweitig bekannt gemacht sein mag, ist mir nicht bekannt. Die Veröffentlichung in Bonaparte's Conspectus sichert ihr jedoch ohnehin schon die Priorität. Der Vogel bildet, als *Carpospiza brachydactyla*, den Typus einer kleinen, zwischen *Petronia* und *Xanthodira* Sundev. mitteninne stehenden Gruppe.]

Taf. 11. *Halcyon Dryas* Hartl.; „Journal für Ornithologie,“ Jahrg. II, S. 2. —

Taf. 12. *Textor sublarvatus* v. Müll. *Ploceus sublarvatus* v. Müll. „Naumannia,“ 1851, a. a. O. — „Mas vere: subtus luteus; facie et rostro nigro; vertice et collo anteriore brunneo-luteo, nitente; dorso olivaceo, scaporum maculis elongatis, umbrino-viridibus; uropygio luteo. Mas hyeme: laete cinereo-viridis; rostro umbrino; stria supra-oculari isabellina; pectore et colli lateribus umbrino-flavis; abdomine tectricibusque caudae interioribus albis.“ Im nördlichen Sennaar und in Süd-Nubien. [Vielleicht, wie der Verfasser selbst vermuthet, zusammenfallend mit *P. intermedius* Rüpp, Syst. Uebers. Vög. Nordost-Afrika's.]

Die IV. Lieferung enthält:

Taf. 13. *Galerida rutila* v. Müll. „Naumannia,“ 1851, S. 29. — „G. supra ferruginea, subtus alba, pectore maculis rubello-isabellinis sparso; stria supra-oculari et collo albo; plumulis interscapulii et tectricibus alarum interne macula longitudinali nigra, margine exteriore alba; rectricibus utrinque duabus externis albis, in vexillo interno macula longitudinali nigra, sequentibus duabus nigris, albo marginatis, caeteris rufo castaneis.“ Ganze Länge $5\frac{1}{2}$ “; Flügel $3\frac{1}{4}$ “; Schwanz $2\frac{1}{4}$ “. Unter-Aegypten.

Taf. 14. *Ruticilla Bonapartii* v. Müll. *R. marginella* Bp. — „R. pectore, ventre, uropygio et cauda rufis; fronte, genis, gula et fascia pectorali nigris; remigibus externe albo marginatis. Remigum 3 et 4 omnium longissimae; 6. longior quam 2.“ Abyssinien.

[Diese, von *R. phoenicura* hauptsächlich durch die weisse Zeichnung auf der Mitte des Flügels sich unterscheidende Art wurde zuerst von Ehrenberg in den „Symbol. Physic.“ als *Sylvia mesoleuca* aus Arabien (Djedda) beschrieben. In die Gattung *Ruticilla* übertragen, wird sie also *Rut. mesoleuca* zu nennen sein.]

Taf. 15. *Strix thomensis* Hartl., Rev. et Mag. de Zool. 1852, p. 2; Jardine Contribut. to Ornith. 1852, p. 118; Cabanis „Journ. f. Ornith.“ 1853. S. 395.

Taf. 16. *Spermestes cucullatus* Sws. — *Loxia prasipteron* Less.; Sundev. Oefvers. K. Vetens. Acad. Förhandl. 1849, p. 159; Hartl. in Cab. „Journ. f. Ornith.“ 1854, sp. 336.

Die Zeichnung zu dieser Abbildung scheint entweder von einem anderen Künstler angefertigt, oder sie ist durch Schuld des Coloristen missrathen; die Farbengebung, und somit auch der Zweck einer naturgetreuen Darstellung, ist hier leider ziemlich misslungen. Glücklicherweise gehört aber dieser Fall unter die Ausnahmen.

Berlin, den 17. August 1854.

Der Herausgeber.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [2_1854](#)

Autor(en)/Author(s): Cabanis Jean Louis

Artikel/Article: [Baron J. W. v. Müller's "Beiträge zur Ornithologie Afrika's", III. und IV. Lieferung, 1854. 445-446](#)