

von Poltalloch (p. 165), durch welchen die Zahl der bekannten Bälge in Gross-Britannien und Irland erst wirklich auf 22 steigt, wie oben (p. 114) in Folge eines Versehens fälschlich angegeben war, sind jetzt 77 Bälge, 9 Skelette und 68 Eier von *Alca impennis* speciell nachzuweisen; ausserdem befinden sich in Kopenhagen die Weichtheile zweier Exemplare und in verschiedenen Sammlungen noch zahlreiche einzelne Knochen von etwa hundert Individuen.

Vorstehende Arbeit bitte ich als einen ersten, noch viele auszufüllende Lücken darbietenden, Versuch einer übersichtlichen Darstellung der Schicksale der Ueberreste von *Alca impennis* nachsichtig beurtheilen und nach Möglichkeit berichtigen und ergänzen zu wollen.

Neue Vogelarten aus Central-Afrika.

Von

Dr. Rich. Böhm.

Crex lugens n. sp.

♀, Oberkopf braun und schwarz längsgestrichelt, das Schwarz nach dem Nacken zu vorherrschend, Kopfseiten sehr fein hellbraun und schwarz gestrichelt, diese Zeichnung sich allmählich in das reine Weiss von Kinn und Kehle verlierend. Ganze Oberseite schwarzbraun, jede Feder mit weisser Zeichnung, die auf dem Halse vorzüglich aus zwei feinen Längsstreifen, auf dem Rücken aus zwei Längsreihen einzelner Flecke besteht. Bürzel und Schwanzfedern schwarz mit ähnlicher, sehr feiner Fleckenzeichnung. Auf den oberen Flügeldeckfedern ziehen sich die Flecken zu unregelmässigen Querstreifen aus, die Ränder derselben zart rehbraun. Alle Federn, namentlich die verlängerten des Hinterrückens, der Flügeldecken, des Bürzels und Schwanzes, mit sehr zerschlissenen Fahnen. Innere Flügeldecken braunschwarz mit weisser Zeichnung. Schwingen schwarzgrau, die ersten mit schmalem weissen Rand der Aussenfahne, die zweiten mit einzelnen kleinen Flecken auf derselben. Hals, Brust und Bauchseiten braunschwarz, weissgeflekt und quergebändert. Mitte von Brust und Bauch weiss. Iris dunkelbraun. Schnabel bleigrau, Füsse lilabläulich. Lg. tot. 17 cm., al. 8,5, al. a caud. 3,5.

Gebiet der Ugalla.

Lanius Schalowi n. sp.

Ganze Oberseite aschgrau, die oberen Schwanzdecken weissgrau, bei ♂ mit schmaler schwarzer Querbinde vor dem Ende. Die ähnlich wie bei *L. caudatus* Cab. borstig aufgerichteten Stirnfedern sowie breiter, über Zügel-, Augen-, Ohrgegend und Halsseiten bis zum Flügelbug verlaufender Streif schwarz, über letzterem ein schmaler, verwaschener, weisslicher Streif. Ganze Unterseite weiss. Schwungfedern erster Ordnung schwarz mit weisser Basis, daher weisser Spiegelfleck, die der zweiten mit schmalem fahlweissen Endsaum. Die zwei mittelsten Steuerfedern schwarz mit verdeckter weisser Basis, die anderen weiss, am Ende etwas über $\frac{1}{3}$ ihrer Länge schwarz mitweissem Endfleck.

Ein erlegtes ♀ auf der Unterseite, besonders am Schwanz, jedenfalls durch äussere Einflüsse, ockerbraun überflogen.

Iris dunkelbraun, Schnabel und Füsse schwarz.

♂ Lg. tot. 27 cm. al. 12. al. a caud. 9. Mittl. Schwanzfeder 13.
♀ „ 27 „ „ 13. „ 10. „ 15.

Boga Katani, am Tanganykasee.

Pyromelana nigrifrons n. sp.

♂ wie *P. franciscana*, aber nur die Stirn, nicht der Oberkopf schwarz und die Schwanzdecken nicht verlängert. Iris braun, Schnabel schwarz, Füsse hellbräunlich fleischfarben. Lg. tot. 12 cm., al. 7, al. a caud. 2.

Karema, am Tanganykasee.

Anmerkung.

In seinem letzten Briefe aus Qua-Mpana am Westufer des Tanganyka, vom 12. Juni 1883, übersandte mir Dr. Rich. Böhm neben verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten, auch die Beschreibungen von acht Arten, welche der Reisende für neu hielt. Die Typen dieser neuen Arten befinden sich in Sammlungen, welche vorläufig, da es Böhm an der nothwendigsten Emballage fehlt, auf der belgischen Station Karema deponirt sind.

Von den 8 neuen Arten hat Dr. Böhm sorgfältig angefertigte Aquarellskizzen eingesendet. Dieselben sind von Herrn Dr. Reichenow und mir verglichen worden, und es hat sich herausgestellt, dass 5 der vermeintlich neuen Arten bereits bekannt sind: *Sterna leucoptera* = (*S. tanganycae* Böhm M. S.), *Querquedula pileata* Licht. (*Qu. cyanorhyncha* Böhm M. S.), *Hyphantornis cardinalis* Hartl. (*Ploceus cruentus* Böhm M. S.), *Pytelia cinereigula* Cab. (*P. pyro-*

pteryx Böhm M. S.) und *P. sanguinolenta* (Temm.) (*P. elegantissima* Böhm M. S.). Die übrigen drei Arten sind oben beschrieben.

Lanius Schalowi Böhm steht, der eingesandten Abbildung sowie der oben gegebenen Beschreibung nach zu urtheilen, dem *Lanius excubitorius* Des Mur's sehr nahe. Ich habe die Abbildung Böhm's mit einem alten Vogel der letztgenannten Art aus Abessynien (Lepsius, Werne) verglichen. *L. Schalowi* ist oberseits mehr hellaschgrau, während *L. excubitorius* tief dunkelgrau gefärbt ist. Die schmale schwarze Uropygialbinde fehlt der letzteren Art. Die Scapularfedern sind bei der neuen Art hellgrau wie der Rücken und nicht tief schwarz.

Herman Schalow.

Neue Vogelarten aus dem Massailand (Inneres Ost-Afrika).

Beschrieben von

Dr. G. A. Fischer und Dr. Ant. Reichenow.

(Nachtrag zu Seite 52—58.)

1. *Cursorius gracilis* Fschr. u. Rchw.

Aehnlich dem *C. bicinctus* Temm., mit zwei schwarzen Brustbinden, aber wesentlich kleiner. Oberseite viel heller, Rückenfedern an der Basis erdbraun, mit sandfarbenem Saume und schmaler, scharf abgesetzter schwarzer Binde vor letzterem; Oberkehle rein weiss, nur auf der isabellfarbenen angeflogenen Unterkehle sehr feine schwarze Schaftstriche. Unterkörper weiss, schwach isabell angeflogen, ohne Schaftstriche; Steiss und Unterschwanzdecken rein weiss. Länge 175—180; Flügel 130; Schwanz 50—55; Lauf 47; Firste 13 mm.

Massailand.

2. *Charadrius venustus* Fschr. u. Rchn.

♂: Oberseits bräunlich grau, Stirn weiss, hinten von einer schwarzen und einer rostfarbenen Binde gesäumt, welche letztere längs der Schläfen verläuft und sich mit einer gleichgefärbten Kropfbinde jederseits vereinigt; Zügelstrich schwarz; Kehle, Kopfseiten und übrige Unterseite weiss; Handschwingen und vordere Armschwingen schwarz mit weissen Schäften, weisser Basis der Innenfahne und schmalen weissen Spitzensäumen. Mittlere Schwanzfedern dunkelbraun, die folgenden an der Aussenfahne mehr oder weniger weiss, die äussersten rein weiss. Schnabel schwarz; Füsse



1. *Parus griseiventris* Rchw. 2. *Euplectes nigrifrons* Böhm. 3. *Ploceus Reichardi* Rchw

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [32_1884](#)

Autor(en)/Author(s): Böhm Richard, Schalow Herman

Artikel/Article: [Neue Vogelarten aus Central-Afrika. 176-178](#)