

JOURNAL

für

ORNITHOLOGIE.

Dritter Jahrgang.

N^o 15.

Mai.

1855.

Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.

Von

Baron Dr. J. W. v. Müller.

(Fortsetzung von S. 1 — 16.)

183. *Nectarinia Longuemarii* Gr.

Cinnyris Longuemarii Less. Illustr. Zool. t. 23. — *Anthreptes leucosoma* Sw. Birds of West. Afr. II, t. 17. — *Cinnyricinclus leucosoma* Less. — Hartl. Synops. sp. 126.

West-Afrika.

184. *Nectarinia melasoma* Gr.

Cinnyricinclus melasoma Less., Rev. Zool. 1840. p. 272.

Aus Senegambien.

III. Familie: *CERTHIDAE*.

Subfamilie: *CERTHINAE*.

185. *Tichodroma* (Ill.) *phoenicoptera* Temm.

Certh. muraria Lin. — *Tichodr. europaea* Steph. — Gould Eur. t. 239. — Buff. enl. 872.

Nach Rüppell in Aegypten und Abyssinien.

Anmerk. Ich konnte nicht ermitteln, ob *Sitta syriaca* Ehrenb. in Afrika vorkomme, was sehr wohl möglich ist.

C. DENTIROSTRES.

I. Familie: *LUSCINIDAE*.

I. Subfamilie: *MALURINAE*.

186. *Oligocercus* (Cah.) *microrus* (Rüpp.)

Journ. f. Ornith. I, 1853, S. 109. — *Troglodytes microrus* Rüpp. Faun. Abyss. t. 41, I. 2. — *Sylvietta brachyura* Lafr., Rev.

Zool. 1839, p. 258. — *Oligura micrura* Rüpp. Vög. N.O.Afr. sp. 115. — Hartl. Synops. sp. 150.

Nubien, Abyssinien, Cordofan und Senegambien.

187. *Oligocercus rufescens* Cab.

Museum ornith. Heineanum, I, p. 44, no. 281. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 135. — *Dicaeum rufescens* Vieill. — *Sylvietta crombec* Lafr. Rev. Zool. 1839, 258. — *Drimoica rufescens* Gray.

Süd-Afrika.

188. *Oligocercus icteropyga* Cab.

Sylvietta icteropygialis Lafr. Rev. Zool. 1839, 258.

Süd-West-Afrika.

189. *Oligocercus lutescens* Cab.

Sylvietta lutescens Less. Echo du monde savant 1844, p. 233. — Hartl. Synops. sp. 151.

Am Senegal.

Quid *Oligura brachyptera* Lafr. ex Sennaar. (Bonap. Consp. p. 257, No. 541. 3)?

Quid *Ol. meridionalis* Sundev. Mus. Holm. ex Afr. merid. (Bonap. Consp. p. 257)?

190. *Syncopta* (Cab.) *brevicauda* (Rüpp.)

Journ. f. Orn. I, 1853, S. 110. — *Sylvia brevicaudata* Rüpp. Atlas t. 35, f. b. — *Ficedula brevicaudata* Rüpp. Vög. N.O.Afr. sp. 149. — *Sylvia chrysochema* Licht. — Hartl. Synops. sp. 149.

Cordofan, Senegal.

191. *Orthotomus* (Horsf.) *griseoviridis* v. Müll.

Diagnosis: *O. subtus* cinereus, medio abdominis albo; capite, uropygio et dorso fusco-cinereo; stria supra-oculari isabellina; pallio, subscapularibus superioribus tibialibusque laete olivaceis; tetricibus caudae superioribus candidis.

In Nubien und Kordofan.

192. *Camaroptera olivacea* Sundev.

Süd-Afrika.

193. *Drymoeca* (Sw.) *maculosa* (Bodd.)

Sylvia macroura Lath. — *Malurus capensis* Steph. — Buff. enl. 752. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 129, 130. — *Drymoeca macroura* Sw.

Süd-Afrika.

194. *Drymoeca thoracica* Gr.

Sylvia gutturalis Boie. — *Apalis thoracica* Sw. — *Sylvia thoracica* Shw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 123. — Swains. Zool. Ill. n. s. 119. — Nat. Miscel. 969.

West-Afrika.

195. *Drymoeca textrix* A. Sm.

Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 131. — Smith Birds of South. Afr. t. 74.

Süd-Afrika.

196. *Drymoeca superciliosa* Sw.

Birds of West.Afr. II. t. 2.

West-Afrika.

197. *Drymoeca subflava* Gr.

- Motacilla subflava* Gmel. — *Sylvia flavicans* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 127.
Süd-Afrika
198. *Drymoeca diophrys* Gr.
Le Vaill Ois. d'Afr. t. 128. — Nat. Misc. t. 973.
Süd-Afrika.
199. *Drymoeca oxyura* Gr.
Sylv. oxyura Shw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 133. — Nat. Misc. t. 957.
Süd-Afrika.
200. *Drymoeca coryphaea* Gr.
Le Vaill Ois. d'Afr. t. 120. — *Thamnobia coryphaea* Cab. Mus. Hein. I, p. 40.
Süd-Afrika.
201. *Drymoeca fulvicapilla* Gr.
Sylvia fulvicapilla Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 124. 1 u. 2.
Süd-Afrika.
202. *Drymoeca ocularia* Smith.
Birds of South. Afr. t 75. fig. 1.
Süd-Afrika.
203. *Drymoeca pectoralis* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 75. fig. 2.
Süd-Afrika.
204. *Drymoeca substriata* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 72. fig 1.
Süd-Afrika.
205. *Drymoeca pallida* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 72. fig. 2.
Süd-Afrika.
206. *Drymoeca ruficapilla* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 73. fig. 1.
207. *Drymoeca Le Vaillantii* A. Smith.
Birds of South. Afr. t 73. fig. 2. — *Malurus tinniens* Licht. Verz. 1842, p. 13, sp. 70. — *Aedon tinniens* Gray. — *Cisticola Levaillantii* Cab. Mus. Heinean. I, p. 44, no. 280.
Süd-Afrika.
208. *Drymoeca terrestris* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 74. fig. 2.
Süd-Afrika.
209. *Drymoeca capensis* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 76. fig. 1.
Süd-Afrika.
210. *Drymoeca subruficapilla* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 76. fig. 2.
Süd-Afrika und Abyssinien.
211. *Drymoeca affinis* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 77. fig. 1.
Süd-Afrika.

212. *Drymoeca cherina* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 77. fig. 2.
Süd-Afrika.
213. *Drymoeca aberrans* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 78.
Süd-Afrika.
214. *Drymoeca chiniana* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 79.
Süd-Afrika.
215. *Drymoeca natalensis* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 80.
Süd-Afrika.
216. *Drymoeca subcinnamomea* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 111. 1.
Süd-Afrika.
217. *Drymoeca fasciolata* A. Smith.
Birds of South. Afr. t. 111. 2.
Süd-Afrika.
218. *Drymoeca clamans* Rüpp.
Zool. Atl. t. 2. f. a. — Pl. col. 466. 2.
Nubien, Sennaar, Kordofan.
219. *Drymoeca gracilis* Rüpp.
Zool. Atl. t. 2. f. b. — Temm. Pl. col. 466. 1. — Descr. de
l'Eg. V. f. 4.
In Aegypten und Nubien.
220. *Drymoeca pulchella* Rüpp.
Zool. Atl. t. 35 a.
Sennaar und Kordofan.
221. *Drymoeca inquieta* Rüpp.
Zool. Atl. t. 36. f. b.
Im peträischen Arabien.
222. *Drymoeca ruficeps* Rüpp.
Zool. Atl. t. 36. f. a.
In Nubien, Kordofan und Abyssinien.
223. *Drymoica rufifrons* Rüpp.
Neue Wirbelth. t. 41.
In Abyssinien.
224. *Drymoeca mystacea* Rüpp.
System. Uebers. t. 10. — Jard. Contrib. 1852. part. 3.
Abyssinien.
225. *Drymoeca robusta* Rüpp.
System. Uebers. t. 13.
Abyssinien.
226. *Drymoeca lugubris* Rüpp.
System. Uebers. t. 11.
Abyssinien.
227. *Drymoeca erythrogeris* Rüpp.
System. Uebers. t. 12.

Abyssinien.

228. *Drymoeca africana* (Gmel.) Gray.
Muscicapa dubia Forst. — *Dasyornis africanus* Sm. — *Sphenura tibicen* Licht. — *Synallaxis cantor* Less. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 112. f. 2. — Swains. Zool. III. pl. 170. — *Sphenoeacus africanus* Strickl.
 Süd-Afrika.
229. *Drymoeca polychroa* Gr.
 Pl. col. 466. 3.
 West-Afrika.
230. *Drymoeca mentalis* Fras.
 Pr. Zool. Soc. 1843. p. 16. — Jard. Contrib. 1849. part. 1.
 West-Afrika.
231. *Drymoeca Strangei* Fras.
 Pr. Zool. Soc. 1843. p. 16. — Allen, Nig. Exp. II. p. 490.
 West-Afrika.
232. *Drymoeca lateralis* Fras.
 Pr. Zool. Soc. 1843. p. 16. — Ann. Mag. Nat. hist. 12. p. 479.
 West-Afrika.
233. *Drymoeca anonyma* v. Müll.
Dr. ruficapilla Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 16. — (Der Name *ruficapilla* konnte nicht bleiben, da es bereits eine solche Species gab.)
 West-Afrika.
234. *Drymoeca rufa* Fras.
 Zool. typica III. pl. 1. — Pr. Zool. Soc. 1843. p. 17.
 West-Afrika.
235. *Drymoeca rufogularis* Fras.
 Pr. Zool. Soc. 1843. p. 17.
 West-Afrika.
236. *Drymoeca undata* Gr.
 Pl. enl. 582. 2. — *S. rufigastra* Vieill. Enc. 440.
 Süd-Afrika.
237. *Drymoeca erythroptera* Jard.
 Contrib. to Ornithology, 1849.
 Cap Coast.
238. *Drymoeca melanorhyncha* Jard.
 Contrib. 1852, part. 3.
 Abomey, Westküste.
239. *Drymoeca fortirostris* Jard.
 Contrib. 1852. part. 3.
 Abomey, Westküste.
240. *Drymoeca badiceps* Fras.
 Proceed. Zool. Soc. 1842, p. 144.
 Fernando Po.
241. *Drymoeca uropygialis* Fras.
 Pr. Zool. S. 1843. p. 17.
 West-Afrika.

242. *Drymoeca brachyptera* Gray.
Bradypterus brachyurus Sw. — *Calamoherpe saltator* Boie. —
 Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 122. — *Bradypterus brachypterus* Cab.,
 Mus. Hein. 1, p. 43.
243. *Catriscus apicalis* Cab.
 Mus. Hein. 1, p. 43.
 Süd-Afrika.
244. *Cisticola* (Less.) *schoenicola* Bp.
 Pl. col. 6. f. 3.
 Ueber ganz Afrika.
245. *Prinia olivacea* Strickl.
 Proc. Zool. Soc. 1844. p. 99. — Allen, Nig. Exp. p. 494. —
 Hartl. Synops. sp. 145.
 Fernando Po.
246. *Prinia icterica* Strickl.
Sylvicola superciliaris Fras. — *Chloropeta* (Smith) *icterica*. —
 Strickl. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 100. — Allen, Nig. Exp. II.
 p. 493. — Hartl Synops. sp. 146.
 Fernando Po.

2. Subfamilie: LUSCINIAE.

247. *Calamodyta* (Meyer & Wolf) *fluviatilis* M. & W.
Acrocephalus stagnatilis Naum. — *Salicaria fluviatilis* Schleg.
 — *Locustella fluviatilis* Degl. — Gould Birds of Eur. t. 102. —
 Descr. de l'Eg. t. 13. f. 3. — Vieill. Dict. t. XI.
 Nach Degland (Ornith. europ. I. p. 539,) in Aegypten. Wurde
 von uns nicht gefunden. Nach Carsten in N.W.Afrika.
248. *Calamodyta phragmitis* (Bechst.)
Sylv. schoenobaenus Vieill. — *Motacilla schoenobaenus* S. —
Salicaria phragmitis Selby. — Gould Birds of Eur. t. 110. —
 Descr. de l'Eg. t. 13, 4.
 Häufig in Aegypten und Algerien.
249. *Calamodyta aquatica* Gr.
Motacilla schoenobaenus Scop. — *Sylvia aquatica* Lath. —
S. salicaria Meyer. — *S. paludicola* Vieill. — *S. cariceti* Naum.
 — *Salicaria aquatica* Keys. — Gould Birds of Eur. t. 111. 2. —
 Descr. de l'Eg. t. 13, 4.
 Aegypten.
250. *Calamodyta sericea* (Natt.)
Sylvia Cetti Marmorata. — *S. platyura* Vieill. — *Salicaria Cetti*
 Schleg. — *Cettia sericea* Bp. — *C. Cetti* Degl. — Gould Birds
 of Eur. t. 115. — Gerbe, Mag. de Zool. 1840. — Roux Ornith.
 Prov. t. 212.
 Aegypten.
251. *Calamodyta africana* v. Müll.
Cettia africana Bp. — Consp. Avium p. 287. — Mus. Lugd.
 Afrika.
252. *Calamodyta luscinioides* (Sav.)

Luscinopsis Savii Bp. — *Cettia luscinioides* Degl. — *Potamodus luscinioides* Bp. — *Salicaria luscinioides* Keys. — Bp. Fauna italic. t. 30. f. 2. — Gould Eur. t. 104.

Aegypten.

253. *Calamodyta arundinacea* (Lath.)

Motacilla arundinacea L. — *Sylvia strepera* Vieill. — *S. affinis* Hardy. — *Salicaria arundinacea* Selby. — *Calamoherpe arundinacea* Boie. — *C. salicaria*, *Brehmii*, *piscinarum*, *alno-rum* et *arbustorum* Brehm. — *Acrocephalus arundinaceus* Rüpp. — Gould Birds of Eur. t. 109. — Bp. Fauna Italica, t. 29. — Naum. V. D. 81, 2.

Im nördlichen Afrika, südlich bis Nubien.

254. *Calamodyta turdoides* Meyer.

Turdus arundinaceus L. — *Acrocephalus lacustris* Naum. — *Turdus junco* Pall. — *Muscipeta lacustris* Koch. — *Salicaria turdina* Schleg. — Gould Birds of Eur. t. 106. — Pl. enl. 513.

Ueberwintert in Nord-Afrika.

255. *Calamoherpe macrorhyncha* v. Müll.

C. longirostris v. Müller. Naumannia 1851. IV. p. 27. — v. Müll. Beitr. zur Ornith. Afrika's, Taf. IX. — *Acrocephalus sten-toreus* Cab., Journ. f. Ornith. II, No 11, S. 445.

Aegypten und Arabien.

256. *Calamodyta palustris* Bechst.

Calamoherpe arbustorum Boie. — Gould Birds of Eur. t. 109. — Bp. Fauna Ital. t. 30. f. 1.

Aegypten.

257. *Calamodyta pallida* Gr.

Salicaria pallida Ehrenb.

Aegypten, Nubien und Senegambien.

258. *Calamodyta languida* Gr

Salicaria languida Ehrenb. — Keys et Bl. Wirbelth. Eur. nota sp. 201. — *Hypolais languida* Cab. Mus. Hein. 1, p. 37.

Ober-Aegypten, Nubien (?).

259. *Salicaria rufescens* Keys. et Blas.

Wirbelth. pag. LIV. sp. 201. 3. — *Calamodyta rufescens* Gr. Kafferland.

260. *Calamodyta babaecula* Gr.

Sylvia babaecula Vieill. — *Calam. loquax* Boie. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 121. 1.

Süd-Afrika.

261. *Calamodyta baeticula* Gr.

S. baeticula Vieill. — *Sylv. isabella* Boie. — Le Vaill. d'Afr. t. 121. 2.

Süd-Afrika.

262. *Calamodyta cinnamomea* Gr.

Curruca cinnamomea Rüpp. Neue Wirbelth. t. 42. 1.

Abyssinien.

263. *Calamodyta lanceolata* Gr.

- Sylvia lanceolata* Temm. — *Salicaria lanceolata* Schleg. —
Cisticola lanceolata Degl. — Temm. Man. d'Orn. III p. 614.
 Kommt ohne Zweifel in Aegypten vor.
264. *Luscinola melampogon* Gr.
Sylvia Bonellii Naum. — *Salicaria melampogon* Keys. —
Cettia melampogon Degl. — Pl. col. 245. 2. — Roux, Orn. prov.
 t. 233.
 Dürfte in Algerien vorkommen.
265. *Sylvia Philomela* Bechst.
Luscinia major Briss. — *Motacilla aedon* Pall. — *Philomela*
major Sw. — Gould Birds of Eur. t. 117.
 Im Winter von uns in Nord-Afrika gefunden. Südlich bis zum
 18. Grad nördl. Breite, z. B. im Monat October in Berber.
266. *Sylvia Luscinia* Lath.
Motacilla Luscinia L. — *Lusciola Luscinia* Keys. et Bl. —
 Gould Birds of Eur. t. 116. — Pl. enl. 615, 2.
 Im Winter in Aegypten und Arabien.
267. *Aedon* (Boie) *galactodes* (Temm.)
Turdus arundinaceus variet. β Lath. — *Turd. rubiginosus*
 Meyer. — Pl. col. 351, 1. — Gould Birds of Eur. t. 112.
 Wahrscheinlich über ganz Nord-Afrika verbreitet.
268. *Aedon minor* Cab.
 Mus. Hein I, p. 39.
 Abyssinien.
269. *Aedon familiaris* Gr.
Sylvia familiaris Ménétr. — *Pandicilla familiaris* de Filippi. —
 Cat. Raison. p. 32.
270. *Aedon leucoptera* Gr.
Salicaria leucoptera Rüpp. System. Verz. Vögel N.O.Afr. t. 15.
 Abyssinien.
271. *Aedon leucophrys* Gr.
Sylvia leucophrys Vieill. — *Turdus pipiens* Steph. — Le Vaill.
 Ois. d'Afr t. 118. — *Thamnobia leucophrys* Cab. Mus. Hein. I, p. 40.
 Süd-Afrika.
272. *Aedon pectoralis* Gr.
Erythropygia pectoralis Sm. Birds of South. Afr. t. 49. —
Thamnobia pectoralis Cab. Mus. Hein. I, p. 40.
 Süd-Afrika.
273. *Aedon paena* Gr.
Erythropygia paena Smth Birds of South. Afr. t. 50 a. et b.
 — *Thamnobia paena* Cab. l. c.
 Süd-Afrika.
274. *Sylvia melanocephala* Gr.
Sylvia ruscicola Vieill. — *S. ochrogenion* Linderm. — Pl. col.
 245. 3. — Gould Birds of Eur. t. 129.
 Nord-Afrika.
275. *Sylvia nigricapilla* (Cab.)
 Mus. Hein. I, p. 35.

Nordost-Afrika.

276. *Sylvia sarda* Marmora.
Pl. col. 245. 2. — Gould Birds of Eur. t. 127.
Wurde von uns nicht gefunden, dürfte aber doch wohl vorkommen.
277. *Sylvia subalpina* Bonn.
S. leucopogon Meyer. — *S. passerina* Temm. — *S. mystacea* Ménétr. — *Erythroleuca subalpina* Kaup. — Pl. col. 6, 2 et 251, 2, 3. — Gould Birds of Eur. t. 124.
In Aegypten und Senegambien beobachtet.
278. *Sylvia Rüppellii* Temm.
S. capistrata Rüpp. — *Curruca Rüppellii* Bp. — Temm. Pl. col. 245. 1. — Rüpp. Atl. t. 19. — Gould Birds of Eur. 122.
Fast im ganzen nördlichen Afrika.
279. *Sylvia curruca* Lath.
S. leucopogon Heckel. — *Motacilla sylvia* Pall. — *Curruca garrula* Koch. — Pl. enl. 380. 3. — Descr. de l'Eg. t. 5. 3. — Gould Birds of Eur. t. 125. 2.
In Arabien, Aegypten und Sennaar beobachtet
280. *Sylvia Naumanni* v. Müll.
Beitr. zur Ornith. Afr. t. XXII. — Naumannia, Archiv f. d. Ornith. 1851. Heft IV. S. 26.
Diagn.: *S. grisea*, vertice in mare et fem. fusco-rubro nitente.
Bei Ambukol in Nubien gefunden.
281. *Sylvia (Curruca) Heinekeni* Jard.
Ill. Orn t. 94. 1.
Von der Insel Madeira.
Ob nicht vielleicht identisch mit *S. Naumanni* v. Müll.?
282. *Sylvia atricapilla* Briss.
Motacilla moschita Gm. — *Monach. atricapillus* Kaup. — Pl. enl. 580. 1, 2. — Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 94. 2. — Gould Birds of Eur. t. 120.
In Nord-Afrika bis Senegambien. Nach Temminck am Cap, falls nicht mit *S. Naumanni* verwechselt.
283. *Sylvia cinerea* Briss.
Motac. sylvia L. — *S. fruticeti* Vieill. — Descr. de l'Eg t. 5, 2. — Pl. enl. 579. 3 et 581. 1. — Gould Birds of Eur. t. 125. 1.
In Aegypten, Nubien, Algerien etc.
284. *Sylvia conspicillata* Marmora.
Pl. col. 6. 1 — Gould Birds of Eur. t. 126.
Kommt in Syrien und wohl auch in Aegypten vor.
285. *Sylvia orphea* Temm.
S. grisea Vieill. — *S. curruca* Br. — Pl. enl. 579. 1. — Gould Birds of Eur. t. 119.
In Aegypten und Nubien.
286. *Sylvia nisoria* Bechst.
Adophoneus nisorius Kaup. — *Nisoria undata* Bp. — Gould Birds of Eur. t. 128.
Ein einziges Exemplar, einen jungen Vogel im Winterkleide,

- bemerkt, den ich im October bei El Muscheiref (Berber, 18 Grad nördl. Br.) erlegte.
287. *Sylvia hortensis* Lath.
Motacilla hortensis Gm. — *S. aedonia* Vieill. — *Epilais hortensis* Kaup. — Pl. enl. 579. 2. — Gould Birds of Eur. t. 121.
 Nord-Afrika.
288. *Sylvia crassirostris* Rüpp.
 Zool. Atl. t. 33 a.
 In Nubien und Kordofan.
289. *Sylvia lugens* Rüpp.
 N. Wirbelth. t. 42.
 In Nubien, Kordofan und Abyssinien.
290. *Sylvia chocolatina* Gr.
Curruca chocolatina Rüpp. Syst. Uebers. d. Vög. N O. Afr. t. 14.
 Schoa in Abyssinien.
291. *Sylvia abyssinica* Rüpp.
 N. Wirbelth. t. 40.
 Abyssinien.
292. *Sylvia Hypolais* Lin.
Hypolais salicaria Bp. — *Salicaria italica* de Philippi. — *Sylvia ambigua* Durazzo. — *Ficedula hypolais* Schleg. — *S. icterina* Gerbe. — *Hypolais icterina* Degl. — Pl. enl. 581. 2. — Bonap. Faun. italic. t. 28. 2. — Pl. peintes 58. 1.
 Ein Exemplar in Nubien beobachtet und erlegt.
293. *Sylvia opaca* Licht.
Hypolais opaca Cab. Mus. Hein. I, p. 36.
 Senegal.
294. *Sylvia natalensis* Gr.
Chloropeta natalensis Sm. — Birds of South. Afr. t. 112. 2.
 Süd-Afrika.
295. *Sylvia sibilatrix* Bechst.
S. sylvicola Lath. — *Sibilatrix sylvicola* Kaup. — Pl. col. 245. 3 — Bp. Faun. ital. t. 27. 1. — Gould. Eur. t. 131. 3.
 Ueberwintert in Nord-Afrika.
296. *Sylvia rufa* Lath.
S. abietina Nils. — *S. collybita* Vieill. — Gould Eur. t. 131. 2. — Bonap. Faun. ital. t. 27. 3.
 Ueberwintert in Nord-Afrika.
297. *Sylvia Bonelli* Vieill.
S. Nattereri Temm. Pl. color. tab. 124. 3. — Bonap. Faun. ital. t. 27. 4.
 Standvogel in Nord-Afrika. Am Senegal.
298. *Sylvia trochilus* Gm.
Motac. acredula Lin. — *Ficedula fitis* Kaup. — *Sylv. flaviventris* Vieill. — *S. icterina* Temm. — Pl. enl. 651. 1. — Descript. de l'Eg. t. 27. 2. — Bonap. Faun. ital. t. 27. 2. — Gould Eur. t. 131. 1.
 Nord-Afrika.

299. *Sylvia umbro-virens* Rüpp.
Faun. Abyss. p. 112.
Abyssinien und Kordofan.
300. *Sylvia obscura* Smith.
Birds of South Afr. t. 112. 1.
Süd-Afrika.
301. *Sylvia senegalensis* Bodd.
S. rufigastrea Lath. — Pl. enl. 282.
West-Afrika.
302. *Sylvia provincialis* Gm.
S. dartfordiensis Lath. — *S. ferruginea* Vieill. — *S. undata*
Gr. — Pl. enl. 655. 1. — Gould Eur. t. 129.
Zufällig in Nord-Afrika.
303. *Troglodytes europaeus* Cuv.
Mot. troglodytes Lin. — *Tr. parvulus* Koch — *Tr. regulus*
Meyer. — *Anorthura troglodytes* Rennie. — Pl. enl. 65. 1. —
Gould Eur. t. 130.
Nord-Afrika.
3. Subfamilie: ERITHACINAE
- 304.? *Copsychus* (Wagl.) *atricollis* (Vieill.)
Le Vaill. Ois. d'Afr. 113.
- 305.? *Copsychus melanicterus* (Vieill.)
Le Vaill. Ois. d'Afr. 117.
306. *Pentholaea frontalis* Cab.
Mus. Hein. I, p. 40. — *Saxicola frontalis* Sw. Birds of
W.Afr. II, p. 46. — *Sax. albifrons* Rüpp. Neue Wirbelth. p. 78.
— Rüpp. System. Uebers. der Vögel N.O.Afr. t. 17. — *Thamnobia*
frontalis Gray. — Hartl Synops. sp. 152.
Gambia, Nordost-Afrika.
307. *Pentholaea melaena* Cab.
Mus. Hein. I, p. 40. — *Thamnobia melaena* Gr. — *Sax. mc-*
laena Rüpp. Neue Wirbelth. 28. 2.
Abyssinien.
308. *Thamnolaea semirufa* Cab.
Mus. Hein. I, p. 8. — *Thamnobia semirufa* Rüpp. — *Sax.*
semirufa Rüpp. Neue Wirbelth. t. 25. 1 u. 2.
Nordost-Afrika.
309. *Thamnolaea* (Cab.) *albiscapulata* (Rüpp.)
Turdus cinnamomeiventris Lafr. Mag. de Zool. 1836. t. 55
und 56. — *Sax. albiscapulata* Rüpp. Neue Wirbelth. t. 26. —
Bonap. Consp. p. 267. Nr. 568. 5. — Id. p. 302. Nr. 645. 1 et 2.
Im nordöstlichen und südlichen Afrika.
310. *Myrmecocichla aethiops* Cab.
Turdus aethiops Licht. — Bonap. Consp. p. 302. Nr. 646. —
Hartl. Synops. sp. 153.
Senegambien.
311. *Myrmecocichla formicivara* (Vieill.) Cab.
S. leucoptera Sw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 186, 187.

Süd-Afrika.

312. *Myrmecocichla nigra* Cab.*Saxicola nigra* (Vieill.) Gr. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 189.

Süd-Afrika.

313.? *Bradornis marequensis* Sm.

Ill. Süd-Afr. Zool. t. 113 a. et b.

Süd-Afrika.

NB. Ich habe dieses Genus nur einmal gesehen, und bin nicht gewiss, ob hier dessen Stelle ist.

314.? *Bradornis major* Smith.

Ill. S Afr. Zool. fig. nulla.

Süd-Afrika.

315. *Dromolaea leucura* Cab.*Turdus leucurus* Gm. — *Saxicola cachinnans* Temm. — *Sax. leucura* auct. — Descr. d'Eg Ois. t. 5. fig. 1. — Gould Birds of Eur. 88. — Hartl. Synops. sp. 154.

In Aegypten und Nubien, häufig an den Nilkatarakten Nubiens. Die meisten eingesammelten, etliche 30 Exemplare, hatten weisse Kopfplatten und waren Weibchen. Ich fand nur ein Männchen mit dieser Auszeichnung. (?)

Quid *S. leucuroides* Guér.?316. *Dromolaea monacha* Cab.*Saxicola monacha* Rüpp. — *S. gracilis* Licht. — Pl. col. 359. 1.

Abyssinien.

317. *Dromolaea cursoria* Cab.*Saxicola cursoria* Gr. — *S. leucomelana* Burch. Afr. Trav. p. 335. — *Sylvia cursoria* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 190.

Süd-Afrika.

318. *Dromolaea monticola* Cab.*Oenanthe monticola* Vieill. — *Vitiflora rupicola* Boie. — *Gryllivora capensis* Sw. — *Saxicola monticola* Gr. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 184. 1.

Süd-Afrika.

319. *Saxicola cinerea* Vieill.*S. Levaillantii* Sm. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 184. 2.

Süd-Afrika.

320. *Saxicola albifasciata* Rüpp.

Syst. Uebers. der Vögel N.O.Afr. t. 16.

Abyssinien.

321. *Saxicola* (Bechst.) *oenanthe* (Lin.)*S. cinerea* Vieill. — *S. vitiflora* Pall. — Pl. enl. 554. — Gould Birds of Eur. t. 90.

In ganz Nord- und Nordost-Afrika.

322. *Saxicola stapazina* Vieill.*Motac. stapazina* Gm. — Edw. Birds t. 31. — Gould Birds Eur. t. 91.

In Nord-Afrika, südlich bis Nubien.

323. *Saxicola saltator* Ménétr.

- S. stapazina* Pall.
Nubien und Abyssinien.
324. *Saxicola squalida* Eversm.
S. melanoleuca Steph. — *S. valida* Licht. — *S. olivastra* Rüpp.
Nordost-Afrika.
325. *Saxicola aurita* Temm.
Oenanthe albicollis Vieill. — Pl. col. 275. 1. — *Vitiflora rufescens* Briss. Orn. III. t. 25. 4.
Nord-Afrika.
326. *Saxicola lugens* Licht.
S. leucomela Temm., aber nicht *S. leucom.* Pall. — Pl. col. 257. 3.
Aegypten und Nubien.
327. *Saxicola albicilla* v. Müll.
Beitr. zur Ornith. Afr. tab. III. — Naum. 1851. IV, S. 28.
Hochabyssinien.
328. *Saxicola atricollis* v. Müll.
Naum. 1851. IV S. 28. — v. Müll. Beitr. zur Orn. Afr. t. IV.
Abyssinien.
329. *Saxicola deserti* Rüpp.
Pl. col. 359. 2.
In Nubien, selten.
330. *Saxicola melanura* Rüpp.
Pl. col. 257. 2.
In Nubien, am rothen Meere.
331. *Saxicola moesta* Licht.
Bonap. Consp. p. 304 15.
Aegypten.
332. *Saxicola leucorrhoea* Gm.
Buff. Enl. 583. 2. — Less. Tr. d'Orn. p. 413. — Harl. Synops.
sp. 155.
Senegambien.
333. *Saxicola isabellina* Rüpp.
Atlas t. 34. fig. b.
Nubien und Abyssinien.
334. *Saxicola pallida* Rüpp.
Atl. 34 a. — Pl. col. 472. 1.
Nubien
- 335.? *Saxicola sordida* Rüpp.
Neue Wirbelth. t. 26. 2.
Einzeln in Abyssinien.
336. *Saxicola rufocinerea* Rüpp.
Neue Wirbelth. t. 27. 1 und 2.
Abyssinien.
337. *Saxicola lugubris* Rüpp.
Neue Wirbelth. t. 28. 1.
Abyssinien.
338. *Saxicola infuscata* Smith.

Ill. Süd-Afr. Zool t. 28.
Süd-Afrika.

339. *Saxicola fasciata* Temm.
Pl. col. 472. 2.

Süd-Afrika.

340. *Saxicola pileata* Gm.

Sylvia imatrix Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 181 u. 182.
Süd-Afrika.

341.? *Saxicola hottentota* Gm.

Süd-Afrika.

342. *Saxicola sperata* Gr.

Le Vaill. Ois. d'Afr. 183.
Süd-Afrika.

343. *Saxicola familiaris* Steph

Oenanthe explorator Vieill. — *Turdus sordidulus* Forst. —
Le Vaill. Ois. d'Afr. 183. 1 und 2.
Süd-Afrika.

344. *Saxicola salina* Eversm.

S. gutturalis Mus. Berol. pt. Hempr. et Ehrenb. ? — Eversm.
Addend. Fas. III tab. VIII f. 2. — Journ. f. Orn. 1853. p. 287.
Nach Cabanis von Hemprich und Ehrenberg im Winter
in Nubien eingesammelt.

345. *Saxicola baroica* Smith.

Bonap. Consp. p. 303.
Süd-Afrika.

346. *Pratincola* (Koch) *rubetra* (Lin.)

Sylvia rubetra Lath. — *Saxicola rubetra* Temm. — Pl. enl.
678. 2. — Gould Birds of Eur. t. 93. — Naum. Vg. D. t. 89. 3 u. 4.
In ganz Nord-Afrika.

347. *Pratincola rubicola* (Lin.) Koch.

Mot. maura Pall. — *S. muscipeta* Scop. — Pl. enl. 678. 1. —
Gould Eur. t. 94. — Naum. Vög. Deutschl. 90.
Nord-Afrika, südlich bis Abyssinien.

348. *Pratincola Hemprichii* Cab.

Mus. Hein. I, p. 11. — *Sylvia Hemprichii* Ehrenb. — *Saxi-*
cola Hemprichii Keys et Bl.
Nubien und Abyssinien.

349. *Pratincola Sibilla* Cab.

Mus. Hein. I, p. 10. — *Motac. Sibilla* Gm. — *Saxicola maura*
Temm. — *Pratincola pastor* Strickl. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 180.
Am Cap.

350. *Pratincola fervida* (Gm.)

Bull. enl. 583. 1. — Hartl. Synops. sp. 159.
Senegambien.

351. *Pratincola salax* (Verr.)

Mag. de Zool. 1851. p. 307. — Strickl. Contrib. 1852 part. 5.
Gaboon.

352. *Pratincola senegalensis* (Briss.)

- Mot. senegalensis* Lin. — Briss. Orn. III. t. 20. 3.
Senegal.
353. *Ruticilla* (Brehm) *phoenicura* (Lin.)
Pl. enl. 351. 1. 2. — Gould Eur. t. 95.
In Nord-Afrika.
354. *Ruticilla Bonapartii* v. Müll.
Beitr. zur Orn. Afr. tab. XIV. — *Rutic. marginata* Bonap. —
Rutic. mesoleuca (Ehrenb.) Cab. Journ. f. Ornith. II, p. 446.
Nordost-Afrika.
355. *Ruticilla tithys* Brehm.
Sylvia tithys Scop. — *Mot. atrata et gibraltariensis* Lath. —
Edw. Birds t 29. — Gould Eur. 96.
In Nord-Afrika.
356. *Erithacus rubecula* Cuv.
Motacilla rubecula Lin. — *Sylvia rubecula* Lath. — *Dandalus*
rubecula Boie. — *Rub. familiaris* Blyth. — Pl. enl. 360. 1. —
Gould Eur. t. 98.
Im Winter in Nord-Afrika.
357. *Cyanecula* (Brehm) *suecica* (Lin.)
Sylvia suecica Lath. — Pl. enl. 361. 2 und 610. 1. 2. 3. —
Gould Eur. t. 97.
Im Winter in Nord-Afrika. Am häufigsten fand ich die Varietät
mit rothgelbem Sterne, doch kamen auch Vögel mit weissem und
solche vor, welche eine rein blaue Brust trugen.
358. *Pogonochila stellata* Cab.
Mus. Hein I, p. 2. — *Muscicapa stellata* Vieill. — Le Vaill.
Ois. d'Afr. tab. 157.
Süd-Afrika.
4. Subfamilie: PARINAE.
359. *Parus leucopterus* Sw.
Birds of W.Afr. II. p 42. — Bonap. Consp. p. 228. — Hartl.
Synopsis sp. 162. — *Pentheres leucopterus* Cab. Mus. Hein. I, p. 62.
Senegal.
360. *Parus leucomelas* Rüpp.
Neue Wirbelth. tab. 37. f. 2. — *Pentheres leucomelas* Cab. l. c.
Abyssinien.
361. *Parus leuconotus* Guér.
P. dorsatus Rüpp. Syst. Uebers. V. N.O.Afr. t. 18. — *Pen-*
theres leuconotus Cab.
Abyssinien.
362. *Parus niger* Vieill.
P. luctuosus Licht. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 137. 1. — *Pen-*
theres niger Cab.
Süd-Afrika.
363. *Parus funereus* (Verr.)
Melanoparus funereus Jul. et Ed. Verr., Journ. f. Ornith. III,
No. 14, S. 104.
Gabun.

364. *Parus cinerascens* Vieill.
Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 138.
Süd-Afrika.
365. *Parus afer* Gm.
Le Vaill. Ois. d'Afr. tab. 139. fig. 2. (in textu fig. 1.) — *Parus fuscus* Vieill. — *P. afer* Jard. Ill. Orn. t. 117. — *P. afer* Cab. Mus. Hein. I, p. 92.
Süd-Afrika.
- 366.? *Parus Ledouci* Malherbe.
Mém. Acad. Metz. 1842. — Bonap. Consp. p. 229. No. 15.
Aus Nord-Afrika. (Mir unbekannt.)
367. *Parus coeruleanus* Malh.
P. ultramarinus Bp. Consp. p. 229. — Rev. Zool. 1841. p. 146.
— Gr. Gen. of Birds t. 52. — *Cyanistes ultramarinus* Cab.
Nordwest-Afrika.
368. *Anthoscopus capensis* Cab.
Mus. Hein. I, p. 89. — *P. capensis* Gm. Sonn. Voy. t. 115. — *Paroides capensis* Gray.
Süd-Afrika.
369. *Anthoscopus minutus* Cab.
Mus. Hein. I, p. 89. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 134. — *Sylvia minuta* Shaw. N. Misc. t. 997. — *S. anthophila* Boie. — *Parus Smithi* Jard. Edinb. J. Nat. sc. n. ser. I. t. 5. — *Aegithalus Smithi* Jard. Selb. Ill. Orn. tab 113, 1. — *Drymoica minuta* Gray. — *Parus pensilis* Licht. Bonap. Consp. p. 231. — *Paroides pensilis* et *Smithi* Gr.
Süd-Afrika.
370. *Parisona frontale* Rüpp.
Syst. Uebers. d. Vög. N.O.Afr. t. 22. — *P. Galinieri* Guér.
Abyssinien.
371. *Parisona subcoeruleum* (Vieill.)
P. rufiventer Sw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 126.
Süd-Afrika.

5. Subfamilie: MNIOTILTINAE.

372. *Zosterops* (Vig.) *madagascariensis* (L.)
Sylvia annulosa Sw. — *Zost. flavigula* Sw. — Briss. Orn. III. t. 28. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 132. — Sw. Ill. Zool. t. 164.
In Süd- und Ost-Afrika, nordwärts bis Abyssinien
373. *Zosterops flava* Sw.
Z. senegalensis Bp. — Sw. Birds of W.Afr. II. t. 3. — *Z. citrina* Hartl. Beitr. Orn. West-Afr. S. 22. — Reichenb. Vollst. Naturgesch. t. 460. fig. 3288. — Hartl. Syn. sp. 163.
Senegal.
374. *Zosterops borbonica* Bodd.
Z. cinerea Sw. — Pl. col. 705. 2.
Madagascar.

(Schluss folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [3 1855](#)

Autor(en)/Author(s): Müller John Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's
193-208](#)