

Von diesen hier beschriebenen Vögeln befinden sich in den Sammlungen von

Frankfurt: *Gabianus bathyrhynchus* und *Xema Sabini* adult.

Wiesbaden: *Dominicanus Fritzei*.

Paris: *Dominicanus Verreauxii*, *Gavina Bruchii* und *citrirostris*, *Gavia corallina*, *Atricilla microptera*, *Chroicocephalus Franklini* und *Creagrus furcatus*.

Berlin: *Laroides glaucopterus*, *chalconotus* und *cachinnans*.

Neuwied: *Laroides borealis*.

Bremen: *Laroides occidentalis*.

Petersburg: *Rissa brevirostris*, und

Mainz: *Rhodostethia rosea*, *Xema Sabini* hornotina, und alle die übrigen.

Mainz den 1. Mai 1855.

## Literarische Berichte.

### Literarische Notizen.

Von

Ernst A. Zuchold,

in Leipzig.

I. Ein Verzeichniss der in Spanien, vorzugsweise in der Provinz Madrid beobachteten Vögel befindet sich in dem Anhange folgender Schrift: D. Francisco de Lujan, Memoria que comprende el resumen de los trabajos verificados en el anno de 1852 por las diferentes secciones de la Comision encargada de formar el mapa geológico de la provincia de Madrid etc. Madrid: 1854. 4<sup>o</sup>.

II. Ueber einige neue und wenig bekannte Vögelarten aus Chili und Columbia, von F. de Lafresnaye. (Guerin-Meneville, Revue et Magasin de zoologie. 1855. N. 2.)

Subfamilie: *Fluvicolinae*, Gen. *Muscisaxicola* Lafr., Syn. av., p. 65, 1837 (1.). — *Ptyonura* Gould, 1840. — Bp. Consp., p. 196.

1. *M. flavinucha* Lafr. — Supra tota murino-grisea, tectricibus totis, remigibusque magis fuscis pallidioribus limbatis et terminatis; macula magna occipitali pallide ochracea; cauda nigra, reetricibus duabus utrinque extimis, tertiaque argute, extus albo limbatis, fronte vittaque lata superciliari brevi, a naribus ad medium oculum, tantummodo, oculorum ambitu mentoque albis; subtus tota albido-cinerea, pectore hypochondriisque cinereis; rostro pedibusque nigris. — Longit. tota (ave nondum arte farcto,) 18 cent.; alae plicatae 13 cent.; caudae 8½ cent.; tarsi 3¼ cent. — Habitat in regione Chilense. — Diese chilesische

Art ähnelt in Gestalt und Färbung im Allgemeinen sehr der *Muscisaxicola ruficrux* Lafr., Synops., et d'Orb., Voy. pl. 40, 2, nur ist sie grösser.

2. *M. albiflora* Lafr. — Supra murino-grisea; alae concolores remigibus tectricibusque totis magis fuscis, pallidior marginatis, verticis plumis aliquot ferrugineo tinctis; cauda, ejusque tectricibus superis apice, nigris, rectrice extima laterali extus albo limbata; loris, gula, collo antico et laterali, pectore, abdomine anoque cinerascens albidis; rostro pedibusque fortibus nigris; ungulo postico valde elongato parum curvato. — Longit. tota (ave arte facta,) 15 cent., alae plicatae  $10\frac{3}{4}$  cent., caudae 6 cent., tarsi 3 cent.

3. *M. albimentum* Lafr. — Supra tota fusco-grisea, pileo brunnescenti-fusco, alis nigro-fuscis, tectricibus remigibusque totis pallidior marginatis; cauda obscure nigra; rectrice extima laterali pogonio externo albo, secunda limbo strictissime extus sordide pallido. — Longit. tota (ave arte facta,) 15 cent.; alae plicatae  $10\frac{3}{4}$  cent.; caudae  $6\frac{1}{4}$  cent.; tarsi  $2\frac{1}{2}$  cent. — Habitat . . . . ? — Mit diesen drei neuen Arten umfasst die Gattung *Muscisaxicola* im Ganzen 10. Die sieben bisher bekannten sind in dem *Conspectus* des Prinzen Lucian Bonaparte, Seite 196 aufgeführt.

---

III. Beschreibung zwei neuer Arten *Ptilotis* und *Eöpsaltria*, von John Gould, F. R. S. (*The Anna's and Magazine of natural history*. Vol. XIV. Nr. 82. p. 302. London 1854. 8<sup>o</sup>.)

*Ptilotis fasciolaris*. — Die ganze Oberseite, Flügel und Schwanz olivengrün (olive-brown); Kopf- und Rückenfedern mit dunklerem Mittelstreif; Schwung- und Schwanzfedern nach aussen schmal grünlich wachsgelb gesäumt; Zügel und ein Strich vom hintern Augenwinkel an der Seite des Kopfes hinab dunkelbraun; Ohrdecken blass-gelb; auf jeder Seite des Nackens ein gelblich weisser Flecken; die Federn an der Kehle braunschwarz, blassgelb gerandet, wodurch denselben ein gestreiftes Ansehen verliehen wird; Brust dunkel-braun; Unterseite braun gestreift, nach dem Bauche zu blasser werdend; Iris bleifarben; Schnabel und Füsse schwarz. Totallänge:  $7\frac{1}{2}$  Zoll; Schnabel  $\frac{7}{8}$ ; Flügel:  $3\frac{3}{4}$ ; Schwanz:  $3\frac{1}{2}$ ; Tarsen:  $1\frac{1}{8}$  Zoll. Hab.: Mangrove Island, Moreton-Bay. (Ostküste von New-Holland.)

*Eöpsaltria Capita*. — Oberseite olivengrün, auf dem Kopfe ins Bräunliche spielend; Flügel und Schwanz schieferartig braun, matt olivengrün gesäumt; Ohrdecken grau; Zügel, eine am Auge hinabgehende Linie und die Kehle graulich weiss; Unterseite gelb; Iris hellbraun; Schnabel schwarz; Füsse bräunlich fleischfarben. Totallänge: 5 Zoll; Schnabel:  $\frac{5}{8}$ ; Flügel:  $3\frac{1}{8}$ ; Schwanz:  $2\frac{1}{4}$ ; Tarsen:  $\frac{7}{8}$  Zoll. Hab.: In den Dickichten am Brisbane: Flüsse in Neu-Süd-Wales. — Anmerkung: Gedrungener und von weniger ziemlicher Gestalt als *E. australis*, mit einem starken, breiten Schnabel und verhältnissmässig grossem, dickem Kopfe.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [3 1855](#)

Autor(en)/Author(s): Zuchold Ernst Amandus

Artikel/Article: [Literarische Notizen 293-294](#)