

JOURNAL
für
ORNITHOLOGIE.

Dritter Jahrgang.

Nº 17.

September.

1855.

Beschreibung einiger neuen,

von **Herrn H. S. Pal,**

holländischem Residenten an der Goldküste,

daselbst gesammelten

Vögelarten.

Von

Dr. G. Hartlaub.

1. *Astur macrourus* Temm.

♂. Supra fuscus, pilei, colli lateralis et nuchae plumis parte basali albis; supracaudalibus fuscis, fascia lata alba terminatis; cauda valde elungata, cuneata; rectricibus dilutius brunneis, fasciis 5 latis nigricantibus, subtus albo et nigricante fasciatis, ipso apice albis; alis subrufescentibus, remigibus anguste fusco-nigricante fasciatis, subalaribus albis, maculis magnis nigris; subtus albus, maculis multis magnis rotundatis fusco-nigris; hypochondriis et braccis late nigro alboque fasciatis; subcaudalibus albis, maculis nonnullis majoribus fuscis; cera et angulo oris aurantiacis, pedibus flavis, rostro nigricante; iride pallide flava.

Long. tot. circa 23", caud. a bas. 14", rectr. extim. 10", al. 11 $\frac{1}{2}$ ", tars. 2" 8^{'''}.

Von Dabocrom.

2. *Astur Temminckii* Pel.

Supra niger, plumis versus basin fusciscentibus; remigibus pogonio interno maculis majoribus subquadratis albidis, brunneo variegatis; cauda fuaca, fasciis 5—6 transversis obscurioribus, parum distinctis;

subtus albus, lateribus nigris, maculis nonnullis subtriquetris albis; subcaudalibus albis; braccis nigris; tarsi flavis, unguibus nigris; rostro basi pallido, apicem versus nigricante. ♂ ad.

Long. 15", caud. 7", al. 8½", tars. 2" 4".

Foem. multo major. Long. tot. 20", caud. 9⅓", al. 10¾", tars. 3⅓".

Rio Bontry.

3. *Astur macrocelides* Temm.

Supra fuscus, pilei et colli lateribus nuchaque albo variegatis; cauda longa, fusca, fasciis 5 nigricantibus, subtus pallida, fasciis angustioribus, apice albida; subtus albus, maculis colli et pectoris subguttatis fuscis; epigastrio, abdomine medio et subcaudalibus pure albis; hypochondriis et cruribus late fusco-fasciatis; pedibus robustis, flavis; rostro plumbeo. ♂.

Long. circa 13", al. 7¾", caud. 7", tars. 2" 4", dig. med. c. ung. 1" 7".

♀. Major; maculis a mento decurrentibus nullis; corpore inferiore medio immaculate albo, lateribus totis maculis ovatis fuscis; braccarum fasciis magis rufescentibus, strictioribus. Long. 14⅓".

Guinea.

4. *Nisus erythropus* Temm.

Supra nigro-fuscus, cauda supra fusca, late nigricante-fasciata, rectricum pogoniis internis maculis subtriquetris albis; subtus albus, gula, jugulo, abdomine imo crisso et subcaudalibus immaculatis, pectore et abdomine fusco-fasciatis; rostro nigro, pedibus, cera et angulo oris rubris; hypochondriis et braccis dilute rufescentibus, indistincte pallidius fasciolatis ♂.

Long. *N. minulli*, al. 5" 5", tars. 1" 7".

Rio Bontry. — Scheint von *minullus* verschieden zu sein.

5. *Bubo fasciolatus* Temm.

Supra in fundo laete fulvo fusco fasciolatus, alis et cauda simili modo pictis; remigibus majoribus nigricante-fuscis, late nigricante transversim maculatis; alae tectricibus et plumis auricularibus elongatis multum nigricantibus; regione periorbitali dilutius rufescente, corona nigro-notata; subtus in fundo albo fusco et laete fulvo fasciolatus, fasciis in jugulo et pectore angustius positis; subalaribus albis, fusco el fulvo fasciatis; rostro albedo, setis basalibus nigris; unguibus pallidis; iride vitellina. ♂ ad.

Long. circa 18", al. 13", caud. 5", dig. med. 2" 2".

Foem. multo pallidior.

Dabocrom. — Ist wahrscheinlich mit *B. poensis* Fras. zu identificiren, dieser letztere jedoch zu unvollständig beschrieben.

6. *Bubo leucostictus* Temm.

Supra in fundo brunneo fasciolis et maculis pallidioribus et rufescentibus transversim notatus, alis hinc inde magis albicantibus, remigibus fuscis, maculis transversis angustioribus nigro vermiculatis; pileo et plumis auricularibus elongatis albedo brunneoque variis; corona latera-

liter nigro-notata; regione periophthalmica obscurione; subtus in fundo pure albo hinc inde irregulariter fusco rufoque fasciolatus; subcaudalibus albis, fasciis rarioribus strictis fuscis; cruribus et tarsis albedo et brunneo fasciolatis. ♂ ad. Long. 19", al. 12½", caud. 5" 8", tars. 1" 9".

Foem. Supra multo albidior; subtus vix diversa.

Dabocrom.

7. *Hirundo obscura* Temm.

Parva; tota unicolor fusco-nigra, nitore nonnullo aeneo; subtus fuscior; cauda profunde furcata; rostro minimo. ♂.

Long. 4" 8", rectr. extim. 2" 2", rectr. med. 1" 4", rostr. 1¾", a. rict. 3¼", al. 3¼", tars. 4¼".

Dabocrom.

8. *Caprimulgus binotatus* Temm.

Valde obscurus, nigro-fuscus, subtilissime rufo punctulatus et vermiculatus, alis hinc inde minus obscuris; cauda aequali distinctius rufo variegata; subtus paullo pallidior et magis fulvescens; macula ad colli latera nivea; remigum pogoniis externis fuscis; maculis parvis rufis rarioribus. ♂.

Long. 9¼", caud. 3" 8", al. 6".

Dabocrom.

9. *Muscipeta nigriceps* Temm.

Laete rufa; capite non cristato toto holosericeo nigro; rectricibus 2 mediis valde elongatis; remigibus fuscis, tertiariis late rufo-marginatis; subalaribus rufis. ♂. Foem. cauda gradata.

Long. 6¾" (rectric. 2 med. except. 5" longis). caud. 2" 8", al. 2" 10", rostr. 6½", tars. 6".

Guinea.

10. *Stiphronis* *) *erythrothorax* Temm.

Supra olivaceo-viridis; macula parva inter rostrum et oculum utrinque alba; regione ophthalmica et parotica nigra; mento gula et pectore laete aurantiaco-rufis; abdomine albedo, medio subflavicante; lateribus cinerascens; subcaudalibus et subalaribus albidis; remigibus et cauda olivaceo-fuscescentibus; rostro nigro; pedibus pallidis. ♂.

Long. 4¼", rostro 5⅓". al. 2½", caud. 1" 4", tars. 11", dig. med. c. uug. 6½".

Dabocrom.

11. *Stiphronis superciliaris* Temm.

Supra olivaceo-viridis; fascia lata per oculum nigro-olivacea, superciliis pallide flavis; subtus obsolete flavescens, hypochondriis magis olivaceis; rostro fusco, pedibus plumbeis; subalaribus flavidis.

*) Rostrium mediocre, rectum, crassiusculum, apicem versus subcompressum, submarginatum; setis rictalibus nullis.

Alae breviusculae, caudae basin vix superantes, rem. tertia longiss.

Cauda breviuscula, aequalis.

Pedes graciles; tarsi satis elongati; digiti longi, graciles, unguibus longiusculis, tenuibus.

Diese eigenthümliche Form wäre im System etwa bei *Chloropeda* Smith zu placiren.

Long. $4'' 4'''$, al. $2'' 2'''$, rostr. $4\frac{1}{2}'''$, caud. $1'' 3'''$, tars. $7\frac{1}{2}'''$.
Guinea. — Weniger typische Art.

12. *Trichophorus nivosus* Temm.

Supra laete brunnescente-olivaceus, striola supraciliari albida, angusta; plumulis frontalibus indistincte albido variegatis; gula albida, pectore superiore olivaceo, albido longitudinaliter vario; corpore inferiore reliquo albo flavidoque vario; subalaribus flavidis; cauda rotundata; rectricibus 4 mediis totis, reliquis apice late albis; remigibus fuscis; rostro fusco, pedibus plumbeis; setis rictalibus 3—4 nigris. ♂.

Long. $9'' 3'''$, rostr. $9'''$, al. $3'' 11'''$, caud. $3\frac{1}{2}''$, tars. $10'''$.

Rio Bontry.

13. *Trichophorus eximius* nob.

Supra laete olivaceo-viridis, macula poneoculari indistincta flavida; cauda subrotundata concolore, rectricibus 2 extimis macula apicali obsolete flava; subtus flavissimus, lateribus olivaceo lavatis; rostro plumbeo, mandibula pallidior, pedibus pallidis; scapis rectricum supra nigris, subtus flavis. ♂.

Long. $8\frac{3}{4}''$, rostr. $10'''$, al. $3\frac{3}{4}'''$, caud. $3'' 2'''$, tars. $1''$.

Dabocrom.

Der ziemlich lange, sehr gerade, comprimerte und gekielte Schnabel mit stark aufsteigender Gonys, zeichnet diese schöne eigenthümliche Art sehr aus. Drei schwache Bartborsten. Tarsen etwas länger.

14. *Trichophorus simplex* Temm.

Supra brunneo-olivascens, pileo obscuriore fusco; cauda et alis dorso concoloribus; subtus in fundo sordide flavicante olivaceo-fusco lavatus et variegatus; subcaudalibus fulvescentibus; gula sordide alba, pectore obscuriore; subalaribus et margine interno remigum et rectricum pallide rufescentibus; rostro nigricante, pedibus fusco-plumbeis. ♂.

Long. vix $8''$, rostr. $7'''$, al. $3'' 8'''$, caud. $3'' 2'''$, tars. $10'''$.

Rio Bontry.

15. *Sycobius nigrifrons* Temm.

Nigerrimus; fronte et periophthalmiis nigris; pileo, capitis lateribus, mento gula et jugulo intense scarlatinis; subcaudalibus et subalaribus nigris; rostro nigro. Long. $6''$, rostr. $7'''$, al. $3''$, caud. $2''$, tars. $7\frac{1}{2}'''$. ♂.

Rio Bontry.

16. *Buceros semifasciatus* Temm.

Niger, nitore coracino; abdomine albo, rectrice secunda et tertia macula apicali $2''$ longa alba (in *fasciato* totis albis); rostro ut in *B. fasciato* formato et picto, sed subtus albo. ♂♀.

Long. *B. fasciati*. — rostr. $4'' 2'''$.

Rio Bontry; Senegal.

17. *Agelastus meleagrides* Temm.

Niger, punctulis minutissimis albis irroratus; remigibus majoribus immaculatis nigris; rectricum apicibus immaculatis; capite et collo superiore nudis carneo-rubentibus, hoc pilis rarius obsito; collo inferiore, interscapulio pectoreque isabellinis; rostro virente, pedibus brunneis. ♂♀.

Long. tars. (calcarati) 2" 7^{'''}, dig. med. 2" 1^{'''}, dig. ext. 1" 7^{'''}, dig. int. 1" 6^{'''}, rostr. 13^{'''}, al. 9^{3/4}" , caud. 5^{1/2}" .

Dabocrom.

Diese höchst interessante neue Form ist durch die Anwesenheit eines starken Sporn's am Tarsus, durch den Mangel irgend welcher Protuberanz des Schädels sowie durch das Färbungssystem hinlänglich von *Numida* verschieden.

18. *Himantornis haematopus* Temm.

Supra olivaceo-brunescens, plumis omnibus medio nigricantibus, margine pallidis; colli et pilei plumis concoloribus; colli lateribus et gula brunneo-albidis; subtus dilute olivascens, plumis omnibus late cinerascens-marginatis; remigibus et cauda brevi fuscis; subalaribus albo-variegatis; iride et pedibus laete rubris, rostro viridi, apice pallidiore; unguibus albis. ♂.

Long. 17^{1/2}" -18", rostr. 1" 9^{'''}, tars. 2" 8^{'''}, al. 8^{1/2}" , dig. med. c. ungu. 2" 1^{'''}, ext. et intern. 1" 9^{'''}, post. 8^{1/2}" .

Foem. paullo minor.

Dabocrom.

Stehet im System bei *Tribonyx*.

19. *Gallinula ocula* Temm.

Major, pulchra; supra pure olivacea, occipite obscuriore, sincipite, facie, periophthalmiis et gula dilute cinereis; collo postico et laterali, pectore et epigastrio laetissime rufis; abdomine reliquo pallide olivaceo, fasciis irregularibus fulvis; subcaudalibus nigricante et fulvo fasciatis; cauda unicolore rufa; remigibus nigris, maculis subrotundatis niveis elegantanter pictis; tectricibus alarum nec non subalaribus albo-maculatis, margine flavescens; rostro mediocri viridi, pedibus rubentibus; iride rubra. ♂.

Long. 11" 3^{'''}, rostr. 1" 5^{'''}, al. 6" 8^{'''}, caud. 2" 4^{'''}, tars. 1" 11^{'''}.

Rio Bontry.

20. *Gallinula porphyrio* Temm.

Pulchra et insignis species. Supra obscure sericeo-olivacea, cauda longiuscula concolore; collo toto corporeque subtus caeruleis; pileo et occipite nigris; abdomine imo nigricante, subcaudalibus niveis; remigibus primariis margine externo pallide caerulescentibus; subalaribus ex parte caeruleis; rostro et scutello frontali sanguineis; pedibus dilute fuscis.

Long. 8^{3/4}" , rostr. 1" 4^{'''}, caud. 2" 4^{'''}, tars. 1" 9^{1/2}" , dig. med. c. ungu. 2" 3^{'''}.

Elmina.

21. *Anas cyanoptera* Temm.

Tota saturate rufa, unicolor; alis obscurioribus, capite et collo fuscioribus; area magna alari dilute caerulea; ipso speculo nullo; remigibus secundariis vix distincte caerulescente marginalis, primariis obscure fuscis; rostro nigro, ante apicem nigrum late caeruleo. ♂.

Long. 17-18", rostr. 1" 8^{'''}, al. 9" 7^{'''}, tars. 1" 7^{'''}.

Rio Bontry.

Nachstehende Arten sind von Bonaparte in dessen „*Conspectus avium*“ mit ungenügender Kürze bezeichnet aber bisjetzt noch nicht beschrieben worden:

1. *Scotopelia Peli* Temm.

Supra dilute et laete fulva, irregulariter fusco fasciolata, remigum et rectricum scapis dilute fulvis; pilei, colli postici et nuchae plumis laete fulvis, scapis obscuris, maculis nonnullis parvis subtriquetris fuscis; frontis et coronae plumis immaculatis, pallidioribus, gula et jugulo immaculatis; pectore maculis minutis rarioribus fuscis, abdomine vix ullis; subcaudalibus et subalaribus fulvis, his totis immaculatis; rostro magno, producto, valido, corneo; pedibus et tarso inferiore nudo sulphureis, illis maximis, robustissimis, unguibus longis, validis, pallidis; iride fusca; plumis auricularibus elongatis nullis.

Long. tot. circa 23", al. 16", tars. 2 $\frac{1}{2}$ ", dig. med. c. ung. 3'7".

Rio Bontry. — Wir möchten das einzige Exemplar dieser neuen und höchst ausgezeichneten Form für noch nicht völlig ausgefärbt halten.

2. *Trichophorus poliocephalus* Temm.

Medius; supra obscure rufo-cinnamomeus, subtus pallide brunnescente-albidus, gula albidus; pileo et capitis lateribus obscure plumbeis; superciliis pallidius plumbeis; regione parotica plumbea; cauda fusca; subalaribus albidis; remigibus majoribus fuscis; pedibus pallidis; iride fusca. ♂.

Long. 6 $\frac{3}{4}$ ", rostr. 7", al. 3 $\frac{1}{2}$ ", caud. 2" 1", tars. 11".

Dabocrom. Fernando Po. — Foem. vix diversa.

Species minus typica tarsi longioribus, cauda brevioris, alis longiusculis etc.

3. *Laniarius Peli* Temm.

Supra dilute olivaceo-viridis; cauda laetius tincta, rectricibus, 4 mediis exceptis, apice flavis; plumulis periopthalmicis flavis; ♂ macula parva sericeo-alba nigro circumdata utrinque inter oculum et nares; alae tetricibus remigibusque tertiariis (fuscis) macula subrotundata dilute flava pulchre terminatis et gracillime viridi limbatis; remigum marginibus externis flavo-virentibus, internis dilute flavis; capitis lateribus flavidis; corpore subtus cinereo, gula albicante, pectore et hypochondriis olivaceo lavatis; crisso, subcaudalibus et cauda subtus flavis, scapis rectricum supra fuscis, subtus flavis; rostro nigro. Foem. parum diversa.

Long. tot. 9 $\frac{1}{4}$ ", rostr. 10", al. 3" 11", caud. 3" 8", tars. 12 $\frac{1}{2}$ ".

Rio Bontry. — Moonda-river. — St. Pauls river. — Liberia.

Diese schöne typische Art, in Bonaparte's „*Conspectus*“ höchst mangelhaft angezeigt, ist ganz kürzlich von Cassin unter dem Namen *L. lepidus* beschrieben worden: Proc. Ac. Nat. Sc. of Philad. 1855, p. 327.

4. *Centropus Francisci* Bp.

Capite et collo totis, interscapulio et pectore superiore nigro-chalybaeis, scapis plumarum nigris; dorso medio et alis totis saturate rufis; tergo et uropygio fulvo nigroque fasciatis; epigastrio et abdomine albidis, imo fulvescente; cauda valde gradata nigra, basi et supracauda-

libus fasciis angustis brunnescente-albidis; ala intus tota rufa; subcaudalibus ochraceis; rostro nigro, pedibus plumbeis, iride rubra. ♂.

Long. 23", rostr. 1" 10"', al. 8", caud. 12", tars. 1³/₁", ung. post. 9¹/₂", Foem. minor, 19¹/₂" longa.

Rio Bontry.

5. *Centropus epomidis* Temm.

Minor; capite colloque totis, interscapulio et pectore superiore subvirescente-nigris, nitore aeneo, scapis plumarum nigris; corpore reliquo cum alis rufo; cauda aeneo-nigra; rostro nigro, pedibus plumbeis. ♂. — Juv. pileo, collo postico et nucha nigris, dorso et alis dilutius rufo et nigricante fasciatis; cauda aeneo nigra; remigibus rufis, vix maculatis; subtus fulvus, gula rufescente circumdata; rectricibus apice subfasciatis.

Long. 14³/₄", rostr. 14¹/₂", al. 6", caud. 7", tars. 15¹/₂", ung. post. 8¹/₂".

Guinea.

6. *Xylobucco scolapaceus* Temm.

Supra niger, obscure flavo fasciolatus et maculatus, cauda unicolore nigra; remigibus minoribus flavo limbatis; subalaribus flavo-albidis; corpore subtus flavido, gula albicante, abdomine et subcaudalibus flavo longitudinaliter variegatis; rostro majusculo nigricante, pedibus plumbeo-corneis; setis rictalibus mollibus, mediocribus; tomiis glabris, integris; iride flava. ♂♀.

Long. 4¹/₂", rostr. 6"', al. 2", caud. 13"', tars. 6"'.
Dabocrom.

Die generische Abtrennung dieser Art von *Barbatula* erscheint uns zulässig. Allerdings ist sie eine weniger typische.

7. *Pyrenestes capitalba* Temm.

Supra obscure fuscus; capite et collo, interscapulio et pectore summo laete et dilute rulis; sincipite albo; cauda subgradata fusca; remigibus tertiariis et tetricibus majoribus gracillime rufescente marginatis; speculo alari parvo albo; subtus cinereus, maculis scapalibus strictis nigris longitudinaliter varius; subcaudalibus cinereis, albo-limbatis; subalaribus nigricantibus; rectricum limbo apicali albido; rostro robutissimo plumbeo; pedibus plumbeis. ♂. Foem. parum diversa; plumis dorsi et alarum margine magis rufescentibus; frontis albedine minus extensa.

Long. 6¹/₂", rostr. 7¹/₄", al. 3" 4"', caud. 1" 10"', tars. 8"'.
Saccondé.

Ueber alle diese sowie über noch andere von Pel gesammelte seltene Arten, wird der zweite Theil von Temminck's „Esquisses sur la Faune de Guinée“ weitere Auskunft bringen.

Schliesslich die Beschreibung einer ganz eigenthümlichen kleinen Art von Guinea, die wir vorläufig bei der Gattung *Platistira* lassen und von welcher die Leidner Sammlung ein einziges Exemplar ohne Angabe des Geschlechts besitzt:

Platystira concreta Temm.

Supra cinerea, nitore nonnullo virescente vix metallico; subtus laete et saturate ex aurantiaco-rufa, mento et gula dilutioribus, flavidis; cauda dorso concolore; loris nigris, macula parva alba; periophthalmis nudis rubris; subalaribus albis; rostro nigro basi valde dilatato caeterum ut in gen. *Platystira* formato; cauda brevissima, alas vix superante; pedibus brunneis.

Long. tot. 3" 3"', rostr. 5³/₄"', al. 2" 1"', caud. 8¹/₂"', tars. 8"'.
Guinea.

Systematisches Verzeichniss der von Herrn H. S. Pel auf der Goldküste zwischen Cap Tres Puntas und Accrah gesammelten Vögel.

Mitgetheilt von

Dr. G. Hartlaub.

I. RAPACES.

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Cathartes monachus</i> Temm. | ✓ 36 <i>Nectarinia splendida</i> Sh. |
| 2. <i>Gypohierax angolensis</i> (Gm) | ✓ 37. <i>Stiphornis erythrothorax</i> Temm. |
| 3. <i>Polyboroides radatus</i> (Scop) ✓ | ✓ 38. <i>Stiphornis superciliosus</i> Temm. |
| 4. <i>Spizaetos occipitalis</i> (Daud) | ✓ 39. <i>Stiphornis budiceps</i> (Fras.) ✓ |
| 5. <i>Pandion haliaetus</i> L. | ✓ 40. <i>Pitta angolensis</i> Vieill. |
| 6. <i>Falco ruficollis</i> Sw. | ✓ 41. <i>Cossypha cyanocamptor</i> Cab. ✓ |
| 7. <i>Aviceda cuculoides</i> Sw. | ✓ 42. <i>Cossypha diademata</i> Temm. |
| 8. <i>Milvus parasiticus</i> (Daud.) ✓ | ✓ 43. <i>Cossypha poensis</i> Fras. ✓ |
| 9. <i>Circus Swinsonii</i> Smith. | ✓ 44. <i>Crateropus atripennis</i> Sw. |
| 10. <i>Pernis ptilorhynchus</i> (L.) ✓ | ✓ 45. <i>Crateropus oriolides</i> Sw. |
| ✓ 11. <i>Astur macrourus</i> Temm. | ✓ 46. <i>Oriolus Baruffii</i> Bp. |
| 12. <i>Astur Temmiachii</i> Pel. | ✓ 47. <i>Trichophorus barbatus</i> Temm. |
| 13. <i>Astur macroseelides</i> Temm. | ✓ 48. <i>Trichophorus nivosus</i> Temm. ✓ |
| ✓ 14. <i>Nisus polyzonoides</i> Gm. | ✓ 49. <i>Trichophorus canicapillus</i> nob. ✓ |
| 15. <i>Nisus erythropus</i> Temm. | ✓ 50. <i>Trichophorus icterinus</i> Temm. |
| 16. <i>Scotopelia Peli</i> (Temm.) ✓ | ✓ 51. <i>Trichophorus simplex</i> Temm. |
| 17. <i>Bubo fuscicollis</i> Temm. | ✓ 52. <i>Trichophorus eximius</i> nob. |
| 18. <i>Bubo leucostictus</i> Temm. | ✓ 53. <i>Trichophorus poliocephalus</i> Temm. |
| 19. <i>Scops leucotis</i> Temm. | ✓ 54. <i>Trichophorus indicator</i> Verr. |

II. PASSERES.

- | | |
|--|---|
| 20. <i>Scotornis cinucurus</i> (Vieill.) ✓ | ✓ 55. <i>Andropadus latirostris</i> Strickl. |
| 21. <i>Caprimulgus binotatus</i> Temm | ? 56. <i>Andropadus gracilirostris</i> Strickl. |
| 22. <i>Hirundo obscura</i> Temm | ✓ 57. <i>Exos ashanteus</i> Bp. ✓ |
| 23. <i>Hirundo rustica</i> L. | 58. <i>Muscipeta nigriceps</i> Temm. ✓ |
| 24. <i>Hirundo holomelas</i> Sundev. | 59. <i>Dicourus modestus</i> nob. |
| 25. <i>Hirundo abyssinica</i> Gner. ✓ | ✓ 60. <i>Tephrodornis ocreatus</i> Strickl. ✓ |
| 26. <i>Hirundo nigrita</i> Gray. | 61. <i>Laniarius Peli</i> Temm. |
| 27. <i>Eurystomus gularis</i> Vieill. ✓ | 62. <i>Laniarius cruentus</i> Less. ✓ |
| 28. <i>Halcyon dryas</i> nob. ✓ | 63. <i>Signodorus caniceps</i> Temm. ✓ |
| 29. <i>Alcedo quadribrachys</i> Temm. | ✓ 64. <i>Chaunonotus Sabini</i> Gray. ✓ |
| 30. <i>Ceryle maxima</i> (Pall.) ✓ | 65. <i>Lanius Smithii</i> Fras. |
| 31. <i>Ceryle rudis</i> (L.) ✓ | ✓ 66. <i>Lamprotornis purpureiceps</i> Verr. ✓ |
| 32. <i>Merops gularis</i> Sh. ✓ | ✓ 67. <i>Sycobius nitens</i> Gray. |
| 33. <i>Merops Cuvieri</i> Licht. ✓ | 68. <i>Sycobius nigriceps</i> Temm. |
| 34. <i>Merops hirundinaceus</i> Vieill. | ✓ 69. <i>Sycobius scutatus</i> Cass. |
| 35. <i>Nectarinia cuprea</i> Sh. ✓ | ✓ 70. <i>Hyphantornis textor</i> (Gm.) ✓ |
| | 71. <i>Hyphantornis luteolus</i> Licht. |
| | ✓ 72. <i>Hyphantornis rustaneofuscus</i> Less. |
| | ✓ 73. <i>Euplectes flammeiceps</i> Sw. ✓ |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [3 1855](#)

Autor(en)/Author(s): Hartlaub Gustav [Carl Johann]

Artikel/Article: [Beschreibung einiger neuen Vögelarten. 353-360](#)