

Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.

Von

Baron Dr. J. W. v. Müller.

(Fortsetzung von S. 193 — 208.)

375. *Zosterops chloronota* Gr.
Certhia borbonica Gm. — *Z. curvirostris* Sws. (nec Blyth.) —
 Pl. enl. 681. 2. — Vieill. Ois. dor. t. 28.
 St. Maurice.
376. *Z. curvirostris* Blyth.
 Journ. Asiat. Soc. XIV. p. 363 und XV. p. 44.
 St. Maurice.
377. *Z. lugubris* Hartl.
 Synops. sp. 164. — Hartl. Abh. naturh. Vereins. Hamburg II.
 t. 8. — Reichb. Merop. t. 462. f. 3306.
 Insel St. Thomä.
378. *Z. abyssinica* Guér.
 Rev. Zool. 1834. p. 165.
 Ostafrika.
379. *Z. pallida* Sw.
 Two Cent. and a Quarter p. 294.
380. *Z. lateralis* Sund.
 Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 399.
 Kafferland.
381. *Z. virens* Sund.
 Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 399.
 Kafferei.
382. *Z. capensis* Sund.
 Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 399.
 Kafferland.
6. Subfam. MOTACILLINAE.
383. *Motacilla alba* L.
M. cinerea Bodd. — *M. cinerea* Gm. — *M. albeola* Pall. —
 Pl. enl. 652. 674. — Gould. B. Eur. t. 143.
 Im nördlichen Afrika.
384. *M. capensis* L.
M. afra Gm. — Pl. enl. 28. 2. — Le Vieill. O. d'Afr. 177. —
 Kittl. Kupfert. 21. 2.
 Im südlichen Afrika. Häufig in Egypten und Nubien an den
 Nilkatarakten.
385. *M. longicauda* Rüpp.
 Neue Wirbelth. t. 29. 2.
 Abyssinien.
386. *M. Lichtensteinii* Cab.
 Mus Heinean. I. S. 12. — *Mot. capensis* Licht. et Rüpp., nec
 Lin. — *Mot. vidua* Sundev. part.

Nord-Ost-Afrika; Mozambique.

397. *Mot. Vaillantii* Cab.

Mus. Hein. I. S. 13. — Le Vaill. O. d'Afr t. 178. — *Mot. vidua* Sundev part.

Süd-Afrika

388. *Mot. gularis* Sws.

Birds of West. Afr. II. p. 38. — Hartl. Synops sp. 165.
Am Senegal und Niger.

389. *Mot. flava* Lin.

M. flaveola Pall. — *M. chrysogastra* Bechst. — *M. neglecta* Gould. — Pl. enl. 674. 2. — Gould Birds Eur. 146. — Edw. Birds t. 258.

Nordafrika

390. *Mot. cinereocapilla* Savi.

M. Feldeggii Michah. — *M. dalmatica* Bruch — Bonap. Faun. Ital. t. 31. 2.

Nord-Ost-Afrika.

391. *Mot. melanocephala* Savi.

M. nigricapilla Bp. — Rüpp. Atl. t. 33. — Bonap. Faun. ital. t. 31. 3.

Nordafrika.

392. *Budytes Rayi* Bonap.

Mot. flava Ray. — *M. flaveola* Temm. — Gould Birds Eur. t. 145. — Le Maout Hist. nat. des ois. p. 264. — Hartl. Synops. sp. 166.

In Senegambien, an der Goldküste und Cap Coast.

393. *Mot. nigricapilla* v. Müll.

Mot. melanocephala Licht. nec Savi — *Bud. melanocephala* Rüpp. Atl. t. 33. 6.

Nord-Ost-Afrika.

394. *Mot. sulphurea* Bechst

M. boarula auct. — *M. flava* Briss — *M. melanope* Pall. — Pl. enl. 28. 1. — Edw. Birds. 259. — Gould Birds Eur. 147.

Soll in Nordafrika vorgekommen sein?

395. *Anthus spinoletta* (Lin.)

Anth. aquaticus Bechst — *Anth. montanus* Koch. — Pl. enl. 661. 2. — Exped. Eg Ois. t 5. 5.

Im Winter in Unteregypen und wahrscheinlich am N.-O.-Rande Afrika's.

396. *Anthus pratensis* (L.)

Alauda sepiaria Briss — *Anth. sepiarius* Vieill. — Pl. enl. 660. 2. — Gould Birds Eur. 136.

Ueberwintert häufig in Nordafrika.

397. *Anthus cervinus* Keys. et Bl.

Mot. cervina Pall. — *Anth. rufigularis* Brehm. — *Anth. Cecilii* Audouin — *Anth. aquaticus* Blyth. — Gould Birds Europ. t. 140. — Descr. de l'Eg. t. 5. fig. 6

Häufig im nördlichen und nordöstlichen Afrika.

398. *Anthus campestris* Bechst.

A. rufescens Temm. — *A. rufus* Vieill. — Pl. enl. 661 2. — Gould Birds Eur. t. 137.

Im nordöstlichen Afrika, südlich bis Abyssinien und Kordofan

399. *Anthus Gouldii* Fras.

Proc Zool. S 1843. p. 27. — Hartl. Synops. sp. 167.

Fernando Po.

400. *Anthus Richardi* Vieill.

A. rupestris Ménétr. — *Corydalla Richardi* Vig. — *A. macronyx* Glog. — *A. longipes* Hollandre. — Gould Birds Europ. t. 135. — Roux Orn. Prov. t. 189. 190. — Zander, in Cab. Journ. f. Ornith., 1853, Extraheft, S. 61. — Id. Naumannia, 1854, S. 2. Nach Bonaparte und Zander im nördlichen Afrika?

401. *Anthus leucophrys* Vieill.

Gal. Ois. t. 262.

Südafrika.

402. *Anthus brevicaudus* Sundev.

Mus. Holm.

Südafrika.

403. *Anthus caffer* Sundev.

Mus. Holm.

Kafferland, Vorgebirge der guten Hoffnung, Port Natal.

404. *Anthus chloris* Licht.

Cat. 1842. sp. 49.

Südafrika.

405. *Anthus obtusipennis* Sundev.

Mus. Holm.

Südafrika.

406. *Anthus Raalteni* Temm.

Licht. Catal. sp. 54.

Südafrika.

407. *Anthus cinnamomeus* Rüpp.

Neue Wirbelth. p. 103.

Provinz Simen, in Abyssinien.

408. *Anthus sordidus* Rüpp.

Neue Wirbelth. t. 39. 1. — *A. Gouldi* Fras.

Abyssinien.

409. *Anthus scapularis* Licht.

Cat. sp. 50.

Südafrika.

410. *Anthus arboreus* Bechst.

Al. pratensis Briss. — *Motac. spipola* Pall. — *Al. turdina*

Scop. — *Al. minor* Bewick. — *Pipastes arboreus* Kaup — *Dendronanthus trivialis* Blyth. — Pl. enl. 660. 1. — Gould Birds Eur. 139. — Temm. et Schleg. Faun. japon. 23.

Im Winter im nördlichen Afrika.

411. *Macronyx* (Sws.) *capensis* Gr.

Al. capensis L. — Pl. enl. 504. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr.

195. — *Macronyx flavigaster* Sws. — Rüpp. N. Wirbelth. 38. 2.

Mit Ausnahme der westlichen Länder über ganz Afrika verbreitet.

412. *Macronyx flavigaster* Sws.

Birds West. Afr. I. p. 215. — *Al. crocea* Vieill. Enc. t. 232. 2.

— Jardine Selby Ill. of Ornith. t. 22. — Hartl. Synops. sp. 168.

Von Senegambien bis an's Cap an der Westküste.

413. *Macronyx Ameliae* Tarrag.

Gr. Gen. of Birds t. 54.

Von Port Natal und der Kafferei.

2. FAM. TURDIDAE.

1. Subfam. FORMICARINAE.

414. *Pitta* (Vieill.) *angolensis* Vieill.

Nouv. Dict. IV. p. 356. — Hartl. Synops. sp. 170.

Angola.

415? *Pitta pulih* Fras.

Proceed. Zool. Soc. X. p. 190. — Allen Nig. Exp. II. p. 495

— Hartl. Synops. sp. 169.

Sierra Leone.

416. *Philepitta* (Is. Geoffr.) *sericea* Geoff.

Mag. de Zool. 1839. p. 3. — O des Murs. pl. p. 32.

Madagascar.

417. *Ph. Geoffroyi* O des Murs.

Rev. zool. 1846 p. 241. — O des Murs pl. p. 33.

2. Subfam. TURDINAE.

418. *Chaetops* (Sw) *frenatus* Gr.

Ch. Burchelli Sw. — *Malurus frenatus* Temm. Pl. col 385.

Südafrika.

419. *Turdus viscivorus* L.

Pl. enl. 489. — Gould Eur. 77. — Naum. V. D. 66. 1.

Ueberwintert nach Rüppell in Egypten, was jedoch nur ausnahmsweise geschehen muss

420. *Turdus guttatus* Vig.

Smith. Illustr. Afr. Zool. t. 39.

Südafrika.

421. *Turdus pilaris* L

Pl. enl. 490. — Gould Birds Eur. 76. — Naum. V. D. t. 672.

Nach Rüppell im Winter in Egypten.

422. *Turdus musicus* L

Pl. enl. 406. — Gould Birds Eur. t. 78. 1. — Naum. V. D. t. 66. 2.

Im Winter in Egypten.

423. *Turdus simensis* Rüpp.

Neue Wirbelth. t. 29. 1. — Lath. Gen. hist. of Birds V. p. 23.

Häufig in Abyssinien und Kordofan

424. *Turdus iliacus* L.

Pl. enl. 51. — Gould Birds Eur. 78. 2. — Naum. Vög. Deutschl.

- Nach Bonap. Conspl. p. 270 in Nordafrika?
425. *Turdus olivaceofuscus* Hartl.
 Beitr. zur Orn. Westafr. p. 50. — Id. Abh. des nat. Vereins.
 Hamb II. t. 3. — Id. Syn. sp. 179.
 Insel St. Thomä.
426. *Turdus merula* L.
 Pl. enl. 2 mas, 555 fem. — Gould Birds Eur. t. 72. — Naum.
 V. D. t. 71.
 Ueberwintert einzeln in Egypten.
427. *Turdus torquatus* L.
 Pl. enl. 516. — Gould Birds Eur. 73.
 Nach Keyserl. und Blas. in Egypten?
428. *Turdus olivaceus* L.
Merula olivacea Blyth. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 98. 99. 100.
 — Briss. Orn. II 23. f. 3.
 Süd- und Centralafrika, nordwärts bis Abyssinien.
430. *Turdus Cabanisi* Bonap.
 Cab Museum Heinean. I. p. 3. no. 24.
 Südafrika.
431. *Turdus libonyanus* Sm.
 Birds of S. Afr. 38.
 Südafrika.
432. *Turdus icterorhynchus* P. v. Württ.
 In den Nilquellenländern nordwärts bis Nubien. Die specifische
 Verschiedenheit dieser Art von der vorigen ist nicht sicher.
433. *Turdus africanus* Jacq.
 Vögel t. 14.
434. *Turdus Smithi* Bonap.
Merula obscura Smith. Birds of S. Afr. t. 36.
 Südafrika.
435. *Turdus strepitans* Sm.
 Birds of S. Afr. t. 37.
 Südafrika.
436. *Turdus guttatus* Vig.
 Sm. Birds of S.-A
 Südafrika.
437. *Monticola* (Boie) *cyanus* Cab.
Turd. cyanus Lin. — *T. solitarius* Gm. — *T. azureus* Cresp.
 — *Petrocossyphus longirostris* Blyth. — Pl col. 250. — Edw.
 Birds t. 18. — Gould Birds Eur. t. 87.
 Im nördlichen Afrika bis Abyssinien.
438. *Monticola saxatilis* Cab.
Turdus saxatilis Lin. — *Lanius infaustus* Gm. — *Sax. mon-*
tana Koch. — *Petrocos. saratilis* Boie. — Pl. enl. 562. — Gould
 Birds Eur. t. 86.
 In ganz Nordafrika.
439. *Monticola rupestris* Cab.
Turdus rupestris Vieill. — *T. rupicola* Licht. — *T. rocar*

Steph. — *Petrocincla montana* Sw. — Le Vaill. Ois d'Afr. 101 102.

Im südlichen Afrika; vielleicht auch in Sennaar.

440. *Monticola exploratrix* Cab.

Turdus explorator Vieill. — *T. perspicax* Shaw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 103. — Nat. Misc. 961.

Südafrika.

441. *Lioptilus nigricapillus* Cab.

Mus. Hein. I. p. 88. — *Turd. nigricapillus* Vieill. — *Turd. cucullatus* Illig. — *Gracula cucullata* Licht. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 108.

442. *Cercotrichas (Boie) erythroptera* Rüpp.

Turd. erythropterus Gm. — *Sphenura erythropyt.* Licht. — *Argya erythr.* Lafr. — Dict. d'Orb. II. p. 126. — Boie Isis 1831. p. 542. — Hartl. Synops. 171.

Senegambien, Nord-Ost-Afrika.

443. *Cercotrichas luctuosa* Cab.

Mus. Hein. I. p. 41. — *Sphenura erythroptera* var. *arabica* Ehrenb. — *Argya luctuosa* Lafr. — Hartl. Synops. sp. 172.

Senegambien, Nord-Ost-Afrika.

444. *Bessonornis (Smith) vociferans* Gray.

Turdus reclamator Vieill. — *T. vociferans* Sw. — *T. revo-cator* Temm — *T. chrysogaster* Vieill. — *Muscic. bicolor* Sparm. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 104. — Zool. Illustr. III. t. 180. — Pl. enl. 221. — Sparm. Mus. Carls. t. 46. — Hartl. Syn. sp. 173.

Süd- und Westafrika.

445. *Bessonornis phoenicurus* Müll.

Mot. pectoralis Shaw. — *Sax. superciliaris* Licht. — *Petro-cincla superciliosa* Sw. — *Turd. phoenicurus* Gm. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 111. — Nat. Misc. t. 965.

Südafrika.

446. *Bessonornis natalensis* Gr.

Cossypha natalensis Sm. — Illustr. Zool. S. Afr. t. 60.

Süd-Ost-Afrika.

447. *Bessonornis humeralis* Sm

Cossypha humeralis auct. — Sm. Illustr. S. Afr. Zool. t. 48.

Südafrika.

448. *Bessonornis albicapillus* v. Müll.

Turd. albicapillus Vieill. — *Petrocincla leucoceps* Sw. — *T. albiceps* Cuv — Lath. Gen. hist. V. p. 101. — Sw. Birds West. Afr. I. p. 282. — Hartl. Synops. sp. 174. — v. Müll. Beitr. zur Ornith. Afrika's. Taf. XXIII.

Westküste.

449. *Bessonornis Swainsoni* v. Müll. (1849).

Petrocincla albicapilla Swains. (nec Vieill.) — *Cossypha ver-ticalis* Hartl — *Bessonnis verticalis* Cab. — Hartl. Synops. sp. 175. — Sws. Birds of West. Afr. p. 284. t. 32. — v. Müll. Beitr. zur Ornith. Afr. t. XXIII.

Nordost- und Westafrika.

450. *Bessonornis semirufa* Rüpp.

Cossypha uigricapilla Guér. — Rüpp. Syst. Uehers. Vgl. Nord-Ost-Afr. t. 21.

Abyssinien.

451. *Bessonornis gutturalis* Gr.

Cossypha gutturalis Guér. Rev. Zool. 1843. p. 162. — Bonap. Conspl. p. 301.

Nord-Ost-Afrika.

452. *Bessornis cyanocampter* Cab.

Bonap. Conspl.

Westafrika.

453. *Besson. poënsis* Strickl.

Cossypha poënsis Fras. Zool. typic. Strickl. Proc. Zool. Soc. 1844. p. 100. — Allen Nig. Exp II. p. 496. — Hartl. Synops. sp. 176.

Westafrika.

454. *Besson. brevipes* Gr.

Cossypha brevipes Waterh. — App. Alex. Exp. Disc. S. Afr. — Bonap. Conspl. p. 301.

Südafrika.

455. *Besson. auraticollis* Gr.

Turd. auraticollis Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 19.

Süd? - Afrika

456. *Besson. diadematus* Bonap.

Turdus diadematus Temm. — Hartl. Synops. sp. 177. — Bonap. Conspl. p. 302.

Guinea.

3. Subfam. TIMALINAE.

457. *Crateropus* (Sw.) *bicolor* Jard.

Edinb. Journ. nat. sc. III. t. 3. — Smith Illustr. S. Afr. Zool. Av. — Bonap. Conspl. p. 278.

Südafrika.

458. *Crateropus Reinwardtii* Sw.

Sws. Zool. Illnstr. II. t. 80. — Sws. Birds of West. Afr. I. p. 276. — Hartl. Synops. sp. 180.

Senegambien.

459. *Crat. leucocephalus* Rüpp.

Atl. t. 4.

Nubien, Abyssinien und Kordofan.

460. *Crat. plebejus* Gr.

Ixos plebejus Rüpp. Atl. t. 23.

Nubien und Kordofan, seltener in Egypten.

461. *Crat. platycercus* Sws.

Birds of West. Afr. I. p. 274. — Hartl. Synops. 181.

Senegambien.

462. *Crat. atripennis* Sws.

Phyllantus capucinus Less. — Sws. Birds of West. Afr. I. p. 278.
— Hartl. Synops. sp. 182.

Gambia, Sierra Leone.

463. *Crat. atriceps* Gr.

Cr. orioloides Sws. — *Moho atriceps* Less. — *Hypochloreus atriceps* Cab. Mus Hein I p. 85. — Hartl. Synops. sp. 183. — Sws. Birds of West. Afr. I. t. 31.

Süd- und Westafrika.

464. *Crat. leucopygius* Rüpp.

Neue Wirbelth. t. 30. 1.

Abyssinien.

465. *Crat. rubiginosus* Rüpp.

Syst. Uebers der Vögel Nord-Ost-Afr. t. 19.

466. *Crat. limbatus* Rüpp. p. Harris.

Rüpp. System. Uebers d. Vögel Nord-Ost-Afr. p. 47.
Schoa (Abyssinien).

467. *Crat. Swainsonii* Smith.

Illustrat S. Afr. Zool. — Bonap. Consp. p. 278.

468. *Crat. Jardinii* Smith.

Sm. Ill. S. Afr. Zool. av. t. 6.

Südafrika.

469. *Crat. acaciae* Bonap.

Cr. acaciae Rüpp. Atl. t. 18. — *Sphenura acaciae* Licht. Cat. p. 40. no. 454. — *Argya acaciae* Cab.

Egypten und Nubien.

470. *Crat. squamiceps* Rüpp.

Atl. tab. 12. — *Argya Rüppellii* Less. — *A. squamiceps* Cab.
Nord-Ost-Afrika, (am rothen Meere.)

4. Subfam. ORIOLINAE.

471. *Oriolus galbula* L.

Coracias oriolus Scop. — *Turd. oriolus* Br. — Pl. enl. 26.
— Edw. Birds t. 185. — Gonld Birds Eur. t. 71. — Naum.
Vgl t. 40. — Roux. Orn. prov. t. 125. 126. 127.
Nordafrika und Arabien.

472. *Oriolus auratus* Vieill.

Oriolus bicolor Temm. — Sws. Birds of West. Afr. II. t. 1. —
Le Vaill. Ois. d'Afr. 260. — Vieill. Enc. Meth. 695. — Vieill.
Gal. t. 83. — Hartl. Synops. sp. 184.

Südafrika; Senegambien, Nigritien, selten in Ost-Sudan.

473. *Oriolus larvatus* Licht.

Or. melanocephalus var. Vieill. — *Or. condougnan* Temm. —
Or. chloris Cuv. — *Or. capensis* Sws. — *O. monachus* Wagl. —
Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 261. 262. — Sws. Birds of West. Afr. II.
p. 31. — Vieill. Enc. p. 696. — Wagl. Syst. av. sp. 7. — Hartl.
Synops. sp. 185.

Südafrika, Senegambien und Ostafrika

474. *Oriolus brachyrhynchus* Sws.

- Birds of West. Afr. II. p. 35. — Hartl. Synops. sp. 186.
Sierra Leone.
475. *Oriolus meloxita* Rüpp.
Turd. monacha Gm. — Rüpp. Neue Wirbelth. t. 12 1.
Abyssinien.
476. *Oriolus arundinarius* Burch.
Trav. in S. Afr. I. p. 464. 501.
Südafrika.
477. *Oriolus Baruffii* Bonap.
Or. intermedium Hartl. Beitr. z. Orn. Westafr. p. 46.
Ashantee.
478. *Oriolus (Is Geoffr.) Bernieri* J. Geoffr.
Mag. de Zool. ois. t. 4.
Madagascar.
- 5 Subfam. PYCNONOTINAE.
479. *Trichophorus barbatus* Temm.
Tr. strigilatus Sws. Birds of West. Afr. t. 28. — Less. Compl. VI. p. 98. — Pl. col. 88. — Hartl. Synops. sp. 188.
Süd- und Westafrika, (Sierra Leone.)
480. *Trichophorus olivaceus* Sws.
Tr. mentalis Temm. Mus. Lngd. — Sw. Birds of West. Afr. I. p. 264. — Hartl. Synops. sp. 189.
Senegambien.
481. *Trichophorus icterinus* Temm.
Bonap. Consp. p. 262. — Hartl. Synops. sp. 190.
Guinea.
482. *Trichophorus gularis* Sws.
Tr. tephrogenys Jard. Selb. Ill. t. 127. — Sws. Birds of West. Afr. II. p. 266. — Hartl. Synops. sp. 191.
Gambia, Sierra Leone.
483. *Trichophorus poliocephalus* Temm.
Bonap. Consp. p. 262. — Hartl. Synops. sp. 192.
Guinea.
484. *Trichophorus canicapillus* Hartl.
Beitr. zur Orn. Westafr. S. 24. — v. Müll. Beitr. zur Ornith. Afr. t. XIX. — Hartl. Synops. sp. 193.
Sierra Leone. Gambia.
485. *Trichophorus chloris* Valenc.
Lanius chloris Valenc. Dict. des sc. nat. vol. 40. p. 226. — Hartl. Synops. sp. 193. — v. Müll. Beitr. zur Orn. Afr. t. . . . Galam, (Westafrika.)
486. *Trichophorus syndactylus* Sws.
Dasycephala syndactyla Sws. Birds of West. Afr. I. p. 261. — Hartl. Synops. sp. 195.
Sierra Leone.
487. *Andropadus* (Sws.) *importunus* Gr.
Turd. importunus Vieill. — *Turd. clamosus* Steph. — *Ixos importunus* Temm. — *Polyodon importunus* Lafr. — *Andropadus*

- vociferus, familiaris* Sw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 106. 2. — Mag. Zool. 1832. t. 4.
Südafrika.
488. *Andropadus latirostris* Strickl.
Ann. Nat. Hist. XV. p. 127. — Bonap. Conspl. 261. — Hartl. Synops. sp. 202.
Fernando Po.
489. *Andropadus gracilirostris* Strickl.
Ann. Nat. Hist. XV. p. 127. — Bonap. Conspl. 261. — Strickl. Proceed. Soc. 1844. p. 100. — Hartl. Synops. sp. 203.
Fernando Po.
490. *Pycnonotus* (Kuhl) *aurigaster* Gr.
Haematornis aurigaster Sws. — *Turd. aurigaster* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 107. — *Brachypus aurigaster* Cab.
Südafrika.
[Das afrikanische Vaterland beruht sicherlich nur auf dem von Le Vaillant eingeführten Irrthume. D. Herausg.]
491. *Pycnonotus ashanteus* v. Müll.
Ixos ashanteus Bonap. Conspl. p. 266. — Verr. Rev. de Zool. 1851. p. 271. — Strickl. Contrib. 1851. p. 132. — Hartl. Synops. sp. 196.
Ashantee und Gaboon.
492. *Pycnonotus arsinoë* Gr.
Ixos arsinoë Licht. Doubl. Cat. sp. 442.
Häufig in Nord-Ost-Afrika
493. *Pycnonotus obscurus* Bl.
Turd. obscurus Temm. — *Ixos obscurus* Bonap. — *Haematornis lugubris* Less. — *Ixos inornatus* Fras. — Temm. Man. IV. p. 608. — Fras. Proc Zool. Soc. 1843. p. 27. — Hartl. Synops. sp. 197.
Westafrika.
494. *Pycnonotus flavigollis* Gr.
Haematornis flavigollis Sws. Birds of West. Afr. p. 259. — Hartl. Synops. sp. 198.
Seuegambien.
495. *Pycnonotus nigricans* Gr.
Turdus nigricans Vieill. — *Ixos Le Vaillantii* Temm. — *Ixos xanthopygius* Ehrenb. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 106 1. — Rüpp. Syst. Verz. v. Nord-Ost-Afr. p. 60. — Pl. enl. 317.
Egypten und Nubien.
496. *Pycnonotus capensis* Gr.
Turd. capensis Gm. — Briss. Orn. III. t. 27. 3. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 105. — Bonap. Conspl. p. 266.
Südafrika.
497. *Pycnonotus caffer* Gr.
Turd. caffer L. — *Ixos caffer* Bonap. — *Ixos haemorrhous* Temm. — Pl. enl. 563. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 107. 1. — *Brachypus haemorrhous* Cab.

Südafrika.

[Kommt sicherlich, gleich *aurogaster*, No. 490, nicht in Afrika vor.
D. Herausg.]

498. *Bradornis* (Smith) *marequensis* Sm.

Ill. S Afr. Zool. av. t. 113. a. et b.
Südafrika.

499. *Bradornis major* Sm.

Ill. S. Afr. Zool. — Bonap. Conspl. p 267.
Südafrika.

500. *Phyllastrephus capensis* Gr.

Ph. terrestris Sws. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 112. 1.
Südafrika.

501. *Phyll. scandens* Sws.

Birds of West. Afr. I. t. 30. — Hartl. Synops sp 201.
Senegambien.

502. *Phyll. lugubris* (Bodd.)

Turd. senegalensis Gm. — Pl. enl. 563. 2. — *Merula senegalensis* Briss. Orn. II. t. 22. 2. — Hartl. Synops. sp. 200.
Senegambien.

3. FAM. MUSCICAPIDAE.

1. Subfam. MUSCICAPINAE.

503. *Platystira* (Jard.) *melanoptera* (Gm.)

Muscicapa melanoptera Gm. — *Musc. collaris* Lath. — *Platyrhynchus collaris* Vieill. — *Platyrh. melanoleucus* Vieill. — *Musc. fimbriata* Licht. — *Platystira lobata* Sws. — *Plat. collaris* mas. et *Desmaresti* fem. Jard — Pl. enl. 567. 3. — Briss. Orn. II. t. 36. 1. — Jard. Ill. t. 9. f. 2. — Sws. Birds of West. Afr. II. 22. — Hartl. Synops. sp. 204.
Westafrika.

504. *Plat. pistrinaria* Gr.

Musc. molitor Licht. — *M. pulsator* Steph. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 160.
Südafrika.

505. *Plat. senegalensis* Gr.

Pl. velatus Vieill. — *Musc. senegalensis* Vieill. — Pl. enl 567. 1 et 2. — Hartl. Synops. sp. 205 — Briss. Orn. II. t. 37. f. 1 et 2.
In Westafrika, Nubien, Abyssinien und Kordofan.

506. *Plat. pririt* Gray.

Musc. pririt Vieill. — *Musc. strepitans* Licht. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 161.
Südafrika.

507. *Plat. torquata* Gr.

Musc. torquata L. — Pl. enl 572. 2.
Südafrika.

508. *Plat. capensis* Gr.

Musc. capensis L. — Pl. enl. 572. 1.
Südafrika

509. *Plat. monacha* Gr.
Le Vaill. Ois. d'Afr. 159.
Süd-Ost-Afrika.
510. *Plat. brevicauda* Sws.
Nat. Libr. X, Flycatch. p. 159.
Süd-West-Afrika.
511. *Plat. leucopygialis* Fras.
Zool. typ. part. 5. fig. — Fras. Proceed. 1842. p. 142 mas. et
p. 141 fem. — *Pl. castanea* Strickl. Contrib. 1851. p. 163. —
Hartl. Synops. sp. 206.
Fernando Po, Gaboon
512. *Plat. scita* Gr.
Stenostira scita Cab. Bonap. — *Musc. scita* Vieill. — *Musc.*
tcnella Licht. — *Pl. longipes* Sws. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 154.
— Sws. Nat. Libr. X. t. 21.
Südafrika.
513. *Bias* (Less.) *musicus* Vieill.
Platyrhynch. musicus Vieill. Dict. Hist. nat. vol. 27. p. 15. —
Myiagra flavipes Sws. Nat. Libr. Flyc. p. 255. 208.
Congo.
514. *Smithornis capensis* Bp.
Platyrh. capensis Smith Ill. S. Afr. Zool. t. 27. — Bonap.
Consp. p. 322.
Südafrika.
515. *Tschitrea* (Less.) *cyanomelas* Gr.
Musc. cyanomelas Vieill. — *Musc. scapularis* Steph. — *Tro-*
chocercus cyanomelas Cab. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 151.
Südafrika.
516. *Tschitrea cristata* Gr.
Musc. cristata Gm — *Muscipeta castanea* Temm. — *Muscip-*
perspicillata Sws. — *Platyrh. cristatus* Vieill. — Briss. Orn. II.
t. 39. 2. — Pl. enl. 573. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 142 143.
— Sws. Birds of West. Afr. II. p. 59. 60.
Senegambien, Süd- und Centralafrika.
517. *Tschitrea mutata* Gr.
Muscic. mutata Gm. — *Muscipeta bicolor* Sws Birds of West.
Afr. II. p. 60 — Pl. enl. 248. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 148.
Madagascar.
518. *Tschitrea viridescens* Gr.
Muscic. mutata var. Lath — *M. holosericea* Temm. — *Muscip-*
eta rufa Sws. — Pl. enl. 248. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 147.
— Sws. Birds of West. Afr. II. p. 60.
Südafrika.
519. *Tschitrea Casamansae* Less.
Muscipeta rufiventris Sws. Birds of West. Afr. II. t. IV. —
Annales des sc. nat. IX. p. 173. — Less. Rev. Zool. p. 277. m. —
Hartl. Synops. sp. 209.
Senegambien und Nigrition.

520. *Tschitrea borbonica* Blyth.

Muscic. borbonica Gm — Pl. enl. 573 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t 143. — Bonap. Conspl. p. 325.
Madagascar, St. Maurice.

521. *Tschitrea melanogastra* Gr.

Muscip. melanogastra Sws. Birds of West. Afr. II. p. 55. — Verr. Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 310. — Hartl. Syn. sp. 210.
Senegambien, Nubien, Kordofan, Sennaar am weissen und blauen Nil, Abyssinien.

522. *Tschitrea nebulosa* Gr.

Muscipeta fluvicola Sws. Birds of West. Afr. p. 60. — *Muscic. nebulosa* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 149.
Südafrika

523. *Tschitrea pectoralis* Gr.

Muscip. pectoralis Sws. — *Sylv. melanoleuca* Vieill. — *Muscic. torquata* Gm — *M. capensis* Kuhl. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 150.
— Sws. Birds of West Afr. II. p. 60.
Südafrika.

524. *Tschitrea senegalensis* v. Müll.

Muscipeta senegalensis Less. Rev. zool. 1838. p. 279. — Less. Ann. des sc. nat. IX. p. 173. — Hartl. Synops. sp. 211.
Senegambien, Goldküste.

525. *Tschitrea tricolor* Fras.

Proceed. Zool. Soc. 1843. p. 3. — Id. Ann. and Mag. vol XII. p. 441. — Hartl. Synops. sp. 212.
Fernando Po.

526. *Tschitrea Ferretti* Guér.

Rev. Zool. 1843 p. 162 — Bonap. Conspl. p. 326.
Ostafrika.

527. *Tschitrea Smithii* v. Müll.

Muscipeta Smithii Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 34. — Hartl. Synops. sp. 213.
Westafrika.

528. *Tschitrea atrochalybea* v. Müll. p. Thoms

Thoms. Ann. et Mag. X. p. 104. — Hartl. Beitr. z. Orn. West-afr. p. 46 fem. — Id. Synops. sp. 214.
Fernando Po, St. Thomä.

529. *Tschitrea longicauda* v. Müll.

Muscipeta coerulea Hartl. — *Myiagra longicauda* Sws. Nat. Libr. Flycatch t. 25. — Lath. Gen. hist. IV. p. 90. — Hartl. Synops. sp. 215.
Sierra Leone.

530. *Muscicapa grisola* L.

Pl. enl. 565. 1. — Gould Birds Eur. t. 65. — Hartl. Synops. sp. 217.
Wahrscheinlich über ganz Afrika verbreitet?

531. *Muscic. atricapilla* L.

M. nigra Br. — *M. ficedula* Gm. — *M. muscipeta* Bechst. —

- Pl. enl. 565. 2 mas., 668. 1 fem. — Gould Birds Eur. 63. 1. —
Edw. Birds t. 30. 1. 2.
Nord-Ost-Afrika.
532. *Muscic. albicollis* Temm
M. collaris Bechst. — *M. streptophora* Vieill. — Gould Birds
Eur. t. 63. 2. — Temm. Mau. I. p. 153
In Arabien.
533. *Muscic. adusta* Gr.
Muscic. undulata Gm. — *Butalis adusta* Boie. — *Muscic. undulata* Licht. — *Alseonax undulata* Cab. — Le Vaill. Ois d'Afr. 156.
Südafrika.
534. *Muscic. chocolatina* Rüpp.
System. Uebers. Nord-Ost-Afr. t. 20.
Abyssinien.
535. *Muscic. semipartita* Rüpp.
Neue Wirbelth t. 40. 1.
Kordofan.
536. *Muscic. lugubris* v. Müll.
Beitr. z. Orn. Afr. tab. II. — Naumannia, 1851, IV, p. 27.
Abyssinien.
537. *Muscic. pallida* v. Müll.
Beitr. zur Orn. Afr. tab. VIII. — Naumannia, 1851, IV, p. 27.
Kordofan und Abyssinien.
538. *Muscic. albifrons* Sparrm.
Mus. Carls. t. 24.
Südafrika.
539. *Muscic. Fraseri* Strickl.
Proceed. Zool. Soc. 1843. p. 102. — Id. Ann. Nat. Hist. XV.
p. 128. — Hartl. Synops. sp. 216.
Südafrika.
540. *Muscic. picata* Swains.
Nat. Libr., Flycatcher, p. 254. — Hartl. Synops. sp. 218.
Westafrika.
- 541.? *Muscic. azurea* Cuv.
Le Vaill. Ois d'Afr. 138.
Südafrika.
- 542.? *Muscic. madagascariensis* Gm.
Briss. III. t. 24. 5.
Madagascar.
Quid *Muscic. rufiventris*. Pl. enl. 572. 2?
Quid *Muscic. latirostris* Sws.? Quid *Muscic. ruficauda* Sws.?
542. *Hyliota* (Sws.) *flavigastra* Sws.
Birds of West. Afr. II. p. 47. — Id. Nat. Libr. Flyc. p. 28.
Senegambien.
544. *Hyliota violacea* Verr.
Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 308. — Strickl. Contrib. 1851.
p. 132. — Hartl. Synops. sp. 220.
Gaboon.

4. FAM. AMPELIDAE.

1. Subfam. DICRURINAE

545. *Melaenornis* (Gr.) *edoliooides* Sws.

Melasoma edoliooides Sws. Birds of West. Afr. I. t. 29. —
Argya edoliooides Lafr. — Bonap. Conspl. p. 350. — Hartl. Sy-
 nops sp. 221.

Gambia, Ilha dos Rollas, Abyssinien

546. *Melaenornis ater* v. Müll. p. Bonap.

Melanosoma atra Sundev. Mus. Holm. — Bonap. Conspl. p. 350.
 Kafferei.

547. *Melaenornis taeniopterus* v. Müll. p. Bonap.

Melanosoma taenioptera Sundev. Mus. Holm.
 Kafferei.

548. *Melaenornis simplex* v. Müll. p. Bonap.

Melanosoma simplex Sundev. Mus. Holm.
 Kafferei.

549. *Artamus* (Vieill.) *viridis* Gm.

Ocypterus viridis Cuv. — Pl. enl. 32. f. 2.
 Madagascar.

550. *Dicrurus* (Vieill.) *cristatus* Vieill.

Lanius forficatus L. — *L. drongo* Shaw. — *Muscicapa ga-*
leata Bodd. — Pl. enl. 189. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 166.
 Madagascar.

551. *Dicrourus mystaceus* Vieill.

N. dict. d'hist. n. IX. 583. — *Muscicapa divaricata* Licht.
 Doubl. p 52. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 169 — Hartl. Syn. sp. 227.
 Senegambien, Kordofan.

552. *Dicrourus lugubris* Gr.

Edolius lugubris Ehrenb. Symb. Phys. t 8. f. 3. — Bonap.
 Conspl. p. 352.

Abyssinien, Sennaar und Kordofan

553. *Dicrourus Ludwigi* Smith.

Ill. S. Afr. Zool. t. 34
 Südafrika.

554. *Dicrourus canipeennis* Sws.

Birds of West Afr. I. p. 254. — Hartl. Syn. sp. 223.
 In Westafrika; nicht identisch mit *D. lugubris* Ehrenb.

555. *Dicrourus musicus* Vieill.

N. dict. IX. p. 586. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 167. 168. —
 Hartl. Synops. sp. 222.
 Im südlichen und westlichen Afrika.

556. *Dicrourus emarginatus* Sundev.

Muscicapa emarginata Licht. — *Edol. emarginatus* Licht. —
 Temm. Bonap. Conspl. p. 352.
 Nubien.

557. *Dicrourus atripennis* Sws.

Birds of West Afr. I. p. 256. — Hartl. Syn. sp. 224.
 Sierra Leone.

558. *Dicrourus modestus* Hartl.
Rev. et Mag. de Zool. 1849. p. 495. — Hartl. Beitr. z. Orn. Westafr. t. 4. Id. Synops. sp. 225.
559. *Dicrourus coracinus* Verr.
Rev. et Mag. Zool. 1851. p. 311. — Strickl. Contrib. 1851. p. 132. Gaboon.
2. Subfam. CAMPEPHAGINAE.
560. *Campephaga nigra* Vieill.
Campeph. flava (fem.) Vieill. — *Campeph. atrata* Sws. — *Ceblepyris ater* Less. — Le Vaill. Afr. t. 165. Südafrika.
561. *Campephaga phoenicea* Sws.
Ampelis phoenicea Lath. — *Turd. phoenicopterus* Temm — *Tanagra dubia* Sparrm. — *Ceblepyris melanoxantha* Licht. (fem.) — *Ceblep. flava* Licht. (fem.) — Lath. Synops. 146. 10. — Pl. col. 71. — Sws. Birds of West. Afr. I. t. 27. 28 — Le Vaill. Afr. 164. (fem.) — Nat. Misc. t. 252. — Hartl. Synops. sp. 228. Senegambien, Sennaar, Abyssinien.
562. *Campephaga caesia* Gr.
Ceblep. caesia Licht. — *Ceblep. Le Vaillantii* Temm. — Le Vaill. Afr. t. 162. 163. Kafferei
563. *Campephaga cana* (Lin.) — Pl. enl. 541. Madagascar.
564. *Campephaga xanthornoides* Less. An. des sc. n. 1838. pag. 169. — Cab Mus. Hein. p. 61. Gambia.
565. *Campephaga labrosa* Gr.
Edolius labrosus Sws. — *Lanicterus Swainsonii* Less. — Sws. Zool. Ill. t. 179. — Bonap. Conspl. p. 356. West? - Afrika.
566. *Ceblepyris* (Cuv.) *pectoralis* Sws.
Graucalus pectoralis Jard et Selb. Ill. of Orn. t 57. — *Pyronotus niveoventer* Less. Rev. Zool. 1840. p. 226. — Sws. Birds of West. Afr. I. p. 249. — Hartl. Synops. sp. 230. Gambia, Guinea, Abyssinien.
567. *Ceblepyris azurea* Cass.
Graucalus azureus Cass. Proc. Acad. Philad. 1851. p. 348. — Hartl. Synops. sp. 231. Sierra Leone.
? *Ceblepyris Jardinii* Rüpp.
? *Ceblepyris offinis* Rüpp. Orn. Misc. 1839. p. 38.
568. *Lobotos* (Reichenb.) *Temminckii* Hartl.
Ceblepyris labatus Temm. — *Campephaga lobata* Gr. — *Lanicterus lobatus* Less. — Pl. col. 279. 280. — Schinz Abb. Vög. t. 31. — Less. Rev. Zool. 1839. p. 197. — Hartl. Synops. sp. 232. Guinea.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [3_1855](#)

Autor(en)/Author(s): Müller John Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's
385-400](#)