

# JOURNAL

für

# ORNITHOLOGIE.

**Dritter Jahrgang.**

**N<sup>o</sup> 18.**

**November.**

**1855.**

## Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.

Von

Baron Dr. J. W. v. Müller.

(Fortsetzung von S. 385—400.)

### 5. FAMILIE LANIIDAE.

#### 1. Subfam. Laninae.

569. *Lanius excubitor* L.

*L. cinereus* Br. — Gould Birds Eur. t. 66. — Naum. Vögel  
Deutschl. t. . . — Pl. enl. 445.

Im nördlichen Afrika.

570. *Lanius meridionalis* Temm.

Pl. col. 143. — Roux Orn. prov. t. 153. — Gould Eur. t. 67.  
— Susem. Vög. Eur. t. 15.

In Nord-Ost-Afrika bis Sennaar.

571. *Lanius minor* Gm.

*Emneoctonus italicus* Bp. — *Emneoct. minor* Cab. — *Lan. vigil*  
Pall. — *L. italicus* Lath. — *L. longipennis* Blyth. — Pl. enl.  
32. 1. — Gould Eur. t. 68. — Roux Orn. prov. t. 51.

In Nord-Ost-Afrika, südwärts bis Sennaar und Abyssinien.

572. *Lanius personatus* Temm.

*L. brubru* Sibthroop. — *L. nubicus* Licht. — *L. leucometo-*  
*pon* v. d. Mühle. — *Emneoctonus nubicus* Cab. — Pl. col. 216.  
2. — Susemihl V. Eur. t. 17. 1.

Standvogel im nordöstlichen Afrika, südwärts bis Abyssinien,  
Sennaar und Kordofan.

573. *Lanius algeriensis* Less.

Rev. Zool. 1839. p. 134. — Bonap. Monogr. des Laniens (Rev.  
de Zool. 1853. p. 293.)

In Nord-Afrika.

574. *Lanius princeps* Cab.  
Mus. Hein. I, p. 73. — *L. excubitorius* O des Murs. — *L. macrocerus* Defilippi. — Lefevr. Voy. Abyss. p. 89. t. 8.  
Ost- und Central-Afrika.
575. *Lanius pallidirostris* Cassin.  
Proceed. Acad. nat. sc. Philadelph. 1851. p. 244. — *L. dealbatus* Defilippi. Bonap. Laniens Rev. zool. 1853. p. 294.  
Vom weissen Nil.
576. *Lanius collaris* Lin.  
Pl. enl. 477. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 61. 62. — Jard. and Selby Ill. Orn. t. 52. 53.  
In Südafrika und Abyssinien.
577. *Lanius fiscus* Cab.  
*L. collaris* Rüpp. — *L. Arnaudi* O des Murs. — Cab. Mus Hein. p. 74. — Bp. Rev. zool. 1853. p. 434.  
Abyssinien.
578. *Lanius subcoronatus* Smith.  
Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 68.  
Am Cap.
579. *Lanius afer* Lath.  
*Lanius signatus* Shaw. Gr. Gen. of Birds p. 291. sp. 20.  
Südafrika.
580. *Lanius Smithii* Gr.  
*Collurio Smithii* Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 16. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 312. — Jard. Contrib. 1849. p. 8.  
Cap Coast und Gaboon.
581. *Enneoctonus* (Boie) *collurio* (Lin.)  
*Lan. spinitorquus* Bechst. — *L. aeruginosus* Klein. — Buff. enl. 31. — Gould Birds Eur. t. 69. — Le Vaill. Afr. t. 64. — Naum. V. D.  
Nord-Ost-Afrika bis Sennaar
582. *Enneoctonus rufus* (Lin.)  
*Lan. ruficollis* Shaw. — *L. rutilus* Lath. — *L. ruficeps* Bechst. — *L. pomeranus* Sparm. — Pl. enl. 9. 2 et 31. 1. — Gould Birds Eur. t. 70.  
In Nord-Ost-Afrika. Nach Swainson in Senegambien und fast ganz Afrika
583. *Enneoctonus pectoralis* v. Müll.  
Simillimus *En. rufo*, sed pectore cinnamomeo, speculo alari minore.  
Sennaar.
584. *Enneoctonus Jardinii* v. Müll.  
Simillimus *En. rufo*, sed rectricibus 2 mediis externis dimidiato albis.  
Sennaar und Nubien.
585. *Enneoctonus rutilans* Cab.  
*Lanius rutilans* Temm. — *L. superciliosus* Licht. Doub. p. 47. — *L. erythropterus* Rüpp. — Pl. enl. 477. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 63. 1 und 2. — Hartl. Synops. sp. 253.  
Senegambien.

586. *Enneoctonus badius* Hartl  
Synops. sp. 254.  
Goldküste.
587. *Enneoctonus niloticus* Bp.  
Rev. zool. 1853 p. 439.  
Vom weissen Nil.
588. *Nitauis brubru* Sws.  
*Lan. brubru* Lath. — *L. capensis* Shaw. — *L. frontalis* Forst.  
— Le Vaill. Ois. d'Afr. 71. 1, 2. — Licht. Doubl. p. 48. — Hartl.  
Synops. sp. 251.  
In Süd- und West-Afrika, Abyssinien, Kordofan und Nubien.
589. *Corvinella corvina* Less.  
*Lan. corvinus* Sh. — *L. cissoides* Vieill. nec Licht — *L. mel-  
livorus* Licht. — *L. flavirostris* Sw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 78.  
— Hartl. Synops. sp. 256.  
Südafrika, Goldküste, Senegambien, am oberen weissen Nil
590. *Urolestes melanoleucus* Cab  
*Lan. cissoides* Gr. — *L. melanurus* Licht. — *L. melanoleucus*  
Smith. — *Basanistes cissoides* Licht. — Jard. et Selb. Ill. Orn.  
t. 117. — Mag. Zool. 1837. Ois. t. 61.  
Kafferei.
591. *Oxynotus ferrugineus* Sws.  
*Lanius ferrugineus* Gm. — Vog. Uranie t. 17.  
Insel St. Maurice.
592. *Sigmodus caniceps* Temm.  
Schleg. Naum. II. 2. p. 27. — Hartl. Cab. Journ. f. Ornith. I.  
p. 32. — Jard. Contrib. 1852. t. 95.  
Goldküste.
593. *Sigmodus rufiventris* Bonap.  
Rev. et Mag. de Zool. 1853. p. 441.  
Gaboon.
594. *Eurocephalus anguitemens* Smith  
*Chaetoblemma leucocephala* Sws. — Ill. S. Afr. Zool.  
Südafrika.
595. *Eurocephalus Rüppelli* Bonap.  
*Euroc. anguitemens* Rüpp. System. Uebers. N O. A t. 27.  
In Abyssinien und am weissen Nil.
596. *Prionops* (Vieill.) *plumatus* (Shaw.)  
*Pr. Geoffroyi* Vieill. — *Lan. plumatus* Sws. — Le Vaill. Ois.  
d'Afr. t. 80, 81. — Vieill. Gal. d'Ois. t. 142. — Sws. B. of W. Afr. t. 26.  
Senegambien.
597. *Prionops poliocephalus* Gr.  
*Lan. poliocephalus* Stanley. — *Prionops cristatus* Rüpp. Neue  
Wirbelth. t. 12. 2.  
Abyssinien und Sennaar.
598. *Prionops thalacoma* Smith.  
Ill. S. Afr. Zool. av. t. 5.  
Südafrika, wahrscheinlich auch in Abyssinien.

599. *Tephrodornis* (Sws.) *ocreatus* Strickl.  
Proc. Zool. Soc. 1844. p. 102. — Allen Exp. Nig. II. p. 489.  
— Hartl. Synops. sp. 233.  
Fernando Po.
600. *Telephonus* (Gr.) *senegalus* Gr.  
*Lanius senegalus* L. — *L. senegalensis* Briss. Orn. II. t. 17. 1.  
— *Pomatorhynchus senegalus* Cab. — Pl. enl. 297. 1  
Senegambien, Damara.
601. *Telephonus cucullatus* Gr.  
*Lanius cucullatus* Temm. — *L. senegalus* Licht. — Susem.  
V. E. II. t. 17. 2.  
In Nordafrika?
602. *Telephonus aethiopicus* Lath.  
Rüpp Uebers. der Vög. N.O.Afr. t. 23.  
Abyssinien.
603. *Telephonus erythropterus* Sws.  
*Lanius erythropterus* Shaw. — *L. melanocephalus* Temm. —  
*Thamnophilus tschagra* Vieill. — *Pomatorhynchus erythropterus*  
Cab. — Pl. enl. 479. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 70.  
Abyssinien, Sennaar, Kordofan, nördlich bis Wadi-Halfa (Nubien),  
Senegambien und Südafrika.
604. *Telephonus longirostris* Sws.  
*Lanius tschagra* Rüpp. — *Harpolestes longirostris* Cab. Mus.  
Hein. I. p. 70. — Sws 2. Cent. and a Quart. p. 282.  
Ostafrika (?).
605. *Telephonus trivirgatus* Sm.  
*Melacanotus australis* Sm. Ill. S. Afr. Zool. t. 94 fem.  
Südafrika
606. *Telephonus zeylonus* L.  
*Lan. Bakkakiri* Vieill. — *L. collaris* Sws. — *L. ornatus* Licht.  
— Buff. enl. 272. — Edw Birds 321. — Le Vaill. Afr. 67.  
Südafrika.
2. Subfam. TAMNOPHILINAE.  
(*Dryoscopus* Boie.)
607. *Laniarius cubla* Gr.  
*Dryoscopus cubla* Boie. — *Lanius cubla* Shaw. — *Malonotus cubla* Sundev. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 72. 1 et 2.  
Südafrika, Abyssinien und Sennaar.
608. *Laniarius gambensis* Gr.  
*Malacon. mollissimus* Sws. — *Lan. gambensis* Licht. — Sws.  
Birds of W. Afr. I. t. 23. — Hartl. Synops. sp. 243.  
Senegambien, Sierra Leone.
609. *Laniarius affinis* Gr.  
Ann. Nat. Hist. 1837. p. 489.
610. *Laniarius orientalis* Gr.  
*Malacon. orientalis* et *similis* Sws. Two Cent. and a Quart.  
p. 342. — *Dryoscopus orientalis* Cab.  
Ost? - Afrika.

611. *Laniarius bulbul* Lath.  
*Lanius cafer* Forst. — *Malacon. rufiventris* Sw. — *Malacon. bouboul* Cab. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 68.  
 West? — und Südafrika.
612. *Laniarius aethiopicus* (Gm.)  
*Turdus aethiopicus* Gm. Lath. — *Telephonus aethiopicus* Rüpp.  
 — *Melaconotus aethiopicus* Cab.  
 Abyssinien, Kordofan.
613. *Laniarius madagascariensis* Gr.  
*Lanius madagascariensis* L. — Pl. enl. 299. 1 et 2.  
 Madagascar.
614. *Laniarius bicolor* Gr.  
*Lanius bicolor* L. — *L. madagascariensis coeruleus* Br. —  
 Pl. enl. 298. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 73. 1. 2. 3.  
 Madagascar.
615. *Laniarius Sabini* Gr.  
*Dryoscopus Sabini* J. E. Gray. — *Chaunonotus Sabini* Gr. —  
*Hapalophus melanoleucus* Verr. Rev. de Zool. 1851. p. 312 —  
 Jard. Selb. Ill. sec. ser. pl. 27. — Hartl Synops. sp. 244.  
 Sierra Leone, Gaboon.
616. *Laniarius major* Hartl.  
*Thelephonus major* Hartl Rev. Zool. 1848. p. 108. — Hartl.  
 Beitr. zur Orn. W. A. t. 5. — Id Synops. sp. 245.  
 Goldküste.
617. *Laniarius leucorhynchus* Hartl.  
*Teleph. leucorhynchus* Hartl Rev. Zool. 1848. p. 108. — *Dryo-*  
*scopus leucorh.* Hartl. Syn. sp. 246. — Id. Beitr. z. Orn. W.A. t. 6.
618. *Laniarius carbonarius* Cassin.  
 Proc. Acad. Phil. 1851. p. 347.  
 Sierra Leone.
- (*Laniarii* Vieill.)
619. *Laniarius barbarus* Vieill.  
*Malaconotus barbarus* Sws. — *Lanius barbarus* L. — Pl. enl.  
 56. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 69. — Sws. Zool. Ill. t. 71.  
 Nord-, West- und Süd-Afrika.
620. *Laniarius atrococcineus* (Burch.)  
 Zool. Journ. I. t. 28. — Sws. Zool. Ill. t. 72.  
 Südafrika.
621. *Laniarius* (Gr.) *cruentatus* Rüpp.  
*Malaconotus roseus* Jard. — *M. erythrogaster* Sws. — Rüpp.  
 Atl. t. 29. — Ehrenb. Symb. Phys. t. 3.  
 Abyssinien.
622. *Laniarius* (Gr.) *olivaceus* (Shw.)  
*Lanius oleaginus* Vieill. — *Malac. olivaceus* Sws. — *Chloro-*  
*phoneus olivaceus* Cab. Mus. Hein. I. p. 71. — Le Vaill. Ois.  
 d'Afr. 75. 1 et 76. 1.  
 In Süd-, Ost- und Central-Afrika, nordwärts bis Nubien.
623. *Laniarius rubiginosus* nob.



- Malaconotus rubiginosus* Sundev. — *Chlorophoneus rubiginosus* Cab. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 75 2.  
Südafrika.
624. *Laniarius similis* Gr.  
*Malaconotus similis* Smith — *M. aurantiopectus* Less. — *M. affinis* Less. — *M. chrysogaster* Sws. — *Chlorophoneus similis* Cab. — Hartl. Synops. sp. 236. — Sm. Ill. S. Afr. Zool. t. 46. fem. — Sws. Birds of W. Afr. t. 25.  
Mit Ausnahme der Nordküstenländer über ganz Afrika verbreitet.
625. *Laniarius leucotis* Gr.  
*Melaconotus leucotis* Sws. Two Cent and a Quart p. 341.  
Süd? - Afrika.
626. *Laniarius* (Gr) *superciliosus* Sws.  
*Malac. superciliosus* Sws. Birds of W. A. I. p. 239. — Hartl. Synops. sp. 237.  
Gambia.
627. *Laniarius gutturalis* Gr.  
*Lanius gutturalis* Daud. — *L. viridis* Vieill. — *Malaconot. torquatus* Sws. — *Telephonus gutturalis* Cab. — Daud. Ann. du Mus. III t. 15. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 286. — Vieill. Gal. t. 143. — Hartl. Synops. sp. 242.  
Congo.
628. *Laniarius chrysogaster* Bonap.  
*Turd. chrysogaster* Gr. — *Laniar. erythrogaster* Gr. — Pl. enl. 358. — Rüpp. Atl. t. 29.  
Abyssinien, Sennaar, Kordofan
629. *Laniarius icterus* Gr.  
*Vanga ictera* Cuv. — *Lan. olivaceus* Vieill. nec Shw. — *Lan. poliocephalus* Licht. — *Malaconotus Blanchoti* Steph. — *Archolestes icterus* Cab. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 185. — Sws. Birds of W. Afr. I t. 22. — Vieill. Gal. t. 139. — Hartl. Syn. sp. 238.  
Senegambien, Süd- und Ost-Afrika.
630. *Laniarius hypopyrrhus* Hartl.  
*Archolestes hypopyrrhus* Cab. Mus. Hein. p. 71. — Hartl. Verz. Brem. Samml. p. 61. — Id. Syn. sp. 239.  
Gambia, Algoabay.
631. *Laniarius rubrigaster* Vieill.  
Dict. d'Hist. Nat. XIII. p. 300.  
Süd? - Afrika.
632. *Laniarius cruentus* (Less.) Gray.  
Less. Cent. Zool. t. 65. — Id. Zool. de Belang. p. 256. — Hartl. Synops. sp. 240.  
Cap.
633. *Laniarius mystaceus* Gr.  
*Lanius mystaceus* Lath. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 65.  
Südafrika.
634. *Laniarius multicolor* Gr.  
Gen. of Birds t. 72.  
Südafrika.

635. *Laniarius Peli* Bonap.  
 Consp. p. 360. — Hartl. Synops. sp. 241.  
 Ashantee.
636. *Vanga* (Vieill.) *curvirostris* nob.  
*L. curvirostris* Lin. — *Thamn. leucocephalus* Vieill. Pl. enl. 328.  
 Madagascar.
637. *Vanga xenopirostris* Lafr.  
*Xenopirostris Lafresnayi* Bp. Rev. Mag. de Zool. 1850. t. 1. 1 et 2.  
 Madagascar.

## D. Conirostres.

### I. FAM. CORVIDAE.

#### 1. Subfam. GARRULINAE.

638. *Garrulus melanocephalus* Bonelli.  
*Garr. atricapillus* Geoffr. — *G. iliceti* Mus. Berol. — *Pica stridens* Ehrenb. — Géné Mem. Acad. Tour. XXXVII. t. 1. — Le Vaill. jun. Explor. Alger. t. 6.  
 In Algerien, Arabien und Syrien gefunden, in Egypten nie von mir bemerkt.

#### 2. Subfam. CALLAEATINAE.

639. *Ptilostomus senegalensis* Sws.  
*Corvus afer* Gm. — *Pica senegalensis* Briss. — *Corvus senegalensis* L. — *Pica nigra* Vieill. — *Cryptorhina piapiac* Wagl. — *Lanius acuticaudatus* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 54. — Pl. enl. 538.  
 Senegambien.
640. *Ptilostomus poecilorhynchus* Gray.  
*Cryptorhina poecilorhyncha* Wagl. Syst. Avium sp. 2. — Hartl. Synops. W. Afr. sp. 260. — Bonap. Consp. p. 369.  
 Senegambien.
641. *Ptilostomus rufigaster* Lath.  
*Corvus octopennatus* Daud. — *C. ventralis* Shaw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 55.  
 Südafrika.

#### 3 Subfam. CORVINAE

642. *Pica caudata* Ray.  
*Corvus pica* L. — *P. europaea* Cuv. — *C. melanoleuca* et *albiventer* Vieill. — Pl. enl. 488. — Gould Birds of Eur. t. 216.  
 Nach Rüppell im Winter in Egypten
643. *Pica mauritanica* Malh.  
 Mem. Soc. Hist. Nat. Metz 1843. — Cat. des Ois. Alger. p. 7. — Explorat de l'Alg. t. 35.  
 Nordafrika.
644. *Pica cyanea* Cook nec Pall.  
*Cyanopica europaea* Schl. — Gould Birds Eur. t. 217. — Su-sem. V. Eur. t. 5. — *Dolometis Cooki* Cab.  
 Nord-West-Afrika.

645. *Corvus major* Vieill.  
*C. montanus* Temm. — *C. corax* Daud. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 51.  
 Südafrika.
646. *Corvus corone* Lin.  
 Pl. enl. 495. — Gould Birds of Eur. t. 221. — Naum. Vgl. D. t.  
 Im Winter zuweilen in Nordafrika.
647. *Corvus affinis* Rüpp.  
 Neue Wirbelth. t. 10. 2.  
 In Kordofan und Abyssinien.
648. *Corvus umbrinus* Hedenb.  
 In Egypten, Nubien, Sennaar, Kordofan, Abyssinien und Arabien.
649. *Corvus brevicaudatus* v. Müll. (1849.)  
 Dieser merkwürdige und ausgezeichnete Rabe, den man schon  
 im Fluge leicht unterscheidet, wurde von mir 1848 in Kordofan  
 entdeckt, wo ich ein gepaartes Paar von ihm erhielt. Er wird in  
 meinen „Beiträgen zur Ornithologie Afrika's“ beschrieben und ab-  
 gebildet werden. Der im „Journal für Ornithologie, 1854, 1. Heft,  
 S. 75, von A Brehm unter dem Namen *C. brachyurus* angeführte  
 Rabe ist vielleicht mit *C. brevicaudatus* Nob. identisch.
650. *Corvus frugilegus* Lin.  
 Pl. enl. 483. 484. — Gould Birds of Eur. t. 224. — Naum. V. D. t. .  
 Erscheint häufig auf dem Zuge in Nord-Ost-Afrika.
651. *Corvus capensis* Licht.  
*C. segetum* Temm. — *C. macropterus* Wagl. — *C. Le Vail-  
 lantii* Less. — Rüpp. Neue Wirbelth. t. 10. — Le Vaill. O. d'Afr. t. 52.  
 Aus Südafrika und Abyssinien.
652. *Corvus cornix* L.  
 Pl. enl. 76. — Gould Birds Eur. t. 22. — Naum. V. D. t.  
 Häufig in Egypten, aber nicht südlicher.
653. *Corvus monedula* L.  
 Pl. enl. 523. — Gould Birds of Eur. t. 223. — Naum V. D. t.  
 Selten in Unter-Egypten?
654. *Corvus scapulatus* Daud.  
 Pl. enl. 327. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 53.  
 Vom südlichen bis zum nordöstlichen Afrika, mit Ausnahme des  
 Nordens und Nordwestens.
655. *Corvus phaeocephalus* Cab.  
 Mus. Hein. I, p. 232.  
 Abyssinien.
656. *Corvus curvirostris* Gould.  
*C. leuconotus* Sws. Birds of W. Afr. I, t. 5. — Jard. et Selb.  
 Ill. new. ser. t. 33. — Hartl. Synops. W. Afr. sp. 261.  
 Senegambien, Fernando Po, Cap Coast.
657. *Corvultur* (Less.) *albicollis* (Lath.)  
*Corvus cafer* Licht — *C. vulturinus* Shaw. — Le Vaill. Ois.  
 d'Afr. t. 50. — *Archicorax cafer* Cab.  
 Südafrika
658. *Corvultur crassirostris* Rüpp.



N. Wirbelth. t. 8. — *Archicorax crassirostris* Cab.

In den abyssinischen Gebirgen.

659. *Picathartes* (Less.) *gymnocephalus* (Temm.)

*Corvus gymnocephalus* Temm. — *Pica gymnocephala* Schinz.

— *Galgulus gymnoceph.* Wgl. — Pl. col. 327. — Schinz Vgl. t. 16.

Von Sierra Leone und dem inneren Südafrika.

#### 4. Subfam. FREGILINAE.

660. *Fregilus graculus* Cuv.

*Corvus graculus* L. — *C. erythroramphus* Vieill. — *Pyrrhoro-*

*corax graculus* Temm. — *Freg. europaeus* Less. — *Freg. ery-*

*thropus* Sws. — *Corac. gracula* Degl. — Pl. enl. 225. — Vieill.

Gal. des Ois. t. 103. — Gould Birds of Eur. 219. — Naum. V. D. t.

Nach Rüppell „in kleinen Familien auf den höchsten Bergen von Arabien und Abyssinien.“

## II. FAM. STURNIDAE.

### 1. Subfam. PTILONORHYNCHINAE.

661. *Pilorhinus albirostris* Cab.

Mus. Hein I, p. 201. — *Ptilonorhynchus albirostris* Rüpp. N.

Wirbelth. t. 9. fig. 1. 2.

Häufig in Abyssinien und Kordofan.

662. *Juida* (Gr.) *aenea* (Gm.)

*Merula viridis longicauda senegalensis* Briss. — *Turdus aeneus*

L. — *Corvus aureoviridis* Shaw. — *Lamprocolius aeneus* Sund.

— *Lamprotornis longicauda* Sws. — Briss. Orn. II. t. 31. — Le

Vaill. Ois. d'Afr. t. 87. — Sws. Birds of W. Afr. I. t. 7. — *Urauges*

*aeneus* Cab. Mus. Hein. I, p. 200. — Hartl. Synops. sp. 263.

Mit Ausnahme der nördl. Küstenländer über ganz Afrika verbreitet.

663. *Juida Burchelli* Smith.

*Megalopterus australis* A. Sm.? — Ill. S. Afr. Zool. t. 47. —

*Urauges australis* Cab.

Im südlichen Afrika.

664. *Juida aeneoides* Nob.

Bonap. Consp. p. 415. — *Lamprotornis aeneoides* Temm.

Afrika.

665. *Juida splendens* Nob.

*Lamprotornis splendens* Temm. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 84.

Afrika.

666. *Juida ignita* Gr.

*Lamprotornis ignita* Licht. Nordmann in Erm. Reise, t. 3. —

Gr. Genera of Birds t. 80. — Hartl. Synops. sp. 264.

Ilho de Principe, St. Thomé.

667. *Juida ptilonorhyncha* (Sws.)

*Turdus auratus* Gm. Lath. — *Lamprot. lucida* Erm. Zool. Atl.

t. 3. f. 2. — Sws. Birds of W. Afr. I. p. 140. — Pl. enl. 540.

— Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 90. — Hartl. Synops. sp. 265.

Süd- und Westafrika.

668. *Juida chrysonotis* (Sw.)

*Lampr. splendidus* Vieill. — *Lampr. fulgida* Licht.? — Sws. Birds of W. Afr. I. t. 6. — Vieill. Enc. p. 653. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 418. — Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 57. — Hartl. Synops. sp. 266.

Süd- und Westafrika.

669. *Juida nitens* (Lin.)

*Turdus nitens* Gm. — *Merula viridis angolensis* Briss. Orn. II. t. 30. f. 2. — Pl. enl. 561. — Hartl. Synops. sp. 268.

Westafrika. (Angola).

670. *Juida aurata* (Gm.)

*Turdus auratus* L. — *Sturnus auratus* Daud. — *Lamprotornis auratus* Licht. — Pl. enl. 540.

Südafrika.

671. *Juida cyanotis* (Sw.)

*Lampr. chalcura* Nordm. — *Lampr. chalybaea* Licht. — Sws. Birds of W. A. I. p. 146. — Rüpp. N. Wirbelth. t. 11. f. 2. av. juv. — Nordm. in Erm. Zool. Atl. p. 8. — Hartl. Synops. sp. 269. — Bonap. Consp. p. 415.

West? - Afrika.

672. *Juida purpureiceps* Verr.

Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 418. — Strickl. Contrib. to Orn. 1851. p. 133. — Hartl. Synops. sp. 267.

Gaboon.

673. *Juida corusca* (Licht.)

*Lampr. corusca* Licht. Mus. Berol. — Bonap. Consp. p. 415. Mir unbekannt. (Von „Korosko in Nubien?“)

674. *Juida chrysogastra* (Gm.)

*Lampr. chrysogaster* Licht. — *L. erythrogaster* Hempr. et Ehrenb. — Pl. enl. 358. — Bonap. Consp. p. 415. — *Notauges chrysogaster* Cab.

Abyssinien.

675. *Juida superba* (Rüpp.)

*Lamprotornis superba* Rupp. — Bonap. Consp. p. 415. — *Notauges superbus* Cab.

Abyssinien.

676. *Juida melanogastra* (Sws.)

Two Cent. Anim. in Manag. p. 297. sp. 52. — Bonap. Consp. p. 415. — Hartl. Synops. sp. 270.

Senegambien.

677. *Juida chloroptera* (Sws.)

*Lamprotornis chloropterus* Sws. Two Cent. p. 297. — Bonap. Consp. p. 416. — Hartl. Synops. sp. 271.

Westafrika.

678. *Juida phoenicoptera* (Sws.)

Nairobi Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 89. — Sws. Two Cent. p. 360. Bonap. Consp. p. 416.

Südafrika.

679. *Juida rufiventris* (Rüpp.)

- N Wirbelth. t. 11. fig. 1. — Hartl. Synops. sp. 272.  
In Ost- und Westafrika.  
(Beschr. des Nestes und Eies s. m. Beitr. z. Orn. Afr. t. XXVII. f. 4)
680. *Juida tenuirostris* (Rüpp.)  
N. Wrblth. t. 10. f. 1.  
Abyssinien.
681. *Spreo* (Less.) *bicolor* Blyth.  
*Turdus bicolor* Gm. *Lamprotornis albiventer* Sws. — *Lampr.*  
*bicolor* Licht. — *Notauges bicolor* Cab. Mus. Hein. I, p. 198. —  
Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 88. — Bonap. Consp. p. 416.
682. *Spreo morio* (Daud.)  
*Turd. morio* Lin. — *Corvus rufipennis* Shw. — *Astrapia morio*  
Blyth. — *Amydrus morio* Cab.  
Südafrika.
683. *Spreo fulvipennis* (Sws.)  
*Lamprot. fulvipennis* Sws. Anim in Menag. (Two Cent.) p. 298.  
f. 49 a. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 91. — Bonap. Consp. p. 416.  
— Hartl. Synops. sp. 273  
Süd- und Westafrika.
684. *Onychognathus fulgidus* Hartl.  
Rev. et Mag. de Zool. 1849. t. 14 f. 2, 3. — Hartl. Beitr.  
zur Orn. W. A. t. 7.  
Insel St. Thomè.
685. *Calornis leucogastra* (Gm.)  
*Turd. leucogaster* L. — *Lamprot. leucogaster* Sws. — *Pholi-*  
*dauges leucogaster* Cab. Mus. Hein. I, p. 198. — Pl. enl. 648.  
f. 1. — Sws. Birds of W. Afr. I. t. 8. — Bonap. Consp. p. 416.  
— Hartl. Synops. sp. 275.
686. *Saraglossa madagascariensis* Gr.  
*Turdus madagascariensis* Herm. Pl. enl. 557, f. 1. — Bo-  
nap. Consp. 418.
2. Subfam. BUPHAGINAE.
687. *Buphaga africana* L.  
*B. rufescens* Vieill. Gal. t. 93. — Pl. enl. 293. — Le Vaill.  
Ois. d'Afr. t. 97. — Gray Gen. of Birds t. 82.  
Ind Süd- und Westafrika.
688. *Buphaga erythrorhyncha* Stanley.  
*B. habessinica* Ehrenb. Symb. phys. t. 9. — Pl. col. 465.  
In Abyssinien und Madagascar.
3. Subfam. EURYCEROTINAE.
689. *Euryceros Preosti* Less.  
Cent. Zool. t. 74. — Illustr. Zool. t. 13. — Bp. Cousp. p. 423.  
Madagascar.
4. Subfam. STURNINAE.
690. *Pastor roseus* Wagl.  
*Turd. selescis* Gm. — *T. suratensis* Lath. — *Sturn. roseus*  
Scop. — Pl. enl. 251 — Edw. Birds t. 250. — Le Vaill. Ois.  
d'Afr. t. 96. — Bonap. Faun. ital. av. t. 4. — Gould Birds Eur. 212.  
Verstreicht sich zuweilen nach Nordafrika.

691. *Acridotheres pagodarum* Vieill.

*Sturnus subroseus* Shaw. — *Maina sylvestris* Hodgs. — *Gracula pagodarum* Daud. — *Sturnia pagodarum* Blyth. — *Pastor pagodarum* Wagl. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 92. 1. — Mem. Soc. Copenh. III. t. 8. — Wagl. Syst. av. sp. 8 — *Temenuchus pagodarum* Cab

Nach Wagler zufällig in Südafrika?

692. *Dilophus carunculatus* Gr.

*Gracula carunculata* Gm. — *Gr. larvata* Shaw. — *Gr. gallinacea* Daud. — *Dilophus gallinaceus* Vieill — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 93 1, 2 et 94. 1, 2.

Aus Süd- und Nord-Ost-Afrika.

693. *Sturnus vulgaris* L

*St. varius* Meyer. — Pl. enl. 75. — Gould Birds Eur. t. 210. — Naum. Vgl. Deutschl. t.

In Unter-Egypten häufig.

694. *Sturnus unicolor* Marm.

Pl. col. 111. — Gould Birds Eur. t. 211.

Ich erhielt ein Individuum in Algier; in Marocco, Egypten und sonstigen Ländern Afrika's von mir nicht bemerkt.

## III. FAM. FRINGILLIDAE.

## I. Subfam. PLOCEINAE.

695. *Alecto albirostris* (Sws.)

*Textor alecto* Temm. — *Dertroides albirostris* Sws. Birds of W. Afr. I. p. 163. — Pl. col. 446. — Less. Traité d'Orn. p. 433. — Bonap. Consp. p. 438 — Hartl. Syn. sp. 277.

Abyssinien, Sennaar, (Kordofan?) Senegambien.

696. *Alecto erythrorhyncha* (Sm.)

*Textor erythrorhynchus* Sm. Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 64. — Bonap. Consp. p. 438.

Südafrika.

697. *Alecto dinemelli* Horsf.

Gr. Gen. of Birds t. 87. 1. — Rüpp. System. Uebers. d. Vgl. N.O.Afr. t. 30. — Bonap. Consp. p. 438.

Abyssinien.

698. *Alecto panicivora* (Lin.)

*Pyrhula africana nigra* Briss. Orn. III. p. 317. — *Loxia panicivora* Lin. — Hartl. Synops. sp. 278.

Westafrika?

699. *Sycobius cristatus* Vieill.

*Malimbus cristatus* Vieill. — *Ploceus cristatus* Vieill. — *Tanagra malembica* Daud. — Vieill. Ois. chant t. 42. — Daud. Ann. du Mus. II t. 10. — Bonap. Consp. p. 438. — Hartl. Syn. sp. 279.

Westafrika. (Congo.)

700. *Sycobius malimbus* Temm.

*Malimbus cristatus* fem. Vieill. — *Fringilla tatrix* Licht. — *Sycob. rubricollis* Sws. — *Ploceus fasciatus* Steph. — *Euplectes*

- rufovelatus* Fras. — Vieill. Ois. chant. t. 43. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 419. — Strickl. Contrib. 1851. p. 133. — Bonap. Consp. p. 438. — Hartl. Synops. sp. 280.  
Westafrika, Fernando Po.
701. *Sycobius melanotis* Lafrén.  
*Ploc. erythrocephalus* Rüpp. — Lafr. Rev. Zool. 1839. p. 20. — Guér. Mag. de Zool. 1839. t. 7. — Rüpp. Syst. Uebers. N O.A. p. 71. — Less. Descript. Mam. Ois. p. 334. Id. Echo du M. Sav. 1844. p. 31. — Bonap. Consp. p. 438. — Hartl. Syn. sp. 106.  
Senegambien, Abyssinien.
702. *Sycobius leuconotos* v. Müll.  
*Ploc. leuconotos* v. Müll. Naum. 1851. IV. p. 28. — Major cinereus; capite, collo et pectore igneo rubro; loris, regione orbitali et mento nigro; medio dorsi abdomineque albido; remigibus et tectricibus exterioribus igneo-marginatis.  
Abyssinien.
703. ?*Sycobius rubriceps* Sundev.  
Mus. Holm. Bonap. Consp. p. 438.  
Südafrika.
704. *Sycobius nitens* Gr.  
Gen. of Birds t. 87. 2. — Sundev. Oef. K. V. Ac. Förh. p. 158. — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Synops. sp. 283.  
Sierra Leone.
705. *Sycobius scutatus* Cassin  
Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. IV. p. 157. — Journ. Acad. I. p. 297. t. 41. 1 et 2. — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Syn. sp. 282.  
Sierra Leone.
706. *Sycobius nigerrimus* Vieill.  
*Ploc. nigerrimus* Vieill. — *Pl. niger* Sws. Menag. p. 306. — Vieill. Enc. meth. Orn. p. 700. — Id. Dict. 34. p. 130. — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Synops. sp. 284.  
Angola.
707. *Symplectes* (Sws.) *nigricollis* (Vieill.)  
*Ploc. nigricollis* Vieill. — *Ploc. atrogularis* Voigt. — *Sycobius nigricollis* Gr. — Vieill. Ois. chant. t. 45. Id. Encycl. p. 699. — Id. Dict d'Hist. N. p. 129 — Cuv. Voigt. 1 p. 164 — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Syn. sp. 285.  
Westafrika (Malimbe.)
- 708 *Symplectes bicolor* Vieill.  
*Ploc. bicolor* Vieill. — *Fringilla gregalis* Licht. — *Pl. chrysogaster* Vig. — *Symplectes chrysomus* Sws. — *Eupodes xanthosomus* Jard. — *Hyphantornis chrysogaster* Gr. — *Sycobrotus bicolor* Cab. Mus. Hein. I. p. 182. — Vieill. Enc. p. 698. — Licht. Doubl. p. 23. — Jard. Selb. Ill. new ser. t. 10. — Sws. Birds W. A. I. p. 170. — Hartl. Synops. sp. 286. — Bp. Consp. p. 439.  
Süd- und Westafrika.
709. *Symplectes St. Thomae* Hartl.



- Sycob. St. Thomae* Hartl. Rev. Zool. 1848. p. 109. Id Beitr. zur Orn. W. Afr. t. 9. — Bp. Consp. p. 439. — Hartl. Syn. sp. 287. Insel St. Thomä.
710. *Symplectes princeps* Bonap.  
Consp. p. 439. — Hartl. Synops. sp. 288.  
Ilho do principe.
711. *Nelicurvius* (Bp.) *pensilis* (Gm.)  
*Loxia pensilis* Gm. — *Loxia nelicurvi* Scop. — *Ploc. nelicurvi* Gr. — Sonnini Voy. Ind. t. 17.  
Madagascar.
712. *Hyphantornis aurantia* Gray.  
*Pl. aurantius* Vieill. Enc. p. 700. — Id Ois. chant. t. 44. — Sws. Menag. p. 306. — Bp. Consp. p. 440. — Hartl. Syn. sp. 289.  
Angola.
713. *Hyphantornis ocellaria* Gr.  
*Ploc. ocellarius* Sm. Ill. S. A. Zool. Av. t. 30. 2. m. — *Hyphanturgus ocellarius* Cab. Mus. Hein. I. p. 182.  
Südafrika.
714. *Hyphantornis brachyptera* Gr.  
*Ploc. brachypterus* Sws. Birds of W. Afr. I. t. 10. — Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 52. — Bonap. Consp. p. 440. — *Hyphanturgus brachypterus* Cab. Mus. Hein. I. p. 182. — Hartl. Synops. sp. 290.  
Senegambien, Fernando Po.
715. *Hyphantornis personata* Gr.  
*Ploc. personatus* Vieill. — *Pl. melanotis* Sws. — Vieill. Gal. d'Ois t. 84. — Sws. Menag. p. 307. fig. 56. — Jard. Contrib. 1848. — Bonap. Consp. p. 440. — Hartl. Synops. sp. 291.  
Westafrika.
716. *Hyphantornis flavocapilla* (Vieill.)  
*Ploc. flavocapillus* Vieill. Dict. Hist. N. Vol 34. p. 127. — Id. Encycl p 698. — Hartl. Synops sp. 292.  
Congo.
717. *Hyphantornis grandis* Gr.  
*Ploc. grandis* Gr. — *Pl. collaris* Fras. — Gr Gen. of Birds part. I. — Fras Proc Zool S. 1842. p. 142. — Allen Ex. Nig. II. p. 499. — Fras Zool. Typ. VII t 2. — Hartl Syn. sp. 293.  
Insel St Thomae.
718. *Hyphantornis textor* Nob.  
*Oriolus textor* Gm. — *Loxia melanocephala* Gm. — *Fring. longirostris* Vieill. — *Pl. senegalensis* Steph. — *Fring. senegalensis* Briss — *Textor melanocephalus* Bonap. — *Pl. modestus* Hartl. Gm. I 392. — Licht. Doubl. p. 23. — Vieill. Enc. p. 591. — Sws. Zool Ill. n. s. t. 37. Birds of W. A I p. 167 — Fras. Proc. 1843. p. 51. — Briss. Orn. III. 173 — Sundev. Oefers. 1849. p. 158. — Bonap. Consp. p. 440. — Hartl. Rev. Zool. 1845. p. 406 fem. — Id. Synops. sp. 294.  
West- und Süd-West-Afrika.

719. *Hyphantornis capitalis* Nob

*Tanagra capitalis* Lath. — *Fr. capitalis* Licht. — *Ploc. capitalis* Less. — *Pl. velatus* Vieill. — Lath. Ind. Orn. I. 432. — Id. Gen Hist. VI. t. 94. — Licht Doubl. p. 23. — Less. Compl. VIII. p. 308. — Vieill. Enc. p. 702. — Hartl. Synops. sp. 295. Senegambien.

720. *Hyphantornis cucullata* (Sws.)

*Pl. cucullatus* Sws. — *Textor cucullatus* Bonap. — Sws. Birds of W. A. II. p. 261. — Id. Menag. p. 307. — Bonap. Consp. p. 441. — Hartl. Synops. sp. 296. Senegambien.

721. *Hyphantornis vitellina* (Licht)

*Fr. vitellina* Licht. — *Pl. ruficeps* Sws. — *Textor vitellinus* Bonap. — Licht. Doubl. p. 23. — Sws. Birds of W. Afr. II. p. 262. Id. Menag. p. 408. — Bonap. Consp. p. 441. — Hartl. Syn sp.

722. *Hyphantornis sublarvata* v. Müll.

*Ploc. sublarvatus* v. Müll. Naumannia, 1851. IV. p. 28. — v. Müll. Beitr. z. Orn. Afr. t. XII — *Pl. intermedius* Rüpp.? Syst. Uebers. d. Vgl. N.O.A. p. 71? Kordofan und Abyssinien.

723. *Hyphantornis larvata* (Rüpp.)

*Pl. larvatus et flavoviridis* Rüpp. N. Wirbelth. t. 32 1 m, Uebers. N.O.A. t. 29 fem. Abyssinien.

724. *Hyphantornis spilonota* (Vig.)

*Pl. spilonotus* Vig. — *Pl. stictonotus* Sm. — *Pl. flaviceps* Sws. Birds of W. A. II. t. 32. — Sm. S. Afr. Quat. Journ. no. 5. p. 11. Id. Ill S Afr. Zool t. 66 1. West- und Südafrika.

725. *Hyphantornis capensis* Gr.

*Pl. abyssinicus* Less. — *Pl. capensis* Sm. Ill. S Afr. Zool. Av. t. 66. 2. m — Bonap. Consp. p. 440. Südafrika.

726. *Hyphantornis aurifrons* Gr.

*Pl. aurifrons* Temm — *Pl. icterocephalus* Sws. — Pl. col. 175. 176. — Bonap. Consp p. 440. Südafrika

727. *Hyphantornis Grayi* Verr.

Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 514. — Hartl. Synops. sp. 300. Gaboon.

728. *Hyphantornis melanotis* v. Müll.

*Pl. melanotis* Guér — *Pl. auricularis* Prev. — *Hyphantornis Guerinii* Gr. O. des Murs Voy. Lcféb. — v. Müll Beitr. z. Orn. t. XX. Ost-Afrika, (Abyssinien, Sennaar, Kordofan und südl Nubien.)

729. *Hyphantornis flavigula* Hartl.

*Pl. flavigula* Hartl. — v. Müll. Beitr. zur Orn. Afr. t. XX. Westafrika.

730. *Hyphantornis luteola* (Licht.)

*Fring. luteola* Licht. Doubl. p. 23. — *Sitagra luteola* Cab.  
Mus. Hein. 1. p. 181. — Hartl. Synops. sp. 302  
Kafferland.

731. *Hyphantornis collaris* (Vieill.)

*Pl. collaris* Vieill. Enc. p. 699. — Id. Dict. d'Hist. Nat. 34.  
p. 129. — Bonap. Consp. p. 441. not. — Hartl. Synops. sp. 303.  
Westafrika, (Congo, Senegal.)

732. *Hyphantornis castaneofusca* (Less.)

*Pl. castaneofuscus* Less. Rev. Zool. 1840. p. 99. — Bonap.  
Consp. p. 442. — Hartl. Synops. sp. 305.  
Senegambien.

733. *Hyphantornis isabellina* (Less.)

*Pl. isabellinus* Less. Rev. Zool. 1840. p. 226. — Hartl. Syn. sp. 306.  
Sierra Leone.

734. ? *Hyphantornis tricolor* Hartl.

*Pl. collaris* J. E. Gray. Zool. Misc. I. p. 6. — Hartl. Syn. sp. 304.  
Sierra Leone.

735. *Hyphantornis subaurea* Gr.

*Pl. subaureus* Sm. Ill. S. Afr. Zool. t. 30. t. m. — Bp. Consp. p. 441.  
Südafrika.

736. *Hyphantornis mariquensis* Gr.

*Ploc. mariquensis* Sm. Ill. S. A. Zool. t. 103. — Bp. Consp. p. 441.  
Südafrika.

737. *Hyphantornis nigrifrons* Cab.

Mus. Hein. 1, p. 182.  
Kafferland.

738. *Hyphantornis galbula* Gr.

*Pl. galbula* Rüpp. N. Wrblth. t. 32. 2. — Bp. Consp. p. 441.  
Abyssinien

739. *Hyphantornis rubiginosa* Gr.

*Pl. rubiginosus* Rüpp. N. Wrblth. t. 33. 1. — Bp. Consp. p. 442.  
Abyssinien.

740. *Ligurnus* (Reichb.) *olivaceus* (Fras.)

*Coccothraustes olivaceus* Fras. Proc. Zool. Soc. 1842. p. 144.  
— Id. Zool. typica part. X. — Allen Exp. Nig. II. p. 500. —  
Hartl. Synops. sp. 307.

741. *Plocepasser mahali* Sm.

*Leucophrys pileatus* Sws. — *Ploceus haematocephalus* Licht.  
— *Agrophilus mahali* Cab. — *Philagrus mahali* Cab. Mus. Hein. I,  
p. 179. — Smith Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 63. m. — Bp. Consp. p. 443.  
Südafrika.

742. *Plocepasser superciliosus* Rüpp.

*Ploceus superciliosus* Rüpp. — *Agrophilus superciliosus* Sws.  
— Rüpp. Atl. t. 15. — Sws. Birds of W. A. I p. 209. — Bp.  
Consp. p. 444. — *Philagrus superciliosus* Cab. — Lefebv. Voy.  
en Abyss. t. 9. 2. — Allen Exp. Nig. I. p. 310. — Hartl. Syn. sp. 308.  
Kordofan, Darfur, Senegambien, Nigritien.

(Schluss folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [3 1855](#)

Autor(en)/Author(s): Müller John Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's  
449-464](#)