

5 Jahren sah ich ein ebenfalls in der Söhre, wenn auch einige Stunden weiter südlich, geschossenes Exemplar bei dem hiesigen Präparator Beckmann.

Falco aesalon Tunst. November 1891 wurde ein junges ♂ bei Cassel geschossen und im October 1892 eins bei dem benachbarten Arolsen.

Falco peregrinus Tunst. Zum ersten Male seit 10 Jahren hat in 1892 kein Paar am Bilstein bei Besse im südwestlichen Habichtswalde, einige Stunden von hier, gebrütet. Wahrscheinlich sind sie auf der neu errichteten Krähenhütte des benachbarten Jagdpächters geschossen. Präparator Beckmann erhielt April 1892 ein Paar, ♀ mit Brutfleck, die von der Ruine Schachtenburg, einige Stunden nordwestlich von hier, stammten. Der dritte der hiesigen Horste, am Hohlestein im nördlichen Habichtswalde, war dieses Jahr überhaupt unbesetzt geblieben.

Ciconia nigra (L.). Ein Stück in diesem Herbste (1892) bei Ziegenhain an der Schwelm geschossen. Er brütet wohl noch im Süden des Fürstenthums Waldeck in den waldigen Ederbergen.

Somateria mollissima L., ein ♀ im October d. J. bei Eschwege an der Werra geschossen.

Notiz über *Lanius major*.

Von

Prem.-Lieut. von Winterfeldt.

Ueber diesen grössten Würger, welchem ich hin und wider auf den Feldern Metzethins auch bei strenger Kälte begegnete, allerdings immer nur vereinzelt, hätte ich zu erwähnen, dass ich einst, einen solchen beobachtend, sah, wie derselbe von dem Ast eines dünnen Baumes abflog, dann in der Luft ganz in der Weise, wie es die Falken und Bussarde gern thun, rüttelte, sich schnell zur Erde stürzte, den erspähten Raub aufnahm und sich nach seinem Standort zurückbegab.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [41_1893](#)

Autor(en)/Author(s): Winterfeldt

Artikel/Article: [Notiz über Lanius major. 152](#)