© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Zur Vogelfauna von Kamerun.

Zweiter Nachtrag.

Von

Dr. **Ant. Reichenow.**

Seit Erscheinen des ersten Nachtrags zu meiner Übersicht der aus dem Kamerungebiet bisher bekannt gewordenen Vogelarten in dieser Zeitschrift Jahrg. 1891 S. 177—195 ist die ornithologische Erforschung des Schutzgebietes wieder um wesentliches gefördert worden. In erster Linie sind die mehrjährigen Forschungen des Herrn Yngve Sjöstedt zu erwähnen, über welche mehrere vorläufige Berichte, die Beschreibungen neuer Arten sowie eine Übersicht der für das Gebiet neu nachgewiesenen Species enthaltend, in den „Ornithologischen Monatsberichten" (1. Jahrg. 1893 S. 28, 42, 65 84, 101, 138 und 139) und in dem „Journal f. Ornithologie" 1892 S. 313 veröffentlicht worden sind, und eine ausführliche Arbeit demnächst zu erwarten steht. Durch Sjöstedt's Entdeckungen ist die Anzahl der aus Kamerun bekannten Arten um 68, darunter 10 neue, im ganzen auf etwa 290 erhöht worden.

Inzwischen sind durch die Herrn Dr. Preuſs und Zenker weitere Sammlungen veranstaltet worden. Von dem erstgenannten Reisenden, dessen verdienstvolle Forschungen im Kamerungebirge dem vorerwähnten „ersten Nachtrage" zu Grunde lagen, ist eine teils aus Buea, teils aus dem am Fusse des Gebirges gelegenen Ort Victoria stammende Collection heimgebracht worden, während Herr G. Zenker auf der weit ins Innere vorgeschobenen, zwischen den Flüssen Njong und Sannaga auf dem 30° östl. L. (Gr.) gelegenen Jaunde-Station gesammelt hat. Wenngleich diese beiden Collectionen nur klein sind, so haben dieselben doch wiederum 29 für das Gebiet neue, darunter 8 überhaupt bisher noch nicht bekannte Arten geliefert. Die neuen Species sind bereits im „Journal für Ornithologie" 1892 S. 441 und 442 und in den „Ornithologischen Monatsberichten" S. 177, 178 und 205 beschrieben.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mit der Jaunde-Station ist ein neuer Fundort erschlossen worden, auf dessen besondere Wichtigkeit ich in meiner ersten Arbeit (J. O. 1890 S. 104) hingewiesen hatte. Die damals bezüglich der Grenze des west- und ostafrikanischen Faunengebiets ausgesprochenen Vermutungen haben insofern durch die von der Jaunde-Station vorliegende Sammlung keine Bestätigung gefunden, als sämtliche daselbst beobachteten Arten dem westlichen Faunengebiet angehören, und noch keine typische östliche Form dort nachgewiesen worden ist. Der Anfang des östlichen Steppengebiets wird also noch weiter in nordöstlicher Richtung im südlichen Adamaua etwa zwischen dem 7. und 8. Breitengrad zu suchen sein.

Es sei noch bemerkt, dafs einige der nachstehend für Jaunde aufgeführten Arten auf Bestimmungen nach Abbildungen sich gründen, welche letzteren von Herrn Zenker eingesandt und so naturgetreu ausgeführt sind, dafs nicht der geringste Zweifel bezüglich der Bestimmung obwalten kann. Alle diejenigen Arten, welche in der ersten Übersicht und dem Nachtrage noch nicht erwähnt waren, sind mit einem * bezeichnet.

Scolopacidae.

1. *Totanus ochropus* (L.)
   Sjöstedt, O. M. 1893 p. 101.
   Von Zenker bei der Jaunde-Station gesammelt.
2. *Totanus hypoleucus* (L.).
   Rchw. J. O. 1890, p. 107.
   Victoria 6. V. (Preufs). L. t. 175, a. c. dist. 30 mm.

Rallidae.

* 3. *Rallus oculeus* (Hartl.) [Tem. Ms.]
   Victoria 28. IV. (Preufs). L. t. 270, a. c. dist. 10 mm; Iris gelbrot; Oberschnabel grauschwarz, am Grunde grün; Unterschnabel grün, an der Spitze grau; Füfse braungrau. Die Art ist hiermit zum ersten Male für die Kamerungegend nachgewiesen.

Ardeidae.

4. *Butorides atricapillus* (Afzel.)
   Rchw. J. O. 1890 p. 108.
   Juv. Victoria 9. V. (Preufs). L. t. 440, a. c. dist. 10 mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

5. *Herodias gularis* (Bosc.)
Rchw. J. O. 1890 p. 108.
Victoria 9. V. (Preufs). L. t. 440, a. c. dist. 10 mm.

Columbidae.

6. *Tympanistria tympanistria* (Tem.)
Peristera tympanistria Rchw. J. O. 1890 p. 109. — *Tympanistria tympanistria* Rchw. J. O. 1892 p. 179.
Jaunde (Zenker). — Einh. Name: Otuh. Lebt in der Steppe, im lichten Walde und in der Nähe von Ansiedlungen.

Falconidae.

7. *Lophoaëtus occipitalis* (Daud.)
Rchw. J. O. 1890 p. 110.
Jaunde (Zenker).
8. *Arturinula monogrammica* (Tem.)
Rchw. J. O. 1890 p. 110.
Victoria 27. IV. (Preufs). L. t. 345, a. c. dist. 60 mm.
9. *Falco cuvieri* A. Sm.
Victoria 9. V. (Preufs). L. t. 280, a. c. dist. 0. — Iris dunkelbraun; Schnabel bleifarben; Wachshaut und Augenlider sowie die Füfse gelb.

Strigidae.

10. *Strix flammea* L.
Sjöstedt O. M. 1893 p. 101.
Victoria 3. III. (Preufs). L. t. 330, a. c. dist. — 40 mm.

Psittacidae.

* 11. *Agapornis pullaria* (L.)
Jaunde-Station (Zenker).

Musophagidae.

12. *Corythaeola cristata* (Vieill.)
Rchw. J. O. 1890 p. 111.
Victoria 22. IV. (Preufs). L. t. 715, a. c. dist. 25 mm.
13. *Turacus persa* (L.)
Corythaix persa Rchw. J. O. 1890 p. 111.
Victoria 26. IV., 5. V., 27. X. (Preufs). L. t. 400—440, a. c. dist. 125—155 mm. Schnabel dunkel rotbraun, an der

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Spitze gelblich; Augenlider karminrot. -- Jaunde-Station (Zenker). Einh. Name: Owók.

Cuculidae.

14. *Centropus monachus* Rüpp.
Rchw. J. O. 1890 p. 111.
Victoria 28. IV., Buea 14. X. (Preufs). L. t. 435, a. c. dist. 140 mm. Iris karmin; Füfse grau. Im Magen Käfer und andere Insekten.

15. *Centropus francisci* Bp.
Rchw. J. O. 1890 p. 111.
Victoria 26. u. 29. IV. (Preufs). L. t. 465, a. c. dist. 185 Num. Iris karmin.

16. *Ceuthmochares aeneus* (Vieill.)
Rchw. J. O. 1890 p. 111.
Victoria 28. IV. (Preufs). L. t. 325, a. c. dist. 140 mm. — Jaunde (Zenker). Einh. Name: Kuningé mendút. Lebt von Früchten im Urwald.

* 17. *Cuculus canorus* L.
Jaunde (Zenker).

18. *Chrysococcyx cupreus* (Bodd.)
Rchw. J. O. 1890 p. 111, 1892 p. 180.
Jaunde (Zenker). Iris ockergelb. Im Magen Insekten.

19. *Chrysococcyx klaasi* (Steph.)
Rchw. J. O. 1890 p. 112, 1892 p. 181.
Jaunde (Zenker). Iris dunkel ockergelb, Füsse grau.

Indicatoridae.

* 20. *Iynx pulchricollis* Hartl.
Jaunde (Zenker). Iris ockergelb.

Trogontidae.

21. *Hapaloderma vittatum* Shell.
Rchw. J. O. 1892 p. 181.
Buea 1200 m. Höhe 5. IX. (Preufs). L. t. 270, a. c. dist. 110 mm. Hinter dem Auge ein kahler gelber Fleck; Iris rotbraun; Schnabel gelb; Füfse bräunlich gelb.

Capitonidae.

22. *Barbatula duchaillui* Cass.
Xylobucco duchaillui Rchw. J. O. 1890 p. 112.
Jaunde (Zenker).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

23. *Barbatula scolopacea* (Bp.)
Xylobucco scolopaceus Rchw. J. O. 1890 p. 112.
Jaunde (Zenker).
24. *Barbatula coryphaea* Rchw.
Rchw. J. O. 1892 p. 181.
Buea 30. VIII. (Preufs). L. t. 100, a. c. dist. 19 mm.
25. *Gymnobucco calvus* (Lafr.)
Rchw. J. O. 1890 p. 112, 1892 p. 182.
Buea 950 m. Höhe, 5. VII. (Preufs). L. t. 175, a. c. dist. 45 mm. Iris dunkel braun.
26. *Gymnobucco bonapartei* Verr.
Rchw. J. O. 1890 p. 113.
Jaunde (Zenker).
* 27. *Pogonorhynchus vieilloti* (Leach)
Jaunde (Zenker).
28. *Pogonorhynchus bidentatus* (Shaw)
Rchw. J. O. 1890 p. 113, 1892 p. 182.
Jaunde (Zenker). Einh. Name: Ekuqui. Lebt von Früchten.
29. *Trachyphonus purpuratus* Verr.
Rchw. J. O. 1890 p. 113, 1892 p. 182.
Buea 1. VIII, 950 m. Höhe, Victoria 29. IV. (Preufs). L. t. 230, a. c. dist. 85 mm. Füfse dunkelgrau. — Jaunde (Zenker).

Picidae.

* 30. *Campothera caroli* (Malh.)
Jaunde (Zenker).

Bucerotidae.

31. *Ceratogymna atrata* (Tem.)
Rchw. J. O. 1890 p. 114.
Jaunde (Zenker).
32 *Berenicornis albocristatus* (Cass.)
Rchw. J. O. 1890 p. 114.
Victoria 4. V. (Preufs). L. t. 800, a. c. dist. 440 mm. Iris hell gelblichweifs; Füsse graublau; Schnabel schwarz. — Jaunde (Zenker). Einheim. Name: Bubondo. Lebt im Urwald von Insekten etc.
33. *Buceros albotibialis* Cab. Rchw.
Rchw. J. O. 1890 p. 114.
Jaunde (Zenker).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

34. *Lophoceros fasciatus* (Shaw)
Rchw. J. O. 1890 p. 114.
Jaunde (Zenker).

35. *Lophoceros camurus* (Cass.)
Rchw. J. O. 1890 p. 116.
Victoria 9. V. (Preufs). L. t. 350, a. c. dist. 130 mm.

Alcedinidae.

* 36. *Halcyon forbesi* Sharpe
Kamerungebirge 30. XI. (Crossley). — Buea (Preufs).

37. *Halcyon senegalensis* (L.)
Rchw. J. O. 1890 p. 116.
Jaunde (Zenker). Einheim. Name: Oquwé.

* 38. *Halcyon badius* Verr.
Jaunde (Zenker). Einheim. Name: Oquwé. Lebt am Wasser von kleinen Fischen und Krabben.

39. *Ispidina picta* (Bodd.)
Alcedo picta Rchw. J. O. 1890 p. 116.
Jaunde (Zenker).

40. *Alcedo guentheri* Sharpe
Alcedo quadribrachys Rchw. J. O. 1890 p. 116.
Victoria 7. und 30. V. (Preufs). L. t. 170, a. c. dist. 24 mm. Füfse orangerot.

41. *Ceryle sharpei* (Gould)
Sjöstedt O. M. 1893 p. 102.
Wuri (Rchw.) — Victoria 6. V. (Preufs). L. t. 430, a. c. dist. 70 mm. Iris dunkelgrau, Füfse blaugrau.

Coraciidae.

42. *Eurystomus afer* (Lath.)
Rshw. J. O. 1890 p. 117.
Jaunde (Zenker).

43. *Eurystomus gularis* Vieill.
Rchw. J. O. 1890 p. 117.
Jaunde (Zenker). Verfolgt Raubvögel.

Hirundinidae.

44. *Hirundo rustica* L.
Rchw. J. O. 1890 p. 117.
Jaunde (Zenker).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

* 45. *Psalidoprocne chalybea* Rchw.
Rchw. J. O. 1892 p. 442.
Da die Originaldiagnose durch Druckfehler entstellt ist, so wiederhole ich dieselbe hier nochmals:
P. obscurae simillima, sed nitore chalybeo-olivascente. Nigra, nitore viridi-chalybeo, dorso olivascente-viridi splendente, gastraeo obscuriore; subalaribus obscure cinerascente-brunneis; cauda furcata. L. t. 160, a. im. 98, c. 95, r. 4—5, t. 9 mm. Victoria 25. IV. (Preufs).

Muscicapidae.

* 46. *Cassinia finschi* Sharpe
Jaunde (Zenker).

47. *Megabias flammulatus* (Verr.)
Sjöstedt O. M. I. 1893 p. 102.
Victoria 30. IV. (Preufs). ♀: L. t. 168, a. c. dist. 35 mm. Iris dunkelbraun.

Campophagidae.

48. *Graucalus preussi* Rchw.
Rchw. J. O. 1892 p. 183.
jun.: Victoria 14. V. (Preufs). — Dieses junge Individuum ist im allgemeinen wie das alte Weibchen gefärbt, aber auf dem Oberkopfe, dem Rücken und dem Unterkörper stehen noch vereinzelte weifs und schwarz gebänderte Federn; auch die Unterschwanzdecken sind weifs mit schwarzen Querbinden, die grofsen Armdecken wie die letzten Armschwingen haben weifsen Endsaum.

Laniidae.

49. *Dryoscopus affinis* (Gray)
Dryoscopus verreauxi Rchw. J. O. 1890 p. 119.
Jaunde (Zenker). Iris orangegelb. Lebt von Raupen und Insekten.

* 50. *Dryoscopus major* (Hartl.)
Jaunde (Zenker).

51. *Dryoscopus lühderi* Rchw.
Rchw. J. O. 1890 p. 119.
Jaunde (Zenker). In der Savanne und im lichten Walde.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

52. *Laniarius hypopyrrhus* (Verr.)
Rchw. J. O. 1890 p. 120 u. 1892 p. 183.
Jaunde (Zenker).

* 53. *Laniarius perspicillatus* n. sp. an var.
Inter *Laniarium poliocephalum* et *monteiri* intercedens; a *L. poliocephalo* rostro crassiore, fascia superciliari et stria tenui suboculari albis, a *L. monteiri* macula collari postauriculari alba absente distinguendus.
♀: L. t. 265, a. c. dist. 75, a. im. 115, c. 115, r. 30, t. 35 mm. Buea, 1000 m. H., 14. X. (Preufs). Iris hellgrau, Füfse bleigrau, Schnabel schwarz.

Es bleibt festzustellen, ob hier eine konstant unterschiedene, vielleicht nur dem Kamerungebirge angehörende Art oder nur eine, freilich auffallende, individuelle Abweichung vorliegt. Bei letzterer Annahme würde auch *L. monteiri* nur als Varietät angesehen werden müssen, welche in Angola ebenfalls zusammen mit *L. poliocephalus* gefunden ist. Jedenfalls dürfte es zweckmäfsig sein, vorläufig durch einen besonderen Namen auf die eigentümliche Form aufmerksam zu machen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dafs *Laniarius approximans* (Cab.) [*Archolestes approximans* Cab. v. d. Deck. R. III. 1869, 27 Bem.] mit Unrecht häufig mit *L. poliocephalus* (Lcht.) zusammengezogen wird. Letzterer bewohnt den Westen und Nordosten, ersterer gehört dem Süden und Osten an und unterscheidet sich von *L. poliocephalus* durch mehr oder minder goldbraun verwaschenen Kropf und Brust; bei der westlichen Art ist immer die ganze Unterseite gleichmäfsig citronengelb.

54. *Laniarius gladiator* Rchw.
Rchw. J. O. 1892 p. 441.
Buea, 1000—1500 m., 22. X. (Preufs). L. 270, a. c. dist. 85 mm. Iris hellgrau; Schnabel schwarz; Füfse hell bläulich. Der Ruf ist ein langgezogener dumpfer Pfiff.

55. *Nicator chloris* (Val.)
Rchw. J. O. 1890 p. 120.
Victoria 5. V. (Preufs). L. t. 200 mm. Iris dunkelbraun, Füfse blaugrau.

56. *Lanius mackinnoni* Sharpe
Rchw. J. O. 1892 p. 184.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Buea 3. VII. (Preufs). Auge dunkelbraun. — Jaunde (Zenker). Einheim. Name: Insolleba. In der Savanne, im lichten Walde, in Plantagen und in der Nähe der Dörfer. Lebt von Insekten.

Dicruridae.

57. *Dicrurus coracinus* Verr.
Rchw. J. O. 1890 p. 120.
Victoria, 25. u. 29. IV. (Preufs). ♀: L. t. 220, a. c. dist. 45 mm. Iris rotbraun. — Jaunde (Zenker).

58. *Dicrurus atripennis* Sw.
Rchw. J. O. 1890 p. 120.
Victoria 21. IV. (Preufs).

Oriolidae.

59. *Oriolus nigripennis* Verr.
Rchw. J. O. 1892 p. 184.
Buea, 1050 m. Höhe, 14. X. (Preufs). Iris karminrot, Schnabel hell purpurbraun, Füfse dunkelgrau.

Sturnidae.

60. *Onychognathus hartlaubi* Gray
Amydrus hartlaubi Rchw. J. O. 1890 p. 120.
Victoria 27. IV. (Preufs). L. t. 300, a. c. dist. 100 mm. Iris hell karminrot.

61. *Lamprocolius glaucovirens* Ell.
Lamprocolius splendidus Rchw. J. O. 1890 p. 120.
Victoria 30. IV., Buea 3. XI., in 950 m. Höhe (Preufs). ♀: L. t. 300, a. c. dist. 70 mm. Iris gelblich weifs.

Ploceidae.

* 62. *Malimbus erythrogaster* Rchw.
Rchw. O. M. 1893 p. 205.
Jaunde (Zenker).

63. *Malimbus scutatus* (Cass.)
Rchw. J. O. 1890 p. 121.
Victoria 27. u. 29. IV. (Preufs). ♂: L. t. 165, a. c. dist. 25; ♀: L. t. 155, a. c. dist. 30 mm.

Bereits in meinem Reisebericht (J. O. 1874 p. 38) hatte ich darauf aufmerksam gemacht, dafs bei den von mir in Kamerun gesammelten weiblichen Individuen von

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Malimbus scutatus das rote Brustschild durch eine schwarze Mittellinie geteilt war. Auch die von Dr. Preufs gesammelten Exemplare zeigen diese Färbungseigentümlichkeit und Dr. Sharpe erwähnt (Cat. Br. Mus. XIII. p. 482) Gleiches von einem von Crofsley in Kamerun gesammelten Stück. Dahingegen haben alle mir zu Gesicht gekommenen und von anderen erwähnten Stücke von Ober-Guinea (vergl. auch Büttikofer, Notes Leyden Mus. XIV. 1892 p. 28) ein ungeteiltes Brustschild. Jugendzustand kann nicht vorliegen, wie Büttikofer (l. c.) anzunehmen geneigt ist, denn die im Berliner Museum befindlichen Exemplare sind sämtlich alte Individuen, die von mir gesammelten zur Brutzeit an den mit Eiern belegten Nestern geschossen. Ich gewinne immer mehr die Überzeugung, dafs hier, wie auch Sharpe vermutet, eine konstant abweichende Form vorliegt, und glaube auch bezüglich der Färbung der Männchen eine Abweichung darin zu finden, dafs das Schwarz der Kopfseiten und der Kehle bei den Kamerunvögeln mehr ausgedehnt ist und auch das Rot des Oberkopfes sich weiter auf den Nacken hin ausbreitet als bei Stücken von der Goldküste. Die Kamerunform möchte danach passend als *M. scutopartitus* zu unterscheiden sein.

64. *Malimbus nitens* (Gray)
Rchw. J. O. 1890 p. 121.
Victoria 19. IV. (Preufs). L. t. 170, a. c. dist. 30 mm. Schnabel bläulich, Auge rotbraun, Füfse dunkel graublau.

65. *Symplectes tephronotus* Rchw.
Rchw. J. O. 1892, 184.
Buea, 1100—1300 m. Höhe, 9. u. 15. IX. (Preufs). L. t. 150—160, a. c. dist. 35 mm. Iris rotbraun, Schnabel bläulich, Füfse hellbraun. Bei einem Exemplar, welches von den typischen Stücken auch durch schwächeren Schnabel abweicht, sind die Oberschwanzdecken nicht rotbräunlich, sondern grau wie der Rücken und nur sehr schwach olivengrünlich verwaschen.

* 66. *Symplectes preussi* Rchw.
Rchw. J. O. 1892 p. 442.
Victoria (Preufs).

* 67. *Symplectes dorsomaculatus* Rchw.
Rchw. O. M. I. 1893 p. 177.
Jaunde (Zenker).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

68. *Symplectes brachypterus* (Sw.)
Rchw. J. O. 1890 p. 122, 1892 p. 185.
Buea 26. IX. (Preufs). L. t. 140 mm. Iris rotbraun, Schnabel schwarz, Füfse dunkelgrau. Im Magen Käferreste. — Jaunde (Zenker).

69. *Symplectes nigricollis* (Vieill.)
Rchw. J. O. 1890 p. 122.
Jaunde (Zenker). Iris ockergelb, Schnabel und Füfse bleigrau. Einheim. Name: Insomo.

70. *Ploceus nigerrimus* Vieill.
Rchw. J. O. 1890 p. 121, 1892 p. 186.
Buea 20. IX. und 10. X. (Preufs). L. t. ♀ 160, ♂ 168; a. c. dist. ♀ 35, ♂ 40 mm. Auge gelb, Füfse bräunlich grau. — Jaunde (Zenker). Einheim. Name: Incass.

71. *Spermospiza guttata* (Vieill.)
Rchw. J. O. 1890 p. 123.
Jaunde (Zenker). Iris dunkel karmin.

* 72. *Nigrita canicapilla* (Strickl.)
Buea, 950 m. Höhe, 6. IX. u. 13. IX. (Preufs). L. t. 135. a. c. dist. 32 mm. Iris orange, Füfse graubraun.

73. *Nigrita luteifrons* Verr.
Rchw. J. O. 1890 p. 123, 1892 p. 187.
♂: Buea, 950 m., 28. VI. (Preufs). L. t. 115, a. c. dist. 25 mm. Iris rotbraun.

74. *Nigrita lucieni* Sharpe Bouv.
Rchw. J. O. 1892 p. 187.
♀: Buea 6. IX. (Preufs). L. t. 110, a. c. dist. 23 mm. Iris fleischrot, Füfse rötlich grau.
Es scheint sich zu bestätigen, dafs diese Form das Weibchen von *N. luteifrons* ist.

* 75. *Nigrita fusconota* Fras.
Buea 22. IX. (Preufs). L. t. 113, a. c. dist. 34 mm. Iris braun, Schnabel schwarz, Füfse grau.

76. *Cryptospiza reichenowi* (Hartl.)
Rchw. J. O. 1890 p. 123, 1892 p. 187.
Buea, 1000 m. Höhe, 22. X. (Preufs). L. t. 112, a. c. dist. 30 mm. Auge braun, Füfse braungrau, Schnabel schwarz.

* 77. *Pytelia monteiri* Hartl.
Jaunde (Zenker). In der Savanne und im lichten Walde.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

78. *Estrilda tenerrima* (Rchw.)
Rchw. J. O. 1892 p. 188.
Buea 21. X. (Preufs). L. t. 105, a. c. dist. 30 mm. Auge dunkelbraun, Oberschnabel karmin, Firstenstrich, Ränder am Grunde und Unterschnabel schwarz, letzterer am Grunde karmin, Füfse schwarz. — Jaunde (Zenker).

79. *Estrilda melpoda* (Vieill.)
Estrelda melpoda Rchw. J. O. 1890 p. 124.
Jaunde (Zenker).

80. *Spermestes poensis* (Fras.)
Rchw. J. O. 1890 p. 124, 1892 p. 187.
Jaunde (Zenker).

* 81. *Pyromelana flammiceps* Sw.
Jaunde (Zenker). Einheim. Name: Kopisong. Lebt von Grassamen und Insekten.

82. *Urobrachya phoenicomera* (Gray)
Coliopasser xanthomelas Rchw. J. O. 1890 p. 122. — *Urobrachya phoenicomera* Rchw. J. O. 1892 p. 186.
Buea, 2100—2300 m. Höhe, 8.—14. X. (Preufs). ♂: L. t. 135—142, a. c. dist. 22—30 mm. Iris braun; Schnabel hell rötlichgrau oder Oberschnabel schwärzlich und Unterschnabel hell rötlich violet; Füfse bräunlich grau.

83. *Urobrachya macrura* (Gm.)
Coliopasser macrurus Rchw. J. O. 1890 p. 123.
Jaunde (Zenker).

Fringillidae.

84. *Hyphantospiza olivacea* (Fras.)
Pyrrhospiza olivacea Rchw. J. O. 1890 p. 124. — *Hyphantospiza olivacea* Rchw. J. O. 1892 p. 188.
Buea 2. VIII., 8. X. (Preufs). ♂: L. t. 137, a. c. dist. 27 mm.

Motacillidae.

* 85. *Motacilla longicauda* Rüpp.
Victoria 29. V. (Preufs). L. t. 175, a. c. dist. 62 mm. Auge dunkel sepiabraun, Füfse bläulichbraun.

Pycnonotidae.

86. *Pycnonotus gabonensis* Sharpe
Rchw. J. O. 1890 p. 125, 1892 188.
Jaunde (Zenker). Einkeim. Name: Kollokollo.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

87. *Criniger chloronotus* (Cass.)
Rchw. J. O. 1890 p. 125.
Victoria 2. V. (Preufs). L. t. 210, a. c. dist. 50 mm.
88. *Xenocichla syndactyla* (Sw.)
Sjöstedt O. M. 1. 1893. p. 102.
Jaunde (Zenker).
89. *Andropadus virens* (Cass.)
Rchw. J. O. 1890 p. 125, 1892 p. 188.
Buea 23. X. (Preufs). ♀: L. t. 155, a. c. dist. 50 mm. Iris braun, Füfse rötlichgrau. — Jaunde (Zenker).

Meliphagidae.

90. *Zosterops stenocricota* Rchw.
Rchw. J. O. 1892 p. 191.
Buea 30. VIII und 4. IX. (Preufs). L. t. 100—105.

Nectariniidae.

91. *Cinnyris verticalis* (Lath.)
Rchw. J. O. 1890 p. 126, 1892 p. 190.
Jaunde (Zenker) Iris karmin.
92. *Cinnyris oritis* Rchw.
Rchw. J. O. 1892 p. 190.
Buea 21. VI. und 14. X. (Preufs). L. t. 115—120, a. c. dist. 20 mm.
93. *Cinnyris cuprea* (Shaw)
Rchw. J. O. 1890 p. 126.
Jaunde (Zenker).
94. *Cinnyris superba* (Shaw)
Rchw. J. O. 1890 p. 126, 1892 p. 190.
Victoria 28. IV., 12. V., Buea 18. II. (Preufs). ♂: L. t. 147—160, a. c. dist. 22—26 mm; ♀: L. t. 132, a. c. dist. 20 mm. — Jaunde (Zenker). Einheim. Name: Intschitschoko.
95. *Cinnyris preussi* Rchw.
Rchw. J. O. 1892 p. 190.
Buea 8. und 23. X. (Preufs). ♂: L. t. 120. a. c. dist. 23; ♀: L. t. 105, a. c. dist. 15 mm.
96. *Anthothreptes hypodila* (Jard.)
Rchw. J. O. 1890 p. 126, 1892 p. 191.
Jaunde (Zenker).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

97. *Anthothreptes gabonica* (Hartl.)
Stiphrornis alboterminata Rchw. J. O. 1890 p. 127.
Victoria 30. V. (Preufs). L. t. 105, a. c. dist. 18 mm.

Paridae.

* 98. *Anthoscopus flavifrons* ?

Herr Zenker hat ein bei der Jaunde-Station gesammeltes Nest einer Anthoscopus-Art eingesandt. Vermutlich gehört dasselbe dem *A. flavifrons* an, welcher am Gabun heimisch ist und auch über das Kamerungebiet seine Verbreitung ausdehnen dürfte.

Timeliidae.

* 99. *Turdinus rufiventris* Rchw.
Rchw. O. M. I. 1893 p. 177.
Jaunde (Zenker).

Die Art dürfte als der südliche Vertreter von *T. moloneyanus* Sharpe (P. Z. S. 1892 p. 228) anzusehen sein, von welchem letzteren sie durch dunkleren Ton der Oberseite, weisse Kehle und intensiver rotbraun gefärbte übrige Unterseite sich unterscheidet. Ich gebe nachstehend eine vollständige Diagnose, da die Original-Publikation nur eine Differential-Beschreibung enthält:

Pileo fusco; cervice, dorso alis et cauda brunneis, paullum in castaneum vergentibus, uropygio et supracaudalibus magis rufescentibus; capitis lateribus canis; gula alba; abdomine reliquo rufescente brunneo, medio albido, crisso et subcaudalibus magis rufescentibus; subalaribus et remigum marginibus interioribus rufescente-isabellinis. L. t. c. 170; a. im. 78—79; c. 70; r. 19; t. 24 mm.

100. *Turdinus fulvescens* (Cass.)
Turdirostris fulvescens Rchw. J. O. 1890 p. 128.
Jaunde (Zenker). Iris ockergelb. Im Magen Insekten.

101. *Alethe hypoleuca* (Rchw.)
Callene hypoleuca Rchw. J. O. 1892 p. 194; Abbildung T. 2.

Den unter dem Namen Callene hypoleuca beschriebenen und abgebildeten Vogel glaube ich jetzt mit Sicherheit auf eine Alethe-Art beziehen zu dürfen. Der ausgefärbte Vogel wird der Alethe poliocephala (Hartl.), Trichophorus poliocephalus Hartl. [Tem. Ms.] Syst. Orn. W. Afr. 1857 p. 85,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

sehr ähnlich sein, u. a. aber durch heller rotbraun gefärbten Oberkörper sich unterscheiden; auch das Grau des Kopfes scheint heller zu sein.

102. *Prinia mystacea* Rüpp.
Jaunde (Zenker).

103. *Burnesia bairdi* (Cass.)
Calamonastes bairdi Rchw. J. O. 1892 p. 193.
Buea (Preufs). — (In Folge eines lapsus calami ist diese Art im Journ. f. O. 1892 p. 193 als *Calamonastes bairdi* aufgeführt.)

* 104. *Burnesia taeniolata* Rchw.
Rchw. O. M. I. 1893 p. 178.
Jaunde (Zenker). Einheim. Name: Idsak.

* 105. *Burnesia reichenowi* Hartl.
Jaunde (Zenker). Einheim. Name: Otok. Lebt in der Savanne von Insekten. — Die vorliegenden Exemplare stimmen in allen Eigenschaften mit der vorstehenden Art überein, nicht mit der Kongoform *leucopogon*.

* 106. *Camaroptera tincta* (Cass.)
Jaunde (Zenker).

* 107. *Hylia prasina* (Cass.)
Jaunde (Zenker).

* 108. *Calamocichla plebeja* Rchw.
Rchw. O. M. I. 1893 p. 178.
Jaunde (Zenker).

109. *Cossypha cyanocampter* (Bp.)
Rchw. J. O. 1892 p. 193.
Jaunde (Zenker).

Sylviidae.

110. *Turdus nigrilorum* Rchw.
Rchw. J. O. 1892 p. 194.
Buea 1. VII., juv. 23. X. (Preufs). L. t. 210 mm.

111. *Pratincola axillaris* Shell.
Pratincola pallidigula Rchw. J. O. 1892 p. 194. — *Pratincola axillaris* Sjöstedt O. M. I. 1893 p. 140.

Wie Herr Sjöstedt überzeugend nachgewiesen hat, ist *P. pallidigula* das Weibchen von *P. axillaris*, die Art mufs sonach unter dem letzteren, älteren, Namen geführt werden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Journal für Ornithologie

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: 42_1894

Autor(en)/Author(s): Reichenow Anton

Artikel/Article: Zur Vogelfauna von Kamerun. 29-43