

Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.

Von

Baron Dr. J. W. v. Müller.

(Schluss von Jahrg. III, S. 449—464.)

743. *Plocepasser melanorhynchus* Rüpp.

Ploc. mahali var. Sm. Ill. South. Afr. Zool. Av. t. 65. — Bonap. Consp. p. 444. — *Philagrus superciliosus* Cab.

Abyssinien.

744. *Nigrita canicapilla* Strickl.

Aethiops canicapillus Proc. Zool. Soc. 1841. p. 30. — Fras. Zool. typ. IX. t. 2. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 420. — Bonap. Consp. 444. — Hartl. Synops. sp. 309.

Fernando Po, Gaboon.

745. *Nigrita fusconota* Fras.

Proc. Zool. Soc. 1842. p. 145. — Allen Exp. Nig. II. p. 501. — Fras. Zool. typ. VIII. pl. 2. — Bp. Consp. p. 444. — Hartl. Synops. W. Afr. sp. 310.

Fernando Po.

746. ? *Nigrita Arnaudi* Puch.

Bonap. Consp. p. 444.

Vom weissen Nil.

747. *Nigrita bicolor* Sclat.

Pytelia bicolor Hartl. Verz. d. Brem. Samml. p. 76. — Sclat. in Jard. Contrib. 1852. p. 2 et 4. — Hartl. Synops. sp. 311.

748. *Nigrita luteifrons* Verr.

Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 420. — Hartl. Synops. sp. 312. Gaboon.

749. *Sporopipes frontalis* Cab.

Fring. frontalis Vieill. Encyclop. p. 990. — Vieill. Ois. chant. t. 16. — Bonap. Consp. p. 444. — Hartl. Synops. sp. 313.

In Abyssinien u. Sennaar, häufig in Kordofan u. Darfur. Am Senegal.

750. *Sporopipes lepidopterus* Cab.

Fring. lepidoptera Licht. — *Amadina squamifrons* Smith. — *Estrelida squamifrons* Gr. — *Ploc. lepidopterus* Gr. — Sm. Illust. S. Afr. Zool. Av. t. 95. f. . . — Bonap. Consp. p. 444.

Süd-Afrika.

751. *Philetaerus socius* Strickl.

Loxia socia Lath. — *Ploc. Patersoni* Less. — *Euplectes lepidus* Sws. — *Philet. lepidus* Sm. — Paters. Voy. t. 19. — Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 8. m.

Süd-Afrika.

752. *Quelea* (Reichb.) *sanguinirostris* (Lin.)

Loxia sanguinirostris Lin. — *Ember. quelea* L. — *Passer senegalensis erythrorhynchos* Briss. — *Fring. quelea* Licht. — *Loxia Lathamii* Sm. — Pl. enl. 223. 1. (?) — Edw. Birds t. 271. 2. — *Ember. quelea* Lin. S. N. X. p. 177. — Bp. Consp. p. 445.

In Abyssinien zuweilen in Schaaren von mehreren Tausenden. In Sennaar; in Kordofan ziemlich selten. Ob der südafrikanische Vogel hierher oder zur folgenden Species gehört, ist mir unbekannt.

753. *Quelea occidentalis* Hartl.

Vieill. Ois. chant. t. 22—24. — *Passer senegal. erythrorhynch.* Briss. Orn. III t. 6. fig. 1. — Pl. enl. 183. 2. — Sws. Birds W. Afr. I. p. 188. — Sundev. Oefvers. 1850. p. 126. — Hartl. Synops. sp. 314.

In Senegambien.

(Nach den Vögeln aus West- und Ost-Afrika zu urtheilen, welche ich zu sehen Gelegenheit hatte, scheint diess eine selbstständige Species zu sein.)

454. *Foudia* (Reichenb.) *madagascariensis* (L.)

Euplectes rubra Sws. — *Cardinalis madagascariensis* Briss. — *Ploc. madagascariensis et ruber* Gr. — Pl. enl. 134. 2. — Vieill. Ois. chant. t. 63.

St. Maurice und Madagascar.

755. *Foudia Martineti* Gr.

Fringilla erythrocephala Gm. — *Emberiza rubra* Gm. — *Ploc. erythrocephalus* Sws. — *Hyphantornis erythrocephala* Blyth. — Pl. enl. 665. 1 et 2. — Brown Ill. Zool. t. 28. 2. — Vieill. Ois. chant. t. 28.

St. Maurice.

Der Speciesname *erythrocephalus* würde leicht Veranlassung zur Verwechslung mit *Ploc. erythrocephalus* Rüpp. geben, wesshalb der von Gray gegebene Name *Martineti* dieser Species füglich bleiben kann.

756. *Foudia erythrops* Hartl.

Ploceus erythrops Hartl. Rev. Zool. 1848. p. 109. — Bonap. Consp. p. 446. — Hartl. Beitr. zur Orn. W.A. t. 8 — Id. Syn. sp. 315.

Insel St. Thomä.

757. *Foudia emincntissimus* Bonap.

Consp. p. 446.

Nach Bonaparte von Ost-Afrika, Zanzibar.

758. *Euplectes nigriventris* Cass.

Proc. Acad. Philad. 1848. p. 66. — Journ. Acad. Philad. 1849. 1. t. 31. 1. — Bonap. Consp. p. 447.

Zanzibar.

759. *Euplectes ignicolor* Sws. — *Loxia ignicolor* Vieill. — *Fr. ignicolor* Licht. — *Loxia franciscana* Isert. — *Ploc. franciscanus* Gr. — Pl. enl. 134. — Vieill. Ois. chant. t. 59. — Isert Schrift. Berl. naturf. Fr. IX. 332. t. 9. — Ehrenb. Symb. Phys. Av. t. 2. — Licht. Doubl. Cat. p. 24. — Sws. Birds W. Afr. I. p. 104. — Gordon, Jard. Contrib. 1849. p. 9. — Bonap. Consp. p. 446. — Hartl. Synops. sp. 317.

Am häufigsten in Nubien; sonst in Sennaar, Abyssinien, Senegambien u. s. w.

760. *Euplectes oryx* Sm.

Loxia oryx L. — *Fring. carolinensis* Gm. — *Fring. oryx* Licht. — *Cardinalis capitis bonae spei* Briss. — Pl. enl. 6. 2. et 309. 2. et 181. 2. — Vieill. Ois. chant. t. 66. — Sws. Birds W. Afr. I. p. 187. — Bp. Consp. p. 446. — Hartl. Syn. sp. 318.

Süd- und West-Afrika.

761. *Euplectes flammiceps* Sws.

Ploceus flammiceps Gr. — Sws. Birds W. Afr. I. t. 13. — Gordon, Jard. Contrib. 1849. p. 9. — Bonap. Consp. p. 446. — Rüpp. Wirbelth. p. 101. — Hartl. Synops. sp. 346.

Senegal und Abyssinien.

762. ? *Euplectes Sunderalli* Bonap.

Ploc. oryx var. minor Sundev. Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 446. Kafferland.

763. *Euplectes Petiti* O. des Murs.

Lefeb. Voy. Abyss. Atl. Ois. t. 10. — Bonap. Consp. p. 446 Abyssinien.

764. *Euplectes craspedopterus* Schiff.

Bonap. Consp. p. 446.

Abyssinien. (Mir unbekannt.)

765. *Euplectes melanogaster* Sws.

Loxia melanogastra Lath. — *L. afra* Gm. — *Fring. abyssinica* Vieill. — *Fring. ranunculacea* Licht. — Brown Illustr. t. 24. 2. — Lath. Ind. Orn. I. 395. — Vieill. Ois. chant. t. 28. — Id. Encyclop. p. 953. — Licht. Doubl. p. 23. — Sws. Birds W. Afr. I. p. 182. — Bonap. Consp. p. 447. — Hartl. Synops. sp. 319.

Vom Senegal und Niger.

766. *Euplectes xanthomelas* Rüpp.

Verz. N. O. Afr. t. 28. — Bonap. Consp. p. 447.

Abyssinien, Sennaar.

767. *Euplectes approximans* Cab.

Orynx approximans Cab. Mus. Hein. I, p. 177. no. 868.
Süd-Afrika.

768. *Euplectes capensis* Sm.

Loxia capensis L. — *Icterus flavescens* Daud. — *Fring. phalerata* Ill. Licht. — Pl. enl. 101. m. 659. 1. fem. — Bp. Consp. p. 447.
Süd-Afrika.

769. *Euplectes aurinotus* Sws.

Loxia aurea Lath. — *Coccothraustes aurea* Vieill. — Brown Ill. t. 25. 1. — Lath. Ind. Orn. I. 373. — Vieill. Enc. p. 1003.
— Hartl. Synops. sp. 321.
Benguela.

770. *Euplectes taha* Sm.

Ploc. taha Gm. — *Pl. dubius* Sm. — *Pl. melanocephalus* Vieill. — Sm. Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 7. — Bonap. Consp. p. 447.
Süd-Afrika.

771. *Euplectes jonquillaceus* (Vieill.)

Ploc. tricolor Hartl. Mus. Lugd. — Id. Beitr. z. Orn. W. Afr. p. 46. — Vieill. N. Dict. d'hist. nat. 34. p. 130. — Guér. Iconogr. Ois. t. 18. 8. — Hartl. Synops. sp. 320.
Angola.

2. Subfam. VIDUINAE.

772. *Urobrachya* (Bp.) *axillaris* (Sm.)

Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 17. m. — Bonap. Consp. p. 447.
Süd- und Ost?-Afrika.

773. *Urobrachya albonotata* (Cassin.)

Vidua albonotata Cass. Proceed. Acad. Nat. sc. Philad. 1848. p. 66. — Journ. Ac. Nat. sc. Philad. I. t. 30. — Bonap. Consp. p. 448. — Hartl. Synops. sp. 322.
West-Afrika?

774. *Penthetria macroura* Cab.

Loxia macroura Gm. — *Loxia longicauda* Lath. — *Fring. flavoptera* Vieill. — *Fring. chrysoptera* Id. — *Vidua chrysonota* Sws. — Pl. enl. 183. 1. — Lath. Ind. Orn. 373. — Vieill. Ois. chant. t. 41. — Id. Enc. p. 964. — Sws. Birds W. Afr. I. p. 178. — Bonap. Consp. p. 448. — Hartl. Synops. sp. 323.
Ganz West-Afrika.

775. *Penthetria laticauda* Cab.

Fring. laticauda Licht. — *Coliuspasser torquatus* Rüpp. —

Vidua laticauda Gr. — Rüpp. Atl. 36. 2. — Bonap. Consp. p. 448.

Abyssinien, Sennaar, nicht selten am weissen Nil.

776. *Penthetria rubritorques* (Sws.)

Ember. panayensis Gm. — *Ember. signata* Scop. — *Fring. auricollis* Licht. — *Vidua torquata* Less. — *Vidua lenocinia* Id. — *Vidua ardens* Gr. ex Bodd. — *Penthetria ardens* Cab. Mus. Hein. I, p. 177. — Pl. enl. 647. — Sonn. Voy. t. 75. (v. 76?) — Sws. W. Afr. I. p. 174. — Less. Tr. p. 437. — Id. Compl. VIII. 278. — Bonap. Consp. p. 448. — Hartl. Synops. sp. 324.

In Ost-, West- und Süd-Afrika.

777. *Penthetria concolor* (Cass.)

Vidua concolor Cass. — *Coliastruthus concolor* Sundeval Oefvers. V. Ac. Förh. 1849. p. 158. — Cass. Proc. Ac. N. Sc. of Philad. 1848. p. 66 et Journ. 1849. I. t. 30. I. — Bonap. Consp. p. 448. — Hartl. Synops. sp. 325.

Sierra Leone, Port Natal.

778. *Penthetria flaviscapulatus* (Rüpp.)

Coliuspasser macrurus Rüpp. — *Fring. macrocerca* Licht. — *Vidua macroc.* Gr. — *Penth. macrocerca* Cab. — Brown. Ill. t. 11.

Abyssinien, Sennaar, Bacher el abiad.

779. *Chera prognie* Gr.

Loxia caffra Gm. — *Ember. longicauda* Gm. — *Vidua phoenicoptera* Sws. — Pl. enl. 635. — Mill. Icon. t. 111. — Vieill. Ois chant. t. 39. 40.

Süd-Afrika.

780. *Steganura* (Rehb.) *paradisea* Cab.

Emberiza paradisea L. — *Fring. paradisea* Licht. — *Vidua paradisea* Cuv. — *Vidua africana* Briss. — Pl. enl. 194. — Edw. Birds t. 86. — Vieill. Ois. chant. t. 37. 38. — Sws. Birds W. Afr. I. t. 11. — Bp. Consp. p. 449. — Hartl. Syn. sp. 326.

Angola, Sierra Leone, Abyssinien, Sennaar, Kordofan.

781. ? *Steganura sphenura* Cab.

Mus. Hein. I. p. 176. — *Vidua sphenura* Verr. — *Steganura Verreauxi* Bonap. Consp. p. 449.

Soll die ostafrikanische *paradisea* sein.

782. *Vidua* (Cuv.) *regia* (L.)

Emberiza paradisca L. — *Vidua riparia africana* Briss. — *Fring. regia* Licht. — Pl. enl. 8. I. — Vieill. Ois. chant. 34. 35. — Briss. Orn. III. p. 129. — Bonap. Consp. p. 449. — Hartl. Synops. sp. 327.

In Nubien, Sennaar, am weissen Nil. Nach Bonaparte am Senegal?

783. *Vidua superciliosa* (Vieill.)

Gal. Ois. t. 61. — Bonap. Consp. p. 449.

Süd-Afrika.

784. *Vidua serena* (Lin.)

Emberiza serena L. — *Emb. vidua* L. — *Emb. principalis* L. — *Vidua principalis* Cuv. — *Vidua major et minor* Briss. — *Vidua erythrorhynchos* Sws. — Pl. 8. 2. — Vieill. Ois. chant. t. 28. — Sws. Birds W. Afr. I. t. 12. — Hartl. Beitr. z. Orn. W. Afr. p. 46. — Id. Synops. sp. 328. — Bonap. Consp. sp. 449.

Beinahe über das ganze innere Afrika verbreitet; Sennaar, Nubien, Kordofan, Senegambien, etc.

785. *Hypochera* (Bp.) *nitens* (Gm.)

Fring. nitens Gm. — *Fring. ultramarina* Gm. — *Hypoch. ultramarina* Bonap. — *Philetaerus nitens* Strickl. — *Loxi-gilla nitens* Less. — Pl. enl. 291. 1 et 2. — Vieill. Ois. chant. t. 21. — Edw. Birds t. 362. 1. — Strickl. Ann. et Mag. n. s. IX. p. 345. — Sws. W. Afr. I. p. 199. — Bonap. Consp. p. 450. — Hartl. Synops. sp. 329.

In Ost-Afrika vom 20. Grad nördl. Breite an südwärts. Am Senegal häufig.

786. *Hypochera aenea* Hartl.

Hypoch. nitens Bonap. Consp. p. 450. — Hartl. Synops. sp. 330.

Senegambien. Vielleicht in Ost-Afrika an denselben Orten, wie *nitens*.

787. *Hypochera musica* (Vieill.)

Loxia musica Vieill. — *Estrela musica* Gr. — Vieill. Ois. chant. t. 11. — Bonap. Consp. p. 450. — Hartl. Synops. sp. 331.

Anmerk. Hiermit schliesst die umfangreiche Ordnung der *Insessores* Vig. und zugleich für unser Journal, wenigstens voraussichtlich auf längere Zeit, das vorstehende systematische Verzeichniss der Vögel Afrika's, da der durch seine afrikanischen Reisen bekannte Verfasser inzwischen eine neue Reise über Nordamerika nach Westindien und Central-Amerika bereits angetreten hat. Den unermüdlichen Bestrebungen des unternehmenden Reisenden den besten wissenschaftlichen Erfolg wünschend, hoffen wir über die Resultate dieser neuen Reise seiner Zeit in unserem Journale berichten zu können.

Der Herausgeber.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [4 1856](#)

Autor(en)/Author(s): Müller John Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.
113-118](#)