

die Breite verlieren dürfen. Das würde dem deutschen Genius, dem Reklame und Bluff allezeit wesensfremd bleiben sollten, vor anderen wohl anstehen.

Vogelarten des afrikanischen Faunengebiets, die von 1905—1914 neu beschrieben worden sind.

Von Ant. Reichenow.

Seit dem Erscheinen des dritten Bandes meines Werkes „Die Vögel Afrikas“ im Jahre 1905 sind in runder Summe etwa 1000 neue Vogelformen aus Afrika beschrieben worden. Eine übersichtliche Zusammenstellung dieser Neubeschreibungen wird eine willkommene Erleichterung für die fernere ornithologische Erforschung Afrikas und eine nützliche Ergänzung zum vorgenannten Werke sein.

Im Nachstehenden sind die seit 1905 bis zum Beginn des Weltkrieges beschriebenen Arten aus dem gesamten Schrifttum zusammengetragen und durch solche ergänzt worden, die während des Krieges in deutschen und den mir zugegangenen Schriften des neutralen Auslandes veröffentlicht wurden. Auch sind noch einzelne Artnamen hinzugefügt, die man bisher irrtümlich gedeutet hatte. Innerhalb der einzelnen systematisch geordneten Gruppen sind die Namen des bequemeren Auffindens wegen alphabetisch geordnet.

R c h w.

Anatidae.

1. *Anas leucostigma* Rüpp. artlich verschieden von *A. sparsa* [A. Sm.] Eyt.; Reichenow, Journ. Orn. 1912, 319.
2. *Pteronetta hartlaubi albifrons* n. vom oberen Kongo, Ituri und Uelle; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 42.

Charadriidae.

3. *Cursorius gallicus dahlakensis* n. von den Dahlakinseln; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1910, 9.
4. *Cursorius gallicus kordofanensis* n. von Kordofan; O. v. Wettstein, Ak. Wissensch. Wien, Mai 1916.
5. *Glareola antaenia* n. von Mawambi am Ituri; Reichenow, Orn. Mnts. 1908, 191.
6. *Glareola fusca fülleborni* n. von Ostafrika, Manjarasee bis Natal; O. Neumann, Orn. Mnts. 1910, 10.
7. *Hemiparra hybrida* n. von Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mnts. 1909, 42.
8. *Lobivanellus senegallus maior* n. von Nord-Abessinien, Schoa, Gallaländer; O. Neumann, Orn. Mnts. 1914, 8.
9. *Oedicnemus capensis ehrenbergi* n. von den Dahlakinseln; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1910, 9.

10. *Oedicnemus csongor* n. von Schirati am Victoria Niansa; J. v. Madarász, Arch. Zool. 1909, 11. — Nicht verschieden von *Oe. capensis* nach Reichenow, Wiss. Erg. D. Zentral-Afr.-Exped. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 245.
11. *Rhinoptilus chalcopterus obscurus* n. von Südafrika, Kapland bis Loango und Mombassa; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1910, 11.
12. *Stephanibyx melanopterus minor* n. von Ost- und Südafrika; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1908, 181.

Rallidae.

13. *Himantornis whitesidei* n. vom oberen Kongo; Sharpe, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 19. — [In der Beschreibung ist nicht angegeben, wie diese Art sich von *H. (Psammocrex) petitii* Oust. unterscheidet, welche Form von Landana am Kongo beschrieben ist, aber mit *H. haematopus* vereinigt wird.]
14. *Ortygops macmillani* n. von Kaffa im südwestlichen Abessinien; D. A. Bannerman, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 38.
15. *Podica jacobi* n. von Kamerun; Reichenow, Journ. Orn. 1906, 325.
16. *Sarothrura antonii* n. von Ndassekera an der Grenze von Deutsch- und Englisch-Ostafrika; J. v. Madarász u. O. Neumann, Orn. Mntsb. 1911, 186.
17. *Sarothrura buryi* n. von den Wagga bergen im Somaliland; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 93.
18. *Sarothrura pulchra centralis* n. von Mittelafrikanischen Seengebiet; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 45. — [Die Verschiedenheit der Form von *S. pulchra* wird bezweifelt von Reichenow, Wissensch. Erg. D. Zentral-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 249.]
19. *Sarothrura pulchra zenkeri* n. von Kamerun; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 45.

Otididae.

20. *Lissotis nothophila* neuer Name für *L. lovati* Grant; Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 836. — [*L. nothophila* (*L. lovati*) jedoch von *O. melanogaster* Rüpp. nicht artlich zu trennen nach Reichenow, Wissensch. Erg. D. Zentral-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 247.]
21. *Otis adolfi-friederici* n. von der Ostseite des Victoria Niansa; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 306.
22. *Otis arabs stieberi* n. vom westlichen Sudan (Schari); O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 307.
23. *Otis kori struthiunculus* n. von Nordost- und Ost-Afrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 306.
24. *Otis ruficrista hilgerti* n. vom nördlichen Somaliland; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 308.

Ibididae.

25. *Hagedashia hagedash erlangeri* n. vom südlichen Somaliland bis Niassaland; O. Neumann, Ornis 13. 1909, 193. — [Vergl. Reichenow, Mitt. Zool. Mus. Berlin 5. 1910, 74.]
26. *Hagedashia hagedash guineensis* n. vom Gambia bis Kongo; O. Neumann, Ornis 13. 1909, 194. — [Vergl. Reichenow, Mitt. Zool. Mus. Berlin 5. 1910, 74.]
27. *Hagedashia hagedash nilotica* n. von Mittel-Abessinien bis Uganda; O. Neumann, Ornis 13. 1909, 193. — [Vergl. Reichenow, Mitt. Zool. Mus. Berlin 5. 1910, 74.]
28. *Oreobis akleyorum* n. vom Kenia; F. M. Chapman, Bull. Amer. Mus. N. H. 31. 1912, 235 T. 23 u. 24.
29. *Theristicus brevirostris* n. von Spanisch Guinea; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 147.

Ardeidae.

30. *Tigribaphe leucolaema* n. von der Insel Ukerewe im Victoria Niansa; Reichenow, Orn. Mntsb. 1912, 61.

Turnicidae.

31. *Turnix sylvatica allenii* n. vom Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 20. 1911, 5.

Pteroclidae.

32. *Pterocles bicinctus multicolor* n. vom Limpopo; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 53.
33. *Pterocles lichtensteini abessinicus* n. von Diredaua und Harar; Frhr. Geyr v. Schwerpenburg, Orn. Mntsb. 1916, 57.
34. *Pterocles lichtensteini arabicus* n. von Südarabien bis Nordost-Indien; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1909, 152.
35. *Pterocles lichtensteini sukensis* n. von den Ländern zwischen Victoria Niansa, Kenia und Rudolfsee; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1909, 153.
36. *Pteroclurus exustus erlangeri* n. von Südarabien; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1909, 154.
37. *Pteroclurus exustus olivascens* n. vom Massailand; E. Hartert, Orn. Mntsb. 1909, 183.

Phasianidae.

38. *Francolinus adolfi-friedericii* n. von Ruanda; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 48. — [Fällt zusammen mit *F. mulemae* Grant nach Reichenow, Wiss. Erg. D. Zentral-Afr.-Exped. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 259.]
39. *Francolinus bicalcaratus adamauae* n. von Adamaua und Ost-Kamerun; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1915, 73. — [Zu beachten ist, dass Übergänge vorkommen. Vögel mit ähnlich blasser Unterseite kommen auch in Togo vor. Die Färbung der Oberkopfplatte wechselt ebenfalls.]

40. *Francolinus camerunensis* n. vom Kamerun-Pik; Alexander, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 12. — [Vergl. auch O. Grant, Bull. Br. O. C. 25. 1910, 125.]
41. *Francolinus clappertoni heuglini* n. vom oberen Weissen Nil und Gazellenfluss; O. Neumann, Orn. Mnts. 1907, 199.
42. *Francolinus granti dilutescens* n. vom Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911.
43. *Francolinus grisescens* n. von Uganda; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911.
44. *Francolinus gutturalis eritreae* n. von Asmara und Bogos; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1910, 357.
45. *Francolinus icterorhynchus emini* n. von Unjoro und der Äquatorial-Provinz; O. Neumann, Orn. Mnts. 1907, 198. — [Fällt mit *F. dybowskii* Oust. zusammen.]
46. *Francolinus jugularis pallidior* n. von Deutsch-Südwestafrika; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 45.
47. *Francolinus lathami schubotzi* n. vom Uelle (Kongogebiet); Reichenow, Journ. Orn. 1912, 320.
48. *Francolinus levaillanti benguellensis* n. von Benguella; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 44.
49. *Francolinus nahani* n. vom Kongo; A. Dubois, Ann. Mus. Congo Fasc. 1. 1905, 17 T. 10.
50. *Francolinus nobilis* n. von den Wirunga-Vulkanen (Sabinio); Reichenow, Orn. Mnts. 1908, 81.
51. *Francolinus schuetti maranensis* n. vom Kilimandscharo; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 14, 1910, 1. — [Die angegebenen Unterschiede dieser Form von *F. schütti* werden durch das Material des Berliner Museums nicht bestätigt. Bei dieser wie bei den drei folgenden Formen scheint es sich nicht um ständig verschiedene Arten, sondern um Spielarten zu handeln. — Siehe auch E. Lönnberg, Arkiv Zool. 9. No. 14, 1915, 5.]
52. *Francolinus schuetti kapitensis* n. von Nairobi in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 14, 1910, 2. — [Vergl. vorher.]
53. *Francolinus schuetti keniensis* n. vom Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 14, 1910, 2. — [Vergl. unter *F. sch. maranensis*.]
54. *Francolinus schuetti zappeyi* n. vom Victoria Niansa; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911. — [Vergl. unter *F. sch. maranensis*.]
55. *Francolinus sephaena jubaensis* n. vom südlichen Somaliland und nördlichen Britischen Ostafrika; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1914, 656.
56. *Francolinus ugandensis* n. von Uganda; O. Neumann, Orn. Mnts. 1907, 199.
57. *Francolinus whytei* n. vom Nyikahochland; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 76.

Vogelarten des afrikanischen Faunengebiets, etc.

65

58. *Guttera cristata makondorum* n. vom Makondehochland in Deutsch-Ostafrika; H. Grote, Journ. Orn. 1912, 514.
 59. *Guttera cristata seth-smithi* n. vom mittelafrikanischen Seen-gebiet; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 13.
 60. *Guttera cristata suahelica* n. vom Küstengebiet Deutsch-Ost-afrikas; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 14. — [Vergl. Reichenow, Wiss. Erg. D. Zentral-Afr.-Exped. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 257.]
 61. *Guttera lividicollis* n. vom Sambesi; A. Ghigi, Mem. Acc. Sc. Bologna 1905, 196.
 62. *Guttera pallasi* neuer Name für *Guttera cristata* (Pall.) (*Numida cristata* Pall.); W. Stone, Auk 1912, 208. — [Die Ausführungen des Verfassers lassen keinen Grund erkennen, der ein Verwerfen des Namens *N. cristata* Pall. erforderlich machte.]
 63. *Guttera plumifera schubotzi* n. vom Uelle; Reichenow, Journ. Orn. 1912, 320.
 64. *Numida frommi* n. vom Rukwasee; K. Kothe, Orn. Mntsb. 1911, 13.
 65. *Numida ptilorhyncha baringoensis* n. vom Baringosee; C. Grant, Bull. Br. O. C. 33. 1914, 141.
 66. *Numida ptilorhyncha rendilis* n. vom Guasso Njiro in Ost-afrika; E. Lönnberg, Sv. Vet. Ak. Handl. 47. No. 5, 1911, 47.
 67. *Numida strasseni* n. vom Ubangi; Reichenow, Orn. Mntsb. 1911, 82.
 68. *Pternistes castaneiventer* n. vom Fort Beaufort-Distrikt in Transvaal; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 1911, 110.
 69. *Pternistes cranchi intercedens* n. vom Rukwasee; Reichenow, Orn. Mntsb. 1909, 88.
 70. *Pternistes harterti* n. von Usumbura am Tanganjika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1909, 41.
 71. *Pternistes leucoscepus keniensis* n. vom Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911.
 72. *Pternistes leucoscepus kilimensis* n. vom Kilimandscharo; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911.
 73. *Ptilopachus fuscus brehmi* n. von Kordofan; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 68.
 74. *Ptilopachus fuscus keniensis* n. vom Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911.
 75. *Ptilopachus fuscus maior* n. vom nördlichen Abessinien; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 68.

Columbidae.

76. *Aplopelia tessmanni* n. vom Campo in Spanisch Guinea; Reichenow, Orn. Mntsb. 1909, 87.
 77. *Chalcopelia chalcospila acanthina* n. vom Kilimandscharo; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 845.

78. *Columba albinucha* n. vom Albert-Edward-See; M. Sassi, Orn. Mnts. 1911, 68.
79. *Columba sodalicia* n. von Abessinien; J. v. Madarász, Orn. Mnts. 1912, 46.
80. *Columba unicincta* iuv. beschrieben von Seth-Smith, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 110.
81. *Oena capensis anonyma* n. vom Kilimandscharo; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 843.
82. *Turtur capicola hilgerti* n. vom nördlichen Somaliland; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1913, 60.
83. *Turtur decipiens elegans* n. vom südlichen Somaliland; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1913, 59.
84. *Turtur electus* n. von Abessinien; J. v. Madarász, Orn. Mnts. 1913, 7.
85. *Turtur hypopyrrhus* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mnts. 1910, 174.
86. *Turturoena iriditorques rothschildi* n. vom Ituriwald; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 42.
87. *Vinago calva uellensis* n. vom Uelle; Reichenow, Journ. Orn. 1912, 320.
88. *Vinago orientalis* n. von Boror in Portugiesisch-Ostafrika; J. W. Gunning u. A. Roberts; Ann. Transvaal Mus. 1911, 109.

Vulturidae.

89. *Gyps erlangeri* n. von Eritrea, Abessinien und Schoa; T. Salvadori, Boll. Mus. Anat. Zool. No. 576, 1908.

Falconidae.

90. *Astur riggenbachi* n. vom Senegal; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 69.
91. *Astur sparsimfasciatus aceletus* n. vom Kilimandscharo; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 823.
92. *Astur sphenurus obscurior* n. vom Uamfluß, Ost-Kamerun; Reichenow, Journ. Orn. 1916, 161.
93. *Astur tachiro orienticola* n. von Ostafrika; H. C. Oberholser, Ann. Carnegie Mus. 3. 1906, 495.
94. *Astur tachiro tenebrosus* n. vom Elgon; E. Lönnberg, Arkiv f. Zool. 11. No. 5, 1917.
95. *Buteo oreophilus* n. von den Hochgebirgen von Nordost-, Ost- und Mittelafrika; Hartert und Neumann, Orn. Mnts. 1914, 31.
96. *Cerchneis tinnunculus carlo* n. von Schoa bis zum Victoria Niansa [*Cerchneis arthuri* (von Gurney) Reichenow, Vögel Afrikas 1. S. 643; Journ. Orn. 1904, Taf. 16]; Hartert und Neumann, Journ. Orn. 1907, 592. — [Gleichbedeutend ist augenscheinlich: *Cerchneis rufescens* (Sw.) (*Falco rufescens* Swainson, Birds West. Afr. 1. 1837, 109).]

97. *Circaetus rufulus* n. von Songea in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 179.
98. *Falco horsbrughi* n. von Pretoria in Transvaal; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 1911, 110.
99. *Falco pyrrhogaster* n. aus dem Uamgebiet in Ostkamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1915, 25.
100. *Melierax canorus neumanni* n. von Nubien; Hartert, Vögel pal. Fauna 2. 1914, 1165. — [Ist anscheinend der recht alte Vogel von *M. metabates*. Bei diesem sind die Armschwingen wie die übrige Oberseite in der Jugend braun, werden danach grau und bekommen dann weisse Wellenzeichnung, die immer breiter und ausgedehnter wird, so dass im späten Alter die Armschwingen auf weissem Grunde grau gewellt erscheinen.]
101. *Micronisus niger* (Vieill.) Melanismus von *M. gabar* (Daud.) nach A. L. Butler, Ibis 1905, 369.
102. *Milvus aegyptius parasitus* (Daud.) vom tropischen und südlichen Afrika artlich verschieden vom ägyptischen *M. aegyptius* Gm. nach Hartert, Bull. Br. O. C. 33. 1914, 90.
103. *Poliohierax semitorquatus deckeni* n. vom südlichen Somaliland bis zum Baringosee; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1914, 675.

Strigidae.

104. *Asio abessinicus graueri* n. vom Urwald westlich des Tanganjika; M. Sassi, Ann. Naturh. Hofmus. Wien 1912, 360.
105. *Asio maculosus amerimnus* n. vom Kilimandscharo; H. C. Oberholser, Pr. Un. St. N. M. 28. 1905, 856. — [Zweifelhafte Form, siehe E. Lönnberg, Arkiv f. Zool. 9. No. 14, 1915, 9.]
106. *Bubo ascalaphus trothae* n. von Keetmannshoop in Deutsch-Südwestafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1906, 10.
107. *Bubo vosseleri* n. von Amani in Usambara; Reichenow, Journ. Orn. 1908, 139.
108. *Glaucidium capense rufum* n. von Boror in Portugiesisch-Ostafrika; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 1911, 111.
109. *Glaucidium capense scheffleri* n. von Ukamba; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1911, 184.
110. *Glaucidium pycrafti* n. von Süd-Kamerun; G. L. Bates, Bull. Br. O. C. 27. 1911, 85.
111. *Pisorhina capensis grisea* n. von Bethulie im südlichen Oranjestaat; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 1911, 111.
112. *Pisorhina capensis intermedia* n. von Transvaal; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 1911, 111.
113. *Pisorhina capensis pusilla* n. von Boror im Portugiesischen Ostafrika; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 1911, 111.

114. *Pisorhina leucotis granti* neuer Name für *P. erlangeri* (O. Grant) (*Scops erlangeri* Grant, nec *P. scops erlangeri* Tschusi); P. Kollibay, Orn. Mntsb. 1910, 148. — [Nach Reichenow, Vögel Afr. 1. S. 661, Die Vögel 1. S. 421 u. 423, gehört die Art zur Gattung *Asio*.]
115. *Scops erlangeri* n. von Südafrika; W. R. Ogilvie-Grant, Ibis 1906, 660. — [Vergl. vorher *Pisorhina leucotis granti*.]
116. *Scops königseggii* n. von südlichen Sudan (Blauer Nil); J. v. Madarász, Orn. Mntsb. 1912, 81.
117. *Scops spurrelli* n. von Aschanti; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 29. 1912, 116.
118. *Scotopelia peli fischeri* n. von Ostafrika; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1908, 172.
119. *Scotopelia peli salvago-raggii* n. von Abessinien; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1908, 172.

Psittacidae.

120. *Agapornis nigrigenis* n. von Rhodesien; W. L. Slater, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 61.
121. *Agapornis pullaria ugandae* n. von Unjoro bis Ruanda und bis zum Omogebiet; O. Neumann, Nov. Zool. 1908, 388. — [Die Sonderung der Form von *A. pullaria* erscheint nicht durchführbar nach Reichenow, Wiss. Erg. D. Zentral-Afr. Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 268.]
122. *Agapornis swinderianus emini* n. vom Ituriwald; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 42. — [Auf *Agapornis zenkeri* zurückzuführen nach Reichenow, Wiss. Erg. D. Zentral-Afr. Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 269.]
123. *Palaeornis krameri centralis* n. vom Tschadsee und Adamaua bis zum Weissen Nil; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1915, 73.
124. *Poicephalus gulielmi fantiensis* n. von der Goldküste; O. Neumann, Nov. Zool. 1908, 381.
125. *Poicephalus meyeri abessinicus* n. vom südlichen Eritrea und nördlichen Abessinien; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1908, 175.
126. *Poicephalus meyeri nyansae* n. von Unjoro bis Kawirondo; O. Neumann, Nov. Zool. 1908, 383. — [Fällt mit *P. m. virescens* Rchw. zusammen.]
127. *Poicephalus senegalus mesotypus* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 174.
128. *Poicephalus simplex* Rchw. ist als selbständige, von *P. rufiventris* unterschiedene Form aufrecht zu erhalten nach J. v. Madarász, Orn. Mntsb. 1912, 80.
129. *Psittacus princeps* n. von der Insel Principe; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 23. 1909, 74.

Musophagidae.

130. *Gymnoschizorhis personata centralis* n. vom Gebiet zwischen Victoria-, Kiwu- und Albert-See; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 94.

131. *Ruwenzorornis chalcophthalmicus* n. vom Rugegewald; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 48.
132. *Ruwenzorornis johnstoni kivuensis* n. von den Kivuvulkanen; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 54. — [Fällt mit *R. chalcophthalmicus* zusammen. Siehe Reichenow, Wiss. Erg. D. Zentral-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 271 Anm.]
133. *Turacus corythaix phoebus* n. von Transvaal; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1907, 198.
134. *Turacus livingstonei loitanus* n. von den Loitabergen; O. Neumann, Nov. Zool. 1908, 378.
135. *Turacus ugandae* n. von Uganda; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 4. — [S. auch: Wiss. Erg. D. Zentral-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 271.]

Cuculidae.

136. *Centropus heuglini* n. vom Weissen Nil; [O. Neum.] Koenig, Verhandl. 5. intern. Ornith.-Kongress 1911, 503 T. 1.
137. *Centropus monachus angolensis* n. vom nördlichen Angola; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 77.
138. *Centropus monachus occidentalis* n. von der Goldküste bis Gabun; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 77.
139. *Centropus neumanni* n. vom Uelle; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 1908, 78.
140. *Centropus senegalensis tschadensis* n. vom Tschadsee-Gebiet; Reichenow, Journ. Orn. 1915, 124.
141. *Cercococcyx olivinus* n. von der Rutschurru-Ebene zwischen Albert-Edward- und Kiwu-See; M. Sassi, Ann. Naturh. Hofmus. Wien 26. 1912, 341. 378.
142. *Chrysococcyx smaragdineus intermedius* Hartl. von Südafrika verschieden von *Ch. smaragdineus* Sw. von Nordwest- und Nordostafrika; D. A. Bannerman, Ibis 1912, 244.

Indicatoridae.

143. *Ceriocleptes* (u. g.) *xenurus* n. vom Belgischen Kongo; Chapin, Bull. Amer. Mus. N. H. 34. 1915, 512.
144. *Indicator exilis erlangeri* n. vom südlichen Somaliland; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1913, 59.
145. *Indicator maior riggenbachi* n. von Adamaua; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1915, 12.
146. *Indicator minor senegalensis* n. vom Senegal; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 43.
147. *Indicator narokensis* n. vom Doingo-Narok in Britisch-Ostafrika; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 20.
148. *Indicator theresae* n. von Gudima am Irifluß in Mittelafrica; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 90. — [Scheint mit *I. stictithorax* Rchb. zusammenzufallen; die angegebenen Unterschiede stimmen durchaus auf den Typ von *I. stictithorax*.]

149. *Indicator variegatus jubaensis* n. von Kismaju am Djuba; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 97.
150. *Melichneutes sommerfeldi* n. vom Dume-Gebiet in Süd-Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 160.
151. *Melignomon robustus* n. vom südlichen Kamerun; G. L. Bates, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 26.
152. *Melignothes exilis meliphilus* n. vom Kilimandscharo; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 869.

Capitonidae.

153. *Barbatula chrysocoma pallida* n. von Kordofan; O. v. Wettstein, Ak. Wissensch. Wien Mai 1816.
154. *Barbatula chrysocoma schubotzi* n. von Archambault im französischen Sudan; Reichenow, Orn. Mntsb. 1912, 28.
155. *Barbatula chrysocoma zedlitzi* n. von Sennar; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 30.
156. *Barbatula leucolaema urungensis* n. von Urungu am Südende des Tanganjika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1915, 91.
157. *Barbatula leucolaima nyansae* n. von Uganda und den Gebieten im Westen des Victoria Niansa; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 347.
158. *Barbatula leucolaima togoensis* n. von Togo; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 347.
159. *Barbatula kandti* vielleicht gleichbedeutend mit *B. jacksoni*; Reichenow, Wiss. Erg. Zentr.-Af.-Exp. Herz. z. Meckl. 1911, 279.
160. *Barbatula mfumbiri* n. von den Mfumbiro-Vulkanen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 107.
161. *Barbatula poensis* n. von Fernando Po; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 15.
162. *Barbatula rubigularis* n. vom Kongo; A. Dubois, Ann. Mus. Congo Tome 1, Fasc. 1. 1905, 1 T. 1. — [Augenscheinlich der junge Vogel von *L. conicus* Rchw.; O. Neumann, Journ. Orn. 1910, 196.]
163. *Barbatula sharpei* n. von der Goldküste; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 108.
164. *Barbatula subsulphurea ituriensis* n. vom Ituri; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 344.
165. *Buccanodon anchetae rex* n. vom nördlichen Angola; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 47. — [Scheint der jüngere Vogel von *B. anchetae* zu sein.]
166. *Buccanodon leucogrammicum* n. von Mahenge in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1915, 90.
167. *Gymnobucco adolfi-friederici* n. von Beni am Semliki; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 160. — [Fällt mit *G. sladeni* zusammen.]
168. *Gymnobucco sladeni* n. vom Kongowald; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 42.

169. *Lybius bidentatus aethiops* n. vom Omo; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 29.
170. *Lybius leucocephalus usukumae* n. von Usukuma; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 46. — [Vielleicht nur Spielart. Bei einer Reihe von Vögeln von der Insel Ukerewe im Victoria Niansa geht das Weiß des Unterhalses bald mehr, bald weniger weit auf die Brust herab.]
171. *Lybius levallanti intercedens* n. von Manjanga; O. Neumann, Orn. Mnts. 1908, 27. — [Es bleibt festzustellen, ob diese Form nicht der ausgefärbte Vogel von *L. levallanti* ist, was um so wahrscheinlicher ist, als beide in denselben Gebieten gefunden sind.]
172. *Lybius tridactylus ugandae* n. von Uganda; A. Berger, Orn. Mnts. 1907, 201.
173. *Lybius undatus senafensis* n. von Bogos; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 29.
174. *Lybius zombae albicularis* n. vom Niassasee; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 46.
175. *Trachyphonus arnaudi zedlitzii* n. vom Baringosee; A. Berger, Journ. Orn. 1911, 512.
176. *Trachyphonus darnaudii usambiro* n. von Usambiro; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 30.
177. *Trachyphonus margaritatus somalicus* n. vom nördlichen Somaliland; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1910, 57.
178. *Trachyphonus nobilis* n. vom Ngamisee; W. R. Ogilvie-Grant, Ibis 1912, 397.
179. *Tricholaema hirsutum angolense* n. vom nördlichen Angola; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 47. — [Es bleibt festzustellen, ob die Form nicht der jüngere Vogel von *T. hirsutum* ist.]
180. *Tricholaema hirsutum hybridum* n. von Süd-Nigeria; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 46.
181. *Tricholaema lacrymosum ruahae* n. von Uhehe; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 47.
182. *Tricholaema schultzei* n. von Süd-Kamerun; Reichenow, Orn. Mnts. 1911, 82.
183. *Viridibucco* n. g. Typus: *Barbatula leucomystax* Sharpe; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 865.
184. *Xylobucco aloysii* n. von Ntebbi in Uganda; T. Salvadori, Boll. Mus. Zool. Anat. Torino 1906, No. 542.

Picidae.

185. *Dendromus abingoni annectens* n. von Angola und Benguella; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 95.
186. *Dendromus albifacies* n. von Portugiesisch-Ostafrika; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transv. Mus. 1911, 112.
187. *Dendromus aureicuspis* n. von Ussagara; Reichenow, Orn. Mnts. 1915, 26.

188. *Dendronus bennetti uniamwesicus* n. von Deutsch-Ostafrika; O. Neumann, Orn. Mnts. 1908, 27. — [Vergl. E. Hesse, Mitt. Zool. Mus. Berlin 6. 1912, 260.]
189. *Dendromus efulenensis* n. von Kamerun: Ch. Chubb, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 92. — [Anscheinend nur Spielart von *D. nivosus*. Vergl. E. Hesse, Mitt. Zool. Mus. Berlin 6. 1912, 249.]
190. *Dendromus herberti* n. vom Ubangi bis Unjoro; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 89. — [Vermutlich nur Spielart von *D. nivosus* wie *D. efulenensis*. Vergl. E. Hesse, Mitt. Zool. Mus. Berlin 6. 1912, 248.]
191. *Dendromus kasaicus* n. von Kassai im belgischen Kongo; A. Dubois, Revue Franç. d'Orn. 3. 1911, 17. — [Vielleicht nur Spielart von *D. caroli*. Vergl. E. Hesse, Mitt. Zool. Mus. Berlin 6. 1912, 249.]
192. *Dendropicos camerunensis* n. von Kamerun; Sharpe, Ibis 1907, 443.
193. *Lynx thorbeckei* n. von Kamerun; Reichenow, Orn. Mnts. 1912, 126.
194. *Mesopicos schultzei* n. von Fernando Po; Reichenow, Orn. Mnts. 1912, 28.

Coliidae.

195. *Colius kirbyi* n. von Lydenburg in Transvaal; Sharpe, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 32.
196. *Colius kiwuensis* n. vom Kiwusee; Reichenow, Orn. Mnts. 1908, 191.
197. *Colius striatus erlangeri* n. vom mittleren Abessinien; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1910, 58.
198. *Colius striatus hilgerti* n. vom nördlichen Somaliland bis zum Hauasch; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1910, 58.
199. *Urocolius macrourus syntactus* neuer Name für die nordostafrikanische Form von *U. macrourus*, falls diese von *U. macrourus* das Senegal verschieden sein sollte [!]; H. C. Oberholser, Pr. Un. St. N. M. 28. 1905, 863.

Trogonidae.

200. *Apaloderma minus* n. vom Belgischen Kongo; Chapin, Bull. Amer. Mus. N. H. 34. 1915, 510.

Bucerotidae.

201. *Bycanistes aloysii* n. von Ntebbi in Uganda; T. Salvadori, Boll. Mus. Zool. Anat. Torino 21. 1906, No. 542.
202. *Lophoceros melanoleucus geloensis* n. vom Sobat in Nord-Ostafrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 187.
203. *Lophoceros melanoleucus suahelicus* n. von Deutsch- und Englisch-Ostafrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 187.

Alcedinidae.

204. *Alcedo leucogaster bowdleri* n. von Oberguinea; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 14.
205. *Halcyon albiventris erlangeri* n. vom südlichen Somaliland; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 71.
206. *Halcyon semicaeruleus centralis* n. von Bussissi am Victoria Nianza; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 189.
207. *Halcyon senegalensis fuscopileus* n. von Kamerun; Reichenow, Orn. Mnts. 1906, 171.
208. *Ispidina leopoldi* n. vom Kongo; A. Dubois, Ann. Mus. Congo Fasc. 1. 1905, 10 T. 6.

Meropidae.

209. *Aerops albicollis maior* n. von Ostafrika; C. Parrot, Orn. Mnts. 1910, 12.
210. *Dicrocerus hirundineus heuglini* n. vom oberen Weissen Nil; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 113.
211. *Dicrocerus hirundineus omoensis* n. vom Omo; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 114.
212. *Merops persicus saharae* n. vom Tschadsee; O. Neumann, Orn. Mnts. 1908, 28. — [Der Typ hat ausnahmsweise lange mittlere Schwanzfedern, bei anderen Stücken aus dem Tschadgebiet sind die Schwanzfedern kürzer.]
213. *Merops viridis reichenowi* n. von Abessinien; C. Parrot, Orn. Mnts. 1910, 13.

Upupidae.

214. *Irrisor erythrorhynchos marwitzii* n. von der Wemberesteppe; Reichenow, Orn. Mnts. 1906, 171.
215. *Irrisor erythrorhynchos neglectus* n. von Schoa und Süd-Athiopien; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 194.
216. *Irrisor erythrorhynchus brevirostris* n. von Portugiesisch-Ostafrika; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Transv. Mus. 1911, 113.
217. *Rhinopomastus minor somalicus* n. vom Somaliland; C. v. Erlanger, Journ. Orn. 1905, 461.
218. *Scoptelus adolfi-friedericii* n. vom Ituri; Reichenow, Orn. Mnts. 1908, 160.
219. *Scoptelus aterrimus emini* n. vom Gebiet des Weissen Nil; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 197. — [Vielleicht nur Spielart. Gleiche Stücke liegen im Berliner Museum vom Tschad und von Togo vor. Der Gefiederglanz ist bald blauer, bald mehr veilchenrötlich sowohl bei westlichen, wie bei nordostafrikanischen Vögeln.]
220. *Scoptelus aterrimus maior* n. von den südäthiopischen Seen; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 197.

221. *Upupa butleri* n. von Chor-Em-Dul zwischen Dinter und Blauen Nil; J. v. Madarász, Ann. Mus. Nat. Hung. 9. 1911, 339.
 222. *Upupa waibeli* n. von Bamugu in Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1913, 8.

Coraciidae.

223. *Coracias caudatus suahelicus* n. von Ussagara; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 593.
 224. *Coracias kovaci* n. vom südlichen Abessinien; J. v. Madarász, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 13.
 225. *Eurystomus afer aethiopicus* n. von Südaethiopien und dem Gebiet des Blauen Nil; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 184. — [Vergl. Reichenow, Journ. Orn. 1909, 235.]
 226. *Eurystomus gularis neglectus* n. von Kamerun bis Angola; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1908, 28. — [Vergl. Reichenow, Journ. Orn. 1905, 235.]

Caprimulgidae.

227. *Caprimulgus batesi* n. von Süd-Kamerun; Sharpe, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 18.
 228. *Caprimulgus chadensis* n. vom Tschadsee; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 90.
 229. *Caprimulgus claudi* n. vom Ubangi; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 47.
 230. *Caprimulgus gabonensis* n. vom Gabun; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 90.
 231. *Caprimulgus goslingi* n. vom französischen Kongo (Kemo); B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 47.
 232. *Caprimulgus houyi* n. vom östlichen Kamerun; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1915, 73.
 233. *Caprimulgus ludovicianus* n. vom südwestlichen Abessinien; St. Clarke, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 108.
 234. *Caprimulgus nauta* n. vom südlichen Arabien; E. Lönnberg, Orn. Mntsb. 1915, 39 u. 64.
 235. *Caprimulgus palmquisti* n. vom Kilimandscharo; Y. Sjöstedt, Wissensch. Ergebni. Kilimandjaro Exp. 3. Vögel 1908, 101.
 236. *Caprimulgus ruwenzorii* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 23. 1909, 94.
 237. *Caprimulgus stellatus simplex* n. vom Suai-See; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 593.

Cypselidae.

238. *Apus apus kalaharicus* n. von der Kalahari; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 81.
 239. *Apus apus mariwitzi* n. von Mkalama am Ostrand der Wemberesteppe in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1906, 171.

Vogelarten des afrikanischen Faunengebiets, etc.

75

240. *Apus kittenbergeri* n. vom Ngare Dobasch im Osten des Victoria Niansa; J. v. Madarász, Archiv Zool. 1. 1910, 177.
241. *Apus melanonotus* n. von Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 60.
242. *Apus reichenowi* n. vom Massailand; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 57.
243. *Apus roehli* n. von Usambara in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1906, 172.
244. *Apus schubotzi* n. vom Ruwenzori; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 161.
245. *Chaetura brevicauda* n. von Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1911, 159. — [Fällt mit *Ch. cassini* zusammen.]
246. *Chaetura melanopygia* n. vom Belgischen Kongo; Chapin, Bull. Mus. N. H. 34. 1915, 509.
247. *Chaetura sabini ogowensis* n. von Fernando Po bis Loango; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 69.
248. *Chaetura stictilaema marwitzii* n. von Mkalama am Ostrand der Wemberesteppe in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1906, 171.
249. *Chaetura ussheri benguellensis* n. von Benguella; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 57.
250. *Chaetura ussheri senegalensis* n. vom Senegal; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1915, 182.
251. *Chaetura ussheri sharpei* n. vom südlichen Kamerun; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 57.
252. *Cypselus maximus* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 56.
253. *Tachornis parvus griseus* n. vom nordwestlichen Abessinien; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1910, 58.
254. *Tachynautes* n. g. Typ: *Cypselus parvus* Lcht.; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 860.

Eurylaemidae.

255. *Pseudocalyptomena graueri* n. vom Russissi zwischen Tanganjika und Kiwusee; Hon. W. Rothschild, Ibis 1909, 690. T. 10.

Hirundinidae.

256. *Cotile sudanensis* n. vom Tschadsee; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 88.
257. *Hirundo christyi* n. von Uganda; Sharpe, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 86.
258. *Psalidoprocne bamingui* n. vom oberen Schari; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 88.
259. *Psalidoprocne pallidigula* n. vom Merusee; T. Salvadori, Boll. Mus. Zool. Anat. Torino 1907, No. 570.
260. *Psalidoprocne sammetina* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 191.

261. *Psalidoprocne tessmanni* n. von Spanisch Guinea; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 146.
262. *Riparia cincta erlangeri* n. von Schoa; Reichenow, Journ. Orn. 1905, 673.
263. *Riparia ducis* n. von Ruanda; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 81.
264. *Riparia nigricans* n. von Deutsch-Ostafrika; J. v. Madarász, Ann. Mus. Hung. 1911, 339.
265. *Riparia paludicola dohertyi* n. von Britisch-Ostafrika; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 25. 1910, 95. — [Scheint mit *R. ducis* zusammenzufallen.]
266. *Riparia rupestris pusilla* n. von Eritrea; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1908, 177.

Muscicapidae.

267. *Alseonax caerulescens pondoensis* n. von Pondoland; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transv. Mus. 1911, 114.
268. *Alseonax griseigularis* n. von Toro und Uganda; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 19.
269. *Alseonax flavipes* neuer Name für *A. fantisiensis* Sharpe; G. L. Bates, Ibis 1911, 522. — [Für diese Namensänderung liegt kein Grund vor.]
270. *Alseonax ituriensis* n. vom Ituri; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 191.
271. *Alseonax melanoptera* n. von Toro; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 89.
272. *Alseonax murinus albiventris* n. von Adamaua; Reichenow; Orn. Mntsb. 1910, 95.
273. *Alseonax murinus djamdjensis* n. von Djamdjain; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 206.
274. *Alseonax poensis* n. von Fernando Po; Reichenow, Orn. Mntsb. 1912, 46. — [Fällt mit *A. poensis* Alex. zusammen.]
275. *Alseonax pseudogrisola* n. von Guasso Njiro in Britisch-Ostafrika; E. Lönnberg, Vet. Ak. Handl. 47. 1911, 82.
276. *Batis chadensis* n. vom Tschadsee; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 105.
277. *Batis erythrophthalma* n. von Gasaland; C. F. M. Swynnerton, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 109.
278. *Batis minor congoensis* n. von Süd-Kamerun bis Nord-Angola; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 354.
279. *Batis minor erlangeri* n. von Harar bis zum Seengebiet; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 353.
280. *Batis minor nyansae* n. von der Nord- und Ostküste des Victoria Niansa, vom Albertsee und oberen Weissen Nil; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 354.
281. *Batis molitor littoralis* n. von Sansibar; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 356.

282. *Batis molitor montana* n. vom Kilimandscharo; Y. Sjöstedt, Wissensch. Ergebni. Kilimandjaro Exp. 3. 1908, 109.
283. *Batis mystica* n. von Ukamba; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 594.
284. *Batis orientalis somaliensis* n. vom Somaliland; O. Neumann; Journ. Orn. 1907, 351.
285. *Batis perkeo* n. vom Somaliland; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 352.
286. *Batis reichenowi* n. von Mikindani in Deutsch-Ostafrika; H. Grote, Orn. Mntsb. 1911, 162.
287. *Batis senegalensis togoensis* n. von Togo; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 350.
288. *Batis sheppardi* n. von Lourenzo Marques; A. Haagner, Ann. Transvaal Mus. 1. 1909, 179.
289. *Bias feminina* n. von Toro; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 87.
290. *Bradornis griseus erlangeri* n. vom Somaliland; Reichenow, Journ. Orn. 1905, 680.
291. *Bradornis pallidus nigeriae* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 95.
292. *Bradornis pallidus tessmanni* n. von Ost-Kamerun; Reichenow, Journ. Orn. 1915, 129.
293. *Bradornis parvus* n. von Uganda; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 171.
294. *Bradornis sylvia* n. von Spanisch-Guinea; Reichenow, Orn. Mntsb. 1909, 47.
295. *Bradyornis granti* n. von Südwest-Abessinien bis Rudolph-See; D. A. Bannerman, Bull. Br. O. C. 27. 1911, 84.
296. *Bradyornis infuscatus ansorgii* n. vom nördlichen Benguella; W. R. Ogilvie-Grant, Ibis 1913, 636.
297. *Bradyornis infuscatus seimundi* n. vom Kapland und Transvaal; W. R. Ogilvie-Grant, Ibis 1913, 636.
298. *Bradyornis pallidus sharpei* n. neuer Name für *B. subalaris* Sharpe; Hon. W. Rothschild, Bull. Br. O. C. 33. 1913, 66.
299. *Chloropeta batesi* n. von Kamerun; Sharpe, Ibis 1905, 468.
300. *Chloropeta gracilirostris* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 33.
- **Chloropeta minulla* siehe *Cryptolopha minulla* [vergl. Orn. Mntsb. 1909, 24].
301. *Chloropeta schubotzi* n. von Rugegewald, südöstlich des Kiwusees; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 119.
302. *Chloropeta storeyi* n. von Chedaro in Britisch-Ostafrika; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 32.
303. *Cichlomyia* n. g. Typ: *Butalis caerulescens* Hartl.; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 908.
304. *Cryptolopha alpina* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 117.

305. *Cryptolopha budongoensis* n. von Uganda; D. Seth-Smith, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 12.
306. *Cryptolopha camerunensis* n. vom Kamerun-Pik; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 13.
307. *Cryptolopha minulla* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mnts. 1905, 181 [irrtümlich als *Chloropeta minulla*] 1909, 24.
308. *Cryptolopha umbrovirens omoensis* n. vom Omo in Nordost-Afrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 208.
309. *Cryptolopha umbrovirens yemenensis* n. von Yemen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 90.
310. *Diaphorophyia ansorgei* n. von Benguella; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 15. 1905, 74.
311. *Diaphorophyia graueri* n. vom Albert-Edward-See; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 7.
312. *Diaphorophyia tonsa* n. von Süd-Kamerun; G. L. Bates, Bull. Br. O. C. 27. 1911, 86.
313. *Dioptrornis uhehensis* n. von Uhehe, Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Journ. Orn. 1916, 162.
314. *Erythrocercus conicus* n. vom östlichen Kongowald; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 41.
315. *Erythrocercus nyasae* n. von Niassaland; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 29. 1912, 115.
316. *Hyliota rhodesiae* n. von Rhodesien; A. Haagner, Journ. S. Afr. Orn. Un. 6. 1910, 14.
317. *Hyliota slatini* n. von Beni (Mittelafrika); M. Sassi, Stzb. Ak. Wien 12. Juni 1914 u. Journ. Orn. 1915, 112.
318. *Muscicapa ansorgei* n. von Gabun; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 25. 1910, 95.
319. *Muscicapa brevicauda* n. vom oberen Kongo; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 107.
320. *Muscicapa somaliensis* n. vom nördlichen Somaliland; D. A. Bannerman, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 20.
321. *Pedilorphynchus brevirostris* n. von Kamerun; G. L. Bates, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 28. — [Fällt offenbar mit *P. tessmanni* Rchb. zusammen.]
322. *Pedilorphynchus tessmanni* n. vom Uelle in Spanisch-Guinea; Reichenow, Orn. Mnts. 1907, 147.
323. *Platysteira cryptoleuca* n. vom Kilimandscharo; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 913. — [Fällt vermutlich mit *P. peltata* zusammen. Weifser Genickfleck und Mangel der weifsen Tropfenflecke auf dem Bürzel scheinen nur Abänderungen der Eigenart zu sein.]
324. *Platysteira cyanea aethiopica* n. von Schoa; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 210.
325. *Platysteira cyanea nyansae* n. vom innerafrikanischen Seengebiet; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 210.
326. *Sheppardia gunningi* n. von Lourenzo Marques; A. Haagner, Ann. Transvaal Mus. 1. 1909, 180.

327. *Smithornis camerunensis* n. von Süd-Kamerun; Sharpe, Ibis 1905, 469.
328. *Stizorhina grandis* n. von Mombas; W. R. Ogilvie - Grant, Bull. Br. O. C. 27, 1910, 30.
329. *Stizorhina vulpina intermedia* n. von Uganda; St. Clarke, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 108.
330. *Tchitrea camburni* n. vom Ituri; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 43.
331. *Tchitrea poliothorax* n. von Bukoba, westlich des Victoria Nianza; Reichenow, Journ. Orn. 1916, 161.
332. *Tchitrea schubotzei* n. vom Ubangi; Reichenow, Orn. Mnts. 1911, 82.
333. *Trochocercus albonotatus swynnertoni* n. von Gasaland; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 46.
334. *Trochocercus bedfordi* n. vom oberen Kongo; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 40.
335. *Trochocercus kibaliensis* n. vom oberen Ubangi; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 88. — [Fällt mit *T. nigromitratus* Rchw. zusammen nach Reichenow, Wiss. Erg. D. Zentr.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 306.]
336. *Trochocercus megalolophus* n. von Gasaland; C. F. M. Swynnerton, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 109.
337. *Trochocercus toroensis* n. von Toro im innerafrikanischen Seengebiet; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 20. — [Fällt vielleicht mit *T. nigromitratus* Rchw. zusammen. Vergl. Reichenow, Wiss. Ergeb. D. Zentr.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 306.]
338. *Trochocercus vivax* n. von Katanga im südöstlichen Kongostaat; S. A. Neave, Ann. Mag. N. H. (8.) 4. 1909, 129.

Campephagidae.

339. *Campephaga quisscalina münzneri* n. von Mahenge in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mnts. 1915, 91.
340. *Campephaga rothschildi* n. von Boranaland; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 594.
341. *Campephaga théliei* n. vom oberen Ituri; H. Schouteden, Rev. Zool. Afr. 1914, 266. [Fällt mit *C. martini* zusammen nach Neumann, Journ. Orn. 1916, 150.]
342. *Campophaga martini* n. von Uganda; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 31. 1912, 18.
243. *Campophaga petiti* ♂ beschrieben; W. R. Ogilvie - Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 87.
244. *Coracina graueri* n. vom Kongowald westlich des Albert-Edward-See; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 11.
245. *Lobotus oriolinus* n. von Kamerun; Sharpe, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 14.

Laniidae.

346. *Chlorophoneus batesi* n. von Kamerun; Sharpe, Ibis 1908, 330.
347. *Chlorophoneus melanprosopus ituriensis* n. vom oberen Ituri; H. Schouteden, Rev. Zool. Afr. 3. 1914, 267. — [Fällt vielleicht mit der noch zweifelhaften Form *reichenowi* Neum. zusammen.]
348. *Chlorophoneus münnneri* n. von Mahenge in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1915, 91.
349. *Chlorophoneus multicolor théliei* n. vom oberen Ituri; H. Schouteden, Rev. Zool. Afr. 3. 1914, 268. — [Fällt augenscheinlich mit *Ch. graueri* Hart. (siehe *Laniarius graueri*) zusammen.]
350. *Chlorophoneus quadricolor intercedens* n. von Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1915, 120.
351. *Chlorophoneus quadricolor nigricauda* siehe *Laniarius qu. nigricauda*.
* *Chlorophoneus rubiginosus rudolfi* siehe *Laniarius r. rudolfi*.
352. *Dryoscopus adolfi-friederici* n. vom Ruwenzori; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 160. — [Fällt mit *D. nandensis* Sharpe zusammen.]
353. *Dryoscopus alboplagatus* n. von Doingo Narok in Äquatorial-Afrika; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 16. 1916, 90.
354. *Dryoscopus bocagei ansorgei* n. vom nördlichen Angola; W. L. Slater, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 37.
355. *Dryoscopus holomelas* n. vom Ruwenzori; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 90.
356. *Eurocephalus anguitimens böhmi* n. vom südlichen und westlichen Deutsch-Ostafrika; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1913, 58.
357. *Eurocephalus anguitimens deckeni* n. vom südlichen Somalia bis Witu; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1913, 58.
358. *Eurocephalus anguitimens erlangeri* n. von Abessinien; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1913, 58.
359. *Eurocephalus anguitimens fischeri* n. vom nordöstlichen Deutsch-Ostafrika und Britisch-Ostafrika; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1913, 58.
360. *Harpolestes australis ansorgei* n. von Angola; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1909, 53.
361. *Laniarius bergeri* n. vom Baringosee; Reichenow, Orn. Mntsb. 1911, 34. — [Fällt mit *L. funebris rothschildi* Neum. zusammen.]
362. *Laniarius erythrogaster chrysostictus* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 95.
363. *Laniarius funebris atrocaeruleus* n. von Abessinien bis Nord-Somali; C. Hilgert, Nov. Zool. 18. 1912, 606.
364. *Laniarius funebris degener* n. vom südlichen Somaliland; C. Hilgert, Nov. Zool. 18. 1912, 606.

365. *Laniarius funebris rothschildi* n. von Süd-Äthiopien; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 595.
366. *Laniarius graueri* n. vom Waldgebiet westlich des Albert-Eduard-See; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 9.
367. *Laniarius helenae* n. von Sierra Leone; H. J. Kelsall, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 85.
368. *Laniarius melas* n. vom Rugegewald; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 47. — [Fällt mit *L. holomelas* Jacks. (siehe *Dryoscopus holomelas*) zusammen.]
369. *Laniarius mufumbiri* n. von den Mfumbiri-Vulkanen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 30.
370. *Laniarius quadricolor nigricauda* n. von der Küste Britisch-Ostafrikas; St. Clarke, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 32. — [Besser als *Chlorophoneus qu. nigricauda* zu führen.]
371. *Laniarius rubiginosus rudolfi* n. vom Urwald westlich des Albert-Eduard-See; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 10.
372. *Lanius antinorii mauritii* n. von den Korolibergen im westlichen Somaliland; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 595.
373. *Lanius arabicus* n. von Süd-Arabien, W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 15. 1905, 78. — [Es bleibt festzustellen, in welcher Weise diese Art von *L. buryi* sich unterscheidet.]
374. *Lanius gubernator strümpelli* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 8.
375. *Lanius humeralis camerunensis* n. von Adamaua und Ost-Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 191.
376. *Malaconotus adolfi-friederici* n. vom Semliki; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 191.
377. *Malaconotus interpositus* n. von der Gegend nordwestlich des Tanganjika und Bihe in Angola; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 36.
378. *Malaconotus melinoides* n. vom nördlichen Kamerun; Reichenow, Journ. Orn. 1907, 470.
379. *Malaconotus pallidirostris* n. von Portugiesisch-Guinea; Reichenow, Journ. Orn. 1915, 613.
380. *Nicator chloris laemocyclos* n. vom Semliki; Reichenow, Journ. Orn. 1909, 108. — [Noch zweifelhafte Form, bedarf der Bestätigung.]
381. *Nicator lepidus* (Cass.) von Unterguinea vermutlich von *N. chloris* zu trennen; Reichenow, Wiss. Ergeb. Exp. d. Herz. zu Meckl. 1911, 311.
382. *Nilaus afer camerunensis* n. von Kamerun; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 364.
383. *Nilaus afer erlangeri* n. vom südlichen Somalilande; C. Hilgert, Orn. Mntsb. 1907, 63.
384. *Nilaus afer erythraea* n. von Bogos und Erythræa; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 361.
385. *Nilaus afer hilgerti* n. von Schoa; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 362.

386. *Nilaus afer massaicus* n. von Deutsch- und Britisch-Ostafrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 363.
387. *Pomatorhynchus australis kiwuensis* n. vom Kiwusee; Reichenow, Wiss. Erg. Exped. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 310.
388. *Pomatorhynchus senegalus armenus* n. von Taweta in Ostafrika; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 30. 1906. — [Die Sonderung dieser Form von *P. senegalus* ist ebenso wenig durchführbar wie die von *P. orientalis*.]
389. *Prionops cristata omoensis* n. vom Omogebiet in Nordost-Afrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 216.
390. *Prionops poliocephalus adamauae* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mnts. 1910, 95.
391. *Sigmodus caniceps harterti* n. von Süd-Nigeria; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 70.
392. *Sigmodus retzii neumanni* n. vom südlichen Somaliland; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1914, 51.
393. *Telophonus¹⁾ australis dohertyi* n. von Kikuju; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 370. — [Fällt mit *P. emini* Rch. zusammen.]
394. *Telophonus jamesi kismayensis* n. von Kismaju; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 369.
395. *Telophonus senegalus camerunensis²⁾* n. von Kamerun und Gabun; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 375.
396. *Telophonus senegalus catholeucus* n. vom südlichen Somaliland; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 377.
397. *Telophonus senegalus erlangeri* n. von Schoa und Süd-Äthiopien; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 373.
398. *Telophonus senegalus pallidus* n. von der Goldküste; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 375.
399. *Telophonus senegalus rufofuscus* n. von Angola; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 376.

Oriolidae.

400. *Oriolus larvatus reichenowi* n. vom Süd-Somaliland, Küste von Englisch- und Deutsch-Ostafrika; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1915, 7.
401. *Oriolus nigripennis leucostictus* n. vom Semliki; Reichenow, Wiss. Ergeb. Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 317.
402. *Oriolus tanganjicae* n. vom Gebiet westlich des Tanganjika; Reichenow, Orn. Mnts. 1910, 161.

¹⁾ *Telophonus* gleichbedeutend mit *Pomatorhynchus*.

²⁾ Die Abarten von *T. senegalus* sind sämtlich noch sehr zweifelhaft und bedürfen der Bestätigung auf Grund umfangreichen Materials. Es scheinen mancherlei Abänderungen nach Alter und Jahreszeit vorzukommen.

Sturnidae.

403. *Amydrus neumannii* n. von Nord-Nigeria; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 41.
404. *Arizelopsar* n. g. Typ: *Pholidauges femoralis* Rich.; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 888.
405. *Lamprocolius chalybaeus hartlaubi* n. vom Senegal; O. Neumann, Orn. Mnts. 1908, 64.
406. *Lamprocolius chloropterus schraderi* n. von Abessinien und Schoa; O. Neumann, Orn. Mnts. 1908, 65.
407. *Lamprocolius sycobius nordmanni* n. von Mossamedes; E. Hartert u. O. Neumann, Orn. Mnts. 1914, 11.
408. *Lamprotornis corrusca* Nordm. älterer Name für *Lamprotornis melanogaster* Sw.; O. Neumann, Orn. Mnts. 1913, 8.
409. *Poneropsar* n. g. Typ: *Spreo albicapillus* Blyth; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 888.
410. *Spreo pulcher intermedius* n. von Adamaua, Sudan, Dongola; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1910, 9.
411. *Spreo torquatus* n. von Kamerun; Reichenow, Orn. Mnts. 1909, 140.
412. *Stilbopsis leucothorax* n. vom Belgischen Kongo; Chapin, Bull. Amer. Mus. N. H. 35. 1916, 23. — [Fällt mit *Spreo torquatus* Rchb. zusammen.]

Ploceidae.

413. *Aidemosyne cantans baraensis* n. von Kordofan; O. v. Wettstein, Ak. Wissensch. Wien Mai 1916.
414. *Aidemosyne cantans meridionalis* n. von Nord-Ostafrika bis Deutsch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 14, 1913, 4. — [Sehr zweifelhafte Form.]
415. *Aidemosyne inornata* n. vom Weissen Nil; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 14, 1913, 3. — [Sehr zweifelhafte Form. In einer mir vorliegenden Reihe von Vögeln aus Ostafrika sind ebenfalls Stücke mit einfarbiger, ungewellter Oberseite].
416. *Amadina fasciata alexandri* n. von Ostafrika, von Abessinien bis Deutsch-Ostafrika; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 43.
417. *Amadina fasciata meridionalis* n. von Rhodesien; K. Neunzig, Journ. Orn. 1910, 198.
418. *A. sudanensis* n. von Nord-Nigeria und Sudan; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 104. — [Fällt mit *A. fasciata* zusammen. Siehe *A. f. alexandri*.]
419. *Amblyospiza saturata* n. von Süd-Kamerun; Sharpe, Ibis 1908, 353.
420. *Cinnamopteryx mpangae* n. von Uganda; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 15.

421. *Coliuspasser dubiosus* n. von Gelo; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 348. — [Ist Winterkleid von *Pyromelana ansorgei* Hart. nach O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 47.]
422. *Coliuspasser macroura conradsi* n. von der Insel Ukerewe im Victoria Niansa; A. Berger, Journ. Orn. 1908, 487.
423. *Cryptospiza borealis* n. von Urguess-Berg nördlich vom Guasso Njiro; A. B. Percival, Bull. Br. O. C. 29. 1912, 76.
424. *Cryptospiza sharpei* n. vom Kemo (Französisch - Kongo); B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 46.
425. *Diatropura progne ansorgei* n. von Angola; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 45.
426. *Estrilda anambrae* n. von Süd-Nigeria; R. Kemp, Journ. Orn. 1907, 624.
427. *Estrilda astrild adesma* n. von Kissenji am Kiwusee; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 168.
428. *Estrilda astrild erlangeri* n. von Harar; Reichenow, Journ. Orn. 1907, 20.
429. *Estrilda astrild massaica* n. von Englisch - Ostafrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 596. — [Es bleibt festzustellen, wie sich diese Form von *E. a. erlangeri* unterscheidet.]
430. *Estrilda astrild münzneri* n. von Bismarckburg am Tanganjika; K. Kothe, Orn. Mntsb. 1911, 70.
431. *Estrilda astrild niediecki* n. von Namuala am Kafue in Rhodesien; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 168.
432. *Estrilda astrild nyansae* n. vom Victoria Niansa; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 596.
433. *Estrilda astrild nyassae* n. von Uhehe bis zum Sambesi; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 596.
434. *Estrilda atricapilla graueri* n. von den Kiwu - Vulkanen; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 55. — [Vielleicht der alte Vogel von *E. kandti* Rchw.]
435. *Estrilda cinderella* n. von Benguella; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 44.
436. *Estrilda incana hapalochroa* n. von Urungu in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 168.
437. *Estrilda larvata togoensis* n. von Togo; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1907, 167.
438. *Estrilda macmillani* n. vom Barofluss in Nord-Ostafrika; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 108.
439. *Estrilda pallidior* n. vom Guasso Njiro in Britisch-Ostafrika; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 27. 1910, 6.
440. *Estrilda paludicola benguellensis* n. von Benguella; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 96.
441. *Estrilda rhodopyga centralis* n. von Kissenji am Kiwusee¹⁾; K. Kothe, Orn. Mntsb. 1911, 70.

¹⁾ Kissenji liegt nicht am Albertsee, wie in der Urbeschreibung irrtümlich angegeben ist, sondern am Kiwusee.

442. *Estrilda rhodopyga frommi* n. von Karema am Tanganjika; K. Kothe, Orn. Mnts. 1911, 70.
443. *Estrilda rhodopyga hypochroa* n. von Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61, No. 9, 1913, 2. — [Fällt augenscheinlich mit *E. r. centralis* Kothe zusammen.]
444. *Estrilda rhodopyga polia* n. von Südalbessinien bis Mombas; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61, No. 9, 1913, 1. — [Sehr zweifelhafte Form, bedarf der Bestätigung.]
445. *Euplectes sabinjo* n. vom Nordabhang des Sabinjo-Vulkans in Mittelafrika; Reichenow, Orn. Mnts. 1910, 161.
446. *Granatina ianthinogastra roosevelti* n. von Sotik in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61, No. 9, 1913, 3. — [Sehr zweifelhafte Form.]
447. *Heterophantes golandi* n. von Britisch-Ostafrika; St. Clarke, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 32.
448. *Hypargos niveoguttatus macrospilotus* n. vom Meru; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61, No. 14, 1913, 2. — [Diese Form ist vom typischen *H. niveoguttatus* nicht zu trennen.]
449. *Hyphantornis feminina* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 15. — [Fällt vielleicht mit *bohndorffi* Rch. zusammen.]
450. *Hypochera codringtoni* n. von Rhodesien; S. A. Neave, Manchester Mem. Proc. Lit. Phil. Soc. 51. No. 10, 1907, 94.
451. *Hypochera neumanni* n. vom Tschadsee; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 33.
452. *Hypochera nigeriae* n. vom Gongolafluss; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 15.
453. *Lagonosticta butleri* n. vom Gazellenfluss; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 16.
454. *Lagonosticta graueri* n. von Baraka, nordwestlich des Tanganjika; Hon. W. Rothschild, Bull. Br. O. C. 23. 1909, 102.
455. *Lagonosticta incerta* n. von Uganda; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56, No. 14, 1910, 6. — [Fällt augenscheinlich mit *L. ruberrima* Rch. zusammen. Die Unterschwanzdecken sind bei dieser Art meistens bräunlichgrau mit weißem Endsaum, bisweilen aber grauweiß.]
456. *Lagonosticta rara forbesi* n. vom Niger; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 58.
457. *Lagonosticta rhodopareia ansorgei* n. von Angola; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 58.
458. *Lagonosticta rhodopareia neglecta* n. von Portugiesisch-Guinea; Reichenow, Orn. Mnts. 1916, 168.
459. *Lagonosticta rubricata fricki* n. von Abessinien; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61, No. 14, 1913, 4. — [Fällt augenscheinlich mit *C. rhodopareia* zusammen.]
460. *Lagonosticta rubricata haematocephala* n. vom Niassagebiet; O. Neumann, Orn. Monatsb. 1907, 168.

461. *Lagonosticta rubricata hildebrandti* n. von Britisch-Ostafrika; O. Neumann, Orn. Mnts. 1907, 167.
462. *Lagonosticta senegala abayensis* n. vom Abajasee; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 349.
463. *Lagonosticta senegala carlo* n. von Harar; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1910, 172.
464. *Lagonosticta senegala erythreue* n. von Bogosland; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 349.
465. *Lagonosticta senegala flavodorsalis* n. von Adamaua; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1910, 172.
466. *Lagonosticta senegala pallidicrissa* n. von Angola; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1910, 173.
467. *Lagonosticta ugandae* n. vom Ruwenzori; T. Salvadori, Boll. Mus. Zool. Anat. Torino 1906, No. 542. — [Fällt mit *L. rhodopareia* zusammen nach O. Grant, Ibis 1908, 272.]
468. *Lagonosticta umbrinodorsalis* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mnts. 1910, 82.
469. *Malimbus coronatus* n. von Süd-Kamerun; Sharpe, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 18.
470. *Malimbus fagani* n. vom Semliki; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 15.
471. *Malimbus flavipes* n. vom Belgischen Kongo; Chapin, Bull. Amer. Mus. N. H. 35. 1916, 27. — [Vielleicht iuv. von *M. coronatus*.]
472. *Malimbus gracilirostris* n. von Spanisch-Guinea; Reichenow, Journ. Orn. 1909, 108. — [Ist ♀ von *M. coronatus* Sharpe.]
473. *Malimbus malimbica melanobrephos* n. von Oberguinea; E. Hartert, Novit. Zool. 14. 1907, 491.
474. *Malimbus nitens microrhyncha* n. vom mittelafrikanischen Seengebiet; Reichenow, Orn. Mnts. 1908, 161.
475. *Neisna dufresneyi nyansae* n. von Bukoba; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 350.
476. *Neisna minima* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 117.
477. *Nigrita alexanderi* n. von Fernando Po; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 16.
478. *Notiospiza* neuer Name für *Sharpia*; H. C. Oberholser, Smiths. Misc. Coll. 48. No. 1579, 1905, 64.
479. *Odontospiza* n. g. Typ: *Pitylia caniceps* Rch.; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 883.
480. *Ortygospiza ansorgei* n. von Portugiesisch-Guinea; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 25. 1910, 84.
481. *Ortygospiza atricollis mülleri* n. von der Wemberesteppe; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 604.
482. *Ortygospiza gabonensis* n. von Gabun; Lynes, Bull. Br. O. C. 33. 1914, 131.
483. *Othyphantes batesi* n. von Kamerun; Sharpe, Ibis 1908, 348. — ♂ beschrieben: Bull. Br. O. C. 25. 1910, 41.

484. *Othyphantes fricki* n. von Abessinien; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 14, 1913, 1.
485. *Othyphantes kovácsi* n. von Abessinien; J. v. Madarász, Orn. Mntsb. 1914, 28. — [Diese Form wird mit *O. fricki* zu vergleichen sein.]
486. *Othyphantes lovati* n. von Süd-Abessinien; G. E. Shelley, Birds of Africa IV. 2. 1905, 457. — [Ist altes Männchen von *P. baglafecht* nach E. Hartert, Nov. Zool. 1907, 495.]
487. *Pachyphantes superciliosus omoensis* n. vom Omogebiet; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 342.
488. *Paludipasser* (n. g.) *locustella* n. vom Bangweolo-See in Rhodesien; S. A. Neave, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 25.
489. *Paludipasser uelensis* n. vom Belgischen Kongo; Chapin, Bull. Amer. Mus. N. H. 35. 1916, 24.
490. *Plocepasser mahali ansorgei* n. von Benguella; E. Hartert, Novit. Zool. 1907, 487.
491. *Plocepasser melanorhynchus erlangeri* n. von Kismaju im südlichen Somaliland; Reichenow, Journ. Orn. 1907, 4.
492. *Ploceus anochlorus* n. vom Uelle (Kongogebiet); Reichenow, Journ. Orn. 1912, 321.
493. *Ploceus aurantius rex* n. von Uganda; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 12.
494. *Ploceus epipolius* n. von Kilwa, Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 392.
495. *Ploceus flavissimus* n. von Soullouké in Nordostafrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 595. — [Vielleicht nur Spielart von *P. galbula*.]
496. *Ploceus graueri* n. von Usumbura am Nordende des Tanganjika; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 21.
497. *Ploceus heuglini neglectus* n. vom Senegal bis zum Niger; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 58.
498. *Ploceus insignis frater* n. vom Gebiet westlich des Albert-Edward-See; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 12.
499. *Ploceus ocularius abayensis* n. vom Abayasee; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 339. — [Noch fragliche Form (vergl. Zedlitz, Journ. Orn. 1915, 13).]
500. *Ploceus ocularius po* n. von Fernando Po; E. Hartert, Novit. Zool. 14. 1907, 498.
501. *Ploceus ocularius suahelicus* n. von Lamu bis zum Sambesi; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 339. — [Vergl. Journ. Orn. 1915, 13].
502. *Ploceus pondoensis* n. von St. Johnsbuscht, Pondoland; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 392.
503. *Ploceus quilimanensis* n. von Quilimane; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 392.
504. *Ploceus rubiginosus cinnamominus* n. von Benguella und Mossamedes; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 11. — [Fällt mit *P. trothae* Rchw. zusammen.]

505. *Ploceus schubotzei* n. vom Karisimbi in Mittel-Afrika; Reichenow, Orn. Mnts. 1908, 161. — [Fällt mit *P. alienus* (Sharpe) zusammen.]
506. *Ploceus trothae* n. von Deutsch-Südwestafrika; Reichenow, Orn. Mnts. 1905, 147.
507. *Pseudonigrita arnaudi kapitensis* n. von Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 14, 1910, 5. — [Von *P. arnaudi* nicht zu trennen.]
508. *Pseudospermestes goossensi* n. vom Stanley-Pool; A. Dubois, Ann. Mus. Congo T. 1. Fasc. 1, 1905, 16.
509. *Pseudospermestes microrhyncha* n. von Buddu, Westseite des Victoria Nianza; Reichenow, Orn. Mnts. 1916, 168.
510. *Pyrenestes granti* n. von Beira in Lourenco Marques; Sharpe, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 67. — [Fällt mit *P. minor* Shell zusammen nach O. Neumann, Journ. Orn. 1910, 530.]
511. *Pyrenestes ostrinus centralis* n. vom mittelafrikanischen Seengebiet; O. Neumann, Journ. Orn. 1910, 529.
512. *Pyrenestes ostrinus frommi* n. von Urungu in Deutsch-Ostafrika; K. Kothe, Orn. Mnts. 1911, 70.
513. *Pyrenestes ostrinus gabunensis* n. von Süd-Kamerun bis Kongo; O. Neumann, Journ. Orn. 1910, 528.
514. *Pyrenestes ostrinus rothschildi* n. vom Niger bis Nord-Kamerun; O. Neumann, Journ. Orn. 1910, 528.
515. *Pyromelana crassirostris* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 14.
516. *Pyromelana flammiceps rothschildi* n. vom Abayasee; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 596.
517. *Pyromelana flammiceps sylvatica* n. von Kamerun bis Angola; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 345.
518. *Pyromelana leuconota* n. vom Kiwusee; Reichenow, Orn. Mnts. 1909, 72.
519. *Pyromelana marwitzi* n. von Mkalama in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mnts. 1906, 171.
520. *Fytelia belli* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 14.
521. *Pytelia chubbi* n. von Britisch-Ostafrika und Uganda; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 29. 1912, 64.
522. *Pytelia lopesi* n. von Bunda in Innerafrika; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 124.
523. *Etylia melba tanganjicae* n. von Usumbura am Tanganjika; Reichenow, Wissensch. Ergeb. D. Zentr.-Afr.-Exp. d. Herzog zu Mecklenb. 1911, 332.
524. *Spermestes bicolor permista* n. von Nord-Kamerun; O. Neumann, Orn. Mnts. 1907, 166.
525. *Spermospiza haematinia leonina* n. von Sierra Leone; O. Neumann, Journ. Orn. 1910, 523.

526. *Spermospiza haematina togoensis* n. von Togo; O. Neumann, Journ. Orn. 1910, 523.
527. *Spermospiza poliogenys* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 32.
- **Spermospiza rubricapilla* [*ruficapilla*] Beschreibung des ♂; D. Seth-Smith, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 110.
528. *Sporopipes frontalis abyssinicus* n. von Abessinien; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 14, 1910, 7. — [Von *S. frontalis* nicht zu trennen; die angegebenen Unterschiede sind nicht stichhaltig.]
529. *Steganura paradisea aucupum* n. von Oberguinea; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 43.
530. *Sycobrotus herberti* n. vom Uelle; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 88.
531. *Textor albirostris nyansae* n. von Kawirondo; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 335.
532. *Uraeginthus bengalus barcae* n. vom Barkagebirge in Eritrea; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 29. 606.
533. *Uraeginthus bengalus brunneigularis* n. von Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911, 6. — [Fällt anscheinend mit *U. b. ugandae* zusammen.]
534. *Uraeginthus bengalus camerunensis* n. von Kamerun; Reichenow, Mitt. Zool. Mus. Berlin 5. 1911, 228.
535. *Uraeginthus bengalus mikindaniensis* n. von Mikindani in Deutsch-Ostafrika; H. Grote, Orn. Mntsb. 1911, 162.
536. *Uraeginthus bengalus natalensis* n. von Natal; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 607.
537. *Uraeginthus bengalus niassensis* n. von Songea am Niassasee; Reichenow, Mitt. Zool. Mus. Berlin 5. 1911, 228.
538. *Uraeginthus bengalus perpallidus* n. vom Weissen Nil; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 351.
539. *Uraeginthus bengalus schoanus* n. von Schoa; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 350.
540. *Uraeginthus bengalus senafensis* n. von Nord-Abessinien; Reichenow, Mitt. Zool. Mus. Berlin 5. 1911, 228.
541. *Uraeginthus bengalus togoensis* n. von Togo; Reichenow, Mitt. Zool. Mus. Berlin 5. 1911, 228.
542. *Uraeginthus bengalus ugandae* n. von Uganda; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 606.
543. *Uraeginthus bengalus ugogensis* n. von Ugogo in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Mitt. Zool. Mus. Berlin 25. 1911, 228.
544. *Uraeginthus cyanocephalus mülleri* n. vom südlichen Somalia; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1912, 77.
545. *Xanthophilus bojeri alleni* n. von Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911, 6. — [Von *P. bojeri* nicht zu trennen Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1916, 20.]

Fringillidae.

546. *Anomalospiza macmillani* n. vom südwestlichen Abessinien; D. A. Bannerman, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 37.
547. *Emberiza affinis omoensis* n. vom Omogebiet; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 358.
548. *Fringillaria goslingi* n. vom Uelle in Innerafrika; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 124.
549. *Fringillaria kovácsi* n. von Abessinien; J. v. Madarász, Orn. Mntsb. 1912, 46.
550. *Fringillaria reichenowi* n. von Kordofan; O. v. Wettstein, Ak. Wissenschaft. Wien Mai 1916.
551. *Gymnoris pyrgita massaica* n. von Britisch- und Deutsch-Ostafrika; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 70.
552. *Gymnoris pyrgita pallida* n. vom Sudan, Senegal bis Kartum; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 70.
553. *Gymnoris pyrgita reichenowi* n. von Süd-Somali; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1916, 42.
554. *Heliospiza noomeae* n. von Transvaal; J. W. B. Gunning, Journ. S. Afr. O. U. 1907, 209.
555. *Passer albiventris* n. vom Sudan; J. v. Madarász, Ann. Mus. Stat. Hung. 1911, 342.
556. *Passer griseus abyssinicus* n. von Abessinien; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 70.
557. *Passer griseus eritreae* n. von Eritrea und Nordwest-Abessinien; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 33.
558. *Passer griseus neumanni* n. vom abessinischen Küstenstrich; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1908, 180.
559. *Passer nikersoni* n. vom Gebiet zwischen Dinder und Blauen Nil; J. v. Madarász, Ann. Mus. Nat. Hung. 1911, 341.
560. *Poliospiza collaris* n. von Gurra-Land; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 146.
561. *Poliospiza dimidiata* n. von Abessinien; J. v. Madarász, Orn. Mntsb. 1912, 45.
562. *Poliospiza elgonensis* n. vom Elgon; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1912, 17.
563. *Poliospiza erlangeri* n. vom Arussi-Gallaland; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 146.
564. *Poliospiza menachensis* n. von Yemen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 90.
565. *Poliospiza mennelli* n. von Rhodesien; Sharpe, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 62.
566. *Poliospiza monticola* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 8.
567. *Poliospiza pachyrhyncha* n. von Garre Liwin; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 146.
568. *Pseudacanthis* (n. g.) *yemenensis* n. von Yemen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 88. 89.

569. *Rhynchostruthus yemenensis* n. von Yemen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 112.
570. *Serinus angolensis hilgerti* n. vom südlichen Somaliland; Graf Zedlitz, Orn. Mnts. 1912, 76.
571. *Serinus angolensis somereni* n. von Uganda; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 29. 1912, 63.
572. *Serinus frommi* n. von der Gegend im Südosten des Tanganjika; K. Kothe, Orn. Mnts. 1911, 71.
573. *Serinus dorsostriatus harterti* n. von Süd-Somali; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1916, 47.
574. *Serinus leucopygius riggenbachi* n. von Senegambien; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 44.
575. *Serinus striolatus graueri* n. vom Ruwenzori; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 84.
576. *Spinus citrinelloides kikuyensis* n. von Kikuju, Kenia, Naiwaschasee; O. Neumann, Journ. Orn. 1905, 356.

Motacillidae.

577. *Anthus camerunensis* n. vom Kamerun-Pik; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 12. — [Fällt mit *A. rufulus camaroonensis* Shell. zusammen.]
578. *Anthus leggei* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 26.
579. *Anthus leucophrys angolensis* n. von Angola und Deutsch-Ostafrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 236. — [Von *A. leucophrys* nicht zu trennen.]
580. *Anthus leucophrys bohdorffi* n. vom Kongo; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 236.
581. *Anthus leucophrys omoensis* n. vom Omo; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 234. — [Nicht von *A. sordidus* Rüpp. zu trennen nach O. Grant, Ibis 1913, 587.]
582. *Anthus leucophrys saphiroi* n. von Harar; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 235.
583. *Anthus leucophrys zenkeri* n. von Kamerun; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 235.
584. *Anthus nicholsoni hararensis* n. von den Hararbergen; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 233.
585. *Anthus nicholsoni nyassae* n. von Uhehe bis Ungoni in Deutsch-Ostafrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 233.
586. *Anthus nivescens* n. von Kismaju im südlichen Somaliland; Reichenow, Orn. Mnts. 1905, 179.
587. *Charadriola* (n. g.) *singularis* n. vom Jipe-See; J. v. Madarász, Ann. Mus. Hung. 2. 1904, 396. — [Fällt mit *Tmetothylacus tenellus* Cab. zusammen.]
588. *Macronyx ascensi* n. vom Maerusee; T. Salvadori, Boll. Mus. Zool. Anat. Torino No. 570, 1907.

589. *Macronyx capensis colletti* n. von Natal; H. Schou, Orn. Mntsb. 1908, 119.
 590. *Motacilla clara* n. neuer Name für *M. longicauda* Rüpp.; Sharpe, Ibis 1908, 341.
 591. *Motacilla wellsi* n. von den Mfumbiru-Vulkanen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 30.

Alaudidae.

592. *Alaemon hamertoni* n. vom Somaliland; H. F. Witherby, Ibis 1905, 513.
 593. *Ammomanes phoenicura pallens* n. vom Sudan (Bajudasteppe); O. le Roi, Orn. Mntsb. 1912, 6.
 594. *Certhilauda albofasciata eriksoni* n. vom Owamboland; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 82.
 595. *Certhilauda albofasciata obscurata* n. von Benguella; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 83.
 596. *Certhilauda daviesi* n. von Ost-Griqualand; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 1911, 114.
 597. *Certhilauda falcirostris* n. von Port Nolloth, Klein-Namaqua; Reichenow, Journ. Orn. 1916, 161.
 598. *Certhilauda kalahariae* n. von der nördlichen Kalahari; W. R. Ogilvie-Grant, Ibis 1912, 375.
 599. *Galerida cristata alexanderi* n. von den Haussaländern; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 45.
 600. *Galerida cristata eritreae* n. von Eritrea; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1910, 59.
 601. *Galerida cristata somaliensis* n. vom nördlichen Somalia; Reichenow, Journ. Orn. 1907, 49.
 602. *Heteromirafru ruddi* neuer Name für *Heteronyx ruddi* Grant; C. H. B. Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 114.
 603. *Heteronyx ruddi* n. von Transvaal; C. H. B. Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 111.
 604. *Mirafra africana dohertyi* n. von Esarpment in Britisch-Ostafrika; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 93.
 605. *Mirafra africana harterti* n. von Süd-Ukamba bis Teita; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 45.
 606. *Mirafra chadensis* n. vom Tschadsee; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 89.
 607. *Mirafra cranbrooki* n. vom Ubangi und Uelle; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 88.
 608. *Mirafra hypermetra gallarum* n. vom Gallaland; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 84.
 609. *Mirafra meruensis* n. von der Kilimandscharo-Meru-Steppe; Y. Sjöstedt, Wiss. Ergeb. Kilimand. Exp. 1908, 137.
 610. *Mirafra poecilosterna jacksoni* n. von Kikuju; W. R. Ogilvie-Grant, Ibis 1913, 586.
 611. *Mirafra schillingsi* n. vom West-Kilimandscharo, Ostafrika; Reichenow, Journ. Orn. 1916, 163.

612. *Mirafra sobatensis* n. vom Sobat; H. Lynes, Bull. Br. O. C. 33. 1914, 129.
 613. *Mirafra strümpelli* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 191.
 614. *Spizocorys obbiensis* n. vom östlichen Somaliland; H. F. Witherby, Ibis 1905, 514.
 615. *Tephrocorys cinerea erlangeri* n. vom Hauaschgebiet; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 239.

Pyconotidae.

616. *Andropadus ansorgei* n. von Süd-Nigerien; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 10.
 617. *Andropadus fricki* n. von Endoto in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 25 1914, 4. — [Sehr zweifelhafte Art, von *A. insularis* wohl nicht zu trennen.]
 618. *Andropadus fricki kitungensis* n. von Kitunga in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 25, 1914, 4. — [Wie voriger von *A. insularis* wohl nicht zu trennen.]
 619. *Andropadus gracilirostris congensis* n. von Leopoldsville am Kongo; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 181.
 620. *Andropadus kagerensis* n. von Buddu, westlich des Viktoria Niansa; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 47.
 621. *Andropadus modestus* n. vom Semliki; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 160.
 622. *Andropadus roehli* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 181.
 623. *Bleda notata pallidior* n. von Tschintschoscho in Loango; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 180.
 624. *Bleda syndactyla ogowensis* n. vom Kamerun bis Kongo; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1914, 9.
 625. *Bleda woosnami* n. von Uganda; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 87.
 626. *Chlorocichla flaviventris meruensis* n. vom Meruwald in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 26, 1914, 3. — [Anscheinend von *Ch. f. mombasae* nicht zu trennen.]
 627. *Criniger barbatus ansorgeanus* n. von Süd-Nigeria; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 97.
 628. *Criniger swainsoni* n. von Gambia oder Senegal; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1914, 8.
 629. *Criniger sylvicultor* n. von Katanga im südöstlichen Kongo-Staat; S. A. Neave, Ann. Mag. N. H. (8.) 4. 1909, 130.
 630. *Phyllastrephus albicularis adametzi* n. von Bamenda in Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 181.
 631. *Phyllastrephus capensis intermedius* n. von Portugisisch-Ostafrika; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transv. Mus. 1911, 115.

632. *Phyllastrephus cerviniventris lönnbergi* n. von Tharaka in Britisch - Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 25, 1914, 2.
633. *Phyllastrephus chlorigula schusteri* n. vom Ngurugebirge; Reichenow, Orn. Mntsb. 1913, 161.
634. *Phyllastrephus dowashanus* n. vom Ngare-Dowasch; J. v. Madarász, Archiv. Zool. 1. No. 11, 1910, 176. — [Fällt mit *Ph. cabanisi sucosus* zusammen.]
635. *Phyllastrephus flavigollis adamauae* n. vom Ngendero-Gebirge in Nord-Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 94.
636. *Phyllastrephus graueri* n. vom Albert - Edward - See; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 13.
637. *Phyllastrephus icterinus sethsmithi* n. von Unjoro; E. Hartert und O. Neumann, Orn. Mntsb. 1910, 81.
638. *Phyllastrephus indicator congensis* n. vom Kongo; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 115.
639. *Phyllastrephus indicator lacuum* n. vom mittelafrikanischen Seengebiet; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 115.
640. *Phyllastrephus indicator togoensis* n. von Ober - Guinea; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 115.
641. *Phyllastrephus kilimandjaricus* n. vom Kilimandscharo; Y. Sjöstedt, Wissensch. Erg. Schwed. Kilimandj. Exp. 1908, 140.
642. *Phyllastrephus leucolaema camerunensis* n. von Duma in Süd-Kamerun; Reichenow, Journ. Orn. 1915, 128.
643. *Phyllastrephus lorenzi* n. von Moera (Mittelafrika); M. Sassi, Sitzb. Ak. Wien 12. Juni 1914 und Journ. Orn. 1915, 112.
644. *Phyllastrephus olivaceogriseus* n. vom Rugegewald in Mittelafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 47.
645. *Phyllastrephus placidus grotei* n. von Mikindano in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 8.
646. *Phyllastrephus placidus keniensis* n. vom Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 25, 1914, 2. — [Wohl nicht von *Ph. placidus* zu trennen.]
647. *Phyllastrephus placidus münsneri* n. von Sanyi in Mahenge, Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 181.
648. *Phyllastrephus schubotzi* n. vom Rugegewald; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 47. — [Fällt mit *Ph. kikuyuensis* zusammen.]
649. *Phyllastrephus strepitans fricki* n. vom Tana; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 25, 1914, 1. — [Augenscheinlich von *Ph. strepitans* nicht zu trennen.]
650. *Phyllastrephus ugandae* n. von Uganda; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 200. — [Diese Art ist mit *Ph. leucolaema* Sharpe noch genauer zu vergleichen.]
651. *Phyllastrephus zenkeri* n. von Bipindi in Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 180.
652. *Proshporocichla scandens acedis* n. vom Ogowe; H. C. Oberholser, Smiths. Misc. Coll. 48. No. 1588, 1905, 157.

653. *Pycnonotus barbatus harterti* n. vom Mossamedes; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1916, 71.
654. *Pycnonotus layardi fayi* n. von Britisch-Ostafrika östlich des Victoria Niansa; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911, 7. — [Von *P. layardi micrus* nicht zu trennen. — Siehe auch E. Lönnberg, Arkiv Zool. 9. No. 14, 1915, 21.]
655. *Pycnonotus layardi micrus* n. von Britisch- und Deutsch-Ostafrika; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. Nat. Mus. 28. 1905, 891. — [Südafrikanische Vögel des *P. layardi* sind im allgemeinen größer als ostafrikanische, wie das bei so vielen Arten der Fall ist, doch gehen die Formen so ineinander über, dass es schwer ist, eine Grenze zwischen der größeren südafrikanischen Form *layardi* und der kleineren ostafrikanischen *micrus* zu ziehen. — Siehe auch E. Lönnberg, Arkiv Zool. 9. No. 14, 1915, 21.]
656. *Pycnonotus layardi pallidus* n. von Boror in Portugiesisch-Ostafrika; A. Roberts, Journ. S. Afr. Orn. Un. 8. 1912, 49.
657. *Pycnonotus layardi peasei* n. von Kitunga in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911, 8. — [Zweifelhafte Form, bedarf der Bestätigung.]
658. *Pycnonotus layardi phaeocephalus* n. von Uganda; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911, 8. — [Sehr zweifelhafte Form, die der Bestätigung bedarf.]
659. *Pycnonotus tricolor ngamii* n. vom Ngamisee; W. R. Ogilvie-Grant, Ibis 1912, 391.
660. *Pycnonotus tricolor tanganjicae* n. vom Gebiet zwischen Victoria Niansa, Albert-Edward- und Kiwu-See; Reichenow, Wissensch. Erg. Z.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 346.
661. *Stelgidillas hypochloris* n. von Toro in Mittelafrica; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 20.
662. *Stelgidocichla latirostris pallida* n. vom Berg Gargues in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 25, 1914, 5.
663. *Stelgidocichla latirostris saturata* n. vom Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 25, 1914, 6. — [Dass in den Gebirgen Britisch - Ostafrikas gleich zwei Abarten des *Andropadus latirostris* vorkommen sollten, erscheint recht auffällig. Da der Autor der Art, wie aus anderen Beispielen hervorgeht, das Bestreben hat, möglichst viele Arten zu beschreiben und dabei die Veränderlichkeit der Eigenart nach Alter, Jahreszeit und Geschlecht nicht berücksichtigt, ist Nachprüfung der Formen dringend erforderlich.]
664. *Xenocichla flavigollis soror* n. von Kamerun bis Kongo; O. Neumann, Orn. Mnts. 1914, 9. — [Fällt mit *Phyllostrephus flavigula* (Cab.) zusammen.]

Zosteropidae.

665. *Zosterops abyssinica socotrana* n. von Sokotra; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 59.
666. *Zosterops bayeri* n. vom Elgon; E. Lönnberg, Arkiv f. Zool. 11. No. 5, 1917.
667. *Zosterops genderuensis* n. vom Genderugebirge in Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 192.
668. *Zosterops phyllicus* n. von Nord-Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 192.
669. *Zosterops poliogastra erlangeri* n. von Schoa; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 60.
670. *Zosterops schubotzi* n. vom Ruwenzori; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 160.
671. *Zosterops senegalensis fricki* n. vom Thikaflus in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 20, 1913, 6.
672. *Zosterops strümpelli* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 191.
673. *Zosterops usambarae* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1909, 42.
674. *Zosterops vaalensis* n. von Transvaal; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transv. Mus. 1911, 115.
675. *Zosterops virens garguensis* n. vom Gargues, nördlich des Guasso Njiro in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 20, 1913, 7.
676. *Zosterops virens* var. *reichenowi* n. von Baraka, Belgisch-Kongo; A. Dubois, Rev. Franç. d'Orn. 3. 1911, 18.

Nectariniidae.

677. *Anthotheptes carruthersi* n. vom Westufer des Tanganjika; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 106. — [Vergl. Reichenow, Wiss. Ergeb. Z.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Meckl. 1911, 348.]
678. *Anthreptes collaris elachior* n. von Mombas; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 14. 1910, 5. — [Von *A. collaris* nicht zu trennen, nur Spielart.]
679. *Anthreptes longmari angolensis* n. von Angola; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1906, 6. — [Vergl. Reichenow, Wiss. Ergeb. Z.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 348 u. Orn. Mntsb. 1916, 25.]
680. *Anthreptes longmari haussarum* n. von Togo; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1906, 6. — [Vergl. Reichenow, Wiss. Ergeb. Z.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 348.]
581. *Anthreptes longmari neumanni* n. von Süd-Somali; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1916, 75.
682. *Anthreptes longmari nyassae* n. vom Niassa- und Maschona-Land; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1906, 7. — [Vergl. Reichenow, Wiss. Ergeb. Z.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 348.]

683. *Anthreptes reichenowi* n. von Beira in Portugiesisch-Ostafrika; J. W. B. Gunning, Ann. Transvaal Mus. I. 1909, 173.
684. *Anthreptes rubritorques* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 181.
685. *Chalcomitra adamauae* n. von Adamaua; Reichenow, Journ. Orn. 1915, 127.
686. *Chalcomitra borgerti* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 182.
* *Chalcomitra changawensis* s. *Cyanomitra changawensis*.
* *Chalcomitra olivacea daviesi* s. unten *Cinnyris olivaceus daviesi*.
687. *Chalcomitra verticalis niassae* n. vom Niassagebiet; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 174.
688. *Chalcomitra verticalis tanganjicae* n. vom Urwald westlich des Tanganjika; Reichenow, Journ. Orn. 1915, 128.
689. *Cinnyris afra graueri* n. von den westlichen Kiwuvulkanen; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 55. — [Fällt mit *Cinnyris schubotzi* Rchb. zusammen.]
690. *Cinnyris batesi* n. von Kamerun; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 19.
691. *Cinnyris chloropygius* var. *pauwelsi* n. von Baraka im Norden des Tanganjika; A. Dubois, Rev. Franç. d'Orn. 3. 1911, 17.
692. *Cinnyris chloropygius uellensis* n. vom Uelle; Reichenow, Journ. Orn. 1912, 321.
693. *Cinnyris decorsei* n. vom Tschadsee; E. Oustalet, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1904, 536.
694. *Cinnyris genderuensis* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 8.
695. *Cinnyris habessinicus alter* n. vom nördlichen Somaliland; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1906, 7.
696. *Cinnyris kempi* n. von Sierra Leone; W. R. Ogilvie-Grant, Trans. Zool. Soc. London 19. 1910, 329.
697. *Cinnyris kruensis* n. von Liberia und Goldküste; D. A. Bannerman, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 23.
698. *Cinnyris manoensis* n. von Mano, westlich des Niassasees; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 200.
699. *Cinnyris marginatus* n. vom oberen Kongo; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 106.
700. *Cinnyris mariquensis kiwuensis* n. vom Kiwusee; A. Berger, Orn. Mntsb. 1907, 181. — [Vergl. Reichenow, Wissenschaftl. Ergeb. Z.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 352.]
701. *Cinnyris mediocris keniensis* n. vom Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 14, 1910, 4.
702. *Cinnyris melanocenion* n. von Tibati; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 192.
703. *Cinnyris neergaardi* n. von Inhambane; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 93.
704. *Cinnyris obscurus neglectus* n. von Ukamba, Taita, Sansibar; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 249.

705. *Cinnyris olivaceus daviesi* n. von Pondoland; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 11.
706. *Cinnyris pembae* n. von der Insel Pemba; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 180.
707. *Cinnyris schubotzii* n. vom Rugegewald; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 47.
708. *Cinnyris schillingsi* n. vom Gebiet westlich des Kilimandscharo; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 154.
709. *Cinnyris seimundi* n. von der Goldküste und Gabun bis zum Semliki; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 19.
710. *Cinnyris sheppardi* n. von Lamu in Britisch-Ostafrika; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 27. 1910, 6.
711. *Cinnyris tanganyicae* n. vom Westufer des Tanganjika; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 105.
712. *Cyanomitra changamwensis* n. von Mombas, Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 14, 1910, 4.
713. *Hedydipna platura adiabonensis* n. vom nordwestlichen Abessinien; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1910, 59.
714. *Helionympha raineyi* n. von Sotik in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 28, 1911, 1.
715. *Nectarinia adolfi-friederici* n. vom Kiwusee; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 81. — [Vergl. Wiss. Ergeb. Z.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Mecklenb. 1911, 352.]
716. *Nectarinia arturi* n. von Südost-Rhodesien; P. L. Sclater, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 30.
717. *Nectarinia chloronota* n. vom Ruwenzori; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 90.
718. *Nectarinia congensis* n. von Boma am unteren Kongo; E. D. van Oort, Orn. Mntsb. 1910, 54.
719. *Nectarinia dartmouthi* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 117.
720. *Nectarinia johnstoni idius* n. vom Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 14, 1910, 3. — [Fällt anscheinend mit *N. salvadorii* Shell. zusammen.]

Certhiidae.

721. *Amaurocichla kempti* n. von Sierra Leone; Sharpe, Bull. Br. O. C. 15. 1905, 38.
722. *Salpornis riggenbachi* n. von Nord-Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1909, 140.
723. *Salpornis salvadorii abyssinica* n. von Süd-Abessinien; W. R. Ogilvie-Grant, Ibis 1913, 597. — [Fällt mit *S. spilonota erlangeri* Neum. zusammen.]
724. *Salpornis salvadorii occidentalis* n. von Nord-Nigerien; St. Clarke, Bull. Br. O. C. 33. 1914, 94.
725. *Salpornis spilonota erlangeri* n. von Kaffa; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1907, 52.

Paridae.

726. *Anthoscopus ansorgei* n. von Benguella; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 15. 1905, 74.
727. *Anthoscopus colomanni* n. von Ngare-Dobasch; J. v. Madarász, Archiv. Zool. I. 1910, 177.
728. *Anthoscopus robertsi* n. von Portugiesisch-Ostafrika; J. W. B. Gunning, Ann. Transvaal Mus. I. 1909, 233.
729. *Anthoscopus roccatii* n. vom Ruwenzori; T. Salvadori, Boll. Mus. Zool. Anat. Torino 1906, 542.
730. *Anthoscopus rothschildi* n. von Britisch-Ostafrika; O. Neumann, Journ. Orn. 1907, 597.
731. *Anthoscopus sharpei* n. von Usambiro; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 15. 1905, 75.
732. *Melaniparus afer fricki* n. von Dire Daua in Abessinien; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 20, 1913, 5.
733. *Parisoma buryi* n. von Yemen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 87.
734. *Parisoma holospodium* n. von Süd-Kamerun; G. L. Bates, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 27.
735. *Parus brunnescens* n. von Kubub in Namaland; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 154.
736. *Parus fasciiventer tanganjicae* n. vom Gebiet westlich des Tanganjika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1909, 42.
737. *Pholidornis denti* n. vom östlichen Kongowald; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 41.

Sylviidae.

738. *Accentor fagani* n. von Yemen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 88.
739. *Acrocephalus cinnamomeus* n. vom Nordufer des Albert-Edward-Sees; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 161.
740. *Alethe akeleyae* n. von Britisch-Ostafrika; N. Dearborn, Field Mus. Chicago Publ. 135. 1909, 170.
741. *Alethe carruthersi* n. von Toro; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 25.
742. *Alethe fülleborni usambarae* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 182.
743. *Alethe kikuyuensis* n. von Kikuju; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 27. 1910, 7.
744. *Alethe montana* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 30.
745. *Alethe polioparea* n. vom Uelle; Reichenow, Journ. Orn. 1912, 321.
746. *Alethe uellensis* n. vom Uelle; Reichenow, Journ. Orn. 1912, 321.
747. *Alethe woosnami* n. von Irumu, nordwestlich des Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 24.

748. *Apalis adolfi-friedericici* n. vom Rugegewald; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 46. — [Fällt mit *A. personata* Sharpe zusammen nach Reichenow, Wiss. Ergeb. Z.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Meckl. 1911, 362.]
749. *Apalis affinis* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 116.
750. *Apalis ansorgei* n. von Angola; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 15. 1905, 95. — [Fällt mit *Eremomela atricollis* Boc. zusammen nach Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 94.]
751. *Apalis catiodes* n. vom Rugegewald; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 46. — [Fällt mit *A. ruwenzorii* Jacks. zusammen nach Reichenow, Wiss. Ergeb. Z.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Meckl. 1911, 362.]
752. *Apalis chirindensis* n. von Gasaland; G. E. Shelley, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 126.
753. *Apalis claudaei* n. vom Kapland; W. L. Sclater, Bull. Br. O. C. 27. 1910, 15.
754. *Apalis dargensis* n. von Natal; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 3. 1911, 117.
755. *Apalis denti* n. von Uganda; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 86.
756. *Apalis flavida malensis* n. vom Stephanie-See; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1905, 78.
757. *Apalis flavida neumanni* n. von Süd-Somaliland; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1916, 89.
758. *Apalis flaviventris* n. von Pretoria; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 3. 1911, 117.
759. *Apalis goslingi* n. vom Uelle; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 89.
760. *Apalis griseiceps uluguru* n. von den Ulugurubergen; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1914, 10.
761. *Apalis pulchra polionota* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 7.
762. *Apalis rhodesiae* n. von Matebeleland; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 3. 1911, 115.
763. *Apalis ruddi* n. von Inhambane; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 93.
764. *Apalis ruficeps* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 119.
765. *Apalis rufogularis kamerunensis* n. von Süd-Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1912, 28.
766. *Apalis spelunkensis* n. vom nördlichen Transvaal; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 3. 1911, 116.
767. *Apalis thescela* n. vom Kilimandscharo; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. Nat. Mus. 28. 1905, 904. — [Die Beziehung dieser Art zu *A. murina* Rehw. bleibt festzustellen.]
768. *Apalis venustus* n. von Pondoland; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 3. 1911, 116.

769. *Argya keniana* n. vom Kenia; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 27. 1910, 7.
770. *Argya rubiginosa emini* n. von Unjamwesi; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 30.
771. *Bathmedonia talboti* n. vom Uelle; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 46.
772. *Bradypterus alfredi albicrissalis* n. vom Ruwenzori; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1914, 10.
773. *Bradypterus babaeculus fraterculus* n. von Eskarpment in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 20, 1913, 3.
774. *Bradypterus barakae* neuer Name für *B. rufescens* (Sharpe); Sharpe, Ibis 1906, 546.
775. *Bradypterus bedfordi* n. vom Ngamisee; W. R. Ogilvie-Grant, Ibis 1912, 382.
776. *Bradypterus brachypterus centralis* n. von Kikuju bis Kiwusee; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 55.
777. *Bradypterus camerunensis* n. vom Kamerun-Pik; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 19.
778. *Bradypterus carpalis* n. vom Belgischen Kongo; Chapin, Bull. Amer. Mus. N. H. 35. 1916, 27.
779. *Bradypterus cinnamomeus pallidior* n. von den Gebirgen westlich des Tanganjika; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1914, 10.
780. *Bradypterus elgonensis* n. vom Elgon; J. v. Madarász, Orn. Mntsb. 1912, 175.
781. *Bradypterus graueri* n. von den westlichen Kiwu-Vulkanen; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 56.
782. *Bradypterus macrorhynchus* n. von Leikipia in Britisch-Ostafrika; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 27. 1910, 8.
783. *Bradypterus mariae* n. von Kiboscho am Kilimandscharo; J. v. Madarász, Ann. Mus. Hung. 1905, 401.
784. *Bradypterus mildbraedi* n. vom Ruwenzori; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 161. — [Der Name war ursprünglich irrtümlich *mildbreadi* geschrieben!]
785. *Bradypterus msiri* n. von Katanga; S. A. Neave, Bull. Br. O. C. 25. 1909, 25.
786. *Bradypterus pondoensis* n. von Pondoland; A. Haagner, Journ. S. Afr. Orn. Un. 5. 1909, 90.
787. *Bradypterus sjöstedti* n. vom Meruberg und Kilimandscharo; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1914, 9.
788. *Bradypterus usambarae* n. von Usambara, Ostafrika; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 391.
789. *Burnesia bairdi obscura* n. vom Albert - Edward - und Kiwu-See; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 13.
790. *Calamocichla ansorgei* n. von Angola; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 52.
791. *Calamocichla ansorgei nilotica* n. von Wadelai; O. Neumann, Novit. Zool. 1908, 246.

792. *Calamocichla chadensis* n. vom Tschadsee; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 63.
793. *Calamocichla leptorhyncha nuerensis* n. vom oberen Weissen Nil; H. Lynes, Bull. Br. O. C. 33. 1914, 130.
794. *Calamocichla neglecta* n. vom Tschadsee; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 33.
795. *Calamocichla palustris* n. vom Massailand; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 391.
796. *Calamocichla zuluensis* n. von Sululand bis Süd-Mossambik; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 96.
797. *Calamonastes fasciolatus pallidior* n. von Benguella; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 97.
798. *Calamonastes katangae* n. von Katanga im südöstlichen Kongostaat; S. A. Neave, Ann. Mag. N. H. (8.) 4. 1909, 130.
799. *Calamonastes simplex erlangeri* n. von Nord-Somali und Abessinien; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1912, 78.
800. *Calamonastes simplex hilgerti* n. von Gurra-Land; Graf Zedlitz, Orn. Mntsb. 1912, 78.
801. *Calamonastes stigmosus* n. von Deutsch - Südwestafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 8.
802. *Callene aequatorialis* n. von Lumbwa; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 46.
803. *Callene lopezi* n. vom Uelle; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 46.
804. *Camaroptera brachyura bororensis* n. von Portugiesisch-Ostafrika; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 1911, 117.
805. *Camaroptera brevicaudata pulchra* n. vom nördlichen Angola bis Tanganjika; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 331.
806. *Camaroptera brevicaudata rothschildi* n. von Gabun; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 331.
807. *Camaroptera caniceps* n. von Süd-Kamerun; Reichenow, Journ. Orn. 1915, 128.
808. *Camaroptera griseoviridis abessinica* n. von Eritrea bis zum nördlichen Somaliland; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 338.
809. *Camaroptera griseoviridis harterti* n. von Nord-Angola; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 342.
810. *Camaroptera griseoviridis noomei* n. von Nord-Transvaal; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 1911, 117.
811. *Camaroptera griseoviridis sharpei* n. von Südwestafrika; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 343.
812. *Camaroptera pileata littoralis* n. von Mikindani in Deutsch-Ostafrika; H. Grote, Orn. Mntsb. 1911, 163.
813. *Camaroptera superciliaris kamerunensis* n. von Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1912, 29.
814. *Camaroptera superciliaris ugandae* n. von Uganda; St. Clarke, Bull. Br. O. C. 33. 1914, 136.

815. *Cercomela melanura erlangeri* n. von Süd-Arabien; O. Neumann u. Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1913, 364.
816. *Cercomela scotocerca enigma* n. von Somali- und Gallaland; O. Neumann u. Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1913, 368.
817. *Cichladusa guttata mülleri* n. von Süd-Somali; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1916, 108.
818. *Cisticola adamauae* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 175.
819. *Cisticola adametzi* n. von Bamenda in Nord-Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 175.
820. *Cisticola alleni* n. vom Meru und Guaso Njiro; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 25, 1911, 3.
821. *Cisticola ansorgei* n. von Benguella; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 114.
822. *Cisticola belli* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 71.
823. *Cisticola butleri* n. vom Gazellenfluss; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 17.
824. *Cisticola cameronensis* n. von Ost-Kamerun; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 191.
825. *Cisticola carruthersi* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 23. 1909, 94.
826. *Cisticola cinnamomeiceps* n. von Matebele; A. Haagner, Ann. Transvaal Mus. 1. 1909, 197.
827. *Cisticola deserticolor* n. von Kordofan; O. v. Wettstein, Ak. Wissensch. Wien Mai 1916.
828. *Cisticola difficilis* n. von Lakiondu, nördlich des Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 36. No. 25, 1911, 5.
829. *Cisticola elgonensis* n. vom Elgon; J. v. Madarász, Orn. Mntsb. 1913, 7.
830. *Cisticola floweri* n. von Sennar; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 27. 1910, 12.
831. *Cisticola frater* n. von Damaraland; Reichenow, Journ. Orn. 1916, 162.
832. *Cisticola garuensis* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 7.
833. *Cisticola harrisoni* n. von Britisch-Ostafrika; W. Stone, Proc. Ac. Philad. 1905, 771.
834. *Cisticola heterophrys* n. von Britisch-Ostafrika; H. C. Oberholser, Ann. Carnegie Mus. 3. 1906, 496. — [Fällt augenscheinlich mit *C. chiniana* zusammen.]
835. *Cisticola hypoxantha reichenowi* n. von Mombas; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 25. 1911, 6.
836. *Cisticola isabellina* n. von Songea in Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 60.
837. *Cisticola kalahari* n. von Britisch-Betschuanenland; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 25. 1910, 121.

838. *Cisticola kmunkei* n. von Buhungu am Elgon; J. v. Madarász, Orn. Mnts. 1912, 175.
839. *Cisticola münzneri* n. von Mahenge, Deutsch-Ostafrika; Reichenow, Journ. Orn. 1916, 163.
840. *Cisticola natalensis inexpectata* n. von Schoa; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 268.
841. *Cisticola mystica* n. von Pretoria; A. Roberts, Journ. S. Afr. Orn. Union 9. 1913, 106.
842. *Cisticola petrophila* n. von Nord-Nigerien; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 104.
843. *Cisticola pretoriae* n. von Pretoria; A. Haagner, Ann. Transvaal Mus. 1. 1909, 230.
844. *Cisticola priniooides kilimensis* n. vom Kilimandscharo; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 25, 1911, 1. — [Nach mir vorliegendem Material sind Vögel vom Kilimandscharo von der typischen Form *C. priniooides* nicht zu trennen.]
845. *Cisticola priniooides wambugensis* n. von Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 60. No. 20, 1913, 1.
846. *Cisticola pussilla* n. von Portugiesisch-Ostafrika; J. W. B. Gunning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 1911, 118.
847. *Cisticola pyrrhomitra* n. von Gallaland; Reichenow, Journ. Orn. 1916, 162.
848. *Cisticola robusta schraderi* n. von Nord-Abessinien; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 265.
849. *Cisticola ruficapilla bororensis* n. von Portugiesisch-Ostafrika A. Roberts, Journ. S. Afr. Orn. Un. 1912, 54.
850. *Cisticola schusteri* n. von den Ulugurubergen; Reichenow, Journ. Orn. 1913, 557.
851. *Cisticola simplicissima* n. von Benguella; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 47.
852. *Cisticola slatini* n. von Kordofan; O. v. Wettstein, Ak. Wissensch. Wien Mai 1916.
853. *Cisticola soror* n. vom Kilimandscharo, Ostafrika; Reichenow, Journ. Orn. 1916, 162.
854. *Cisticola stoehri* n. von Rhodesien; S. A. Neave, Manchester Mem. Proc. Lit. Phil. Soc. 51. No. 10, 1907, 65. — [Fällt augenscheinlich mit *C. angusticauda* Rchb. zusammen.]
855. *Cisticola strangei kapitensis* n. von Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 25, 1911, 4.
856. *Cisticola subruficapilla aequatorialis* n. vom Naiwascha-See; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 25, 1911, 2. — [Fällt vielleicht mit *C. semifasciata* Rchb. zusammen.]
857. *Cisticola subruficapilla borea* n. von Lado; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 25, 1911, 3.
858. *Cisticola sudanica* n. vom Blauen Nil; J. v. Madarász, Ann. Mus. Nat. Hung. 9. 1911, 340. — [Fällt vielleicht mit *C. floweri* Hart. zusammen.]

Vogelarten des afrikanischen Faunengebiets, etc.

105

859. *Cisticola ugandae* n. von Nord-Uganda; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 13.
860. *Cisticola vulpina* n. von Portugiesisch-Guinea; Reichenow, Orn. Mntsb. 1911, 54. 73.
861. *Cisticola wellsi* n. vom Gazellenfluß; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1907, 17.
862. *Cisticola woosnami* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 72. — [Nach O. Grant (Trans. Zool. Soc. London 19. 1910, 349) fällt die Art mit *C. emini* zusammen; indessen widerspricht die Beschreibung dieser Annahme.]
863. *Cisticola zedlitzii* n. von Eritrea; Reichenow, Orn. Mntsb. 1909, 42.
864. *Cossypha albicapilla genderuensis* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 176.
865. *Cossypha bocagei albimentalis* n. vom Urwald westlich des Tanganjika; M. Sassi, Sitzb. Ak. Wien 12. Juni 1914 u. Journ. Orn. 1915, 117.
866. *Cossypha caffra namaquensis* n. von Groß-Namaqua; W. L. Sclater, Ibis 1911, 415.
867. *Cossypha haagneri* n. von Pondoland; J. W. B. Gunning, Ann. Transvaal Mus. 1. 1909, 174.
868. *Cossypha heuglini occidentalis* n. vom Lufuku; Reichenow, Journ. Orn. 1909, 108.
869. *Cossypha natalensis garguensis* n. vom nördlichen Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 20, 1913, 2. — [Die Form ist nicht aufrecht zu halten, nur Spielart. Rchw.]
870. *Cossypha natalensis intensa* n. von Taweta in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61, No. 20, 1913, 2. — [Nicht als Form zu trennen, nur Spielart.]
871. *Cossypha nigriceps* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 7.
872. *Cossypha roberti rufescens* n. vom Albert-Eduard-See; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 9.
873. *Cossypha semirufa saturatior* n. von den südäthiopischen Seen; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1906, 7.
874. *Cossypha somereni* n. von Uganda; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 31. 1912, 3.
875. *Crateropus carruthersi* n. vom oberen Kongo; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 106.
876. *Crateropus cordofanicus* n. von Kordofan; A. L. Butler, Ibis 1905, 330. T. 7.
877. *Crateropus grisescens* n. vom Gebiet westlich des Victoria Niausa (Mpororo); Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 47.
878. *Crateropus hypoleucus rufuensis* n. von Usequa; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1906, 148.
879. *Crateropus jardinei hypobrunneus* n. vom Uelle; Reichenow, Journ. Orn. 1915, 129.

880. *Crateropus plebeius gularis* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mnts. 1910, 7.
881. *Crateropus plebeius kikuyuensis* n. von Kikuju; O. Neumann, Orn. Mnts. 1906, 7. — [Fällt mit *C. hypostictus* Cab. Rch. zusammen.]
882. *Crateropus plebeius permistus* n. vom Senegal; O. Neumann, Orn. Mnts. 1906, 146.
883. *Crateropus reichenowi* n. vom Ngare-Dobasch; J. v. Madarász, Arch. Zool. I. 1910, 177.
884. *Dryodromas pearsoni* n. von Katanga im südöstlichen Kongo-staat; S. A. Neave, Ann. Mag. N. H. (8.) 4. 1909, 130.
885. *Eminia lepidus hypochlorus* n. von Wambugu in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911, 10. — [Die Form ist nicht zu trennen; die angeblichen Unterschiede sind nicht stichhaltig.]
886. *Eremomela crawfurdi* n. von Sotik; St. Clarke, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 43.
887. *Eremomela elegans abyssinica* n. vom Omo in Südwest-Abessinien; D. A. Bannerman, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 38.
888. *Erythracus* [?] *swynnertonii* n. von Gasaland; G. E. Shelley, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 125.
889. *Erythropygia collsi* n. vom Uelle; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 46.
890. *Erythropygia hamertoni* n. vom Somaliland; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 24.
891. *Erythropygia paena benguellensis* n. von Benguella; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 96.
892. *Erythropygia paena damarensis* n. von Omaruru; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 96.
893. *Erythropygia reichenowi* n. von Angola; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 95.
894. *Euprinodes nigrescens* n. vom Ruwenzori; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 90. — [Siehe auch E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 95.]
895. *Geocichla batesi* n. von Süd-Kamerun; Sharpe, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 36; Ibis 1908 T. 3.
896. *Geocichla camaronensis* n. von Süd-Kamerun; Sharpe, Ibis 1905, 472.
897. *Geocichla gurneyi oberländeri* n. von Beni (östlicher Kongo-wald); M. Sassi, Sitzb. Ak. Wien 12. Juni 1914 u. Journ. Orn. 1915, 115.
898. *Geocichla gurneyi raineyi* n. vom Mbolololoberg in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 10, 1913, 4. — [Zweifelhafte Form. Soll der *G. g. otomitra* ähnlich sein, über die Abweichung ist aber nichts angegeben.]
899. *Geocichla gurneyi tanganjicae* n. vom Urwald westlich des Tanganjika; M. Sassi, Sitzb. Ak. Wien 12. Juni 1914 u. Journ. Orn. 1915, 116.

Vogelarten des afrikanischen Faunengebiets, etc.

107

900. *Geocichla piaggiae keniensis* n. vom Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 10, 1913, 3.
901. *Geocichla princei graueri* n. von Moera (östlicher Kongowald); M. Sassi, Sitzb. Ak. Wien 12. Juni 1914 u. Journ. Orn. 1915, 113.
902. *Graueria vittata* n. vom Albert-Edward- und Kiwu-See; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 8.
903. *Heliolais kirbyi* n. von Portugiesisch-Ostafrika; A. Haagner, Ann. Transvaal Mus. 1. 1909, 233.
904. *Hemipteryx minuta* n. von Nord-Transvaal; J. W. B. Gunning, Ann. Transvaal Mus. 1. 1909, 174.
905. *Lioptilus rufocinctus* n. vom Rugegewald; Hon. W. Rothschild, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 6.
906. *Luscinia golzi* bei Chartum nachgewiesen; A. L. Butler, Ibis 1908, 233.
907. *Macrosphenus griseiceps* n. von Mikindani in Deutsch-Ostafrika; H. Grote, Orn. Mntsb. 1911, 162.
908. *Macrosphenus leoninus* n. von Sierra Leone; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 46. — [Ist Jugendform von *M. flaviicans* nach O.-Grant, Bull. Br. O. C. 25. 1910, 85.]
909. *Melocichla mentalis adamauae* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 175.
910. *Merula johnstoni* n. von Uganda; Sharpe, Ibis 1906, 543.
911. *Monticola cyanus tenuirostris* Johansen in Abessinien nachgewiesen; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1911, 78.
912. *Monticola pretoriae* n. von Pretoria; J. W. B. Guaning u. A. Roberts, Ann. Transvaal Mus. 3. 1911, 118.
913. *Neocossyphus granti* n. vom Uelle; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 15.
914. *Neocossyphus praepectoralis* n. von Toro; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 90.
915. *Neocossyphus rufus gabonensis* n. vom Ogowe; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 77.
916. *Notiocichla* n. g. Typ.: *Sylvia baeticata* Vieill.; H. C. Oberholser, Proc. Un. St. N. M. 28. 1905, 900.
917. *Oenanthe yemenensis* n. von Yemen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 87.
918. *Penthalaea albifrons pachyrhyncha* n. vom Omo; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1906, 8.
919. *Penthalaea macmillani* n. vom Omogebiet; Sharpe, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 126.
920. *Phyllanthus czarnikowi* n. vom oberen Kongo; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 40.
921. *Pinarochroa rudolphi* n. vom Elgon; J. v. Madarász, Orn. Mntsb. 1912, 175.
922. *Pinarochroa sordida djamjamensis* n. von Djamjam; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 291.

923. *Pinarochroa sordida erlangeri* n. vom Gara-Mulata; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 25.
924. *Pinarochroa sordida schoana* n. von Schoa; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 290.
925. *Pinarornis rhodesiae* n. von Rhodesien; Sharpe, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 110.
926. *Planesticus helleri* n. vom Mbololoberg in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 10, 1913, 1.
927. *Planesticus olivaceus polius* n. vom Lololokui-Berg in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 10, 1913, 2.
928. *Pogonocichla cucullata helleri* n. vom Mbololoberg in Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 61. No. 20, 1913, 1. — [Zweifelhafte Form, bedarf der Bestätigung.]
929. *Pogonocichla cucullata keniensis* n. von Kenia; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911, 9. — [Zweifelhafte Form, bedarf der Bestätigung.]
930. *Pratincola torquata orientalis* n. von Kapland bis Niassaland und Angola; W. L. Sclater, Ibis 1911, 409.
931. *Prinia gracilis yemenensis* n. von Süd-Arabien; E. Hartert, Vögel paläarkt. Fauna Heft 5, 1909, 609.
932. *Prinia intermedia* n. vom Guasso-Njiro; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 27. 1910, 7.
933. *Prinia metopias* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 30.
934. *Saxicola campicolina* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 175.
935. *Saxicola hawkeryi* n. vom Sudan; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 94.
936. *Schoenicola brunneiceps* n. von Uganda; Reichenow, Orn. Mntsb. 1907, 172.
937. *Sphenoeacus tranvaalensis* n. von Nordost-Transvaal; C. Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 92.
938. *Stiphrornis mabirae* n. von Uganda; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 25. 1910, 85.
939. *Sylvia oliviae* n. vom Tschadsee; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 15.
940. *Sylviella batesi* n. von Süd-Kamerun; Sharpe, Ibis 1908, 319.
941. *Sylviella chubbi* n. von Nordwest-Rhodesien; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 27. 1910, 10.
942. *Sylviella denti* n. vom Westen des Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 25.
943. *Sylviella distinguenda* n. vom Ngare-Dobasch; J. v. Madarász, Arch. Zool. 1. 1910, 177.
944. *Sylviella hardyi* n. von Sierra Leone; D. A. Bannerman, Bull. Br. O. C. 29. 1911, 23.

945. *Sylviella lowei* n. von St. Paul de Loanda; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 27. 1911, 105.
946. *Sylviella oliviae* n. von Tschadsee; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 16.
947. *Sylvietta ansorgei* n. von Angola; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 97.
948. *Sylvietta brachyura hilgerti* n. von Nord-Somali und Ost-Abessinien; Graf Zedlitz, Journ. Orn. 1916, 99.
949. *Sylvietta brachyura nilotica* n. vom Weissen Nil; O. Neumann, Journ. Orn. 1906, 279. — [Fällt mit *S. micrura* Rüpp. zusammen.]
950. *Sylvietta carnapi dilutior* vom Ruwenzori; Reichenow, Orn. Mntsb. 1916, 154.
951. *Sylvietta epipolia* n. von Adamaua; Reichenow, Orn. Mntsb. 1910, 7.
952. *Sylvietta neumanni* n. vom Gebiet westlich des Tanganjika; Hon. W. Rothschild, Bull. Br. O. C. 23. 1908, 42.
953. *Sylvietta rufescens ochrocara* n. von Damaraland; H. C. Oberholser, Smiths. Misc. Coll. 47. 1905, 373. — [Fällt augenscheinlich mit *S. flecki* Rehw. zusammen.]
954. *Sylvietta whytei loringi* n. von Britisch-Ostafrika; E. A. Mearns, Smiths. Misc. Coll. 56. No. 20, 1911, 11. — [Bedarf der Bestätigung.]
955. *Sylvietta whytei* var. *pallidior* n. von Mikindani in Deutsch-Ostafrika; H. Grote, Orn. Mntsb. 1911, 163.
956. *Tarsiger elgonensis* n. vom Elgon; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 27. 1911, 57.
957. *Tarsiger eurydesmus* n. vom Rugegewald; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 48. — [Fällt mit *T. ruwenzorii* O. Grant zusammen nach Reichenow, Wiss. Ergeb. Z.-Afr.-Exp. d. Herz. zu Meckl. 1911, 374.]
958. *Tarsiger johnstoni montanus* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1906, 172.
959. *Tarsiger ruwenzorii* n. vom Ruwenzori; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 19. 1906, 33.
960. *Tarsiger stellatus transvaalensis* n. von Woodbush, Transvaal; A. Roberts, Journ. S. Afr. Orn. Un. 8. 1912, 21.
961. *Thamnolaea claudi* n. vom Tschad-Gebiet; B. Alexander, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 124. — [Ist ♀ von *Th. coronata*.]
962. *Thamnolaea cinnamomeiventris usambarae* n. von Usambara; O. Neumann, Orn. Mntsb. 1914, 11.
963. *Thamnolaea coronata kordofanensis* n. von Kordofan; O. v. Wettstein, Ak. Wissensch. Wien Mai 1916.
964. *Turdinus barakae* n. von Toro; F. J. Jackson, Bull. Br. O. C. 16. 1906, 90.
965. *Turdinus moloneyanus iboensis* n. von Süd-Nigera; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 84.

110 Ant. Reichenow: Vogelarten des afrikanischen Faunengebiets, etc.

966. *Turdinus phoebei* n. von Unter-Nigerien; R. Kemp, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 111.
 967. *Turdinus pyrrhopterus kivuensis* n. von den westlichen Kiwu-vulkanen; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 55. — [Sonderung der Form nicht haltbar nach O.-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 60.]
 968. *Turdinus stictigula* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1906, 10.
 969. *Turdinus tanganjicae* n. vom Urwald westlich des Tanganjika; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 391.
 970. *Turdus albipectus* n. von Mboga südlich des Albert-Sees; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 191.
 971. *Turdus graueri* n. vom Kiwusee; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 56. — [Fällt vielleicht mit *T. bocagei* zusammen.]
 972. *Turdus menachensis* n. von Yemen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 86.
 973. *Turdus olivaceus bambusicola* n. von den Kiwu-Vulkanen; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 56.
 974. *Turdus pelios guineensis* n. von Portugiesisch-Guinea; Reichenow, Mitt. Zool. Mus. Berlin 5. 1911, 237. — [Fällt mit *T. lugubris* zusammen.]
 975. *Turdus pondoensis* n. von Pondoland; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 391.
 976. *Turdus roehli* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 182.
 977. *Turdus swynnertoni* n. von Rhodesien; D. A. Bannerman, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 56.
 978. *Turdus sylvestris* n. vom Gebiet östlich des Kiwusees; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 191.
 979. *Xenocopsychus* (n. g.) *ansorgei* n. von Mossamedes; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 81. 82.
-

Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Bericht über die Oktobersitzung 1917.

Verhandelt Berlin, Montag, den 8. Oktober 1917, abends 7 Uhr im Blauen Saale des „Rheingold“, Potsdamerstrafse 3.

Anwesend die Herren Bärwald, K. Neunzig, Heck, v. Lucanus, Schalow, Reichenow, Haase und Heinroth.

Als Gäste die Herren P. Kothe, Seilkopf, R. Neunzig und Frau Heinroth.

Vorsitzender Herr Schalow, Schriftführer Herr Heinroth.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [66_1918](#)

Autor(en)/Author(s): Reichenow Anton

Artikel/Article: [Vogelarten des afrikanischen Faunengebiets, die von 1905-1914 neu beschrieben worden sind. 61-110](#)