

- 110 Ant. Reichenow: Vogelarten des afrikanischen Faunengebiets, etc.
966. *Turdinus phoebei* n. von Unter-Nigerien; R. Kemp, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 111.
967. *Turdinus pyrrhopterus kivuensis* n. von den westlichen Kiwuvulkanen; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 55. — [Sonderung der Form nicht haltbar nach O.-Grant, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 60.]
968. *Turdinus stictigula* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1906, 10.
969. *Turdinus tanganjicae* n. vom Urwald westlich des Tanganjika; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 391.
970. *Turdus albipectus* n. von Mboga südlich des Albert-Sees; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 191.
971. *Turdus graueri* n. vom Kiwusee; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 56. — [Fällt vielleicht mit *T. bocagei* zusammen.]
972. *Turdus menachensis* n. von Yemen; W. R. Ogilvie-Grant, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 86.
973. *Turdus olivaceus bambusicola* n. von den Kiwu-Vulkanen; O. Neumann, Bull. Br. O. C. 21. 1908, 56.
974. *Turdus pelios guineensis* n. von Portugiesisch-Guinea; Reichenow, Mitt. Zool. Mus. Berlin 5. 1911, 237. — [Fällt mit *T. lugubris* zusammen.]
975. *Turdus pondoensis* n. von Pondoland; Reichenow, Journ. Orn. 1917, 391.
976. *Turdus roehli* n. von Usambara; Reichenow, Orn. Mntsb. 1905, 182.
977. *Turdus swynnertoni* n. von Rhodesien; D. A. Bannerman, Bull. Br. O. C. 31. 1913, 56.
978. *Turdus sylvestris* n. vom Gebiet östlich des Kiwusees; Reichenow, Orn. Mntsb. 1908, 191.
979. *Xenocopsychus* (n. g.) *ansorgei* n. von Mossamedes; E. Hartert, Bull. Br. O. C. 19. 1907, 81. 82.

---

## Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

### Bericht über die Oktobersitzung 1917.

Verhandelt Berlin, Montag, den 8. Oktober 1917, abends 7 Uhr im Blauen Saale des „Rheingold“, Potsdamerstrasse 3.

Anwesend die Herren Bärwald, K. Neunzig, Heck, v. Lucanus, Schalow, Reichenow, Haase und Heinroth.

Als Gäste die Herren P. Kothe, Seilkopf, R. Neunzig und Frau Heinroth.

Vorsitzender Herr Schalow, Schriftführer Herr Heinroth.

Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder in dem neuen Sitzungslokal. Das Preussische Kriegsministerium hat das Architektenhaus, in dem die Gesellschaft vom 2. Februar 1881, also 36 Jahre hindurch, ihre Zusammenkünfte abgehalten hat, angekauft. Die Herren Reichenow und Schalow, die in der heutigen Sitzung anwesend sind, haben auch bereits an jener vor 36 Jahren teilgenommen. Herr Reichenow übermittelt die Grüsse Otmar Reisers aus Bialowies.

Der Genannte und Herr Schalow legen neu erschienene Veröffentlichungen vor. Herr Reichenow geht näher auf eine Arbeit von J. v. Domaniewski über *Sitta homeyeri* und verwandte Formen ein. Er hält die Darstellung für irrtümlich. In Polen kommen zwei Formen vor: im Norden *S. sordida*, die dem Redner aus Lomscha vorliegt, im Süden eine Form, die den Übergang von *sordida* zu *caesia* darstellt und von Kleinschmidt *S. reichenowi* genannt ist. Diese Form wird von Domaniewski augenscheinlich mit *S. homeyeri* verwechselt. Redner konnte Stücke der *S. reichenowi* aus Radom und Lublin und aus der Gegend südlich von Warschau untersuchen. Mit Bezug auf die Anschauung des Redners, das *S. homeyeri* aus Zwischenbrüten von *S. europaea* und *sordida* hervorgehe, sagt Herr v. Domaniewski: „Bastarde treten nur an der Grenze der Brutgebiete zweier Formen auf.“ Er denkt sich danach diese Grenze nur als Linie. Demgegenüber ist auf die Tatsache aufmerksam zu machen, das Bastarde der Nebel- und Rabenkrähe von der Elbe bis zur Spree, also über eine Landstrecke von über 100 Kilometern verbreitet sind. — Herr Schalow weist auf den Neudruck eines, nur in sehr wenigen Exemplaren bekannten Werkes: Waidwerck und Federspiel; Durch Eberhardum Tappium Lunensem Bürger zu Cöln; Zu Strafsburgk bey M. Jacob Cammer Lander [wahrscheinlich 1542 gedruckt] hin. Der Neudruck ist in 250 nummerierten Exemplaren bei J. Scheible in Stuttgart erschienen.

Herr Heinroth spricht hierauf über reflektorische Bewegungsweisen (Kratzen, Schütteln, Baden u. s. w.) im Lichte der Stammesverwandtschaft und führt dabei Folgendes aus:

Das Kratzen des Kopfes geschieht entweder in der Weise, das der Vogel das Bein an der Brust vorbei an den Kopf bringt oder indem er es hinter dem Flügel hindurch steckt und sich also gewissermassen über den Rücken hinweg kratzt. Wir wollen das erstere als vorn herum und das letztere als hinten herum bezeichnen. Diese Bewegungsweise ist durchaus zwangsläufig, d. h. bereits die jungen Vögel im Nest führen sie in der der betreffenden Art zukommenden Weise aus oder versuchen es wenigstens. Es kratzen sich vorn herum: Hühner, Tauben, Rallen, Steifsfüße, Pinguine, Möwen, Schnepfen, Kraniche, Cariama, Triel, Reiher, Störche und Verwandte, Entenvögel, Pelikane, Kormorane, Raubvögel, Eulen; von den Papageien: *Eclectus*, *Conurus*, *Ara*, *Amazona*, *Palaeornis*, *Trichoglossus*; ferner Hornrabe,

Kuckuck, Bartvögel und Spechte. Im Gegensatz hierzu führen die Kratzbewegung hinter dem Flügel aus: Flufsregenpfeifer, Kiebitz, Baumnashornvögel; von den Papageien: Plattschweif-sittiche, *Agapornis*, *Loriculus*, *Melopsittacus*, *Calypsittacus*, *Psittacula*; ferner Bienenfresser, Eisvögel, Wiedehopf, Segler und alle Singvögel.

Es ist natürlich schwer zu sagen, warum die Kratzbewegungen bei der einen Vogelgruppe so und bei der anderen anders ausgeführt werden. Die Beinlänge ist jedenfalls nicht in jedem Falle maßgebend, und auch sonst scheint die Figur des Vogels keinen Einfluß darauf zu haben, wie aus dem Vergleich der oben angeführten Vogelgruppen hervorgeht. Ausdrücklich sei nochmals bemerkt, daß der betreffende Vogel sich nur in der der betreffenden Art zukommenden Weise den Kopf kratzen kann. Wird er durch irgend etwas daran verhindert, so fällt er entweder um, oder er läßt es ganz sein, versucht aber niemals, sich auf die andere Art zu helfen.

Die Schüttelbewegung beginnt bei allen Vögeln am Körper und endet mit einem Schütteln des Kopfes. Paradies- und Jungfern-Kranich schütteln zum Schluß noch das Ellenbogengefieder, das ja bei ihnen besonders entwickelt ist. Besonders bezeichnende Haltungen kommen z. B. bei den Schwänen vor, sodafs man an dem dabei gestreckt gehaltenen Halse den Höcker-schwan ohne Weiteres von dem sich krummhalsig schüttelnden Singschwan unterscheiden kann. Man hat den Eindruck, daß das Schütteln ein echter Reflex ist. Es gehört für den Vogel eine gewisse Ruhe dazu, daß er wirklich gut zustande kommt. Das Schütteln geht, wie beispielsweise bei uns das Niesen, manchmal unverrichteter Sache vorüber. Bei Gänsen wird das Schütteln auch bei großer Wut häufig ausgeführt.

Die bekannte Sichsonnen-Stellung, die darin besteht, daß der Vogel sich die Sonne von hinten in das stark gestäubte Gefieder unter gleichzeitigem Breiten von Flügeln und Schwanz scheinen läßt, kommt sicherlich folgenden Vogelgruppen zu: Raubvögeln, Eulen, Hühnern, Tauben, Kuckuck (auch Guira), Ziegenmelkern, Bienenfressern, Spechten, Regenpfeifern, Singvögeln. Rallen verhalten sich darin noch besonders eigenartig, daß sie wie beim Strecken meist beide Flügel in sehr gleichmäßiger Weise nicht nur breiten, sondern auch nach unten und hinten strecken.

Der Wiedehopf legt den Kopf mit geöffneter Haube auf den Rücken. Die Sichsonnenstellung, mit der die Stellung beim Trocknen des Gefieders nicht zu verwechseln ist, fehlt allen Anatiden, anscheinend den Papageien und wohl auch den Pelikanen, Flamingos, Kranichen und verschiedenen anderen Großvögeln.

Das Baden im Wasser ist bekanntlich fast allgemein verbreitet, auch Kasuare tun es. Niemals baden: Lerchen, Hühner,

vielleicht Baumnashornvögel, Wiedehopf und vielleicht Segler. Kuckuck, Blaurake, Ziegenmelker und Bienenfresser lassen sich gelegentlich gern beregnen. Sie breiten dabei Flügel und Schwanz, baden aber nur sehr wenig, was bei der Blaurake und dem Bienenfresser dann wohl nur im Fluge durch Eintauchen ins Wasser ausgeführt wird, wie dies bekanntlich die Schwalben regelmäÙig und der Pirol gelegentlich tun. Manche Vögel, die drauÙen vom Röhricht oder von Zweigen aus ins Wasser gelangen, springen beim Baden auch im Käfig nicht in das GefäÙ, sondern versuchen, sich vom Rande aus zu benäÙen, wie z. B. der Zeisig und der Rohrsänger. Häherlinge und Sonnenvögel (*Liothrix*) baden in der Weise, daÙ sie ins Wasser springen, rasch eine Schüttelbewegung machen, wieder aufs Trockene gehen und dies in schneller Reihenfolge einige Male wiederholen, nicht aber wie die meisten andern Vögel während des Badens im Wasser sitzen bleiben.

S a n d b ä d e r nehmen Hühner, Lerchen, viele Raubvögel, Cariama, Eulen, Wiedehopf, Baumnashornvögel, Blauraken, Mauerläufer, Zaunkönig, Sperlinge und wahrscheinlich auch noch andere. Es gibt also eine ganze Anzahl von Vogelgruppen, die sowohl im Sande als auch im Wasser baden. Sicherlich niemals tun es alle Schwimmvögel, Kraniche, Rallen, Schnepfen, Regenpfeifer, Reiher und Störche, Flamingo, RuderfüÙler, Tauben.

Eine besondere Körperhaltung beim S i c h s t r e c k e n ist den Tauben dadurch eigen, daÙ sie beim Strecken der geschlossenen Flügel nach oben den Schwanz weit fächern, und daÙ die Rallen, wie bereits erwähnt, die Flügel in eigenartiger Weise nach hinten nehmen.

Der F u ß s wird zum F e s t h a l t e n von Beute u. s. w. benutzt und dem Schnabel genähert: bei Raubvögeln, Eulen, einer Anzahl von Papageien und den Sultanshühnern (*Porphyrio*). Andere, aber auch nur wenige Vögel, stellen sich auf die Beute. Es tun dies die Rabenvögel, die Gattung *Parus* und einige Finken (Zeisig, Kreuzschnabel und Stieglitz). Würger und Bartmeisen haben die Gewohnheit, die Nahrung in die Zehen zu nehmen und dann den Lauf auf die Unterlage aufzulegen. Es befremdet sehr, daÙ nicht alle, oder doch wenigstens viele Vögel auf den uns doch so naheliegenden Gedanken kommen, unbequeme Nahrungsbrocken mit den FüÙen festzuhalten oder wenigstens festzulegen; die physische Möglichkeit dazu hätten sicher die meisten. Es handelt sich bei der Verwendung der FüÙe eben auch um rein instinktive Gewohnheiten, zu denen der Vogel im Leben nie etwas dazu lernt.

B e s o n d e r e F u ß s b e w e g u n g e n werden von den kleineren Regenpfeifern und dem Kiebitz in Gestalt einer zitternden Bewegung ausgeführt, die wohl den Zweck hat, Würmer und Insektenlarven in Bewegung zu bringen, damit sie von dem auf dem Boden Umschau haltenden Vogel durch das Auge bemerkt



werden können. Der Vortragende hat dies gelegentlich einer Jahresversammlung den Mitgliedern bei einem zahmen Flufsregenpfeifer vorgeführt. Über das eigenartige Trampeln der Gänse ist das Nötige in der Anatiden-Biologie des Vortragenden erwähnt.

Beim Putzen des Gefieders haben die Baumnashornvögel die Eigentümlichkeit, daß sie beim Ordnen der Schwanzfedern den Schnabel unter dem Ast, auf dem sie sitzen, hindurchführen, was sonst wohl kaum ein Vogel tut. Bei den Männchen von *Paradisea* beobachtet man ein eigentümliches Federlegen dergestalt, daß der Vogel jedesmal, wenn er sich auf seinem Ast umgedreht hat, diejenigen Brustschmuckfedern, die dabei auf der anderen Seite des Astes zurückgeblieben sind, mit dem Schnabel vorsichtig erfaßt und an die rechte Stelle bringt. Diese Handlungsweise erscheint sehr einfach und selbstverständlich. Um so mehr befremdet es, daß sie anscheinend bei keinem anderen Vogel vorkommt. Geraten z. B. einem langschwänzigen Papagei, einem Pfauhahn u. s. w. seine langen Federn beim Umdrehen auf der Stange irgendwie in die Klemme, so kommt der Vogel nie auf den nahe liegenden Gedanken, sie mit dem Schnabel zurechtzulegen.

Bekanntlich erfolgt der Lidschluss des Vogels durch Anheben des unteren Augenlides nach oben. Eine Ausnahme machen darin die Eulen und der Zaunkönig, die das obere Augenlid ebenso wie wir Menschen nach unten ziehen.

Das Aufsperrn des Schnabels bei Hitze ist bei Eulen, Scharben und vielleicht auch bei den Reiher und Verwandten dahin etwas abgeändert, daß der Kehlsack dabei rasch bewegt wird, also ein eigentliches Hecheln zustande kommt.

Herr v. Lucanus bemerkt zu den Ausführungen des Herrn Heinroth, daß all die Papageien, die sich vorn herum den Kopf kratzen, auch den Fuß zum Festhalten der Nahrung benutzen. *Falco sparverius* stützt nach Würgerart den Lauf auf die Stange auf und hat auch sonst in seiner Bewegungsweise viel singvogelhaftes. Nach Angabe von Herrn Neunzig verhält sich die indische Timalie *Pictorhis* hinsichtlich des Aufstützens des Laufs wie die anscheinend nahe verwandte Bartmeise.

Herr Reichenow weist auf eine von ihm gemachte Beobachtung hin, daß Stare sich nicht nur im Wasser, sondern in Ermangelung dessen auch im Schnee baden.

Herr v. Lucanus legt eine abweichend gefärbte Weindrossel (*T. iliacus*) vor, die aus dem Breslauer Universitäts-Museum stammt und eine Ausartung ins Gelbliche darstellt. Herr Heinroth wirft die Frage auf, bei welchen Rotkehlchen die sogenannten Spiegelflecke auf den Armdecken vorkämen. Nach seiner Erfahrung sind sie sowohl bei unvermauserten Jungen, als auch bei mehrjährigen Vögeln, deren Alter genau feststeht, vorhanden. Auch das Geschlecht hat nachweislich keinen Einfluß. Zu der Arbeit des Herrn v. Lucanus in der Festschrift des Journals für

Ornithologie 1917 über „das numerische Verhältnis der Geschlechter in der Vogelwelt“ bemerkt er, daß 2 Gelege von Bekassine und Kiebitz, die am 23. Juli und 25. Mai ausschlüpfen, also sicher 2. oder 3. Gelege sein müssen, je ♂ ♀♀♀ und ♂ ♀♀ ergeben haben, sodafs also auch in späten Brutten eine Überzahl von Weibchen vorkommen kann. Ein am 12. V. erbrütetes Kiebitzgelege ergab gleichfalls 1 Männchen und 3 Weibchen.

Herr K. Neunzig fragt an, ob der Eichelhäher wirklich, wie angegeben wird, Eicheln im Kehlsacke erweicht. Nach seinen Beobachtungen könne der Vogel überhaupt nur eine Eichel für kurze Zeit darin unterbringen. Den Anwesenden ist darüber nichts Näheres bekannt.

Herr von Lucanus teilt mit, daß ihm eine sichere Angabe über das vor kurzem stattgehabte Horsten von *Haliaetus albicilla* in der Mark Brandenburg zugegangen sei. Ferner sind ihm Beobachtungen über das Brüten von *Colymbus arcticus* in unserer Provinz mitgeteilt worden. Der betreffende Beobachter, ein Mitglied unserer Gesellschaft, bittet mit Rücksicht auf die Gemeingefährlichkeit geschäftlicher Eiersammler von der Nennung der betreffenden Lokalitäten Abstand nehmen zu wollen.

Herr Reichenow berichtet, daß ein am 8. Juli d. J. durch Otto Bock (Berlin) bei Kremmen erlegter Purpurreiher dem Berliner Museum übergeben worden ist. Herr Schalow fügt hinzu, daß das Vorkommen von *Ardea purpurea* in der Mark nunmehr durch 5 Exemplare belegt sei, von denen nachweislich drei im Monat Juli erlegt worden sind. Wahrscheinlich handelt es sich in allen Fällen um aus dem Westen verflogene Vögel, wie solche aus den an Holland grenzenden Distrikten Norddeutschlands mehrfach bekannt geworden sind. **Heinroth.**

### Bericht über die Novembersitzung 1917.

Verhandelt Berlin, Montag, den 5. November 1917, abends 7 Uhr im Blauen Saale des „Rheingold“, Potsdamerstrafse 3.

Anwesend die Herren Neunzig, Steinmetz, Reichenow, v. Lucanus, Graf Zedlitz, Schalow, Haase, und Heinroth.

Als Gäste die Herren R. Neunzig, Weise, Helfer, Seilkopf und Frl. Beele.

Vorsitzender Herr Schalow, Schriftführer Herr Heinroth.

Der Vorsitzende teilt mit, daß J. W. Stolz von der landeskundlichen Kommission in Polen, der sich eifrig und mit großer Liebe ornithologischen Arbeiten zugewendet hatte, am 26. September den Folgen einer schweren Verwundung erlegen ist. Eine kurze Notiz über den Dahingeshiedenen findet sich in den Ornith. Monatsberichten (1917, No. 11, 167).

Die Herren Reichenow und Schalow besprechen neu erschienene Schriften.

Herr Reichow legt das Werk von Pontoppidan, Danske Atlas 1763 vor und bemerkt dazu: „Bei Bearbeitung der „Neuen Namenliste“ hat das Werk mir nicht vorgelegen, wie auf S. 329 des Journ. f. Orn. 1916 bemerkt worden ist. Ich war deshalb in der Annahme der P.'schen Namen dem Vorgange von Hartert u. A. in der Handlist of British Birds gefolgt. Nachdem ich das Werk nunmehr einsehen konnte, finde ich, dafs abgesehen von den allgemeinen Mängeln dieser „Kompilation“ darin die binäre Nomenklatur nicht folgerichtig durchgeführt ist. So steht auf S. 617 *Falco Ossifraga Brissonii*, auf S. 621 *Colymbus Auritus minor*, auf S. 623 *Scolopax Gallinago alius* und *Scolopax Gallinago minor*. Damit wird also die Benutzung der Namen hinfällig. An Stelle von *Urinatar stellatus* Pont. muß wieder *U. lumme* Gunn. treten, an Stelle von *Larus argentatus* Pont. *L. argentatus* L. und für *Asio flammeus* Pont. *Asio accipitrinus* Pall. gebraucht werden. Demgemäß bleibt auch *Strix flammea* L. für *Strix alba* Scop. bestehen. Bezüglich *Strix flammea* Pont. auf S. 617 des „Danske Atlas“ ist noch zu bemerken, dafs dieser Name neben der gegebenen Abbildung auf Linnés Fauna Suecica sich gründet. *Strix flammea* der Fauna Suecica bezieht sich aber nach der Beschreibung in der 12. Ausgabe des Systema Naturae und den beigefügten Stellen des Schrifttums zweifellos auf die Schleiereule. Pontoppidans Abbildung scheint allerdings die Sumpfohreule darzustellen. Somit waren hier augenscheinlich zwei Arten unter dem Namen *S. flammea* vereinigt, der 1766 von Linné auf die von ihm ursprünglich gemeinte Schleiereule zurückgeführt ist.

Herr von Lucanus berichtet, dafs von der Ornithologischen Station Lotos, die von Forstmeister Loos in das Leben gerufen wurde, innerhalb zweier Jahre 11000 Vögel in 95 Arten beringt worden sind. Es handelt sich dabei namentlich um Lachmöwen aus einer bei Liboch gelegenen Kolonie.

Herr Schalow übermittelt Grüsse von Herrn Prof. Neumann in Warschau und berichtet über dessen Arbeiten in den dortigen Museen.

Herr Steinmetz hält einen Vortrag über die Vogelschutzstätte auf Langeoog. Sie ist, wie der Vortragende ausführt, in den 70er Jahren von der Kgl. Regierung in Aurich gegründet und 1914 an den Deutschen Bund für Vogelschutz (Charlottenburg, Tegeler Weg 13) verpachtet worden. Sie umfaßt eine Fläche von einer Längenausdehnung von 8—9 km und liegt auf dem östlichen Teile der Insel zum grössten Teile auf Dünen- und Gelände. Hauptsächlich brüten dort Silbermöwen, nach sorgfältiger Schätzung ungefähr 6000 Paare. Außerdem sind an andern Stellen der Insel noch Sturmmöwen, Flufs-, Küsten- und Zwergseeschwalben, Brandgans, Rotschenkel, Kiebitze, Austernfischer und viele Kleinvögel zu finden. Im letzten Jahre (1917) ist die Kolonie der Silbermöwen von den Einwohnern in der sinnlosesten Weise geplündert worden, sodafs wenige Jungvögel



erbrütet worden sind. Der Vortragende hat sich an Ort und Stelle überzeugt, daß die Wärter ihre Pflicht taten, gegen die Brutalität der Einwohner aber machtlos waren. Der Vortragende gab einige Beispiele von der Dreistigkeit der Eiterräuber zum Besten.

Im nächsten Jahre soll eine Schutzhütte erstehen, in der 3 Wärter mit Gewehr und Hund ausgerüstet, die Schutzbestimmungen streng durchführen. Die nötigen Verhandlungen mit dem Reg.-Präsidenten und den in Frage kommenden Behörden sind eingeleitet.

In Verfolg des Meinungs-austausches verspricht Herr Schalow jede Unterstützung seitens der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

Graf Zedlitz teilt hierauf Beobachtung an Rabenvögeln im westlichen Rufsland mit (wird besonders abgedruckt).

Herr Heinroth berichtet in Ergänzung des Vortrages über seine jung aufgezogenen Kolkkraben, daß sie ebenso schreckhaft wie die meisten Singvögel sind. So fürchtete sich das Männchen entsetzlich vor einer gewöhnlichen Küchenwaage, und bei beiden wurde durch das Aufziehen einer Fahne in etwa 100 m Entfernung ein stundenlanges panischer Schrecken ausgelöst. Eine kleine Veränderung innerhalb ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes erfüllt sie mit großem Mißtrauen: das Weibchen scheute sich tagelang vor einer in das Drahtgeflecht geschnittenen, ganz unauffälligen, zum Ein- und Ausflug bestimmten Tür. Auch hier wurde also wieder beobachtet, daß besondere Veränderungen in einer sonst bekannten Umgebung am meisten gefürchtet werden. Dies erklärt ja auch die Vorsicht vieler Tiere den ihnen ja an sich unbekanntem Fallen gegenüber. Der Nahrungsmittelverbrauch war, so lange die Tage lang waren, ein sehr großer. Die beiden Vögel verzehrten aufser einem eingequellten Backwerk zusammen 1 Pfd. Fleisch täglich. Besonders als Nestjunge sind sie sehr wasserbedürftig. Sie werden sofort schwer krank, wenn man es unterläßt, sie zu tränken. Das Stossen auf alles Fliegende ist ihnen angeboren. Ebenso das Verstecken von Nahrung und anderem, eine Tätigkeit, die im Übermaße ausgeführt wird.

Herr Heinroth stellt die Frage, ob und wohin der Kolkkrabe im Freien seine Nahrung versteckt, und wann die Mauser eintritt.

Graf Zedlitz berichtet, daß die Reste abgefressener Enten z. B. stets von den Vögeln beiseite getragen werden. Der Eintritt der Mauser richtet sich danach, wann die Vögel brüten, dürfte aber meist nicht vor dem Mai stattfinden. Herr Reichenow hat früher bei Berlin Kolkkraben Fleischstücke im Schnee verstecken sehen. Er richtet die Frage an den Grafen Zedlitz, ob die Nebelkrähe in Polen häufig auftritt, die Saatkrähe ist dort sehr zahlreich vertreten. Ferner betonte er im Gegensatz zu der Angabe des Vortragenden, daß Nebelkrähen



im Herbst sehr fett sein können. Graf Zedlitz erwidert, daß die Nebelkrähe in Polen selten sei. Ziehend komme sie aus Südwesten die Schara entlang.

Bezüglich der Bemerkung des Grafen Zedlitz, daß bei den östlich des Ural wohnenden Dohlen der Halsfleck stets merklich größer sei und daß es sich dort wohl um eine noch nicht beschriebene östliche Form handle, bemerkt Herr Schalow, daß Hellmayr vor kurzem darauf hingewiesen hat (Verhandl. Ornith. Ges. Bayern 1917, Bd. 13, 154), daß dem Namen *Corvus soemmeringi* von Fischer (Mém. Soc. Imp. Natur. Moscou 1811, vol. 1, 3 pl. 1) für die östliche Dohle die Priorität vor *Corvus collaris* Drummond (Ann. Mag. Nat. Hist. 1846, 10) gebühre. Sollte sich indessen, wie Graf Zedlitz oben angedeutet hat, ergeben, daß die im Nordosten wohnende *Coloeus*-Form von der südöstlichen zu trennen ist, so würde der ersteren der Name von Fischer verbleiben und die zuerst aus Mazedonien beschriebene Form als *Coloeus monedula collaris* (Drum.) weiter geführt werden müssen. Hellmayr bemerkt übrigens, daß er bei Exemplaren aus West-Rußland, Südungarn, Rumänien, Mazedonien, Krim, Kaukasus etc. einen Unterschied nicht habe feststellen können.

Herr Schalow legt aus seiner Bibliothek die ornithologischen Veröffentlichungen Johann August Donndorfs: — Handbuch der Naturgeschichte (Leipzig 1793); Zoolog. Beiträge zur 13. Ausgabe des Linné'schen Natursystems (Leipzig 1794—1795); und Joh. Aug. Ephr. Goezes Europäische Fauna (Band 4—9 von Donndorf bearbeitet Leipzig 1794—1803) — vor und weist auf die Bedeutung dieses Zeitgenossen von Johann Matthäus Bechstein für die Entwicklung der Vogelkunde in Deutschland hin.

Heinroth.

### Berichtigung.

Auf S. 514 des Jahrgangs 1917 der Zeitschrift ist durch nachträgliches Herausrücken eines Absatzes ein Druckfehler entstanden. Unter *Chaetura bürgersi* muß es weiter heißen: Der *Chaetura novaeguineae* gleichend, aber dadurch unterschieden u. s. w.

### Dem Herausgeber zugesandte Schriften.

- S t. v. Chernel, Beim Anbruch eines neuen Zeitalters. (Abdruck aus: Aquila Bd. 23.)  
 — Horstbaum und Stimme des Wespenbussards. (Abdruck aus: Aquila Bd. 23.)  
 — Nekrolog. W. Graf Wilamowitz-Möllendorff, O. le Roi, A. Kocycán, O. Finsch, H. E. Dresser. (Abdruck aus: Aquila 1917.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [66\\_1918](#)

Autor(en)/Author(s): Heinroth Oskar

Artikel/Article: [Bericht über die Oktobersitzung 1917. Bericht über die Novembersitzung 1917. 110-118](#)