

dunkelt, am untern Augenrande ein dunkelbrauner Fleck mit einem braunen Streifen schief aufwärts über den Hinterkopf und einem schief zum Mundrande. Das etwas vorragende Praelabrum braun, Taster schwarz, Wurzelglieder der Fühler schwarz, 3. Glied gelb. Thorax schwarz, Schultern gelb, vor der Quernaht und vor dem Schildchen quer über den Rücken grau, Pleuren mit durchscheinender rotgelber Grundfarbe, grau bereift. *acr* undeutlich, mehrreihig, Schildchen gelb, an der Basis schwarz. Flügel wie in der Abbildung. (Die Spitze des einen Flügels ist abgerissen und am andern ist sie gefaltet, so daß sich nicht bestimmt angeben läßt, ob die Spitze ganz so aussieht wie in der Abbildung). Schüppchen bräunlich, Schwinger gelb. Beine gelb, die  $f_1$  mit Ausnahme der Wurzel und Spitze, die  $t_1$  mit Ausnahme der Wurzel und einer Stelle hinter der Mitte, die Spitzen der  $t_2$  und  $t_3$  und alle Tarsen schwarz, auch die  $f_2$  und  $f_3$  in der Mitte etwas geschwärzt. Abdomen schwarz, Hinterrandborsten kurz, Hypopyg klein. Länge 4 mm.

---

### **Encarsiocera pennipes, eine neue Gattung und Art der Psiliden aus Arabien.**

Von Abt Leander Czerny.

#### ***Encarsiocera* g. n.**

(*égkársios* schräg).

Kopf und Fühler wie bei der Gattung *Loxocera* Meig. Bei dem vorliegenden nicht gut erhaltenen Exemplar ist die Fühleransatzstelle etwas vorgezogen, die Fühler stehen schräg ab, das 3. Fühlerglied ist sehr lang, mit basaler Borste. 1 lange or ungefähr in der Mitte, 1 ganz vorn zwischen Fühleransatz und Augen, und (?) 1 hinten. 1 pp, 1 h, 1 sa?, 1 dc?, 2 st, die hintere sehr tief, in der Mitte der Sternopleura. Alle Schienen mit Praeapikalborsten. Die Randader ist gleich hinter der Mündung der *sc* gebrochen, nicht gedörnelt, *sc* und  $r_1$  nahe beieinander verlaufend und getrennt voneinander mündend. Flügel an der Spitze gerundet, Randader bis zur *m*,  $r_{4+5}$  an der Spitze mündend und mit *m* parallel, beide gegen die Mündung zu etwas abwärts gerichtet. *M* und *Cu* kurz, *Cu* kürzer als *M*, die die *Cu* abschließende Ader gerade und schief einwärts, *a* fehlt.

28 L. Czerny: *Encarsiocera pennipes*, e. n. Gatt. u. Art d. Psill. aus Arabien.

***Encarsiocera pennipes* sp. n. ♀.**

Stirn und Hinterkopf schwarz, Gesicht, Wangen und Backen goldgelb, Fühler schwarz, Wurzelglieder rötlich, Fühlerborste weißlich, gegen die Spitze zu verdunkelt, sehr fein pubeszent, Rüssel und Taster schwarz. Thorax samt Schildchen schwarz. Beine rostgelb, glänzend, Vorderschienen mit Ausnahme der Wurzel und alle Tarsen schwarz (die Mittelbeine fehlen), Vorder-schienen außen und innen mit dicken, spitzigen, dicht nebeneinander stehenden schwarzen Borsten, von denen auf der Außenseite eine auffallend lang ist, Metatarsus der Vorderbeine auf der Oberseite mit einer Reihe schwarzer Borsten, auf der Unterseite mit kürzeren Borsten und einer langen Borste an der Wurzel, Hinterschenkel anteroventral an der Spitzenhälfte mit 4 langen Borsten, Hinterschienen rückwärts mit 2 langen Borsten, von denen eine auf der dem Körper abgewandten und eine auf der dem Körper zugewandten Seite steht. Flügel hyalin, Schüppchen rötlich, Schwinger?. Abdomen glänzenschwarz, der 4. Ventrit etwas ausgezogen und mit kurzen Randborsten besetzt. Im Zoolog. Museum in Hamburg 1 ♀ von Sanaa, Yemen. Länge 3.5 mm.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Konowia \(Vienna\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Czerny Leander (=Franz)

Artikel/Article: [Encarsiocera pennipes, eine neue Gattung und Art der Psiliden aus Arabien. 27-28](#)