

Notices diptérologiques.

Par le Dr. J. Villeneuve de Janti (Rambouillet).

— I. Mr. Baranoff affirme que *Carcelia ambigua* Villen. est synonyme de *C. rasella* Baran. — Ce n'est pas exact. — *C. rasella*, d'après un type ♂ que Baranoff a eu l'amabilité de me communiquer, est une grosse espèce comme *C. amphion* R. D. = *rasa* (Macq.?) Rond.; le dernier segment abdominal ne porte qu'une fine pilosité. — *Carcelia ambigua* a, il est vrai, la tête absolument pareille à celle de *C. rasella*; mais il est d'une taille constamment moindre et le 4^e segment abdominal du ♂ porte des soies discales. Bref, *C. ambigua* Villen. appartient aux petites formes des *Carcelia*, comme *C. lucorum* B. B., *C. rutilla* B. B., *C. leucophaea* Rond.; c'est la petite forme du „Formenkreise“ de *amphion* R. D. = *rasa* apud Baranoff.

— II. *Blaesoxipha formosa* Rohd. est la forme que j'ai signalée, de Corse et de Provence, sous le nom de *Blaes. littoralis* n. sp., dont le ♂ a beaucoup d'affinité avec *Blaes. cochlearis* Pand. — Je pense avec Rohdendorf que *Blaes. gladiatrix* ap. Baranoff, non Pand., est la même espèce que *Blaes. littoralis* Villen. (= *formosa* Rohd.).

Dans son travail: Die serbischen *Blaesoxiphen*, in Zeitschr. für wissenschaftliche Insectenbiologie, Bd. IV, 1927, p. 9—15, Baranoff a donné de l'hypopygium de quelques espèces une figure qui ne correspond pas à la réalité. Ainsi la figure de *Blaes. gladiatrix* a été déjà trouvée inexacte par Rohdendorf. Il me paraît bien que c'est *Blaes. krameri* Baran. qui correspond au véritable *Blaes. gladiatrix* de Pandellé. — Je ne reconnais pas le pénis de *Blaes. grylloctona* Lw. dans la fig. 4 de Baranoff — Quant à *Blaes. minuta* Baran., c'est le ♂ de *Blaes. unicolor* Villen.: sur 2 ♂♂ pris à Port-Vendres, l'un seulement a le peigne des fémurs II remplacé par „3 dornartigen Borsten“;

l'autre ♂ présente un peigne sur le fémur II gauche et les 3 soies, au lieu du peigne, sur le fémur II droit.

— III. *Stevenia pannonica* Villen. est signalé par Stein comme étant dépourvu de soies acrosticales distinctes au-devant de la suture. Or, il y a réellement 2 formes, rencontrées aussi à Mehadia par notre collègue regretté Oldenberg, à savoir: une forme grande, montrant une paire bien développée d'acrosticales présuturales et la 6^e nervure de l'aile non entière — une forme moins grande, sans acrosticales distinctes au-devant de la suture mais ayant la 6^e nervure entière c'est à dire prolongée jusqu'au bord de l'aile. Il n'y a là, bien entendu, qu'une seule et même espèce véritable.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Konowia \(Vienna\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Villeneuve Janti Joseph de

Artikel/Article: [Notices diptérologiques. 29-30](#)