

Zweiter Nachtrag zum Kataloge der palaearktischen Aphanipteren (Wien, 1930).

Von Prof. Dr. Jul. Wagner, Belgrad.

Die neuen Angaben (neue Gattungen, Arten und Varietäten, Namen der neuen Wirte und Fundorte nebst Literaturergänzungen) sind mit * vor diesen Angaben bezeichnet.

Nachtrag zu den Bestimmungstabellen: *Wagner et Wassilieff 933, p. 431 (nord-afrikanische Arten).

Coptopsylla J. et R.

[Vd. etiam: *Wagn., 932 c, p. 168.]

**africana* Wagn. 1932 b (p. 268. Vd. *Meriones schousboei*, Psam-
et.: Wagn., 932 c, p. 170. Wagn. *momys roudairei*. —
et Wass., 933, p. 463). Südl. Tunis.

**Neocoptopsylla* Wagn. 1932 c (p. 171).

**wassiliewi* Wagn. 1932 c (p. 172. Vd. *Meriones shawi*. — Südl.
et.: Wagn. et Wass., 933, p. 462). Tunis.

Ceratophyllus Curt.

lunatus J. et R. (Vd. et.: *Wagn., *Nord-Schweden.
933 b, p. 339, i. 1.)

**sinicus* Jord. 1932 f (p. 276, 1 ♀). *Ochotona cansa*. — Sze-
tschuan.

barbarus J. et R. *Tunis.

mokrzeckyi Wagn.

**sucinus* J. et R. (921 f, p. 172. *Rumänien.
Ioff, 927 d, p. 212).

laeviceps Wagn. var. **ellobii* (nom.
nov. für *laev. mongolicus* = *nom.*
praeoccup.).

maurus J. et R. *Tunis.

turbidus Roths. 1909b (anstatt *mustelae*

Schill. n. nud., Wagn., 898. Vd. et.:

*Jord., 932g, p. 293).

rectangulatus Wahlgr. (*Jord., 932b, Muridae.

p. 256).

**lebedewi* Wagn. 1932d (p. 273, ♀).

Arctomys sp.. — Semiretschje (Ala-Tau-Geb.).

euteles J. et R. (vd. Wagn., Katal.,

p. 16, als *Myoxopsylla*. *Jord.,

932f, p. 277, ♂ et ♀).

*Sowie: *Dremomys pernyi*,
Ochotona cansa, *Callosciurus erythraeus*.

Paradoxopsyllus Miyai.

**custodis* Jord. 1932f (p. 279).

Anteliomys custos. — Sze-tschan.

**Geusibia* Jord. 1932f (p. 280).

gen. typ.: *torosa*.

**torosa* Jord. 1932f (p. 281).

Ochotona cansa. — Sze-tschan.

Frontopsylla Wagn. et Ioff.

**spadix* J. et R. 1921f (p. 174, ♀. Jord.,

932f, p. 278).

*v. *spad. cansa* Jord. 1932f (p. 278).

Ochotona thibetana, *O. cansa*. — Sze-tschan. (Nagetier). — Naryn (Semiretschje).

**protera* Wagn. 1932d (p. 275, 1 ♀).

**hetera* Wagn. 1932d (p. 276, 1 ♀).

Ellobius tancrei. — Mongolei (Fl. Hangaj).

Miostenopsylla Roths.

arctica Roths.

**hadweni* Ew. (927, p. 89, als *Amphipsylla*. Vd. et.: Ew., 929, p. 201, als *Boreopsyllus*).

(Auf Xema sabini, aus Alaska).

Amphipsylla Wagn.

sibirica Wagn.

v. *sib. thoracicus* Roths. (*Jord., 932c, p. 258, ♂, als *thorac. thoracicus*).

Microtini. — *Lapland.

v. *sib. sepifera* J. et R. (*Jord., 932c, p. 259, als *thoracicus sepifera*).

Microtini.

*v. *sib. hetera* Jord. 1932d (p. 261, *Pitymys* sp.. — Tatra Geb. als *thoracicus hetera*).

***Caenopsylla* Roths.**

mira Roths.

Sowie: *Tunis.

***Neopsylla* Wagn.**

**stevensi* Roths. 1915d (p. 38, ♂. Jord., 932f, p. 284, ♀).

Rattus griseipectus, *Anteliomys custos*. — Szechuan.

***Stenoponia* J. et R.**

tripectinata Tirab.

**Epimys decumanus*, E. rattus. — *Tunis (Stadt).

insperata Weiss. (*Wagn., 932a, p. 14). **Meriones shawi*.

**Corrodopsylla* Wagn. 1929d (p. 317, als subg. von *Doratopsylla*) [Vd. etiam: *Jord., 932c, p. 259, als genus].

gen. typ.: *curvata* (Roths., 915c, p. 25).

birulai Joff.

*Lapland.

***Palaeopsylla* Wagn.**

**steini* Jord. 1932d (p. 261).

Talpa europaea. — Tatra Geb.

kohauti Dampf (Vd. et.: *Jord., 932d, p. 262).

remota Jord. (Vd. et.: *Jord., 932e, p. 270, ♂). (*Anurosorex*. — Sikkim).

***Ctenopsyllus* Kol.**

silvatica Mein. (*Jord., 932b, p. 257, ♂, *Leptopsylla*).

Sowie: *Nord-Europa, Tatra Geb.

v. *silv. spectabilis* Roths.

***Ctenophthalmus* Kol.**

agyrtes Hell. var. *graecus* Jord.

*Bulgarien.

**parcus* Jord. 1932f (p. 286).

Anteliomys custos. — Szechuan.

**dinormus* Jord. 1932f (p. 288, 1 ♀).

Anteliomys custos. — Szechuan.

nivalis Roths. var. **nifetodes* Wagn. 1932d (p. 279, 1 ♀).

Glis glis. — Montenegro.

**sklavinus* Wagn. 1932d (p. 278, ♂). *Microtus nivalis*. — Jul.
Alpen.

uncinata Wagn. *Lapland.

Rhadinopsylla J. et R.

masculana J. et R.

*Tunis.

casta Jord.

Muridae. — *Lapland,

*Tatra Geb.

**Stenischia* Jord. 1932f (p. 288).

gen. typ.: *mirabilis*.

**mirabilis* Jord. 1932f (p. 288, 1 ♀). *Anteliomys custos*. — Sze-
tschuan.

Xenopsylla Glink.

nubicus Roths.

Sowie: *Süd-Tunis.

conformis Wagn. (*Ioff, 930b, p. 191).

mycerini Ioff (927d, p. 211;
929, p. 384).

mycerini Jord. (926a, p. 622,
part.: aus Turkestan).

*, „sp?“ Ioff 1930 b (p. 199).

conformis J. et R. (923c, p. 297,

nec Wagn.! Jord, 926a, p. 623,
part.: aus N.-W. Persien).

**nuttali* Ioff 1930b (p. 201).

Rhombomys opimus. — Geb.
Kopet Dag (Mitt.
Asien).

skrjabini Ioff (*930 b, p. 204).

**lybica* Wagn. 1933b (p. 348, ♀)

= ♀ von *taractes* J. et R.?

Zorilla lybica. — Tunis.

Synosternus Jord.

pallidus Tasch. *var. *infestus* Wagn.
1933 (p. 347, ♀).

Erinaceus algirus. —
Algerien.

Arctopsylla Wagn. 1930

(*933a, p. 94).

ursi Roths. (= *selbst. Art. *Jord.,
932g, p. 291).

Chaetopsylla Koh.

[Vd. etiam: *Wagn., 933a, p. 91].

Verzeichnis der zitierten Schriften.
(Nachtrag).

- 927 Ewing, A new flea from Alaska. In: Proc. Biol. Soc. Wash., XL.
- 929 — A manual of external parasites, London.
- 930b) Ioff, Über *Xenopsylla conformis* W. und einige verwandte Aphaniptera-Arten. In: Zool. Anz., XCII.
- 932a) Jordan, Die Siphonaptera Bulgariens. In: Mitteil. Kon. Naturw. Inst. Sofia, V.
- 932b) — The Siphonaptera collected by Mr. J. L. C. Musters in Norway on the Lemming. In: Novit. Zoolog., XXXVIII.
- 932c) — Siphonaptera collected by Mr. C. Elton in Lapland. Ibidem, XXXVIII.
- 932d) — Siphonaptera collected by Herr Georg Stein in the High Tatra. Ibidem, XXXVIII.
- 932e) — New oriental fleas. Ibidem, XXXVIII.
- 932f) — Siphonaptera collected by Harold Stevens on the Kelley-Roosevelt expedition in Junnan and Szechuan. Ibidem, XXXVIII.
- 932g) — Notes on Siphonaptera. Ibidem, XXXVIII.
- 932a) Wagner, Aphanipterologische Notizen. I. *Stenoponia insperata* Weiss (1930) und *Sten. tripectinata* Tirab. (1903). In: Konowia, XI.
- 932b) — Die Bedeutung der Flöhe für die Frage nach der Genesis der Säugetierfauna. In: Zoogeographica, I.
- 932c) — *Neocoptopsylla wassiliewi* g. n., sp. n. und *Coptopsylla africana* Wagn. In: Konowia, XI.
- 932d) — Fünf neue palaearktische Flöhe. Ibidem, XI.
- 933a) — Concerning Jordan's „Notes on Siphonaptera“. Ibidem, XII.
- 933b) — Aphanipteren-Material aus der Sammlung des Zoologischen Museums der Berliner Universität. In: Mitteil. aus d. Zool. Mus. in Berlin, XVIII.
- 933 Wagner et Wassilieff, Tableaux analytiques pour la détermination des puces rencontrées en Algérie et en Tunisie. In: Arch. d. l'Inst. Pasteur de Tunis, XXI.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Konowia \(Vienna\)](#)

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Wagner Julius

Artikel/Article: [Zweiter Nachtrag zum Kataloge der palaearktischen Aphanipteren \(Wien 1930\). 212-216](#)