

Enicospilus ocellatus sp. nov.

Von A. S h e s t a k o w, Jaroslavl.

♀. Fulvus. Margines oculorum, callum pedesque fulvo testaceis. Unguiculi, mandibulae apice, abdomen infra apice infuscata.

Caput pone oculos rotundato angustatum. Ocelli oculos tangunt. Genae breves. Antennae fere $\frac{3}{4}$ longitudines corporis aequilongae setaceae. Thorax tenuiter pubescens. Mesonotum opacum, sat dense punctulatum. Mesopleurae dense sat grosse rugoso-punctatae, ad callum dispersius. Scutellum nitidum, valde disperse tenuiterque punctatum. Metanotum grosse granuloso-vel rugoso-punctatum, carina transversa distincta praeditum. Stigma testaceum, fusco marginatum, granum alarum brunneo-rufum. Abscissus radii primus usque ad medium incrassatus, deinde abrupte attenuatus; nervulus interstitialis obliquus. Alarum posticarum abscissus radii primus rectus, triplo nervo recurrenti longior. Unguiculi tenues usque ad apicem subdense pectinati. Mas ignotus.

Long. 18 mm.

Hab. Caucasus: distr. Batumensis: Kobulety 15. VIII. 1910 (K. Satunin!).

E. repentino Hlmgr. simillimus, sed ocellis oculos attingentibus, abscissu radii primo alarum posticarum recto et triplo nervo recurrenti longiore, capite magis angustato et cellula cubitali alarum anticarum aliter constructa.

Ab. *E. contributo* Sheshtk. differt pictura flava thoracis absente et unguiculis tenuioribus et longioribus.

Typus in Museo Zoologico Academiae Petropolitanae.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Konowia \(Vienna\)](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Shestakow A.

Artikel/Article: [Enicospilus ocellatus sp.nov. 30](#)