

Synonymische Bemerkungen über Tethiniden.

Von Abt Leander Czerny.

Die von mir in Lindners „Die Fliegen der palaearktischen Region“ als neu beschriebene *Pelomyia Kuntzei* (S. 3) ist mit der von de Meijere in der Tijdschr. v. Ent. 1928, 76, als neu beschriebenen *Pelomyia angustifrons* identisch. De Meijeres Art hat die Priorität, weil die Beschreibung einige Zeit vor der meinigen erschienen ist.

Bei der Bearbeitung der *Tethiniden* in dem erwähnten Lindnerischen Werke entgingen mir zwei von Mercier in den Ann. Soc. Ent. Belgique publizierte Arten: *Rhinoëssa Strobliana* und *albipila*. Aus der Beschreibung der *Rhinoëssa Strobliana* (1923, I, 18): „Grauschwarz, Kopf, Knie, Metatarsen (auch die Schienen) rot, Thorax größtenteils gelb bestäubt, die Abdominalsegmente schmal weiß gerandet, Rüssel lang, gekniet, Makrochäten schwarz, Flügel glasartig, grau, Backen kaum gleich der halben Augenhöhe“ geht hervor, daß diese Art wahrscheinlich *Tethina longirostris* Loew ist.

Von *Rhinoëssa albipila* (1925, 179) sagt Mercier, daß sie sich von *Rh. albosetulosa* Strobl (= *griseola* v. d. Wulp) durch ihren herabgedrückten Kopf und das vorspringende Gesicht unterscheide. Aus dieser kurzen Bemerkung ersieht man, daß diese Art *Tethina illota* Hal. ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Konowia \(Vienna\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Czerny Leander (=Franz)

Artikel/Article: [Synonymische Bemerkungen über Tethiniden. 450](#)