

Dionconotus cruentatus Brullé var. **sellatus** n. var.

Von Håkan Lindberg, Helsingfors.

In einer kleinen Sammlung von Heteropteren, die von Herrn Fritz Wagner in Wien meinem nunmehr verstorbenen Lehrer, Dr. E. Bergroth zur Determination gesandt wurde, befanden sich einige Stücke einer interessanten, bisher unbeschriebenen Varietät der südeuropäischen Capside, *Dionconotus cruentatus* Brullé.

Sonst umfaßt die Sammlung teils einige in der Umgebung der Stadt Tunis gesammelte Stücke, teils einige in der Umgebung von Palermo auf Sicilien erbeutete Exemplare. Trotzdem die bisher undeterminiert gebliebene Sammlung fast nur weit verbreitete mediterrane Arten enthält, scheint es mir doch am Platze zu sein, nebst der Beschreibung der neuen obengenannten Varietät ein Verzeichnis der gefundenen Arten zu veröffentlichen.

Umgebung Tunis, April 1913.

Odontotarsus grammicus L. — 1 St.

Ancyrosoma albolineatum F. — 1 St.

Carpocoris fuscispinus Boh. — 2 St.

Codophila varia F. — 4 St.

Holcogaster fibulata Germ. — 1 St.

Eurydema festivum L. — 1 St.

Nezara viridula L. var. *torquata* F. — 1 St.

Haploprocta sulcicornis F. — 2 St.

Coreus bos Dohrn. — 2 St.

Centrocoris variegatus Klti. — 2 St.

Camptopus lateralis Germ. — 1 St.

Spilostethus pandurus Scop. — 2 St.

Rhinocoris erythropus L. — 7 St.

Coranus aegyptius F. — 1 St.

192 Håkan Lindberg: *Dionconotus cruentatus* Brullé var. *sellatus* n. var.

Umgebung Palermo, Sicilien, Mai—Juni 1921.

Carpocoris fuscispinus Boh. — 1 St.

Centrocoris spiniger F. — 1 St.

Stenocephalus agilis Scop. — 1 St.

Camptopus lateralis Germ. — 2 St.

Rhinocoris erythropus L. — 1 St.

Calocoris trivialis Costa. — 8 St.

C. hispanicus Gmel. — 14 St.

C. norvegicus Gmel. — 2 St.

Dionconotus cruentatus Brullé

var. *sellatus* n. var. — 5 St.

Der Hauptform ähnlich, die schwarze Zeichnung der Flügeldecken doch mehr ausgebildet. So ist der hintere Teil des längs dem Suture ziehenden medianen Makel ausgebreitet, so daß die schwarze Zeichnung fast bis zum Seitenrande reicht, einen breiten Sattel in der Mitte der Flügeldecken, d. h. im hinteren Teil des Corium, bildend.

Holotype (No. 7531) im Zoologischen Museum der Universität Helsingfors.

Pachyzyphus lineellus Muls. — 2 St.

Macrotylus nigricornis Fieb. — 4 St.

Velia rivulorum F. f. macr. — 3 St.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Konowia \(Vienna\)](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Lindberg Hakan

Artikel/Article: [Dionconotus cruentatus Brullé var. sellatus n.var. 191-192](#)