

latus (Sch). *Chlorophanus viridis* (T-S). *Tanymericus dilaticollis* (Ph palliatus (T-S). *Lepyrus palustris* (T-S), *capucinus* (Tr). *Leucosomus pedestris* (Sofia). *Coniocleonus nigrosuturatus* (Sch, Tr). *Mecaspis alternans* (Tr). *Cleonus piger* (Sch). *Adosomus roridus* [Trnovo, Sch]. *Lixus ascanii* [T-S], *flavescens* [Trnovo], *elongatus* [Trnovo, T-S], *cardui* [Trnovo]. *Larinus latus* und *jaceae* [Trnovo]. *Phytonomus punctatus* [Sofia]. *Echinocnemus confusus* [T-S]. *Coeliodes dryados* [Sch]. *Ceuthorrhynchus cochleariae* [T-S], *punctiger* [Sch]. *Cidnorrhinus 4-maculatus* [Sch]. *Baris artemisiae* [Trnovo]. *Sphenophorus parumpunctatus* [T-S, Trnovo]. *Balanobius crux* [Sofia]. *Anthonomus rubi* [Sch], *pedicularius* [Sch], *rufus* (Sch). *Acalyptus* var. *alpinus* (Sch). *Tychius cuprifer* (T-S), *Orchestes fagi* (Sofia), *tastaceus* (T-S). *Mecinus janthinus* (Trnovo). *Gymnetron amictum* (Sch), *asellus* (Trnovo). *Cionus Olivieri* und *pulverosus* (Trnovo). *Magdalis exarata* und *ruficornis* (Sch). *Apion ononiceola* (Sofia), *apricans* (T-S), *minimum* (T-S), *holosericeum* (Sch), *oieiae* (T-S). *Rhynchites aequatus*, *Paykulli* (Sch) *Bacchus* (Trnovo). *Attelabus nitens* (Sch). *Apoderus coryli* (Tr).

Lucanidae: *Lucanus cervus* (Sch). *Doreus parallelepipedus* (Sch) *Systemocerus caraboides* (Kaz).

Scarabaeidae: *Pleurophorus caesus* (Sch, Trnovo). *Oxyomus silvestris*. Tr. *Aphodius fimetarius* (Sch), *4-gut tatus* (Sch), *punctatosuleatus* var. *marginalis* (Sch), *inquinatus* (Kaz), *luridus* (Sch), *fossor* (Sch, Kaz), *varians* (Ph, Trnovo), var. *ambiguus* (T-S, Semlin, Sofia, Trnovo, Kaz). *Ochodaeus chrysomeloides* (Sch). *Ghaetonyx robustus* (Sofia). *Geotrupes spiniger* (Kaz, Tr), *vernalis* (Kaz). *Scarabaeus sacer* und *pius* (T-S). *Gymnopleurus mopsus* (Kaz). *Onthophagus amyntas* (Sch), *lemur* (Sch), *fureatus* (Kaz), *taurus* (Kaz, Ph, T-S), *oerlicicornis* (Kaz, Sch). *Caeobius histeroideus* (Kaz), *Schreberi* (Sch, Kaz), *Copris lunaris* (Tr, Kaz). *Rhizotrogus vernus* (Kaz, Tr), *pilicollis* (Kaz). *Melolontha melolontha* (Kaz, Tr, Trnovo), *vulgaris* (Kaz). *Hoplia farinosa* (Kaz). *Blitopertha hirtella* (Kaz), *lineolata* (Kaz), var. *flavipennis* (Kaz), *Anisoplia cyathigera* (T-S), *lota* [T-S], *segetum* [Kaz], var. *strominea* [T-S], var. *Zubkoffi* [T-S]. *Volgus hemipterus* [Sch, Kaz, Trnovo, Ph]. *Gnorimus nobilis* (Kaz, Trnovo). *Trichius sexualis* var. *biocittatus* (Sch), *zonatus* var. *gallieus* (Kaz, Sch, Trnovo). *Tropinota hirta* (Kaz). *Oxythyrea funesta* (Trnovo). *Cetonio aurata* (Sch, Tr). *Potosia hungarica* (Kaz), *vidua* (Kaz), *cuprea* var. *obscura* (Tr).

■ ■ ■ ■

Die Käferfauna des Oetztals (Tirol.)

J. Ammann und H. Knabl.

(Fortsetzung.)

Abkürzungen: A. = Ammann; Kn. = Knabl; Gredl. = Gredler; „Käfer von Tirol“ und 6 Nachträge, K. T. I. II. III. IV. V. VI. N.; Umh. = Umhausen; Längf. = Längenfeld; Söld. = Sölden; Ochsg. = Ochsengarten; Küh. = Kühteil Höhenkurort).

1. *Cercyon ustulatus* Preyssl. Oetz nicht häufig (A.).
2. *C. lugubris* Oliv. Ebenso wie vorige Art.

3. *C. impressus* Sturm. In Oetz und Ochseng. und wohl im ganzen Tale nicht selten.
4. *C. haemorrhoidalis* F. In Oetz nicht selten (A.), Umh. (Kn.).
5. *C. melanocephalus* L. Durch das ganze Oetztal häufig bis Gurgl [Ratter] und Vent.
6. *C. lateralis* Marsh. Sammelten wir im äußeren Tale (A.), Umh. (Kn.).
7. *C. unipunctatus* L. Im ganzen Tale überall, namentlich im Frühjahr häufig.
8. *C. quisquilius* L. In Oetz und Umgebung bis in eine Höhe von 2300 m noch im Schafdünger vorfindlich (A.).
9. *C. pygmaeus* Illig. In Ochseng. im Kuhmist (A.), Umh. (Kn.).
10. *C. nigriceps* Marsh. Wie voriger.
11. *C. granarius* Erich. In Oetz selten (A.).
12. *C. flavipes* Thunbg. Ebenfalls in Oetz gefunden (A.), Umh. (Kn.).
Megasternum boletophagum Marsh. Häufig im Mist, in Pilzen und faulenden Pflanzenstoffen.
1. *Cryptopleurum minutum* F. Diese Art gibt schon Gredl. vom Oetztale an; sie findet sich im frischen Dünger überall.
2. *Cr. crenatum* Panz. Seltener als *Cr. minutum* in Ochseng. (A.) und Umh. (Kn.).

Cantharidae.

Homaligus fontisbellaquei Geoffr. In Oetz und Ochseng. nicht selten (A.), Umh. (Kn.).

Dictiopterus Aurora Herbst. In Oetz, Ochseng. und Sölden in Gebirgswäldern nicht selten (A.), Umh. (Kn.).

Platyeis minuta F. Ziemlich häufig in Oetz, Ochseng. und Umh. besonders im Sommer an faulenden Baumstrünken (A.).

Lygistopterus sanguineus L. In Oetz selten, häufiger in Ochseng. und namentlich in Längf. an Föhrenstöcken (A.).

Lampyrus noctiluca L. In Oetz und Ochseng. im Juni häufig (A.), Umh. (Kn.).

Podabrus alpinus Payk. Im ganzen Tale häufig, Oetz, Ochseng., Längf., Sölden (A.), Umh. (Kn.).

1. *Cantharis abdominalis* F. Sammelten wir in Oetz und Sölden (A.), Umh. (Kn.).
2. *C. violacea* Payk. In Oetz, Ochseng. und Sölden nicht selten (A.), Umh. (Kn.).
3. *C. rustica* Fall. Durchs ganze Tal auf Wiesenblumen gemein.
4. *C. tristis* F. Nicht häufig auf den Bergen um Oetz und in Ochsg. (A.), Umh. von der Talsohle bis über die Waldgrenze nicht selten (Kn.).
5. *C. obscura* L. Oetz und Längf. häufig (A.), Umh. (Kn.).
6. *C. fibulata* Märk. Nicht selten in Oetz, Ochseng., Längf., Gurgl (A.), Umh. (Kn.).
7. *C. albomarginata* Märk. Seltener als vorige in Oetz (A.), Umh. (Kn.).
8. *C. nigricans* Müll. Im ganzen Tale häufig.
9. *C. pellucida* F. In Oetz nicht häufig (A.), Umh. (Gredl. Kn.).
10. *C. livida* L. nur die var. *rufipes* Herbst. Ueberall gemein.

11. *C. figurata* Mannh. In Umh. (Kn.).
12. *C. quadripunctata* Müll. Umh. auf Gras (Kn.).
13. *C. sudetica* Letzn. In Ochseng. selten (A.), Umh. (Kn.).
14. *C. rufa* L. In Oetz nicht selten (A.), Umh. (Kn.).
15. *C. discoidea* Ahr. Umh. selten (Kn.).
1. *Absidia pilosa* Payk. In Ochseng. (A.), Umh. bis zur Holzgrenze (Kn.).
2. *A. prolixa* Märk. In Oetz auf Bergen und in Ochseng. nicht selten (A.), Umh. (Kn.).
1. *Rhagonycha translucida* Kryn. In Oetz nicht häufig (A.), Umh. (Kn.).
2. *Rh. fulva* Scop. Im ganzen Tale auf Wiesenblumen sehr gemein.
3. *Rh. maculicollis* Märk. In Kühteil und Niedertheil bei Umh. hochalpin nicht selten (A.).
4. *Rh. limbata* Thoms. In Oetz auf blühenden Sträuchern im Frühjahr nicht sehr häufig (A.), Umh. häufig (Kn.).
5. *Rh. nigripes* Redt. Auf den Gebirgshöhen des ganzen Tales, so in Oetz, Ochseng., Kühteil (A.), Gurgl (Ratter), Umh. (Kn.) (determ. Gyll.).
6. *Rh. atra* L. In Ochseng. nicht sehr häufig (A.), Umh. (Kn.).
7. *Rh. Redtenbacheri* Gglb. Umh. (Kn.).
- Pygidia denticollis* Schumm. Ochseng. und Umh. nicht selten (Kn.).
1. *Malthinus biguttulus* Payk. In Umh. selten (Kn.).
2. *M. flaveolus* Payk. In Oetz, besonders auf blühenden Linden nicht selten (A.), Umh. (Kn.).
3. *M. frontalis* Marsh. In Oetz viel seltener (A.), Umh. (Kn.).
1. *Malthodes marginatus* Latr. In Umh. (Kn.).
2. *M. trifurcatus* Kiesw. In Gebirgen bis 2000 m Höhe in Oetz, Ochseng. (A.), Umh. (Kn.), Gurgl (Ratter).
3. *M. mysticus* Kiesw. var. *obscuriusculus* Dietr. Umh. (Kn.).
4. *M. guttifer* Kiesw. In Oetz und Ochseng. nicht häufig (A.), Umh. (Kn.).
5. *M. alpicola* Kiesw. In Umh. (Kn.).
6. *M. brevicollis* Payk. detto.
7. *M. fuscus* Walzl. detto.
8. *M. flavoguttatus* Kiesw. detto.
9. *M. atomus* Thoms. detto.
10. *M. maurus* var. *misellus* Kiesw. detto.
11. *M. hexacanthus* Kiesw. In Umh. häufig (Kn.).
12. *M. cyphonurus* Kiesw. Umh. 1 ♂ (Kn.).
13. *M. caudatus* Weise. Umh. 1 ♂ (Kn.). — Die *Malthodes*-Arten wie auch die anderen *Canthariden* aus Umh. hatte Regierungsrat Direktor Ganglbauer die Güte zu bestimmen.
- Troglops albicans* L. In Oetz (A.) und Umh. (Kn.) in Gärten nicht selten.
- Hypebaeus flavipes* F. In Oetz nicht häufig (A.).

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [1_1912](#)

Autor(en)/Author(s): Ammann Josef, Knabl Hermann

Artikel/Article: [Die Käferfauna des Oetztals \(Tirol\). 161-163](#)